



2024 年执业药师真题及答案解析《中药学专业知识（一）》

一、最佳选择题

1. 炮制后毒性降低，具有温肾暖脾作用，用于心腹冷痛、虚寒吐泻的饮片是

A. 白附片

B. 炮附片

C. 制川乌

D. 淡附片

E. 黑顺片

【答案】B

2. 炮制可以改变或缓和药物的性能，炮制后性味由辛温变为苦凉的饮片是

A. 炙甘草

B. 清半夏

C. 制何首乌

D. 胆南星





E. 熟地黄

【答案】D

3. 含强心苷类化学成分的药材是

A. 细辛

B. 牛黄

C. 合欢皮

D. 斑蝥

E. 香加皮

【答案】E

4. 结构类型属于有机胺类生物碱的化合物是

A. 小檗碱

B. 麻黄碱

C. 氧化苦参碱

D. 土的宁





E. 汉防己乙素

【答案】B

5. 能够增加难溶性药物溶出速度，提高生物利用度的剂型是

A. 蜜丸

B. 浓缩丸

C. 水丸

D. 滴丸

E. 水蜜丸

【答案】D

6. 藿香正气水的剂型是

A. 口服液

B. 流浸膏剂

C. 糖浆剂

D. 酏剂





E. 合剂

【答案】D

7. 粉末显微鉴别可见纤维鲜黄色，常成束，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，石细胞鲜黄色，类圆形，纺锤体形成是分枝状，壁厚，竖纹明显的药材是

A. 地黄

B. 肉桂

C. 黄柏

D. 黄连

E. 厚朴

【答案】C

8. 下列图示中药为半枝莲的是



A.





微信扫码刷题



免费约直播领资料



【答案】A

9. 下列图示中药为自然铜的是



扫码关注人力资源管理公众号



环球网校移动课堂 APP

环球网校 侵权必究



免费订阅考试提醒



免费约直播领资料

A.




B.



C.



D.





微信扫码刷题



免费约直播领资料

E.



【答案】A

10. 下列图示中药为决明子的是

A.



B.



C.




扫码关注人力资源管理公众号



环球网校移动课堂 APP

环球网校 侵权必究



【答案】B

11. 下列图示中药为知母的是





微信扫码刷题



免费约直播领资料



【答案】A

12. 中国药典规定以二苯乙烯苷和结合蒽醌为指标成分进行测定的药材是

- A. 秦皮
- B. 丹参
- C. 何首乌
- D. 虎杖



扫码关注人力资源管理公众号



环球网校移动课堂 APP

环球网校 侵权必究



E. 苦杏仁

【答案】C

13. 花蕾期由绿色转为红色时采摘晒干的药材有是

A. 金银花

B. 红花

C. 辛夷

D. 西红花

E. 丁香

【答案】E

14. 中国药典规定以异嗪皮啉、迷迭香酸为指标成分的药材是

A. 前胡

B. 补骨脂

C. 厚朴

D. 五味子





E. 肿节风

【答案】E

15. 中国药典规定二氧化硫残留不得过 10 mg/kg 的药材是

A. 党参

B. 白术

C. 天冬

D. 山药片

E. 天麻

【答案】D

16. 产地加工时要置沸水中略烫的药材是

A. 红参

B. 黄芪

C. 太子参

D. 白芍





E. 木香

【答案】C

17. 药用部位为块根入药的是

A. 百部

B. 天南星

C. 虎杖

D. 狗脊

E. 商陆

【答案】A

18. 我国历史上第一部药典性本草，也被誉为世界上第一部药典的是

A. 本草纲目

B. 神农本草经

C. 新修本草

D. 证类本草





E. 本草经集注

【答案】C

19. 五味是对人体不同效用的概率，效用为能泄，能坚，能燥的药味是

A. 酸

B. 苦

C. 甘

D. 辛

E. 咸

【答案】B

20. 关于煎膏剂质量要求和临床应用注意事项的说法，错误的是

A. 加入炼蜜或炼糖的量一般不超过清膏量的 3 倍

B. 因制备不当，贮有时易出现“返砂”

C. 成品中需要添加防腐剂

D. 应密封，贮存于阴凉处





E. 不溶物检查，不得有焦屑等异物

【答案】C

21. 中药在切制时通常需要进行水处理软化、适宜的软化方法有利于保证饮片质量采用淋法软化的药材是

A. 肉苁蓉

B. 川乌

C. 昆布

D. 荆芥

E. 海藻

【答案】D

22. 炉甘石洗剂处方：炉甘石 150g，氧化锌 50g，甘油 50ml，甲纤维素钠 2.5g，纯化水加至 1000ml，方中甲纤维素钠是用作

A. 抑菌剂

B. 助悬剂

C. 润湿剂





D. 絮凝剂

E. 助溶剂

【答案】B

23. 为不规则的厚片；外表面黑褐色或棕褐色，粗糙不平，有的可见须根痕或坚硬的细须根残留，切面具有网状或放射状纹理；体轻，质硬，纤维性；气微，味微苦而涩的饮片是

A. 藁本

B. 升麻

C. 威灵仙

D. 地榆

E. 羌活

【答案】B

24. 所含主要生物碱均为异喹啉类化合物的药材组别是

A. 山豆根和洋金花

B. 黄连和防己





C. 苦参和山豆根

D. 苦参和防己

E. 麻黄和黄连

【答案】B

25. 可用于确定分子量的鉴定方法是

A. 质谱

B. 紫外光谱

C. 红外光谱

D. 碳核磁共振谱

E. 氢核磁共振谱

【答案】A

26. 关于蒲黄炭炮制方法及作用的说法, 错误的是

A. 炒炭时应喷适量清水, 灭尽火星

B. 炒炭出锅后应摊开晾凉





- C. 应炒至焦黑色
- D. 宜采用中火炒炭
- E. 炒炭后止血作用增强

【答案】C

27. 连翘中主要化学成分连翘苷的结构类型是

- A. 有机酸类
- B. 香豆素类
- C. 倍半萜类
- D. 蒽醌类
- E. 木脂素类

【答案】E

28. 关于栓剂特点和质量要求的说法, 错误的是

- A. 除另有规定外, 水溶性基质栓剂的融变时限为 30 分钟
- B. 可避免药物对胃肠道的刺激





- C. 直肠栓以鱼雷形较为常用
- D. 栓剂塞入人体腔道后，在体温下应能够融化、软化或溶化
- E. 栓剂可用于局部治疗或全身治疗

【答案】A

29. 《中国药典》规定，以东莨菪碱和莨菪碱为含量测定指标成分的药材是

- A. 延胡索
- B. 千里光
- C. 天仙子
- D. 川乌
- E. 马钱子

【答案】C

30. 呈不规则的块状和脂膏状，具强烈而持久的特异臭气的药材是

- A. 血竭
- B. 乳香





C. 没药

D. 阿魏

E. 草果

【答案】D

31. 经黏膜给药的速效剂型是

A. 糊剂

B. 舌下片

C. 贴膏剂

D. 涂膜剂

E. 贴剂

【答案】B

32. 鉴别药材组织中草酸钙结晶的方法是

A. 加硫酸不溶解

B. 加钨红试液呈红色





- C. 加碘试液显棕色或黄棕色
- D. 加苏丹III试液呈橘红色或紫红色
- E. 加稀醋酸不溶解，加稀盐酸溶解而无气泡产生

【答案】E

33. 关于片剂临床应用注意事项的说法，错误的是

- A. 舌下片置于舌下含服，含后 30 分钟内不宜饮水
- B. 严禁直接服用或口含泡腾片
- C. 5 岁以下幼儿最好选用圈式中空的含片
- D. 应温开水整片送服缓释片
- E. 片剂不得掰开服用

【答案】E

34. 固体分散体中药物的分散状态不包括

- A. 无定形状态分散
- B. 微囊化分散





C. 微晶分散

D. 胶态分散

E. 分子分散

【答案】B

35. 关于药物透皮吸收影响因素的说法, 错误的是

A. 适度增加皮肤水合作用有利于药物的透皮吸收

B. 基质的 pH 大于弱碱性药物的 pK_a 时, 有利于药物的透皮吸收

C. 适度提高皮肤温度有利于药物的透皮吸收

D. 水溶性药物比脂溶性药物易于穿透皮肤

E. 药物在不同部位的皮肤透皮吸收存在差异

【答案】D

36. 取火柴杆浸入本品水浸液中, 使轻微着色, 待干燥后, 再浸入盐酸中立即取出, 置火焰附近烘烤, 杆上即显深红色的药材是

A. 五倍子





- B. 青黛
- C. 海金沙
- D. 冰片
- E. 儿茶

【答案】E

37. 绵马贯众的原植物属于

- A. 兰科
- B. 鳞毛蕨科
- C. 蓼科
- D. 蚌壳蕨科
- E. 百合科

【答案】B

38. 呈类圆形或椭圆形厚片：外表皮灰黄或灰棕色，切面黄绿色、黄棕色或棕褐色，内皮层环纹明显，散在“筋脉”小点的饮片是





- A. 黄精
- B. 泽泻
- C. 莪术
- D. 射干
- E. 土茯苓

【答案】C

39. 可作为眼用制剂黏度调节剂的是

- A. 硼酸
- B. 硼砂
- C. 三氯叔丁醇
- D. 苯酚
- E. 甲基纤维素

【答案】E





40. 颗粒剂粒度检查时, 除另有规定外, 不能通过一号筛与能通过五号筛的总和不得过

A. 15%

B. 8%

C. 5%

D. 18%

E. 10%

【答案】A

二、配伍选择题

【41-43】

A. 粗粉

B. 细粉

C. 中粉

D. 极细粉





E. 最细粉

41. 除另有规定外，内服散剂为

42. 除另有规定外，眼用散剂为

43. 除另有规定外，儿科或局部用散剂为

【答案】B、D、E

【44-45】

A. 红景天

B. 附子

C. 蛤蟆油

D. 太子参

E. 酸枣仁

44. 主产于青藏高原地区的药材是

45. 主产于河北，陕西地区的药材是

【答案】A、E





【46-47】

- A. 3'-羟基黄酮
- B. 4'-羟基黄酮
- C. 5'-羟基黄酮
- D. 7'-羟基黄酮
- E. 7, 4'-二羟基黄酮

46. 酸性最强的化合物是

47. 酸性最弱的化合物是

【答案】E、C

【48-50】

- A. 增稠剂
- B. 增塑剂
- C. 芳香矫味剂
- D. 遮光剂





E. 防腐剂

48. 明胶空心胶囊制备时, 甘油可作为

49. 明胶空心胶囊制备时, 琼脂可作为

50. 明胶空心胶囊制备时, 二氧化钛可作为

【答案】B、A、D

【51-53】

A. 人参皂苷 Rg1

B. 甘草酸

C. 黄芪甲苷

D. 知母皂苷 B11

E. 商陆皂苷 A

51. 结构为四环三萜化合物的是

52. 结构为甾体皂苷化合物的是

53. 结构含有葡萄糖醛酸的是





【答案】A、D、B

【54-56】

A. 10% (g/ml)

B. 20% (g/ml)

C. 45% (g/ml)

D. 65% (g/ml)

E. 85% (g/ml)

54. 合剂在添加蔗糖时, 除另有规定外, 含糖量不高于

55. 单糖剂含糖量为

56. 糖浆剂含糖量不低于

【答案】B、E、C

【57-58】

A. 狮子头

B. 蚯蚓头





C. 菊花心

D. 朱砂点

E. 云锦状花纹

57. 黄芪的性状鉴别术语是

58. 党参的性状鉴别术语是

【答案】C、A

【59-60】

A. 根

B. 根茎

C. 块根

D. 块茎

E. 鳞金

59. 银柴胡的药用部位是

60. 泽泻的药用部位是





【答案】A、D

【61-62】





微信扫码刷题



免费约直播领资料



E.

61. 图示中药为茜草的是

62. 图示中药为威灵仙的是

【答案】B、A

【63-64】



A.



B.



扫码关注人力资源管理公众号

环球网校移动课堂 APP



环球网校 侵权必究



63. 图示中药为肉桂的是

64. 图示中药为秦皮的是

【答案】A、B

【65-66】

A. 番泻叶





B. 枇杷叶

C. 淫羊藿

D. 侧柏叶

E. 罗布麻叶

65. 呈丝片状，上表面绿色、黄绿色或浅黄色，下表面灰绿色，网脉明显，中脉及细脉凸出，边缘具黄色刺毛状细锯齿，近革质，气微，味微苦的饮片是

66. 多分枝，小枝扁平，叶缩小鳞片状，交互对生，贴伏于枝上，深绿色或黄绿色，质脆，易折断，气清香，味苦涩，微辛的饮片是

【答案】C、D

【67-68】

A. 凝胶剂

B. 乳膏剂

C. 黑膏剂

D. 贴膏剂

E. 贴剂





67. 制剂基质由硬脂酸、单硬脂酸甘油酯、三乙醇胺、甘油、蒸馏水等组成，其剂型是

68. 制剂基质由植物油与红丹经高温炼制而成，其剂型是

【答案】B、C

【69-70】

A. 淡竹叶

B. 香薷

C. 车前草

D. 鱼腥草

E. 青蒿

69. 为不规则的段，根须状或直而长，叶片皱缩，表面灰绿色或污绿色，脉明显，可见穗状花絮的饮片是

70. 呈不规则的段，片、叶碎片浅绿色或黄褐色，叶脉平行，具横行小脉形成长方形的网格状，下表面尤为明显的饮片是

【答案】C、A





【71-72】

A. 远志

B. 羌活

C. 重楼

D. 知母

E. 巴戟天

71. 呈圆柱形，略弯曲，表面棕褐色至黑褐色，节间缩短，呈紧密隆起的环状，形似蚕，或节间延长，形如竹节状，节上有多数点状或瘤状突起的根痕及棕色破碎鳞片的药材是

72. 为扁圆柱形，略弯曲，表面灰黄色或暗灰色，具纹及横裂纹，质坚韧，断面皮部厚，紫色或淡紫色，易与木部剥离的药材是

【答案】B、E

【73-74】

A. 南沙参

B. 山药





C. 银柴胡

D. 徐长卿

E. 红参

73. 体轻，质松泡，断面黄白色，多裂隙的药材是

74. 质地坚实，半透明，呈角质样，质硬而脆的药材是

【答案】A、E

【75-76】

A. 棒剂

B. 条剂

C. 锭剂

D. 灸剂

E. 丹剂

75. 将艾叶捣捻成绒状，或另加其他药料捻制成卷烟状或其他形状，供熏灼穴位或其他患部的外用剂型是





76. 汞及某些矿物药为原料，经高温炼制的含氧化汞的外用剂型是

【答案】D、E

【77-79】

A. 石决明

B. 芒硝

C. 赭石

D. 石膏

E. 炉甘石

77. 煅淬后，能够降低苦寒之性，增强平肝止血之功效的是

78. 煅淬水飞后，变的纯净细腻，用于眼科以及外敷的是

79. 用萝卜煮水水炮后，能够提高纯度，缓和其寒之性的是

【答案】C、E、B

【80-82】

A. 鳖甲





B. 蛤蚧

C. 吴茱萸

D. 黄精

E. 延胡索

80. 砂烫醋淬后增强入肝消积，软坚散结作用，用于癥瘕积聚、月经停闭的中药是

81. 酒炙后可增强补肾壮阳作用，用于肾阳不足、精血亏损的中药是

82. 甘草汁煮后降低毒性，缓和燥性，用于厥阴头痛、寒疝腹痛的中药是

【答案】A、B、C

【83-85】

A. 二苯乙烯苷

B. 七叶苷

C. 苦杏仁苷

D. 大豆苷





E. 橙皮苷

83. 《中国药典》规定，郁李仁的含量测定指标成分是

84. 《中国药典》规定，陈皮的含量测定指标成分是

85. 《中国药典》规定，桃仁的含量测定指标成分是

【答案】C、E、C

【86-88】

A. 芒硝

B. 朱砂

C. 滑石

D. 硫黄

E. 炉甘石

86. 为块状集合体，呈不规则块状；灰白色或淡红色，表面粉性，无光泽，多孔，似蜂窝状；体轻；气微，味微涩的中药是

87. 为棱柱状、长方形或不规则块状及粒状；无色透明或类白色半透明；质脆，易碎，断面呈玻璃样光泽；气微，味咸的中药是





88. 为粒状或块状集合体，呈颗粒状或块片状；鲜红色或暗红色，条痕红色至褐红色，气微，味淡的中药是

【答案】E、A、B

【89-91】

A. 鳖甲

B. 蛤蚧

C. 吴茱萸

D. 黄精

E. 延胡索

89. 砂烫醋淬后增强入肝消积，软坚散结作用，用于癥瘕积聚、月经停闭的中药是

90. 酒炙后可增强补肾壮阳作用，用于肾阳不足、精血亏损的中药是

91. 甘草汁煮后降低毒性，缓和燥性，用于厥阴头痛、寒疝腹痛的中药是

【答案】A、B、C

【92-94】





A. 川乌

B. 苦参

C. 马钱子

D. 千里光

E. 防己


92. 《中国药典》规定, 含量测定指标成分为二萜双酯型生物碱的药材是


93. 《中国药典》规定, 限量检查成分为吡咯里西啶类生物碱的药材是

94. 《中国药典》规定, 含量测定指标成分为双稠哌啶类生物碱的药材是


【答案】A、D、B

【95-97】







B.



C.



D.



E.

95. 结构类型为香豆素类化合物的是

96. 结构类型为有机酸类化合物的是

97. 结构类型为黄酮类化合物的是

【答案】C、E、D

【98-100】





A. 葛根

B. 山豆根

C. 板蓝根

D. 北豆根

E. 南板蓝根

98. 呈类圆形的厚片；外表皮灰棕色或暗棕色，切面灰蓝色至淡黄褐色，中央有类白色或灰蓝色海绵状的髓，气微，味淡的饮片是

99. 呈不规则的厚片；粗丝或方块，切面浅黄棕色至棕黄色；质韧，纤维性强；气微，味微甜的饮片是

100. 呈不规则的圆形厚片；表面淡黄色至棕褐色，木部淡黄色，呈放射状排列，纤维性，中心有髓，白色；气微，味苦的饮片是

【答案】E、A、D

三、案例分析题

【101-103】





伤痛宁片是由制乳香、制没药、甘松、醋延胡索、细辛、醋香附、山柰、白芷等药物，经粉碎，过筛，混匀，加入淀粉和饴糖，制成颗粒，干燥，压制成片。具有散瘀止痛的功能，临床常用于跌打损伤、闪腰挫气的治疗。

101. 关于伤痛宁片质量要求的说法，错误的是

- A. 应进行微生物限度检查
- B. 应进行溶出度检查
- C. 应进行脆碎度检查
- D. 在 30 分钟内全部崩解
- E. 应进行重量差异检查

【答案】B

102. 方中醋延胡索所含主要生物碱的结构类型是

- A. 吡啶类
- B. 有机胺类
- C. 莨菪烷类
- D. 吗啡烷类





E. 异喹啉类

【答案】E

103. 关于醋香附炮制方法及作用的说法，错误的是

- A. 取净香附颗粒用米醋拌匀，闷润至醋被吸尽，文火炒干，取出晾凉
- B. 醋制时每 100kg 香附用米醋 20kg
- C. 香附醋制后可抑制其浮阳之性
- D. 醋香附疏肝止痛作用增强
- E. 在净制时应去除毛须及杂质

【答案】C

【104-107】

《中国药典》收载的小柴胡泡腾片、小柴胡片、小柴胡颗粒、小柴胡胶囊，处方由柴胡、姜半夏、黄芩、党参、甘草、生姜、大枣组成，具有解表散热、疏肝和胃的功效。用于外感病，邪犯少阳证，症见寒热往来、胸胁苦满、食欲不振、心烦喜呕、口苦咽干等。

104. 制剂处方中，姜半夏的炮制作用是





- A. 偏于祛寒痰，增强调和脾胃的作用
- B. 增强消肿散结的作用
- C. 增强降逆止呕的作用
- D. 长于息风定惊
- E. 长于燥湿化痰

【答案】C

105. 小柴胡泡腾片须进行的质量检查项目是

- A. 发泡量
- B. 释放度
- C. 溶出度
- D. 崩解时限
- E. 融变时限

【答案】D

106. 小柴胡颗粒含量测定指标成分黄芩苷的化学结构类型是





- A. 黄酮醇苷
- B. 黄酮苷
- C. 二氢黄酮苷
- D. 二氢黄酮醇苷
- E. 异黄酮苷

【答案】B

107. 柴胡舒肝丸含量测定指标成分厚朴酚、和厚朴酚的化学结构类型是

- A. 酯类
- B. 香豆素类
- C. 萜类
- D. 木脂素类
- E. 黄酮类

【答案】D

【108-110】





某男，43 岁。症见胁肋疼痛、胸闷痞满、食滞不清、呕吐酸水，脉弦。医师处以中成药柴胡舒肝丸，该蜜丸处方由茯苓、麸炒枳壳、豆蔻、酒白芍、甘草、醋香附、陈皮、桔梗、姜厚朴、炒山楂、防风、六神曲（炒）、柴胡、黄芩、薄荷、紫苏梗、木香、炒槟榔、醋三棱、酒大黄、青皮（炒）、当归、姜半夏、乌药、醋莪术组成。

108. 处方中六神曲为炒品，其生品的制法是

- A. 复制法
- B. 制霜法
- C. 发酵法
- D. 发芽法
- E. 拌衣法

【答案】C

109. 柴胡疏肝丸可制成小蜜丸或大蜜丸，除另有规定外，所含水分不得过

- A. 9.0%
- B. 10.0%





C. 12.0%

D. 13.0%

E. 15.0%

【答案】E

110. 本品显微镜检查，可见韧皮纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。处方中具有该特征的饮片是

A. 酒大黄

B. 黄芩

C. 茯苓

D. 炒槟榔

E. 甘草

【答案】B

四、多项选择题

111. 中药材质量直接关系到临床疗效，影响中药材质量的因素有





- A. 品种
- B. 产地
- C. 栽培
- D. 采收加工
- E. 贮藏养护

【答案】ABCDE

112. 属于动物生理产物的药材有

- A. 蛇蜕
- B. 珍珠
- C. 僵蚕
- D. 麝香
- E. 蟾酥

【答案】ADE

113. 性状鉴别横断面可见异常构造的药材有





- A. 牛膝
- B. 商陆
- C. 何首乌
- D. 大黄
- E. 茅苍术

【答案】 ABCD

114. 关于注射剂质量要求的说法，正确的有

- A. 乳状液型注射液不得用于椎管内注射
- B. 除另有规定外，注射剂应避光贮存
- C. 乳状液型注射液不得有相分离现象
- D. 输液剂应尽可能与血液等渗
- E. 混悬型注射液中原料药物粒径应控制在 15um 以下

【答案】 ABCDE

115. 液体制剂中属于多相分散体系的有





- A. 乳浊液
- B. 混悬液
- C. 溶胶
- D. 高分子溶液
- E. 溶液

【答案】 ABC

116. 通过胃肠道吸收而发挥治疗作用的口服片有

- A. 分散片
- B. 口崩片
- C. 咀嚼片
- D. 泡腾片
- E. 含片

【答案】 ABCD





117. 对症功效是指某些中药能缓解或消除疾病过程中出现的某些或某种症状，有助于减轻患者痛苦，防止病情恶化。下列属于对症功效的有

- A. 祛风湿
- B. 平喘
- C. 泻下
- D. 止血
- E. 通鼻窍

【答案】BD

118. 《中国药典》规定，测定挥发油含量的中药材有

- A. 穿心莲
- B. 肉桂
- C. 薄荷
- D. 龙胆
- E. 莪术





【答案】 BCE

119. 粉末显微鉴别特征中有油细胞的药材有

- A. 五味子
- B. 厚朴
- C. 当归
- D. 丁香
- E. 白术

【答案】 AB

120. 可采用黄酒炮制，并增强活血祛瘀作用的中药有

- A. 黄连
- B. 白芍
- C. 当归
- D. 丹参
- E. 黄芩





【答案】CD

真题持续更新中，敬请期待！

注意：以上内容根据考生回忆整理，仅供参考！

