

Balanitis



Es la hinchazón del prepucio y del glande del pene.

Causas

La balanitis casi siempre es causada por la higiene deficiente en los hombres que no se han hecho la circuncisión. Otras causas posibles incluyen:

- Enfermedades, como **artritis reactiva** y liquen escleroatrófico
- Infección
- Jabones fuertes
- No enjuagarse adecuadamente el jabón al bañarse
- Diabetes mal controlada

Síntomas

Los síntomas incluyen:

- Enrojecimiento del prepucio o del **pene**
- Otras erupciones en la punta del pene
- Secreción con olor fétido
- Dolor en el prepucio y el pene

Pruebas y exámenes

Su proveedor de atención médica puede diagnosticar el problema mediante solo un examen. Sin embargo, se pueden necesitar pruebas cutáneas para detectar virus, hongos o bacterias. También se puede necesitar una **biopsia de piel**.

Tratamiento

El tratamiento depende de la causa de la balanitis.

- La balanitis causada por bacterias se puede tratar con pastillas o cremas antibióticas.
- Las cremas esteroides pueden aliviar la balanitis que se presenta con enfermedades cutáneas.
- Si se debe a un hongo, se le receta una crema antimicótica.

En casos graves, la **circuncisión** puede ser la mejor opción. Si usted no puede retraer el prepucio para limpiarlo, es posible que necesite ser circuncidado.

