四海公考
SIHAIGONGKAO

2026下半年公考笔试

常识判断



君涛老师

常识判断。主要测查报考者在经济、文化、社会、生态、法律、科技等方面应知应会的基本知识（记忆）以及运用这些知识进行分析判断的基本能力（分析）。

地理部分考题逐年增大，难度变大。先记忆，后理解，再通过复盘真题掌握应用。

法律部分除了国考执法，题量不大，难度不高，微有瑕疵，优先价值观和逻辑做题。

【随堂练习-2026国考】某物流公司要优化长三角到乌鲁木齐的易腐货物运输路线，下列方案最可行的是：

A. 夏季采用陇海——兰新铁路运输利用沿线低温天气自然保鲜

B. 冬季选择长江——京杭大运河——黄河水运组合避开陆路交通拥堵

C. 春秋季采用铁路冷藏集装箱运输平衡运输成本与时效性

D. 全年优先使用连霍高速公路运输以追求最低的运输成本



学习地理一定要借助地图

（一）常见天体

恒星：恒星炽热的气体组成，能自己发光的球状或类球状天体。

会在核心进行核聚变，产生能量并以辐射的形式向外传输

行星：在椭圆轨道上环绕恒星运行的、近似球状的天体

开普勒发现了行星运动三大定律


卫星：环绕行星运行的天体


彗星：扁长轨道上绕着太阳运行的一种质量较小呈云雾状的天体

分为彗核、彗发、彗尾三部分，状如扫帚


黑洞：时空曲率大到光都无法从其事件视界逃脱的天体


海王星
天王星
土星
火星
木星
金星
地球
水星








CHART OF THE SKY CONSTELLATIONS
全天88星座图

（二）太阳


太阳概述：黄矮星，稳定的壮年期，质量占太阳系的99．87%


能量来源主要成分是氢和氦，能量来源是内部的核聚变反应

大气结构：光球层-太阳大气最底层，肉眼可见，地球光的主要来源

色球层-玫瑰色，日全食可见，或用特殊望远镜观测


日冕层-太阳大气最外层，日全食可见，或用特殊望远镜观测







太阳活动：黑子、耀斑、太阳风

活动影响干扰无线电短波通讯；地球出现磁暴现象；产生极光





（三）八大行星



公考最新资料、更新进度微信SKA674


1. 类地行星

水星：古称辰星，八大行星中最小且最靠近太阳的行星。在北半球，只能在凌晨或黄昏的曙暮光中看见水星。


金星：古称太白星，早晨出现于东方称启明星，晚上出现于西方称长庚星，自东向西自转。

地球：地球上具有适宜高级智慧生命生存和繁衍的温度、水、大气等条件

火星：古汉语中则因为它荧荧如火而被称为荧惑。星在视觉上呈现为橘红色是因为地表广泛普遍的分布着氧化铁的造成的，有稀薄的大气层。



（三）八大行星


类地行星
水星
0.05
0.056
金星
0.82
0.856
地球
1.00
1.000
火星
0.11
0.150
巨行星
木星
317.94
1 316.000
土星
95.18
745.000
远日行星
天王星
14.63
65.200
海王星
17.22
57.100
图 例
0.05 与地球的质量比
0.056 与地球的体积比

2. 巨行星

木星：距离太阳第五近的行星，也是太阳系中体积最大质量最大的行星，古代中国则称木星为岁星，取其绕行天球一周约为12年，与地支相同之故。

土星：中国古代人根据五行学说结合肉眼观测到的土星的颜色（黄色）来命名的，亦称之为镇星（常也写作填星）

3. 远日行星

天王星：体积在太阳系中排名第三（比海王星大），质量排名第四（小于海王星），几乎横躺着围绕太阳公转。

海王星：海王星在1846年9月23日被发现，是仅有的利用数学预测而非观测意外发现的行星。

【课后例2】下列诗句都涉及天体，其中说法错误的是（　）

A. “卧看牵牛织女星”所涉及的天体不属于太阳系

B. “每依北斗望京华”中的天体不包括北极星

C. “启明星在树梢头”中的行星公转轨道半径较地球更大

D. “岁星渐高辰星光”中的“岁星”属于气态巨行星

【随堂练习-2023国考】下列与古人出行有关的说法错误的是（　）

A. “开远门前万里堠”中的“堠”是一种路标，可以用来导航和计程

B. “乘舟而惑者，不知东西，见斗极则寤矣”中的“极”就是北极星

C. “东有启明，西有长庚”中指示方向的“启明”“长庚”是不同天体

D. “过洋牵星术”是通过测量星辰的高度指数来确定船只所处位置的

（四）月球

概述：没有生命、没有大气、重力仅及地面重力的六分之一

月球本身不发光，靠反射太阳光



新月： 农历初1、初2


上弦月：农历初7、初8；


上半夜、西半天

满月： 农历15、16

下弦月：农历22、23；

下半夜、东半天






周一
周二
周四
周五
周六
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31


引潮力


发生在早晨的高潮叫潮，发生在晚上的高潮叫汐

月球对地球的引潮力最大，太阳次之，其他天体影响很小















演进前寒武纪：

冥古宙、太古宙、元古宙；


地球诞生到距今5.41亿以前，占地球历史的90%，原始大气形成，出现蓝细菌等原核生物，进而演化成真核生物和多细胞生物，是重要的成矿期。




a


b

古生代：距今5.41亿年到2.52亿年，包括寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪。早期海水中有多种动物，如三叶虫、鹦鹉螺等，晚期的时候鱼类大量繁殖，形成了两栖类、爬行类，是成煤的重要时期。










中生代：距今2.52年到6600万年，分为三叠纪、侏罗纪和白垩纪。联合古大陆在三叠纪晚期开始解体，向各大陆现在的位置漂移。这一时期爬行动物盛行，尤其是恐龙在侏罗纪和白垩纪大量繁殖。中后期，爬行动物进化出羽毛，开始向鸟类发展；小型哺乳动物开始出现裸子植物极度兴盛，也是重要的成煤期。










新生代：距今6600万年至今，分为古近纪、新近纪、第四纪。各大板块漂移到现在位置，被子植物大量繁荣，哺乳动物快速发展，第四纪出现了全球数次冷暖交替，晚期出现了人类。










分层


地壳：地球表面固体岩石组成，大陆厚，海洋薄

地幔：上地幔存在软流层，岩浆发源地

地核：铁镍组成，外核熔融态，运动形成了地球磁场

公考最新资料、更新进度微信SKA674





自转：地球绕其自转轴的旋转运动，方向自西向东

1. 昼夜交替
2. 时差：
3. 地转偏向





图 1.2 地球自转示意


晨昏线
太
阳
光
黑
夜
夜半球
白
天
昼半球




自转：地球绕其自转轴的旋转运动，方向自西向东

1．昼夜交替

2．时差：全球分为24个时区，每个时区跨经度15度。相邻的两个时区相差一小时，东加西减。为了避免日期的紊乱，人们原则上把180度经线作为地球上昨天和今天的分界线。

3．地转偏向力：北半球向右，南半球向左



地球自转方向
E 180° W
150°
120°
90°
60°
30°
W0° E
东十一区
东十二区
西十二区
西十一区
西十区
西九区
西八区
西七区
西六区
西五区
西四区
西三区
西二区
西一区
中时区
东一区
东二区
东三区
东四区
东五区
东六区
东七区
东八区
东九区
东十区
东十一区
国际日界线
本初子午线
纽约
华盛顿
伦敦
莫斯科
开罗
北京
东京
从东十二区向东到西十二区，越过国际日界线，日期要减去一天。
从西十二区向西到东十二区，越过国际日界线，日期要加上一天。
5月1日
4月30日


公转：地球绕着太阳的运动，方向自西向东

1．昼夜长短的变化，正午太阳高度角变化。

2．四季的更替和五带的划分

黄赤交角-黄道面和赤道面的夹角







【课后例4】夏季某天我国两个城市的日月升落时间示意图，下列与之相关的说法正确的是（　）

A. 左图城市比右图城市纬度高　　B. 这一天是农历的二十左右

C. 左图城市比右图城市位置更靠东　　D. 两地的人所看到的月相是不同的





大气

大气组成：25千米以下的干洁空气中，氮气和氧气合占总体积的99%

氧是人类和其他生物维持生命活动所必需的物质；

氮是地球上生物体的基本元素。

二氧化碳是绿色植物进行光合作用的基本原料；使气温升高。

臭氧能吸收太阳光中的紫外线，对生物具有保护作用。

水的相变，产生云、雨、雾、雪等一系列天气现象

大气中的杂质作为凝结核，是成云致雨的必要条件





图2.2 干洁空气成分的体积分数（25千米以下）

对流层——大气层最底部，对流旺盛，雨雪云雾都发生在这一层。风是大气的水平运动；热岛效应

平流层——空气以水平运动为主，适合航行，有臭氧层


高层大气——有流星等，能反射无线电波




两种现象

厄尔尼诺——太平洋东部和中部的热带海洋的海水温度异常地持续变暖

拉尼娜——赤道太平洋东部和中部海表温度大范围持续异常变冷的现象





厄尔尼诺
厄瓜多尔
秘鲁
拉尼娜
厄瓜多尔
秘鲁
(°C)
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0
-0.3
-0.6
-0.9
-1.2
-1.5


公考最新资料、更新进度微信SKA674

岩石　岩浆岩——玄武岩、花岗岩


沉积岩——砂岩、页岩、石灰岩

变质岩——板岩、大理岩




玄武岩　　花岗岩



砂岩　　页岩　　石灰岩


板岩　　大理岩

地震

震源——地震开始发生的地点称为震源，其越浅破坏程度越大

震级——衡量地震大小的一种量度，增加1级能量增加约30倍



地震构造示意

四海公考
SIHAIGONGKAO

下课啦！同学们~

