黎曼猜想在素数分布中的确切位置

2026 年 10 月 24 日初稿

本篇说明 RH 作为数学命题所断言的内容、它能推出的素数分布结论，以及需要更强假设或至今与 RH 无关的问题。所引定理均注明出处；标为“猜想”的命题均未证明。

1 问题

在普及读物中，RH 常被描述为“质数的全部规律”，并与加密、人工智能乃至生命科学相联系。本篇的结论是：RH 是关于 ζ 零点位置的精确命题，等价于素数计数函数误差的最优阶；它在素数分布理论中处于中心位置，但**远不能解决素数的一切问题**。许多基本问题需要更强的假设，另有许多问题即使 RH 与广义 RH 都成立，也没有已知的解决途径。

关于“蕴涵”的说明 对尚未解决的命题 A, B，“A 不蕴涵 B”无法在真值意义上断言：若 B 为真，则任何 A 都蕴涵 B。本文所说“RH 不能解决某问题”，确切含义是：目前没有从 RH 出发的证明，并且由 RH 推出的已知结论在量上不足以得到它（参见学习笔记第 14 篇第 2 节）。

2 素数计数的三个层次

记 $\pi(x)$ 为不超过 x 的素数个数。关于 $\pi(x)$ 的问题可以分为三个层次。

1. **精确表示**。 Riemann 显式公式（本书第 14 章）把 $\pi(x)$（经 $J(x)$ 与 Möbius 反演）精确地表示为对 ζ 全部非平凡零点的求和。这是一个对偶关系：素数完全决定零点，零点也完全决定素数。它把素数计数问题完整地转化为零点问题，但没有确定零点的位置；在不知道 $\operatorname{Re}\rho$ 的情况下，它不给出任何定量估计。

2. **主项**。素数定理 $\pi(x) \sim \operatorname{li}(x)$（1896）。它依赖于 ζ 在 $\operatorname{Re} s = 1$ 上无零点；现有的误差估计 $\pi(x) - \operatorname{li}(x) \ll x \exp\bigl(-c(\log x)^{3/5}(\log\log x)^{-1/5}\bigr)$ 来自 Vinogradov–Korobov 型无零区域。

3. **偏差**。 $\pi(x)$ 与 $\operatorname{li}(x)$ 之差能有多大。这是 RH 所回答的问题：

   定理 2.1 (von Koch 1901，引用)**.** *RH* **成立当且仅当** $\pi(x) = \operatorname{li}(x) + O(\sqrt{x}\log x)$。

   在 RH 下还有显式形式：$x \geq 2657$ 时 $|\pi(x) - \operatorname{li}(x)| < \frac{1}{8\pi}\sqrt{x}\log x$（Schoenfeld 1976）。由 Littlewood（1914），$\pi(x) - \operatorname{li}(x) = \Omega_{\pm}\bigl(\sqrt{x}\log\log\log x/\log x\bigr)$，故 $\sqrt{x}$ 的量级除对数因子外不能再改进。

因此，就 $\pi(x)$ 而言，RH 是“误差阶最优”的命题：它确定素数在大尺度累计意义下有多么规则。素数分布的其他问题，涉及局部间距、算术结构或加法组合，不在这一陈述之内。

3 RH 能推出的素数分布结论

- **误差阶**。如上节，以及 $\psi(x) = x + O(\sqrt{x}\log^2 x)$。

- **相邻素数的间距**。Cramér（1920）在 RH 下证明 $p_{n+1}-p_n=O(\sqrt{p_n}\log p_n)$；显式常数的改进见 Dudek（2015）、Carneiro–Milinovich–Soundararajan（2019）。无条件的最好结果是 $p_{n+1}-p_n\ll p_n^{0.525}$（Baker–Harman–Pintz 2001）。
- **几乎所有短区间**。Selberg（1943）在 RH 下证明：若 $f(x)\to\infty$，则除去一个测度意义下密度为零的集合外，对所有 x，区间 $(x,x+f(x)\log^2 x]$ 中有素数。

3.1 一个界限：Legendre 猜想

Legendre 猜想断言：对每个正整数 n，n^2 与 $(n+1)^2$ 之间有素数。

命题 3.1. *由 RH 推出的间距界 $p_{n+1}-p_n=O(\sqrt{p_n}\log p_n)$ 不足以推出 Legendre 猜想。*

证明. 令 $x=n^2$。区间 $(n^2,(n+1)^2)$ 的长度为 $2n+1=2\sqrt{x}+1$。间距界给出的保证长度为 $C\sqrt{x}\log x$，当 x 足够大时远大于 $2\sqrt{x}+1$。因此仅凭该间距界，不能排除长为 $2\sqrt{x}+1$ 的区间中没有素数。 □

这说明：即使是“相邻平方数之间有素数”这样陈述简单的问题，也超出了 RH 所提供的精度。更强的 Cramér 猜想 $p_{n+1}-p_n=O(\log^2 p_n)$ 同样不能由 RH 推出。

4 需要广义 RH 的问题

广义 Riemann 猜想（GRH）断言全部 Dirichlet L 函数（以及更一般的 L 函数）的非平凡零点都在临界线上。GRH 是比 RH 强得多的假设。普及讨论中常把 GRH 的推论归于 RH。

- **等差数列中的素数**。在 GRH 下，对 $q\le x$ 一致地有 $\psi(x;q,a)=\frac{x}{\varphi(q)}+O(\sqrt{x}\log^2 x)$（Davenport, *Multiplicative Number Theory*, Ch. 20）。无条件地，Siegel–Walfisz 定理只对 $q\le(\log x)^A$ 成立；Bombieri–Vinogradov 定理在对 q 求平均的意义下给出与 GRH 相当的结论。RH 本身对此没有直接作用。
- **最小模素数**。模 q 剩余类 a 中的最小素数：无条件地 $\ll q^L$（Linnik；目前 $L\le 5$，Xylouris 2011）；在 GRH 下 $\ll q^{2+\varepsilon}$。
- **Artin 原根猜想**。非平方数 $a\neq -1$ 是无穷多个素数的原根。Hooley（1967）在 Kummer 域 Dedekind zeta 函数的 GRH 下证明了它；无条件地，Heath-Brown（1986）证明至多有两个素数例外。
- **三素数定理**。每个充分大的奇数是三个素数之和。Hardy 与 Littlewood（1923）在 GRH 下证明；Vinogradov（1937）无条件地证明了充分大的情形；Helfgott（2013）完成了全部奇数 ≥ 7 的证明。这是一个“在 GRH 下先得证、后来无条件解决”的例子。

5 RH 与 GRH 都不能决定的问题

以下问题，目前没有从 RH 或 GRH 出发的解决途径；其中的进展大多来自筛法与组合方法。

- **孪生素数猜想**。无穷多对素数相差 2。Zhang（2013）证明了有界间距，Maynard 与 Tao（2015）及 Polymath 项目把界缩小到 246；这些结果使用 Bombieri–Vinogradov 定理与筛

法，并不依赖 RH。若假设 Elliott–Halberstam 猜想（一个与 GRH 不同的分布猜想），间距可缩小到 12（Maynard）。

- **偶数 Goldbach 猜想**。每个大于 2 的偶数是两个素数之和。在 GRH 下只能证明例外集很小：不超过 x 的例外偶数至多 $O(x^{1/2+\varepsilon})$ 个（Hardy–Littlewood 1924）；GRH 不能推出猜想本身。
- **素数间距的极端值**。大间距的下界（Ford–Green–Konyagin–Maynard–Tao 2018）是无条件的组合结果；Cramér 猜想超出 RH 的范围（第 3.1 节）。
- **多项式取素数值**。例如 n^2+1 是否无穷多次为素数（Landau 问题之一）；与 RH 没有已知联系。
- **素数中的结构**。 Green–Tao 定理（2008）：素数中有任意长的等差数列。它的证明不使用 RH。
- **素数竞赛**。模 4 余 3 的素数"通常"多于余 1 的素数（Chebyshev 偏差）。Rubinstein 与 Sarnak（1994）对偏差的精确刻画需要 GRH 加上零点虚部线性无关的假设（LI）；GRH 本身不够。

6 汇总

问题	与 RH 的关系
$\pi(x)$ 的精确表示	已由显式公式给出，与 RH 无关
素数定理（主项）	已证明，依赖 $\operatorname{Re} s = 1$ 上无零点
$\pi(x) - \operatorname{li}(x)$ 的最优阶	**等价于 RH**
相邻素数间距 $O(\sqrt{p}\log p)$	由 RH 推出
Legendre 猜想、Cramér 猜想	超出 RH 所给精度
等差数列中素数的误差、最小模素数	需要 GRH
Artin 原根猜想	需要 GRH（Hooley）
三素数定理	曾需 GRH，现已无条件证明
孪生素数、偶数 Goldbach	RH 与 GRH 均无已知途径
素数竞赛的精确偏差	需要 GRH 与 LI
素数中的长等差数列	已证明，不依赖 RH

7 与计算和应用的关系

- **加密**。RSA 等方案的安全性基于大整数分解的计算困难。RH 是关于素数分布的命题，不提供分解算法；它的证明或否证都不会直接改变这些方案的安全性。
- **素性检验**。 Miller（1976）的确定性素性检验以 GRH 为前提（Bach 1990 给出显式界）。AKS 算法（2004）无条件地给出多项式时间的确定性检验，使这一依赖不再必要。
- **计算 $\pi(x)$**。实际计算 $\pi(x)$ 使用组合方法（Meissel–Lehmer、Lagarias–Miller–Odlyzko）或基于 ζ 积分的解析方法，都不以 RH 为前提。

- **物理**。零点间距的统计与随机矩阵理论（GUE）一致，后者也描述重原子核能级的统计（学习笔记第 15 篇）。这是统计规律上的深刻对应，并不意味着 RH 与生物或医学问题有关。

8 RH 作为可证伪而高度确证的假说

RH 等价于一个 Π_1 型算术命题（学习笔记第 13 篇）：若它不成立，存在有限的反例，可以由计算严格证实。在这一意义上它是可证伪的。高度 $3 \cdot 10^{12}$ 以下的全部零点已被严格证明位于临界线上（第 12 篇），零点比例、零点密度、函数域类比与随机矩阵统计也都与 RH 相容（第 15 篇）。以实验科学的标准衡量，RH 是一个经受了大量严格检验而未被证伪的假说，其确证程度不亚于物理定律。

但数学的标准不同。实验科学相信一条定律，前提是检验覆盖了它起作用的范围；而控制零点局部行为的量随 $\log\log T$ 变化，现有数据只覆盖 $\log\log T \le 3.4$（第 12 篇），数论中也有 Pólya、Mertens 猜想与 $\pi(x) < \mathrm{li}(x)$ 在大范围验证后失效的先例。因此，RH 在实验科学的意义上高度确证，在数学的意义上仍是猜想。两种身份并不矛盾。

9 结论

1. RH 是一个精确的数学命题：ζ 的非平凡零点都在临界线上；等价地，$\pi(x)$ 偏离 $\mathrm{li}(x)$ 的阶为 $\sqrt{x}\log x$。
2. 显式公式已经把素数计数完全转化为零点问题；RH 回答的是这一转化之后的误差阶。
3. RH 不能解决素数的一切问题：局部间距（Legendre、Cramér 猜想）、等差数列中的分布（需要 GRH）、加法与模式问题（孪生素数、Goldbach）都不在它的范围内。
4. RH 的特殊地位在于它是“零点位置决定误差阶”这一机制的原型，这一机制在 L 函数理论中反复出现；这是方法上的中心地位，而不是对素数分布的全面解答。

参考

- H. von Koch, Sur la distribution des nombres premiers, *Acta Math.* 24 (1901)；L. Schoenfeld, Sharper bounds for the Chebyshev functions $\theta(x)$ and $\psi(x)$ II, *Math. Comp.* 30 (1976)。
- H. Cramér, Some theorems concerning prime numbers, *Ark. Mat. Astr. Fys.* 15 (1920)（RH 下的间距界）；H. Cramér, On the order of magnitude of the difference between consecutive prime numbers, *Acta Arith.* 2 (1936)（Cramér 猜想）；A. Selberg, On the normal density of primes in small intervals, and the difference between consecutive primes, *Arch. Math. Naturvid.* 47 (1943)。
- R. C. Baker, G. Harman, J. Pintz, The difference between consecutive primes II, *Proc. London Math. Soc.* 83 (2001)。
- H. Davenport, *Multiplicative Number Theory*, 3rd ed., Springer, 2000（等差数列中的素数、Bombieri–Vinogradov 定理）。

- C. Hooley, On Artin's conjecture, *J. reine angew. Math.* 225 (1967)；D. R. Heath-Brown, Artin's conjecture for primitive roots, *Quart. J. Math.* 37 (1986)。
- H. A. Helfgott, The ternary Goldbach problem, 2013/2015, https://arxiv.org/abs/1501.05438。
- Y. Zhang, Bounded gaps between primes, *Ann. of Math.* 179 (2014)；J. Maynard, Small gaps between primes, *Ann. of Math.* 181 (2015)。
- B. Green, T. Tao, The primes contain arbitrarily long arithmetic progressions, *Ann. of Math.* 167 (2008)。
- M. Rubinstein, P. Sarnak, Chebyshev's bias, *Experiment. Math.* 3 (1994)。
- M. Agrawal, N. Kayal, N. Saxena, PRIMES is in P, *Ann. of Math.* 160 (2004)。
- 本书第 14、15 章；学习笔记第 12–15 篇。