LABORATORIOS FARMACÉUTICOS DEL SUR S.A.
DOCUMENTO DECLARADO POR EL REGULADO

CTD Módulo 3 — Sección 3.2.S.4.3

Validación del Método Analítico — Pureza Rituximab

1. ALCANCE

El presente informe describe la validación del método analítico por SEC-HPLC para la determinación de pureza del IFA Rituximab (anticuerpo monoclonal quimérico anti-CD20) presente en RITUXAN-AR 500 mg, de acuerdo con ICH Q2(R1) y la Farmacopea Argentina.

2. PARÁMETROS DE VALIDACIÓN

Especificidad	Sin interferencias	Sin interferencias	SÍ
Linealidad (R^2)	≥ 0.990	0.999	SÍ
Exactitud (recuperación)	85 – 115%	102.8%	SÍ
Precisión (CV%)	≤ 15%	8.3%	SÍ
Robustez (CV%)	≤ 20%	5.4%	SÍ

3. CONCLUSIÓN

El método analítico por SEC-HPLC cumple con todos los parámetros de validación establecidos por ICH Q2(R1) y es apto para su implementación en el control de calidad de rutina del producto RITUXAN-AR 500 mg.

Elaborado por:	Farm. Ana González — Jefe/a de Control de Calidad
Revisado por:	Dr. Roberto Méndez — Director Técnico
Fecha:	29/06/2026