VACUNAS PATAGÓNICAS S.A.
DOCUMENTO DECLARADO POR EL REGULADO
CTD Módulo 3 — Sección 3.2.S.4.3
Validación del Método Analítico — Identidad Rituximab

1. ALCANCE

El presente informe describe la validación del método analítico por mapeo peptídico por LC-MS para la determinación de identidad del IFA Rituximab (anticuerpo monoclonal quimérico anti-CD20) presente en RITUXAN-AR 500 mg, de acuerdo con ICH Q2(R1) y la Farmacopea Argentina.

2. PARÁMETROS DE VALIDACIÓN

Especificidad	Sin interferencias	Sin interferencias	SÍ
Linealidad (R^2)	≥ 0.990	0.995	SÍ
Exactitud (recuperación)	85 – 115%	95.7%	SÍ
Precisión (CV%)	≤ 15%	5.0%	SÍ
Robustez (CV%)	≤ 20%	9.8%	SÍ

3. CONCLUSIÓN

El método analítico por mapeo peptídico por LC-MS cumple con todos los parámetros de validación establecidos por ICH Q2(R1) y es apto para su implementación en el control de calidad de rutina del producto RITUXAN-AR 500 mg.

Elaborado por:	Farm. Tomás Ledesma — Jefe/a de Control de Calidad
Revisado por:	Bioq. Daniela Ríos — Director Técnico
Fecha:	29/04/2026