VITALWERTE · SAUERSTOFFSÄTTIGUNG

SPO_2. WIE VOLL IST DEIN BLUT?

Die Sauerstoffsättigung zeigt, wie viel Prozent des roten Blutfarbstoffs **Hämoglobin** mit Sauerstoff beladen sind – ein wichtiges Maß dafür, wie gut die Lunge Sauerstoff aufnimmt und der Körper die Organe versorgt.

NORMWERTE

IN %

PULSOXYMETRIE · FINGER ODER OHR


95-100 %



Gilt als normal – gemessen per Lichtsensor, ohne Blutprobe.

ARTERIELLE BLUTGASANALYSE · BGA

94-97 %



Normalbereich bei der Messung über eine arterielle Blutprobe.

WOZU EINE SAUERSTOFFMESSUNG?

5 GRÜNDE

01	LUNGENFUNKTION	Wie gut nimmt die Lunge Sauerstoff aus der Atemluft ins Blut auf?
02	LUNGENERKRANKUNGEN	Bei COPD, Asthma oder Lungenentzündung einen Mangel früh erkennen.
03	HERZPROBLEME	Ein schwaches Herz kann den Sauerstofftransport im Körper behindern.
04	SCHLAFSTÖRUNGEN	Bei Verdacht auf Schlafapnoe – bei Atemaussetzern kann der Blutsauerstoff absinken.
05	NOTFALL & INTENSIV	Schnelle, schmerzfreie Standardüberwachung im Rettungsdienst oder Krankenhaus.

MEHR HÄMOGLOBIN, MEHR SAUERSTOFF?

Ja – theoretisch. Ab einem gewissen Punkt führt es unter TRT aber zu einem gefährlichen Paradoxon.

01 · WARUM STEIGT DAS HÄMOGLOBIN?

TESTOSTERON
durch die Ersatztherapie (TRT)

→ EPO & MARK
regt EPO in den Nieren an und stimuliert direkt das Knochenmark

→ ERYTHROZYTEN
der Körper bildet mehr rote Blutkörperchen

→ HB & HKT ↑
Hämoglobin und Hämatokrit (Anteil fester Blutbestandteile) steigen

02 · SÄTTIGUNG VS. SAUERSTOFFGEHALT

HÄMOGLOBIN = TRANSPORTER

OHNE TRT

SpO_2 98 %



Jeder Transporter ist fast voll beladen.

MIT TRT · MEHR HB

SpO_2 98 %



Gleich voll – aber mehr Transporter unterwegs.

Die Sättigung (SpO_2) bleibt meist gleich, z. B. 98 % bei Gesunden – die vorhandenen Hämoglobinmoleküle werden weiterhin voll beladen.

Der absolute Sauerstoffgehalt steigt, weil mehr Hämoglobin unterwegs ist – derselbe Effekt, den Sportler mit Höhentraining oder illegalem EPO-Doping erzielen wollen.

03 · DAS PARADOXON

ZU VIEL DES GUTEN

DICKERES BLUT
Steigt der Hämatokrit zu stark, wird das Blut zähflüssiger und fließt langsamer.

WENIGER AN DEN ORGANEN
Mehr Transporter bringen dann nicht mehr Sauerstoff ans Gewebe – das Risiko für Thrombosen steigt.

REGELMÄSSIG KONTROLLIEREN
Hb und Hämatokrit unter TRT ärztlich überwachen lassen – ab über 54 % Hämatokrit wird die Therapie laut Leitlinien angepasst.

Diese Information ersetzt keine ärztliche Diagnose, Therapie oder individuelle Beratung. Eine Testosteronersatztherapie gehört in ärztliche Begleitung.