

— ◆ —

NUTRIÇÃO FUNCIONAL

Caseína A1

versus

A2

O que você precisa saber durante o tratamento

— ◆ —

Não é sobre lactose.

O problema é a caseína A1.

E essa diferença muda tudo no seu resultado.

MATERIAL ELABORADO POR

Dra. Thais Marten

NUTRICIONISTA FUNCIONAL INTEGRATIVA • CRN 13864

PARA ENTENDER DE VERDADE

Não é lactose — é caseína

PROBLEMÁTICA — EVITAR

Caseína A1

Presente no leite de vaca comum

PRESENTE EM

- ✗ Leite de vaca comum
- ✗ Queijos tradicionais
- ✗ Iogurtes convencionais
- ✗ Whey protein comum

POR QUE EVITAR — GERA BCM-7

- ✗ Inflamação intestinal
- ✗ Distensão abdominal e gases
- ✗ Alteração da microbiota
- ✗ Acne e inflamação sistêmica

Fica de fora durante toda a fase de modulação intestinal — sem exceções.

MELHOR TOLERADA — CRITÉRIO

Caseína A2

Presente em leites de outros animais

PRESENTE EM

- ✓ Leite de cabra
- ✓ Leite de ovelha
- ✓ Leite de búfala
- ✓ Queijos frescos (preferir)

POR QUE É MELHOR

- ✓ Não forma BCM-7
- ✓ Menor potencial inflamatório
- ✓ Melhor digestibilidade

Permitida com critério — observe a sua tolerância individual e priorize os leites vegetais sempre que possível.

◇ ATENÇÃO — ERRO MUITO COMUM

Produtos "sem lactose" ainda inflamam.

É comum pensar que o problema é a lactose — mas, na prática, o principal responsável é a caseína A1.

Produtos "zero lactose" continuam tendo caseína A1, e por isso continuam inflamando. Trocar apenas por versões "sem lactose" não resolve o problema.

DURANTE A MODULAÇÃO INTESTINAL

Estratégia do tratamento

◇ O MECANISMO — POR QUE A CASEÍNA A1 INFLAMA

A caseína A1 dá origem a um peptídeo chamado **beta-casomorfina-7 (BCM-7)**, capaz de atravessar a barreira intestinal e gerar inflamação sistêmica, com impacto sobre os hormônios femininos e a microbiota.

RETIRAR TOTALMENTE

Caseína A1 — zero

- ✗ Leite de vaca (qualquer versão)
- ✗ Queijos amarelos e maturados
- ✗ Iogurte convencional
- ✗ Whey protein comum
- ✗ Requeijão e creme de leite

PODE USAR COM CRITÉRIO

Caseína A2

- ✓ Leite de cabra
- ✓ Leite de ovelha
- ✓ Leite de búfala
- ✓ Iogurte e queijos frescos (A2)
- ✓ Observar tolerância individual

◇ PRIORIDADE — LEITES VEGETAIS

Enquanto isso, os leites vegetais são grandes aliados: não formam BCM-7 e oferecem boa variedade de sabores para o seu dia a dia. São as melhores alternativas durante toda a modulação.

- Leite de coco (preferência)
- Leite de amêndoas
- Leite de castanha de caju
- Leite de macadâmia
- Leite de aveia (sem glúten)
- Leite de arroz

COM CUIDADO,

Dra. Thais Marten

NUTRICIONISTA FUNCIONAL INTEGRATIVA · CRN 13864

Este material é informativo e exclusivo para pacientes. Não substitui avaliação e acompanhamento médico individualizado. Proibida a reprodução sem autorização.