



Guia de Medidas

O passo a passo para você avaliar a sua evolução



NUTRIÇÃO FUNCIONAL

MATERIAL ELABORADO POR

Dra. Thais Marten

NUTRICIONISTA FUNCIONAL INTEGRATIVA • CRN 13864

AVALIAÇÃO DE PROGRESSO

Peso corporal

O peso não é o melhor parâmetro para avaliar seus resultados, mas servirá para calcular suas necessidades nutricionais.

◇ FATORES QUE PODEM INFLUENCIAR O PESO

- ◇ Água que você bebeu nas últimas horas
- ◇ Alimentos que você ingeriu nas últimas horas
- ◇ A quantidade de sal
- ◇ Consumo de carboidratos (devido à água)
- ◇ Para as mulheres, período menstrual
- ◇ Uso de medicamentos corticoides
- ◇ Volume de fezes/urina
- ◇ Roupas que está vestindo
- ◇ Horário do dia da pesagem
- ◇ Dia da semana da pesagem
- ◇ Balanças diferentes
- ◇ Balanças mal calibradas

◇ COMO DIMINUIR ERROS NA PESAGEM

- ◇ Faça a pesagem sempre no mesmo dia da semana
- ◇ Use sempre a mesma balança
- ◇ Pese sempre no mesmo horário do dia
- ◇ Pese de preferência pela manhã, depois de ir ao banheiro, antes de consumir qualquer alimento e com o mínimo de roupas possível

Lembre-se: o peso não é o melhor parâmetro para acompanhar perda de gordura ou ganho de massa muscular. Quando subimos na balança, não conseguimos diferenciar o que é água, músculo, gordura ou alimento — ali, mostra-se apenas um número.

AVALIAÇÃO DE PROGRESSO

Medidas e circunferências

Para avaliar de forma adequada o seu progresso, além do espelho, dois recursos são muito úteis: as medidas de circunferência e as fotos evolutivas.

◇ COMO FAZER

- ◇ Tire as medidas das circunferências uma vez ao mês
- ◇ De preferência pela manhã
- ◇ Antes de consumir qualquer alimento ou água
- ◇ Com o mínimo de roupas possível

Como medir cada região



CINTURA

Posicione a fita no "meio do caminho" entre a última costela e o osso ilíaco — cerca de 1-2 dedos acima do umbigo. Fique em pé, ereta, respiração relaxada.



ABDOMINAL

Passa a fita métrica em um plano horizontal, exatamente por cima do seu umbigo.



QUADRIL

Meça na região de maior circunferência do quadril, geralmente na altura do meio do glúteo.



BRAÇO

Use a marquinha da vacina BCG como referência. Meça com o braço esticado e o músculo relaxado, na metade entre o cotovelo e o ombro.



COXA

Meça na região de maior circunferência da coxa. Se tiver uma pinta ou marca fixa, use-a como referência para repetir sempre no mesmo ponto.



PANTURRILHA

A maior circunferência normalmente fica de 4 a 5 dedos abaixo do joelho.

AVALIAÇÃO DE PROGRESSO

Fotos evolutivas

As fotos evolutivas mostram mudanças que a balança e até as medidas isoladas não capturam — por isso valem a pena entrar na sua rotina de acompanhamento.

◇ ROUPAS

Tire as fotos de biquíni (ou sunga) ou com um top e shorts — de preferência sempre com a mesma roupa.

◇ LUGAR

Tire as fotos sempre no mesmo local, de preferência em um fundo neutro e sem muitas coisas, assim a atenção fica só em você.

◇ LUZ E ÂNGULO

- ◇ Tire as fotos durante o dia — a iluminação natural é sempre melhor
- ◇ Tire uma foto sua de frente, de lado e de costas