

回顾

第二章 非线性方程 $f(x) = 0$ 的解法

2.1 引言

2.2 二分法与试值法

2.3 不动点迭代法 (收敛条件、收敛阶)

2.4 牛顿迭代法 (迭代格式、收敛阶)

2.5 割线法 (迭代格式、收敛阶)

2.6 迭代收敛的加速办法 (选讲)

多个非线性方程组情况呢？

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0 \end{cases}$$

本章先探讨最简单的情形

----线性方程组的求解

第三章 线性方程组 $Ax = b$ 的数值解法

3.1 引言

3.2 线性代数的基础知识

3.3 直接解法：

3.3.1 Gauss消去法

3.3.2 三角分解法

3.3.3 直接解法的误差分析

3.4 迭代解法

3.4.1 迭代法的基本概念

3.4.2 Jacobi迭代法

3.4.3 Gauss-Seidel迭代法

3.4.4 超松弛(SOR)迭代法（选讲）

3.4.5 共轭梯度法（选讲）

§ 3.1 引言

大量的科学与工程实际问题常常可以归结为求解含有多个未知量 x_1, x_2, \dots, x_n 的线性代数方程组求解。

即求：

$$\begin{cases} \alpha_{11}x_1 + \alpha_{12}x_2 + \dots + \alpha_{1n}x_n = \beta_1 \\ \alpha_{21}x_1 + \alpha_{22}x_2 + \dots + \alpha_{2n}x_n = \beta_2 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ \alpha_{n1}x_1 + \alpha_{n2}x_2 + \dots + \alpha_{nn}x_n = \beta_n \end{cases} \quad (3.1)$$

可以写为矩阵形式

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}.$$

解线性代数方程组的有效方法在计算数学和科学计算中具有特殊的地位和作用，可有效解决如弹性力学、电路分析、热传导和振动、以及社会科学及定量分析商业经济中的各种问题。

精确求解方法

方法1

$$Ax = b \Rightarrow A^{-1}Ax = A^{-1}b \Rightarrow x = A^{-1}b$$

举例说明

计算量为矩阵求逆

矩阵求逆的方法:初等行变换法, 伴随矩阵法, 高斯-约当法

方法2 Crammer法则

$$\det(A) \neq 0$$

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

其中 $|A|$ 是方程组系数矩阵对应的行列式

$|A_i|$ 是以右端变量向量 b 替代 A 的第 i 列所得矩阵的行列式

$$x_i = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i-1} & b_1 & a_{1i+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i-1} & b_2 & a_{2i+1} & \cdots & a_{2n} \\ & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni-1} & b_n & a_{ni+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}$$

§ 3.1 引言

运用**Cramer**法则，计算一个 n 阶行列式需要做 $(n-1)(n!)$ 次个乘法，求解上述方程所需乘除法的运算量大约为

$$N=(n+1) \times (n-1)(n!)+n$$

$$x_i = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i-1} & b_1 & a_{1i+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i-1} & b_2 & a_{2i+1} & \cdots & a_{2n} \\ & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni-1} & b_n & a_{ni+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}$$

因此,当线性方程组的阶数 n 较高时,

计算量太大，现实上不可行，

例如, $n=20$ 时, $N \approx 9.7 \times 10^{20}$, 如果采用每秒**十亿**次的个人计算机, 按每天工作24小时, 大约需要**3万年**。因此, 需要采用实用的数值计算方法来求解。

□ **快速、高效地数值求解线性方程组是数值线性代数研究中的核心问题，也是目前科学计算中的重大研究课题之一。**

□ 线性方程组的数值解法有：直接法和迭代法。

直接法： 只包含有限次四则运算。若在计算过程中都不发生舍入误差的假定下，计算结果就是原方程组的精确解。包括

- ✓ Gauss消元法
- ✓ 三角分解法

迭代法： 把方程组的解向量看作是某种极限过程的极限，从一个初始向量出发，按照一定的迭代格式，构造出一个趋向于真解的无穷序列。

- ✓ Jacobi迭代法
- ✓ Gauss-Seidel迭代法
- ✓ 超松弛(SOR)迭代法
- ✓ 共轭梯度法

Remark: 由于运算过程中舍入误差的存在，实际上直接方法得到的解也是方程组的近始解。

§ 3.2 线性代数的基础知识

一个 N 维实数向量 x 是 n 个实数的有序集合，通常写成坐标形式

$$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

其中 x_1, x_2, \cdots, x_n 称为 x 的坐标或分量。

向量运算：

相等、和、取负、差、标量乘积 cX , 线性组合

➤常用的几种向量范数:

① 1-范数: $\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$

设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$

② 2-范数: $\|\mathbf{x}\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} = \sqrt{(\mathbf{x}, \mathbf{x})}$

③ ∞ -范数: $\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$

非常
重要

上述3种向量范数统称为**P**-范数(或者Holder范数)

$$\|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \quad 1 \leq p < \infty$$

►三个重要不等式

1 三角不等式

$$\forall x, y \in R^n \quad ||x| - |y|| \leq \|x - y\|$$

证明: $\|x\| = \|x - y + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|$

$$\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\| \quad \|x\| - \|y\| \geq -\|y - x\|$$

同理 $\|y\| = \|y - x + x\| \leq \|y - x\| + \|x\|$

2 闵可夫斯基(Minkowski)不等式:

$$\left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{1/p}$$

3 柯西-施瓦茨(Cauchy-Schwartz)不等式:

$$(x, y)^2 \leq (x, x)(y, y) \quad \forall x, y \in R^n$$

或者

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^2 \right)^{1/2}$$

证明

令 $u = y - \frac{(x, y)}{\|x\|_2^2} x$ 由于 $(u, x) = 0$

可知 $\|u\|_2^2 = (u, u) = (u, y - \frac{(x, y)}{\|x\|_2^2} x) = (u, y)$
 ≥ 0

$$= (y, y) - \frac{(x, y)^2}{\|x\|_2^2} = \|y\|_2^2 - \frac{(x, y)^2}{\|x\|_2^2}$$

因此,

$$(x, y)^2 \leq \|x\|_2^2 \|y\|_2^2 = (x, x)(y, y)$$

§ 3.2 线性代数的基础知识

一个矩阵是数字按行列分布的矩形数组。一个矩阵有M行和N列，称为 $M \times N$ 矩阵。大写字母A表示矩阵，小写带下标字母 a_{ij} 表示构成矩阵的一个数。矩阵可表示为

$$A = [a_{ij}]_{M \times N}, \quad 1 \leq i \leq M, 1 \leq j \leq N$$

这里 a_{ij} 表示位于 (i, j) 的数。

矩阵运算：

相等、和、取负、差、标量乘积 cX , 线性组合

$$cA = [ca_{ij}]_{M \times N}, \quad 1 \leq i \leq M, 1 \leq j \leq N$$

$$pA + qB = [pa_{ij} + qb_{ij}]_{M \times N}, \quad 1 \leq i \leq M, 1 \leq j \leq N$$

矩阵乘

设 c 是一个标量, A, B 和 C 是矩阵, 而且对应的矩阵加法和乘法有定义, 则

$$(AB)C = A(BC) \quad \text{矩阵乘的结合律} \quad (12)$$

$$IA = AI = A \quad \text{单位矩阵} \quad (13)$$

$$A(B + C) = AB + AC \quad \text{左分配律} \quad (14)$$

$$(A + B)C = AC + BC \quad \text{右分配律} \quad (15)$$

$$c(AB) = (cA)B = A(cB) \quad \text{标量结合律} \quad (16)$$

矩阵满足分配率、结合率, 但不满足交换率。

例如: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$$

行列式

方阵 A 的行列式是一个标量值(实数),表示为 $\det(A)$ 或 $|A|$ 。如果 A 是 $N \times N$ 矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{N1} & a_{N2} & \cdots & a_{NN} \end{bmatrix}$$

则 A 的行列式表示为

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{N1} & a_{N2} & \cdots & a_{NN} \end{vmatrix}$$

尽管行列式的表示看起来像一个矩阵,但它的性质完全不同,行列式是一个标量值(实数)。

如果 $A = [a_{ij}]$ 是 1×1 矩阵,定义 $\det(A) = a_{11}$ 。如果 $A = [a_{ij}]_{N \times N}$, 其中 $N \geq 2$, 则让 M_{ij} 为 A 的 $(N-1) \times (N-1)$ 子矩阵的行列式,子矩阵是通过去掉矩阵 A 的第 i 行和第 j 列构成的。行列式 M_{ij} 称为 a_{ij} 的余子式。 A_{ij} 定义为 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, 称为 a_{ij} 的代数余子式。这样 $N \times N$ 矩阵 A 的行列式表示为

$$\det(A) = \sum_{j=1}^N a_{ij} A_{ij} \quad (\text{第 } i \text{ 行扩展}) \quad (19)$$

或

$$\det(A) = \sum_{i=1}^N a_{ij} A_{ij} \quad (\text{第 } j \text{ 列扩展}) \quad (20)$$

Matlab实现

MATLAB 函数 $\det(A)$ 和 $\text{inv}(A)$ 分别用来计算方阵 A 的行列式和逆(如果 A 是可逆的)。

例 3.11 使用 MATLAB 和推论(25)中的逆矩阵法, 分别求解例 3.6 中的线性方程组。

解: 首先通过证明 $\det(A) \neq 0$ (参见定理 3.4), 验证 A 是非奇异矩阵。

```
>>A=[0.125 0.200 0.400;0.375 0.500 0.600;0.500 0.300 0.000];
```

```
>>det(A)
```

```
ans=
```

```
-0.0175
```

然后根据推论(25), 可得到 $AX = B$ 的解是 $AX = B, X = A^{-1}B$ 。

```
>>X=inv(A)*[2.3 4.8 2.9]'
```

```
X=
```

```
4.0000
```

```
3.0000
```

```
3.0000
```

可通过检查 $AX = B$ 来验证此结果。

```
>>B=A*X
```

```
B=
```

```
2.3000
```

```
4.8000
```

```
2.9000
```

根据向量的1、2和 ∞ 范数，可得到如下3种常用的矩阵范数

记 $A = (a_{ij})_{n \times n}$

① 1范数: $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$ 列和范数

② ∞ 范数: $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ 行和范数

③ 2范数: $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_1} = [\rho(A^T A)]^{1/2}$

其中 λ_1 是 $A^T A$ 的最大特征值

非常
重要

$$\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$$

谱半径

例3.1: 给定矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

求矩阵A的1、2、 ∞ 范数。

$$\|A\|_1 = 4 \quad \|A\|_\infty = 5 \quad \|A\|_2 = 3.759$$

若A是实对称矩阵, 则 $\rho(A) = \|A\|_2$

3.3 直接解法--Gauss消去法

重要



研究求解有 N 个方程和 N 个未知数的一般方程组 $Ax=b$,
目标是运用初等变换构造一个等价的上三角方程组
 $Ux=y$.

如果两个 $N \times N$ 线性方程组的解相同，那么二者等价。根据线性代数中的定理可知，对一个给定方程组进行一定的变换，不能改变它的解。

注意：行变换和列变换不能同时执行

初等变换

- Interchanges（对调）交换：对调方程组的两行；
- Scaling（比例）交换：用非零常数乘以方程组的某一行；
- Replacement（置换）交换：将方程组的某一行乘以一个非零常数，再加入到另一行上。

3.3.1 Gauss消去法

转化为回代算法

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ -\frac{3}{2}x_2 = -\frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} &\text{从第二个方程解出 } x_2 = 1 \\ &\text{代入第一个方程, 得到 } x_1 = 1 \end{aligned}$$

消去法的思想

1. 将n元方程组的n-1个方程通过“消元”，形成一个与原方程等价的新方程组
2. 继续将n-1个方程通过“消元”，形成一个与之等价的新方程组
3. 直到最后一个方程为一元一次方程为止
4. 从最后一个方程中解出最后一个未知量，然后回代得到其它的解

消去法的基本步骤：消去、回代

重要

3.3.1 Gauss消去法过程

方程组 $Ax = b$ 的增广矩阵记为:

$$(A^{(0)} \quad b^{(0)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & a_{13}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} & \beta_1^{(0)} \\ a_{21}^{(0)} & a_{22}^{(0)} & a_{23}^{(0)} & \cdots & a_{2n}^{(0)} & \beta_2^{(0)} \\ a_{31}^{(0)} & a_{32}^{(0)} & a_{33}^{(0)} & \cdots & a_{3n}^{(0)} & \beta_3^{(0)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}^{(0)} & a_{n2}^{(0)} & a_{n3}^{(0)} & \cdots & a_{nn}^{(0)} & \beta_n^{(0)} \end{pmatrix}$$

将矩阵的第*i*行分别减去第一行的倍数 $l_{i1} = \frac{a_{i1}^{(0)}}{a_{11}^{(0)}}$, $i = 2, 3, \dots, n$, 得到

$$(A^{(1)} \quad b^{(1)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & a_{13}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} & \beta_1^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} & \beta_2^{(1)} \\ 0 & a_{32}^{(1)} & a_{33}^{(1)} & \cdots & a_{3n}^{(1)} & \beta_3^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(1)} & a_{n3}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} & \beta_n^{(1)} \end{pmatrix}$$

其中

$$a_{ij}^{(1)} = a_{ij}^{(0)} - l_{i1} a_{1j}^{(0)}$$

$$\beta_i^{(1)} = \beta_i^{(0)} - l_{i1} \beta_1^{(0)}$$

$$j = 2, 3, \dots, n$$

$$i = 2, 3, \dots, n$$

3.3.1 Gauss消去法过程

$$(A^{(k)} \quad b^{(k)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & \cdots & a_{1k}^{(0)} & a_{1,k+1}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} & \beta_1^{(0)} \\ & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & a_{kk}^{(k-1)} & a_{k,k+1}^{(k-1)} & \cdots & a_{kn}^{(k-1)} & \beta_k^{(k-1)} \\ & & & a_{k+1,k+1}^{(0)} & \cdots & a_{k+1,n}^{(k)} & \beta_{k+1}^{(k)} \\ & & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & & & a_{nn}^{(k)} & \beta_n^{(k)} \end{pmatrix}$$

计算关系式

$$l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}$$

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - l_{ik} a_{kj}^{(k-1)}, j = k+1, \dots, n$$

$$\beta_i^{(k)} = \beta_i^{(k-1)} - l_{ik} \beta_k^{(k-1)}, i = k+1, k+2, \dots, n$$

3.3.1 Gauss消去法过程

$$(A^{(n-1)} \quad b^{(n-1)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & a_{13}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} & \beta_1^{(0)} \\ & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} & \beta_2^{(1)} \\ & & a_{33}^{(2)} & \cdots & a_{3n}^{(2)} & \beta_3^{(2)} \\ & & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & & a_{nn}^{(n-1)} & \beta_n^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

回代

$$\begin{cases} x_n = \frac{\beta_n^{(n-1)}}{a_{nn}^{(n-1)}} \\ x_k = \beta_k^{(k-1)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k-1)} x_j, k = n-1, n-2, \dots, 1 \end{cases}$$

算法: Gauss消元法

求方程组 $Ax=b$ 的解.

输入: 增广矩阵 $A_{n \times (n+1)} = (A|b)$.

输出: 近似解 $x_k = a_{k,n+1} (k=1,2,\dots,n)$ 或失败信息.

消元过程

for $k = 1, 2, \dots, n-1$ do Step 1 - Step 4

N-1次

Step 1 寻找行号 i_k , 使得 $|a_{i_k,k}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{i,k}|, i = k, k+1, \dots, n$

Step 2 如果 $a_{i_k,k} \neq 0$, 则交换第 k 行和 i_k 行;

否则转 Step 7

算法: Gauss消元法 (续)

Step 3 for $i=k+1, \dots, n$ 计算 $l_{ik} = a_{ik} / a_{kk}$

N-k次

Step 4 for $j=k+1, \dots, n+1$ 计算 $a_{ij} = a_{ij} - l_{ik} a_{kj}$

N-k+1次

回代过程

Step 5 $x_n = a_{n,n+1} / a_{n,n}$

n-i+1次

Step 6 for $i=n-1, \dots, 1$ 计算 $x_i = (a_{i,n+1} - \sum_{j=i+1}^n a_{i,j} x_j) / a_{i,i}$

Step 7 Output (系数矩阵奇异); /*不成功*/ STOP.

高斯消去法运算量估计

1.消去算法运算量

分为 $n-1$ 步,第 k 步变换 $n-k$ 行:求倍数,再从 $n+1-k$ 个元素中减去第 k 行对应列的倍数 因此,所需要的乘除次数为:

$$N_1 = \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)(n-k+1) = \frac{n^3}{3} - \frac{n}{3}$$

已知 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

2.回代运算量

求 x_n 需做1次除法,求 x_{n-1} 需做1次乘法和1次除法,...,求 x_1 需 $n-1$ 次乘法和1次除法,因此所需乘除次数:

$$N_2 = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

因此, $N = N_1 + N_2 = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{n}{6}$, 即,运算量为 $o(n^3)$

例3.2

利用高斯消去法求解方程组:

$$\begin{cases} 6x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 12 \\ 12x_1 - 8x_2 + 6x_3 + 10x_4 = 34 \\ 3x_1 - 13x_2 + 9x_3 + 3x_4 = 27 \\ -6x_1 + 4x_2 + x_3 - 18x_4 = -38 \end{cases}$$

解:

$$\begin{cases} 6x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 12 \\ 12x_1 - 8x_2 + 6x_3 + 10x_4 = 34 \\ 3x_1 - 13x_2 + 9x_3 + 3x_4 = 27 \\ -6x_1 + 4x_2 + x_3 - 18x_4 = -38 \end{cases}$$

利用 $r_i = \frac{\alpha_{i1}}{\alpha_{11}} r_1$, $i=2, 3, 4$. 得

$$\begin{cases} 6x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 12 \\ -4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 10 \\ -12x_2 + 8x_3 + x_4 = 21 \\ 2x_2 + 3x_3 - 14x_4 = -26 \end{cases}$$

利用 $r_i = \frac{\alpha_{i2}^{(2)}}{\alpha_{22}^{(2)}} r_2$, $i=3, 4$. 得

$$\begin{cases} 6x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 12 \\ -4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 10 \\ 2x_3 - 5x_4 = -9 \\ 4x_3 - 13x_4 = -21 \end{cases}$$

利用 $r_i = \frac{\alpha_{i3}^{(3)}}{\alpha_{33}^{(3)}} r_3$, $i=4$. 得

$$\begin{cases} 6x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 12 \\ -4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 10 \\ 2x_3 - 5x_4 = -9 \\ -3x_4 = -3 \end{cases}$$

回代, 可得准确解为

$$\begin{aligned} & [x_1, x_2, x_3, x_4] \\ &= [1, -3, -2, 1]^T \end{aligned}$$

选主元以减少误差

由于计算机使固定精度计算，这样在每次算术计算中可能引入微小的误差。

例3.3： 值 $x_1 = x_2 = 1.000$ 是如下方程组的解

$$1.133x_1 + 5.281x_2 = 6.414$$

$$24.14x_1 - 1.210x_2 = 22.93$$

使用4位有效数字精度求解其近似值。

解：第2行减去第1行乘以倍数 $m_{21} = 24.14/1.133 = 21.31$ ，得到上三角线性方程组。使用4位有效数字精度计算，可得到新的系数，如下所示：

$$a_{22}^{(2)} = -1.210 - 21.31 \times 5.281 = -1.210 - 112.5 = -113.7$$

$$a_{23}^{(2)} = 22.93 - 21.31 \times 6.414 = 22.93 - 136.7 = -113.8$$

计算后的上三角线性方程组为

$$1.133x_1 + 5.281x_2 = 6.414$$

$$-113.7x_2 = -113.8$$

利用回代法可得 $x_2 = -113.8/(-113.7) = 1.001$ 和 $x_1 = (6.414 - 5.28 \times 1.001)/(1.133) = (6.414 - 5.286)/1.133 = 0.9956$ 。

该误差是由于倍数 $m_{21} = 21.31$ 的值。为改善该不足，尝试交换上述方程的第一行和第二行，来减少 m_{21} 的值。

使用4位有效数字精度计算和高斯消去法求解如下方程组

$$24.14x_1 - 1.210x_2 = 22.93$$

$$1.133x_1 + 5.281x_2 = 6.414$$

解：这次用第2行减去第1行乘以倍数 $m_{21} = 1.133/24.14 = 0.04693$ 。新的系数为

$$a_{22}^{(2)} = 5.281 - 0.04693 \times (-1.210) = 5.281 + 0.05679 = 5.338$$

$$a_{23}^{(2)} = 6.414 - 0.04693 \times 22.93 = 6.414 - 1.076 = 5.338$$

计算后的上三角线性方程组为

$$24.14x_1 - 1.210x_2 = 22.93$$

$$5.338x_2 = 5.338$$

利用回代法可得 $x_2 = 5.338/5.338 = 1.000$ 和 $x_1 = (22.93 + 1.210 \times 1.000)/24.14 = 1.000$ 。



思想

选主元策略的目的在于：每次消元之前，在剩余元素中选择绝对值最大的非零元素作为主元，然后经过换行换到主对角线上，进而消去列中的剩余元素。

算法: Gauss选主元消去算法

求方程组 $Ax=b$ 的解.

输入: 增广矩阵 $A_{n \times (n+1)} = (A/b)$.

输出: 近似解 $x_k = a_{k,n+1} (k=1,2,\dots,n)$ 或失败信息.

消元过程

for $k = 1, 2, \dots, n-1$ do Step 1 - Step 4

Step 1 寻找行号 i_k , 使得

Step 2 如果 $a_{i_k,k} \neq 0$, $|a_{i_k,k}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{i,k}|, i = k, k+1, \dots, n$

则交换第 k 行和 i_k 行; 否则转 Step 7

算法: Gauss列主元消去算法 (续)

Step 3 for $i=k+1, \dots, n$ 计算 $l_{ik} = a_{ik} / a_{kk}$

Step 4 for $j=k+1, \dots, n+1$ 计算 $a_{ij} = a_{ij} - l_{ik} a_{kj}$

回代过程

Step 5 $x_n = a_{n,n+1} / a_{n,n}$

Step 6 for $i=n-1, \dots, 1$ 计算 $x_i = (a_{i,n+1} - \sum_{j=i+1}^n a_{i,j} x_j) / a_{i,i}$

Step 7 Output (系数矩阵奇异); /*不成功 */ STOP.

Matlab源程序: GaussXuanzhuyuan.m

function X = GaussXuanzhuyuan(A,B)

%Input - A is an N x N nonsingular matrix

% - B is an N x 1 matrix

%Output - X is an N x 1 matrix containing the

% solution to $AX=B$.

%Initialize X and the temporary storage matrix C

[N N]=size(A);

X=zeros(N,1);

C=zeros(1,N+1);

%Form the augmented matrix: Aug=[A|B]

Aug=[A B];

for p=1:N-1

 %Partial pivoting for column p

 [Y,j]=max(abs(Aug(p:N,p)));

 %Interchange row p and j

 C=Aug(p,:);

 Aug(p,:)=Aug(j+p-1,:);

 Aug(j+p-1,:)=C;

Matlab源程序:

GaussXuanzhuyuan.m

if Aug(p,p)==0

 'A was singular. No unique solution'

 break

end

%Elimination process for column p

for k=p+1:N

 m=Aug(k,p)/Aug(p,p);

 Aug(k,p:N+1)=Aug(k,p:N+1)-

 m*Aug(p,p:N+1);

 end

end

%Back Substitution on [U|Y] using

Program 3.1

X=backsub(Aug(1:N,1:N),Aug(1:N,N+1));

作业3.1

求解方程组

$$1. \quad 2x_1 + 4x_2 - 6x_3 = -4$$

$$x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 10$$

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5$$

$$2x_1 + 4x_2 - 6x_3 = -4$$

$$3x_2 + 6x_3 = 12$$

$$3x_3 = 3$$

6. 求解抛物线 $y = A + Bx + Cx^2$ 的参数, 抛物线经过点(1,6), (2,5)和(3,2)。

算法与程序

GaussXuanzhuyuan.m

2. 使用程序 3.2 求 6 次多项式 $y = a_1 + a_2x + a_3x^2 + a_4x^3 + a_5x^4 + a_6x^5 + a_7x^6$ 的系数, 它经过点(0,1), (1,3), (2,2), (3,1), (4,3), (5,2), (6,1)。使用 plot 命令画出多项式, 标出给出的经过点, 并解释图中的误差。

§ 3.3.2 三角分解法 (LU分解)

非常
重要

本质

它是基本Gauss消元法的一种等价变形

在3.3.1节可以看到，求解上三角矩阵方程组很容易。现在介绍将给定矩阵A分解为下三角矩阵L和上三角矩阵U的乘积的概念，其中下三角矩阵L的主对角线为1，上三角矩阵U的对角线元素非零。

定义 3.4 如果非奇异矩阵A可表示为下三角矩阵L和上三角矩阵U的乘积

$$A = LU$$

则A存在一个三角分解。

如果 $|A| \neq 0$ 可三角分解，则 4×4 维矩阵表示如下，其中 $u_{kk} \neq 0$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ m_{21} & 1 & 0 & 0 \\ m_{31} & m_{32} & 1 & 0 \\ m_{41} & m_{42} & m_{43} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & u_{14} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & u_{24} \\ 0 & 0 & u_{33} & u_{34} \\ 0 & 0 & 0 & u_{44} \end{bmatrix}$$

定理3.1 如果非奇异矩阵 $A \in R^{n \times n}$ 存在三角分解，即存在矩阵 L 和 U 满足

$$A = LU$$

则有

$$\begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases}$$

下面讨论如何得到矩阵的三角分解。

构造下列矩阵的三角分解：

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & -1 \\ -2 & -4 & 5 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

解:通过将单位矩阵放在 A 的左边来构造矩阵 L 。对每个用来构造上三角矩阵的行变换,将倍数 m_{ij} 放在左边的对应位置。初始矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 & -1 \\ -2 & -4 & 5 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

用第 1 行消去矩阵 A 的第 1 列中 a_{11} 下面的元素。第 2 行和第 3 行分别减去第 1 行乘以倍数 $m_{21} = -0.5$ 和 $m_{31} = 0.25$ 。将倍数放到矩阵的左边相应位置,结果为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0.5 & 1 & 0 \\ 0.25 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 & -1 \\ 0 & -2.5 & 4.5 \\ 0 & 1.25 & 6.25 \end{bmatrix}$$

用第 2 行消去第 2 列中对角线下方的元素。第 3 行减去第 2 行乘以倍数 $m_{32} = -0.5$,再将倍数放入矩阵左边,则可得到矩阵 A 的三角分解:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0.5 & 1 & 0 \\ 0.25 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 & -1 \\ 0 & -2.5 & 4.5 \\ 0 & 0 & 8.5 \end{bmatrix} \quad (8)$$

L U

带状矩阵的分解

定义3.1 设 $A = (\alpha_{ij})$ 是 n 阶方阵,对小于 n 的正整数 p 和 q ,当 $j > i + q$ 或 $i > j + p$ 时,有 $\alpha_{ij} = 0$,则称 A 是具有上带宽 q 和下带宽 p 的带状矩阵.

以带状矩阵为系数矩阵的方程组称为带状方程组.

当 $p = q = 1$ 时称为三对角阵

$$T = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ & a_3 & b_3 & c_3 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & & a_n & b_n \end{pmatrix}$$

定理3.2 设 n 阶矩阵 A 有 LU 分解, $A = LU$,如果 A 是上下带宽分别为 q 和 p 的带状矩阵,则 L 是带宽为 p 的下三角阵, U 是带宽为 q 的上三角阵

由定理3.2知, 存在分解 $T=LU$

其中

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ l_2 & 1 & & \\ & l_3 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & l_n & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} \mu_1 & r_1 & & \\ & \mu_2 & r_2 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \mu_{n-1} & r_{n-1} \\ & & & & \mu_n \end{pmatrix}$$

求解三对角方程组 $Tx=d$, 其中 $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)^T$

由 $A=LU$ 可知, 将原方程分解为两个方程 $Ly=d$ $Ux=y$

得到计算 x 和 y 的公式

$$\begin{cases} y_1 = d_1 \\ y_k = d_k - l_k y_{k-1}, k = 2, 3, \dots, n \end{cases}$$

追的过程

$$\begin{cases} x_1 = y_n / \mu_n \\ x_k = \frac{1}{\mu_k} (y_k - r_k x_{k+1}), k = n-1, n-2, \dots, 2, 1 \end{cases}$$

赶的过程

以上解法称为追赶法

非常
重要

然而，存在非奇异矩阵A不能直接进行三角分解。
如下面的例3.4

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 4 & 8 & -1 \\ -2 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

非常
重要

证明: 设 A 存在一个直接 LU 分解, 则

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 4 & 8 & -1 \\ -2 & 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m_{21} & 1 & 0 \\ m_{31} & m_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$$

上式中右边的矩阵L和U相乘与对应的矩阵A的元素进行比较

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{11} = 1; u_{12} = 2, u_{13} = 6; \\ m_{21}u_{11} = m_{21} = 4, \\ m_{21}u_{12} + u_{22} = 8 \Rightarrow u_{22} = 0, \\ m_{21}u_{13} + u_{23} = -1 \Rightarrow u_{23} = -25; \\ m_{31}u_{11} = m_{31} = -2, \\ m_{31}u_{12} + m_{32}u_{22} = 3 \Rightarrow -4 = 3 \text{ error}, \\ m_{31}u_{13} + m_{32}u_{23} + u_{33} = 5; \end{array} \right.$$

引入如下置换矩阵的概念

定义 3.2

$N \times N$ 置换矩阵 P 是在每一行和每一列只有一个元素为 1, 而其他元素为 0 的矩阵。

$P = [p_{ij}]$ 的元素有如下形式:

$$p_{ij} = \begin{cases} 1 & j = k_i \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

例如, 下列 4×4 矩阵是一个置换矩阵:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

定理 3.3 如果 P 是一个置换矩阵, 则它是非奇异的, 且 $P^{-1} = P'$ 。

定理 3.4 如果 A 是非奇异矩阵, 则存在一个置换矩阵 P , 使得 PA 存在三角分解

$$PA = LU$$

定理的证明可参见高级线性代数教材。

如果将例3.4中的第2行和第3行进行交换，则得到的PA有一个三角分解. 此时， $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 计算PA 的乘积可得

$$PA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 4 & 8 & -1 \\ -2 & 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ -2 & 3 & 5 \\ 4 & 8 & -1 \end{bmatrix}$$

对PA进行LU分解，可得

$$\begin{aligned} PA &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ -2 & 3 & 5 \\ 4 & 8 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 0 & 7 & 17 \\ 0 & 0 & -25 \end{pmatrix} = LU \end{aligned}$$

Matlab实现

Matlab命令 $[L,U,P]=lu(A)$ 可得到下三角矩阵L，上三角矩阵U和上述定理中的置换矩阵P

```
>>A=[1 2 6 ;4 8 -1;-2 3 -5];
```

```
>>[L,U,P]=lu(A)
```

```
L=
```

```
    1.0000    0    0  
   -0.5000    1.0000    0  
    0.2500    0    1.0000
```

```
U=
```

```
    4.0000    8.0000   -1.0000  
    0    7.0000    4.5000  
    0    0    6.2500
```

```
P=
```

```
    0    1    0  
    0    0    1  
    1    0    0
```

```
>>inv(P)*L*U
```

```
    1    2    6  
    4    8   -1  
   -2    3    5
```

Matlab源程序：
Sanjiaofenjiefam

Matlab源程序: Sanjiaofenjiefafa.m

```
function X = Sanjiaofenjiefafa(A,B)
%Input   - A is an N x N matrix
%         - B is an N x 1 matrix
%Output  - X is an N x 1 matrix
%containing the solution to  $AX = B$ .
[N,N]=size(A);
X=zeros(N,1); Y=zeros(N,1);
C=zeros(1,N); R=1:N;
for p=1:N-1
    %Find the pivot row for column p
    [max1,j]=max(abs(A(p:N,p)));
    %Interchange row p and j
    C=A(p,:);
    A(p,:)=A(j+p-1,:);
    A(j+p-1,:)=C;
    d=R(p);
    R(p)=R(j+p-1);
    R(j+p-1)=d;
    if A(p,p)==0
        'A is singular. No unique solution'
        break
    end
end
```

```
%Calculate multiplier and place in
%subdiagonal portion of A
    for k=p+1:N
        mult=A(k,p)/A(p,p);
        A(k,p) = mult;
        A(k,p+1:N)=A(k,p+1:N)-
        mult*A(p,p+1:N);
    end
end

%Solve for Y
Y(1) = B(R(1));
for k=2:N
    Y(k)= B(R(k))-A(k,1:k-1)*Y(1:k-1);
end

%Solve for X
X(N)=Y(N)/A(N,N);
for k=N-1:-1:1
    X(k)=(Y(k)-A(k,k+1:N)*X(k+1:N))/A(k,k);
end
```

作业3.2

3. 对下列矩阵求解它的三角分解 L 和 U 。

$$(a) \begin{bmatrix} -5 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 6 \\ -5 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

4. 对下列矩阵求解它的三角分解 L 和 U 。

$$(a) \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & -2 \\ 1 & -2 & 7 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 7 \\ 4 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & -2 \end{bmatrix}$$

算法与程序

1. 使用程序 3.3 求解线性方程组 $AX = B$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 2 & -1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \\ -2 & -6 & -3 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

使用 MATLAB 中的 $[L,U,P] = \text{lu}(A)$ 命令检查得到的答案。

课堂作业

用LU分解法编程求解下列方程组（结果保留4位小数）

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 23 \\ 2x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 29 \\ x_1 - 2x_2 + 7x_3 = 0 \end{cases}$$

注：用QQ软件自带的作业功能上交课程作业
作业上交需在下周一下午上课前完成