# 运动的描述

# 德山书生

## 2014年5月15日

# 目 录

1 长度的测量	1
1.1 长度的单位	1
1.2 长度的生活经验	1
1.3 刻度尺	1
1.4 初中物理对估读的要求	3
1.5 关于误差的讨论	3
1.6 测量距离的方法	4
<b>2</b> 时间的测量	6
<b>2.1</b> 秒表的使用	7
2.2 计时的方法 (周期性的事件)	7
<b>3</b> 运动的描述	7
3.1 机械运动	7
3.2 参照物	8
4 运动的快慢	9
<b>4.1</b> 速度的生活常识	9
4.2 平均速度	9
4.3 距离—时间图	10
4.4 速度—时间图	12
5 总结	13
6. 颗库 A	15



敢于承认自己的无知也是一种智慧。

### 长度的测量

测量需要有标准,测量某个物理量时用来进行比较的标准量叫做单位。为了交流 的方便, 国际计量组织制定了一套国际统一的单位, 叫国际单位制。

长度的测量工具有:刻度尺、米尺、皮卷尺、游标卡尺、激光测距仪等。

长度的单位	
长度的国际单位是, 常用的国际单位及其符号有: 千米 (km)、分米 ()、厘米 (cm)、毫米 ()、微米 (μm )、纳米 ()。	问学生换算
问题: 1nm=rm , 1mm=μm	
长度的生活经验	
有些题目考学生对长度或者其他物理量的生活感知认识,这些题目并不难,但需要学生仔细认真。	
(2013 河南, 8, 2分) 为了解自己的身体状况,小丽做了一些测量,其中记录错误的是()	
A. 身高 16m B. 质量 40kg C. 体温 37°C D. 1min 心跳 75 次	
刻度尺	
使用刻度尺注意事项	
① 注意刻度标尺的零刻度线、最小和量程。	
② 测量时尺要沿着所测长度,尽量靠近被测物体,不用磨损的零刻度线。	


③ 读数时视线要与尺面 \_\_\_\_\_\_, 在精确测量时要估读到分度值的下一位。



视线?

④ "记",测量值由数字和组成,最末一位是值,包括估读值在内的测量值称为有效数字。
分度值
长度测量的精确程度是由刻度尺的分度值决定的,要根据需要达到的精确度选择刻度值和量程合适的刻度尺。比如只是测量身高,用分度值
<b>问题:</b> 用最小刻度值是 0.1 毫米的尺子去测量某钢丝的直径,下面是几个同学的记录,其中有效数字错误的是()
A. 0.52 毫米 B. 0.53 毫米 C. 0.518 毫米 D. 0.052 厘米
长度的估读
单位? 估读?
<b>问题:</b> 某同学以铅笔长为单位长,测得一桌子的长度为单位长的 5.6 倍,则桌子的长应记作,其中准确值为,估计值为。
问题:用刻度尺测出桌子的长度为 1.243m, 所用的刻度尺的分度值是,测量的准确程度达到。
(2013 湖北黄冈, 34, 3分) 图甲圆柱体直径为cm; 图乙是游码在天平标尺上的位置, 其表示的质量为g; 图丙温度计的读数是°C。





### 初中物理对估读的要求

初中物理大纲要求长度的测量是要估读一位的, 其他物理量都不做要求。

### 关于误差的讨论

用测量仪器测定待测物理量所得的数值叫测量值,任何一个物理量都有一个客观大小,这个客观值叫做真实值,真实值是不可测的。测量值和真实值之间的偏差叫做误差,我们不能消灭误差,但应尽量减小误差。误差的产生与测量仪器、测量方法、测量的人有关。

减少误差方法:多次测量求平均值、选用精密测量工具、改进测量方法,熟练实验技能等。

误差与错误区别:误差不是错误,错误不该发生能够避免,误差永远存在不能避免。

问题:小红想要知道从自己家到学校有多远的距离,于是她决定采用类比的方法。首先她知道学校的跑道有四百米,于是她进行了五次实验,实验的内容就是从跑道上走一圈统计所走的步数。所得结果如下:



实验次数	1	2	3	4	5
所用步数	884	857	853	871	884

那么请问小红平均走一步的距离是多少? 然后小红又测得从自己家走到学校需要走 8960 步。那么小红家到学校的距离是?

小红在这里进行了多次实验取平均值的方法,请问小红为什么要这么做?

#### 测量距离的方法

#### 直接拿尺子量

这个不用多说了。

#### 累计法

在生活中我们要测量某个微小的长度,可以采用将那个微小的长度累积变成一个很大的长度,这样再来测量。比如测量纸张的厚度我们可以先测量一本书的厚度,然后除以这本书包含的纸张数,这样我们就得到了这本书的一张纸的平均厚度(也就是 n 张纸 × 每张纸的厚度 = 书的总厚度);比如铜线的直径,我们可以将这段铜线绕在圆铅笔上紧密绕很多圈,这样我们便可以求出细铜丝的直径了(也就是 n 圈 × 细铜丝的直径 = 铜丝排布的总长度。)

此外还有用自行车测一段马路的长,可以先测出车轮的周长,然后计算自行车通过这段马路转了多少圈(这样马路的总长度 = 圈数 n× 自行车的车轮周长。)

(2012 山东潍坊, 23, 5 分) 蚊香生产者为了节约原料和用户使用方便,要根据蚊香的燃烧速度生产规格不同的各种蚊香。有一种蚊香如图所示,请你设计一个实验,测出该蚊香正常燃烧的速度。要求:

- (1) 写出所需要的器材
- (2) 说明测量方法






#### 间接法

问题:测量大楼或者高山的高度

小明想要测量某个大楼的高度,然后他拿了一根棍子,让这个棍子的影子正好落在大楼影子的末端重合。然后他测得这个一米长的棍子的影子长 (*l*1) 1m,测得从棍子到大楼的距离 (*l*2) 是 304m。那么请问这座大楼有多高?




#### 速度法(根据 s = vt)

问题:激光测距仪

1969 年 7 月 21 日阿波罗 11 号飞船的组员在月球上安置了复归反射器(如下图所示),可以将地球射出的激光平行返回到原射出点。这样就可以测得地球和月球之间的距离。这个实验的成果之一就是发现月球在以每年 3.8 厘米的速度远离地球。有一次测量从射出到受到返回的激光花了 2.56 秒,那么请问地球到月球的距离是 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_? (已知光速  $c=3\times 10^8 m/s$ )






#### 三角法 (测量大的距离)

探险家汤姆破解了最新的藏宝图,藏宝图的密码是两个废弃的金字塔,金字塔 A 上垂直放一面镜子,对着下午 4 点钟时候的太阳光,宝藏就在反射光所指的方向;

金字塔 B 上也要垂直放一面镜子,对着早上 9 点钟时候的太阳光,宝藏就在放射光所指的方向。汤姆马上就找到宝藏的方法了。请问汤姆是怎么做到的?



### 时间的测量

时间的测量工具有: 秒表、手表等等。 (生活中能够看时间的工具都能用来测量时间喽。)

别扯太远



时间的国际主单位是 \_\_\_\_\_(s);常用的单位有小时(h)分(min)等。 1h= 60min=360s.

#### 秒表的使用

秒表的分度值是多少?幸运的是初中阶段除了长度需要估读其他都不需要估读, 所以你读到达到多少秒就写多少秒喽。

那么什么是时间?

#### 计时的方法 (周期性的事件)

#### 生活中的时间

比如以太阳周期性升起计时一天。此外还有一年(叶子落下,花开花落),心跳 等等。这些时间的生活经验也可能考对错题。

#### 更加精确的周期性事件

单摆, 电磁波的振动频率。(比如我们的日常用电是 50Hz, 也就是 1s50 个周 期。这样一个周期就是 1/50s, 我们就可以用这个周期来计时。)

#### 速度法

 $(根据 t = \frac{s}{v})$ 

### 运动的描述

### 机械运动



#### 参照物

在研究物体的机械运动时,需要明确是以哪个物体为标准,这个作为标准的物体叫 \_\_\_\_\_。

(就坐火车或坐汽车的实际生活经验讲开去)

所以自然界一切物体都在运动,静止是相对的,我们观察同一物体是运动还是静止,取决于所选的\_\_\_\_。

(2013 广西南宁, 1, 2分) 2012 年 11 月 23 日,国产歼 -15 舰载机首次 在航空母舰"辽宁号"上成功起降。如图所示,飞机起飞时,若说该飞机上的飞行员是静止的,所选的参照物是(\_\_\_\_\_)

A. 航母 B. 该飞行员驾驶的飞机 C. 海水 D. 航母上的工作人员







### 运动的快慢

物体通过的路程和通过这段路程所需的时间的比值,	称为物体在这段路程或这段
时间内的。	
速度表示物体运动快慢的物理量,公式 $v=s/t$ , 国际	单位是米每秒(m/s)。

1m/s=3.6km/h (这个记住方便换算。)

问题: 下列四个选项中, 平均速度最大的是 ( \_\_\_\_\_)

- A. 航模飞行器以 11m/s 的速度飞行
- B. 汽车以 50km/h 的速度在公路上行驶
- C. 百米赛跑中运动员用 10s 时间跑完全程
- D. 从 30m 高出竖直下落到地面的物体用了 2.5s

#### 速度的生活常识

人走路的速度约为 3 ~ 4 公里每小时,跑步的速度约为 15 公里每小时,自行车的速度约为 30 公里每小时,摩托车的速度约为五六十公里每小时,汽车的速度最快约为一百多公里每小时,一般火车的速度和汽车的速度差不多的,超过二百公里每小时的是动车。

问题: 小汽车在高速公路上正常行驶, 它的速度最接近 ( \_\_\_\_\_)

A. 3m/s B. 30m/s C. 300m/s D. 3000m/s

(2013 贵州贵阳,	<b>15, 2</b> 分)据悉,	全程约 800km 的贵	:(阳)广(州)高速
铁路将于 2014 年建	建成通车, 列车全程	的行驶时间只需 4h	, 则列车这段路程的
平均速度为	_km/h。若仅考虑均	也理位置的关系,同	一列车从贵阳开到广
州比从广州开到贵阳	所消耗的能量要	(选填"大"	或"小")。

若学生不了解重 力势能和动能, 第二问可忽略。

### 平均速度

匀速直线运动的特点是速度大小不变,方向不变。变速直线运动的速度大小改变,方向不变。只能用平均速度——也就是该物体走过的总路程除以总的时间 (计算公式都是类似的,简单提一下即可。)




(2013 山东济南, 18, 2分) 如图为告诉摄影机拍摄的子弹射过柿子的照片。若子弹的平均速度是 900m/s,则子弹穿过柿子的时间大约为(\_\_\_\_\_)

这里可以(下瞬时速)

- A. 0.1min
- B. 0.1s
- C. 0.1ms
- D.  $0.1 \mu s$



(2013 山东烟台, 17, 2 分) 小明一家双休日驾车外出郊游, 在汽车行驶的过程中, 小明同学观察了一下速度及里程表盘如甲所示, 此时汽车的行驶速度为 \_\_\_\_\_。汽车行驶了半个小时后, 表盘的示数如图乙所示, 那么这段时间内汽车行驶的平均速度为 \_\_\_\_\_。






### 距离一时间图

我们在数学中学过一次函数,比如下面是描述一个物体的距离—时间图,你能从中看到什么?






从 0-2 秒物体在做什么运动? 从 2-4 秒是什么运动? 走了多远的距离? 速度是多少? 从 4-6 秒是什么运动? 走了多远的距离? 速度是多少? 整个过程又是什么运动? 走了多远的距离? 平均速度是多少?

(2012 上海, 7, 2 分) [难] 甲、乙两物体同时同地同方向开始做匀速直线运动,甲的速度大于乙的速度,它们的 s-t 图象为下图所示 a、b、c 三条图线中的两条,运动 5 秒甲、乙间的距离大于 2 米,则(\_\_\_\_\_)






#### (2011 黑龙江哈尔滨, 39, 2 分)


甲、乙两辆汽车在水平路面上同时向东行驶,路程—时间图象如图所示,则甲车的速度是 \_\_\_\_\_\_m/s;两车行驶过程中,若以甲车为参照物,乙车向 \_\_\_\_\_运动。

- A. 甲的 s-t 图一定为图线 a
- B. 甲的 s-t 图可能为图线 b
- C. 乙的 s-t 图一定为图线 c
- D. 乙的 s-t 图可能为图线 a



### 速度一时间图


速度-时间图是描述一个物体运动速度和时间的关系图,下面这幅图你会看吗?




在 0-4 秒是什么运动? 4-6 秒的时候 A 物体和 B 物体谁的速度快, 各是多少?

(2013 辽宁沈阳, 14, 2分) 甲、乙两个物体同时从同一地点向西做直线运动, 速度与时间关系如图所示。以甲为参照物, 乙向 \_\_\_\_\_\_做直线运动, 经过6s 甲乙两物体相距 \_\_\_\_\_\_\_m。







### 总结

现在我们已经学会了如何用**速度**这个概念来描述物体的运动的情况,其中涉及到了长度,时间,参照物等的概念。速度这一块大题主要以实验探究的形式展开。值得一提的是虽然初中并不讨论加速度这个概念,但常常有些题目实际上已经涉及到了。


**(2010 湖北黄冈, 23, 3 分) [难]** 物理学中将物体在单位时间内速度的增加量定义为加速度。依据该定义,若某物体在 t 时间内速度从  $v_1$  增加到  $v_2$ ,则加速度为  $\frac{v_2-v_1}{t}$ 。现有一小球从静止开始以  $3\text{m/s}^2$ 的加速度加速运动 2s,则 2s 末小球的速度为 ( \_\_\_\_\_\_)

A. 0 B. 2m/s C. 3m/s D. 6m/s



最后我们来通过这些大题来检验一下自己对这一章的理解程度。

(2011 江西, 23, 8分) 某物理兴趣小组利用带有刻度尺的斜面、小车和数字钟"测量小车的平均速度",如图所示,图中显示的是他们测量过程中的小车在甲、乙、丙三个位置及其对应时间的情形,显示时间的格式是"时:分:秒"。



(1) 请你根据图示完成下表。


	小车由甲至乙	小车由乙至丙	小车由甲至丙
路程 s/cm	26		
时间 <i>t/</i> s		4	
平均速度 $v$ (cm/s)			15

L			



### 题库 A


- 1. 妈妈用电动车送小明上学,途中妈妈提醒小明"坐好,别动!"。这个"别动"的参照物是(\_\_\_\_\_)
  - A. 电动车上的座位
  - B. 路旁的树木
  - C. 迎面走来的行人
  - D. 从旁边超越的汽车
- 2. 小明坐在行驶的列车内, 若说他是静止的, 则所选择的参照物是(\_\_\_\_\_)
  - A. 车窗 B. 铁轨 C. 路边的树 D. 在车内走动的乘务员
- 3. 一辆汽车沿平直的公路向西快速行驶,一个行人沿该公路的便道向西散步。以行人为参照物汽车(\_\_\_\_\_)
  - A. 向东运动
  - B. 向西运动
  - C. 静止不动
  - D. 无法确定
- 4. 机场周围不允许有鸟类飞行,以免撞毁飞机。这是因为(\_\_\_\_\_)
  - A. 以地面为参照物, 鸟的速度非常大
  - B. 以机场步行的人为参照物, 鸟的速度非常大
  - C. 以机场内的飞机为参照物, 鸟的速度很大
  - D. 以正在飞行的飞机为参照物, 鸟的速度很大
- 5. 甲、乙两位同学进行百米赛跑,假如把他们的运动近似看作匀速直线运动处理,他们同时从起跑线起跑,经过一段时间后他们的位置如下图所示,在图中分别作出在这段时间内两人运动路程 s、速度 v 与时间 t 的图像,正确的是(\_\_\_\_\_\_)






6.	为了减小测量的误差, 使测量结果更精确, 下列方法中错误的是 ()
	A. 进行多次测量取平均值
	B. 改进测量方法
	C. 更换更精确的测量工具
	D. 测量数据不合适时,可做适当的修改
	坐在逆水行驶的船中的乘客,我们说他静止是以下列哪种物体为参照物的)
	A. 河岸上的树 B. 迎面驶来的船 C. 船舱 D. 河水
_K;	空中加油机加油过程中,加油机、受油机沿同一水平方向以相同的速度行,以加油机为参照物,受油机是的;以地面为参照物,加油机的。
_	田


9. 甲、乙两辆汽车在水平路面上同时向东行驶,路程-时间图像如下图所示,则甲车的速度是 \_\_\_\_\_m/s; 两车行驶过程中,若以甲车为参照物,乙车向 \_\_\_\_\_运动。



**10**. 如下图所示,量筒的直径 d 为 \_\_\_\_\_cm。







- **12**. 小明同学在今年初中毕业升学体育考试 50m 跑项目中,取得 7s 的成绩。求:
- (1) 小明的平均速度;
- (2) 如果终点计时员听到发令枪才计时,则小明的成绩比他的实际成绩快多少秒? (已知声速为 340m/s,结果保留两位小数。)
- **13.** 一座大桥长 1.6km,一列长 200m 的火车以 15m/s 的速度通过此桥,火车完全通过此桥所需的时间为多少?