

# Лабораторная работа №2

Вариант №31

Товмасын Арман М3132

Функция:

$$f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{6} + x\right)$$

## Аналитический Метод

### 1. Получим формулу производной n-ого порядка для $f(x)$

Для начала найдем первые 4 производные

$$f'(x) = -\sin\left(\frac{\pi}{6} + x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6} + x + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$f''(x) = -\cos\left(\frac{\pi}{6} + x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6} + x + \pi\right)$$

$$f'''(x) = \sin\left(\frac{\pi}{6} + x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6} + x + \frac{3\pi}{2}\right)$$

$$f^4(x) = \cos\left(\frac{\pi}{6} + x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6} + x + 2\pi\right)$$

---

Докажем, что  $f^{(n)}(x) = \cos\left(\frac{\pi}{6} + x + \frac{\pi n}{2}\right)$  индукцией по  $n$

Пусть  $n = 1$ :

$$f'(x) = -\sin\left(\frac{\pi}{6} + x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6} + x + \frac{\pi}{2}\right)$$

Истина

Пусть для  $n = m$  истина. Докажем для случая  $n = m + 1$

$$f^{(m+1)}(x) = (f^{(m)}(x))' = \left(\cos\left(\frac{\pi}{6} + x + \frac{\pi m}{2}\right)\right)' =$$

$$= -\sin\left(\frac{\pi}{6} + x + \frac{\pi m}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6} + x + \frac{\pi m}{2} + \frac{\pi}{2}\right) =$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{6} + x + \frac{\pi(m+1)}{2}\right)$$

Что является также истиной

---

## 2. Распишем многочлен Тейлора n-ого порядка по степеням x

По формуле Тейлора:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^k(x_0) (x - x_0)^k}{k!}$$

Для нашей функции имеем многочлен Тейлора порядка  $n$  вида:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2}\right) \frac{x^k}{k!}$$


---

## 3. Выведем многочлен Тейлора n-ого порядка и сравним с П.2

$$\cos\left(\frac{\pi}{6} + x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \cos(x) - \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos(x) - \frac{1}{2} \sin(x) =$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \sum_{k=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]} \frac{(-1)^k \cdot x^{2k}}{(2k)!} - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\left[\frac{n-1}{2}\right]} \frac{(-1)^k \cdot x^{(2k+1)}}{(2k+1)!} = (*)$$

Однако заметим что

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot (-1)^k = \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi(2k)}{2}\right)$$

$$-\frac{1}{2} \cdot (-1)^k = \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi(2k+1)}{2}\right)$$


---

$$\begin{aligned}
 (*) &= \sum_{k=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]} \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi(2k)}{2}\right) \cdot \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\left[\frac{n-1}{2}\right]} \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi(2k+1)}{2}\right) \cdot \frac{x^{(2k+1)}}{(2k+1)!} = \\
 &= \sum_{k=0}^n \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2}\right) \cdot \frac{x^k}{k!}
 \end{aligned}$$

Получили тоже самое что и в П.2

---

#### 4. Оценим остаточный член формулы Тейлора

Используем остаточный член формулы Тейлора в форме Лагранжа

$$R_n(x, x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi) \cdot (x - x_0)^{n+1}}{(n+1)!}, \quad \xi \in (0, x)$$

Имеем следующие данные:

$$f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{6} + x\right)$$

$$a = -0.2 \quad \Delta_1 = 10^{-3} \quad \Delta_2 = 10^{-6} \quad x_0 = 0 \quad x = a \quad \xi \in (0, a)$$

Тогда

$$f^{(n+1)}(\xi) = \cos\left(\frac{\pi}{6} + \xi + \frac{\pi(n+1)}{2}\right)$$

Оценим  $|R_n(a)|$  сверху

$$\left| \cos\left(\frac{\pi}{6} + \xi + \frac{\pi(n+1)}{2}\right) \cdot \frac{a^{(n+1)}}{(n+1)!} \right| = (*)$$

Учитывая что:

$$\left| \cos\left(\frac{\pi}{6} + \xi + \frac{\pi(n+1)}{2}\right) \right| \leq 1$$

Получим:

$$(*) \leq \frac{a^{(n+1)}}{(n+1)!}$$

Найдем такие  $n_1$  и  $n_2$  чтобы выполнялось неравенство для  $\Delta_1$  и  $\Delta_2$

$$|R_{n_1}(a)| < \Delta_1$$

$$n = 1 \Rightarrow \frac{0.2^2}{2!} = \frac{2}{10^2} > \frac{1}{10^3}$$

$$n = 2 \Rightarrow \frac{0.2^3}{3!} = \frac{4}{3 \cdot 10^3} > \frac{1}{10^3}$$

$$n = 3 \Rightarrow \frac{0.2^4}{4!} = \frac{2}{3 \cdot 10^4} < \frac{1}{10^3}$$

Следовательно  $n_1 = 3$ . Найдем значение  $n_2$

$$|R_{n_2}(a)| < \Delta_2$$

$$n = 4 \Rightarrow \frac{0.2^5}{5!} = \frac{4}{15 \cdot 10^5} > \frac{1}{10^6}$$

$$n = 5 \Rightarrow \frac{0.2^6}{6!} = \frac{4}{45 \cdot 10^6} < \frac{1}{10^6}$$

Следовательно  $n_2 = 5$

Получим

$$n_1 = 3 \quad n_2 = 5$$

## Численный Метод

### 1. Построим графики $f(x)$ и многочленов Тейлора $1, 2, \dots, n_2$

```
In [40]: import numpy as np # Библиотека для работы с массивами чисел
import matplotlib.pyplot as plt # Библиотека для построения графиков
%matplotlib inline
```

```
In [41]: plt.style.use(["science", "notebook", "grid", "high-vis"]) # Стиль координатной плоскост
```


```
In [42]: # Функция возвращающая значения по данной нам функции
def function(x):
    return np.cos((np.pi / 6) + x)
```

```
In [43]: # Функция возвращающая n-ую производную нашей функции
def get_n_derivative(n):
    return np.cos((np.pi / 6) + ((np.pi * n) / 2))
```

```
In [44]: # Функция возвращающая многочлен Тейлора n-ого порядка
def taylor_polynom(x, n):
    result_sum = 0
    for k in range(n + 1):
        result_sum += (1 / np.math.factorial(k)) * get_n_derivative(k) * np.power(x, k)
    return result_sum
```

```
In [45]: X = np.arange(-5, 5 + 1) # Область определения
Y = function(X) # Область значений
```

```
In [46]: plt.figure(figsize=(20, 10))
plt.axvline(x=0, lw=2, color="black") # Построим x=0
plt.axhline(y=0, lw=2, color="black") # Построим y=0
plt.xlabel("$x$", fontsize=20) # Подпишем ось абсцисс
plt.ylabel("$f(x)$", fontsize=24) # Подпишем ось ординат
# Построим график основной функции
X_main = np.arange(-10, 10 + 1) # Возьмем побольше область определения
Y_main = function(X_main)
plt.plot(X_main, Y_main, "o--", lw=3, ms=8, label="Main Function")
plt.legend(loc="center left", bbox_to_anchor=(1, 0.5), edgecolor="black") # Отообразим л
plt.title("Main Function Plot", fontsize=25, fontweight="bold", verticalalignment="cente
plt.show()
```



```
In [47]: # Функция строящая график основной функции и многочлена Тейлора n-ого порядка
def get_nth_Taylor_plot(X_i, Y_i, n, i):
    global axes
    local_X = np.arange(-5, 5 + 1)
    ax_i = axes[i]
    ax_i.set_title(f"Taylor: n = {n}", fontsize=20) # Название у графика

    ax_i.set_xlabel("x", fontsize=20) # Лэйбл по оси Ox
    ax_i.set_ylabel(r"$f(x)$", fontsize=20) # Лэйбл по оси Oy
    ax_i.axvline(x=0, lw=1, color="black") # Построим x=0
    ax_i.axhline(y=0, lw=1, color="black") # Построим y=0
    ax_i.plot(local_X, function(local_X), label="Main Function") # График основной функц
    ax_i.plot(X_i, Y_i, label=f"Taylor: n = {n}") # График многочлена Тейлора n-ого поря
```

```
ax_i.set_ylim(-5, 5)
ax_i.legend()
```

```
In [48]: fig, axes = plt.subplots(5, constrained_layout=True)
fig.suptitle("Taylor Polynoms", fontsize=25, fontweight="bold", verticalalignment="cente
fig.set_figwidth(18)
fig.set_figheight(30)

get_nth_Taylor_plot(X, taylor_polynom(X, 1), 1, 0)





get_nth_Taylor_plot(X, taylor_polynom(X, 2), 2, 1)


get_nth_Taylor_plot(X, taylor_polynom(X, 3), 3, 2)

get_nth_Taylor_plot(X, taylor_polynom(X, 4), 4, 3)

get_nth_Taylor_plot(X, taylor_polynom(X, 5), 5, 4)
```

## Taylor Polynoms





## 2. Вычислим приближенные значения $f(a)$

In [49]: `a = -0.2`

In [50]: `taylor_polynom(a, 3)`

Out[50]: 0.9480382290420832

In [51]: `taylor_polynom(a, 5)`

Out[51]: 0.9480972974023355

## 3. Сравним приближенные значения с точным значением (вычисленным компьютером)

Для полинома 3-ого порядка, точность относительно машинного значения достигает 5 знаков после запятой

In [52]: `R_n1 = abs(function(a) - taylor_polynom(a, 3))`  
`R_n1`

Out[52]: 5.8990166041605896e-05

Для полинома 5-ого порядка, точность относительно машинного значения достигает 8 знаков после запятой

In [53]: `R_n2 = abs(function(a) - taylor_polynom(a, 5))`  
`R_n2`

Out[53]: 7.819421066201926e-08

Убедились что требуемая точность достигнута

```
In [54]: R_n1 < 10**(-3)
```

```
Out[54]: True
```

```
In [55]: R_n2 < 10**(-6)
```

```
Out[55]: True
```