


頸椎壓迫的治療？

項目	作用	時間	風險
藥物治療	消炎止痛、放鬆肌肉，緩解頸部不適	即時不持久	★
物理治療	緩解疼痛症狀，維持頸椎功能	緩慢漸進，2-3次/週，持續6-8週	★
頸椎牽引	緩解 椎間盤 壓力，恢復生理曲線狀態	緩慢漸進	★
注射治療	類固醇注射或是增生治療	快速緩解	★★
手術治療	神經減壓	快速緩解	★★★★

預防與居家復健運動

調整生活習慣

- 螢幕上緣與眼睛同高，距離約50–70公分
- 不低頭滑手機，不在床上看書
- 睡姿自然，側躺時保持頸椎直線



工作時正確姿勢



頸部和脊椎成直線

睡眠時正確姿勢

姿勢調整

坐姿下的烏龜頸姿勢調整→

眼睛平視正前方，想像有一條線從頭頂正上方往天花板延伸，身體隨著線的方向，往天花板方向慢慢挺直，眼睛始終維持平視正前方，此時胸口應呈現打開不縮胸的姿勢，並不過度挺腰，肩膀自然下垂不聳肩。



矯正訓練

深層頸部肌肉控制訓練

避免頭部前凸、頸椎前傾→

坐姿，頭和背部靠牆，將姿勢調整至標準狀態下，接著眼睛往斜下45度，嘴巴張開約2公分，接著做輕微幾雙下巴的動作，並維持10秒後，休息5秒，重複此循環10次。

