

- 您確定有糖尿病。
- 糖尿病不認真控制，保證日後心臟、腎臟、眼睛會壞掉，最終要洗腎、瞎掉。
- 您需要固定在一家醫院/診所追蹤回診。家醫科/內科/內分泌科/新陳代謝科都是適當的選擇。
- 您需要每天早飯前，使用血糖機測量血糖，並且把每天的數字記錄在一個固定的本子，供門診的醫師參考調藥。飯前血糖的目標數字為 80-130。若飯前血糖小於  $<80$ ，當天的血糖藥要暫停不吃。
- 門診追蹤會抽血測量“糖化血色素”(HbA1c)，這是一個代表您血糖控制得如何的數字。“糖化血色素”的目標數字為小於  **$<7.0\%$** 。糖化血色素每上升 1%，整體死亡率會增加約 11%至28%，等同於短命約12.9年(95%CI 6.6-19.3)。
- 若你有打胰島素，請務必記得每天短效的打幾次？一次打幾個單位？長效的一次打幾個單位？

## ✓ 建議飲食習慣

1. 定時定量進食：每天固定時間進餐，避免暴飲暴食，建議一天吃 3 主餐 + 1~2 小餐。
2. 控制碳水化合物攝取量
  - 選擇低升糖指數(GI)的食物，如糙米、地瓜、燕麥、全麥麵包。
  - 減少精製糖、白米飯、白麵、甜點等的攝取。
3. 攝取足夠纖維
  - 吃多種蔬菜(尤其是深綠色蔬菜)。
  - 選擇全穀類、豆類、水果(控制份量)來增加膳食纖維，有助穩定血糖。
4. 適量蛋白質
  - 建議選擇豆腐、雞肉、魚肉、蛋、低脂乳製品等。
  - 避免高脂紅肉(如肥豬肉、香腸、臘肉)。
5. 減少油脂與鹽分
  - 使用健康油脂(如橄欖油、苦茶油)，避免炸物、奶油、動物油。
  - 控制鈉攝取，降低高血壓與心血管風險。
6. 限制含糖飲料與酒精
  - 避免含糖飲料(如手搖飲、汽水)。
  - 飲酒需謹慎，因會影響血糖，空腹喝酒可能導致低血糖。

## ✓ 運動建議

1. 規律性有氧運動：
  - 建議每週至少 **150** 分鐘中等強度運動，如快走、游泳、騎腳踏車、健走。
  - 可分為每天 30 分鐘，或每次 10 分鐘分多次完成。