

慢性腎衰竭飲食

慢性腎臟病飲食是對於有腎臟疾病而未接受透析治療者，需修正飲食中蛋白質、鈉（鹽）、鉀、磷、水份的飲食。

飲食原則

足夠的熱量攝取

- 1. 控制蛋白質的同時，須配合攝取足夠的熱量，避免體重快速減輕，以維持適當體重為主。
- 2. 每日所需熱量可由下列蛋白質含量較低的食物提供熱量，作為點心或正餐使用：
 - 低蛋白澱粉：冬粉、米粉、米苔目、粉條、板條、涼粉皮、西米露、粉圓、粉粿、玉米粉、太白粉、地瓜粉、樹薯粉、藕粉、涼糕等。
 - 油脂：利用植物性油脂如：苦茶油、橄欖油、葵花油、芥花油、花生油等，以油拌、油炒、油煎等烹調方式增加熱量。
 - 利用市售特殊營養補充品：低蛋白奶粉、低蛋白營養品、糖飴...等。

適度的蛋白質限制

- 1. 腎臟病患者若攝取過多蛋白質，會增加含氮廢物的產生，加速腎臟衰竭。
- 2. 根據腎衰竭的病程不同，每日蛋白質建議攝取量為0.6～1.0克/公斤/天

選擇高生理價的蛋白質（需佔每日蛋白質攝取量的50%以上）	
好的蛋白質來源（多選擇）	低生理價的蛋白質（少食用）
奶類、雞蛋、魚類、雞肉、鴨肉豬肉、牛肉、羊肉、黃豆製品等。	穀類與乾豆類：薏仁、蓮子、碗豆仁、綠豆、紅豆、蠶豆、皇帝豆、花豆。 麵筋類：麵筋、麵腸、麵輪、烤麩。 堅果類：花生、瓜子、核桃、腰果、杏仁果。

控制鈉（鹽分）攝取

常見高鈉（鹽）食品

蔬菜類	加工品及醃製品，如:榨菜、梅干菜、泡菜、筍乾、醬菜等
水果類	蜜餞、醃製桃、加工果汁、罐頭水果等
全穀雜糧類	麵線、油麵、泡麵、鹹餅乾、鹹麵包、洋芋片等
豆魚肉蛋類	火腿、香腸、鹹魚、鹹蛋、燻雞、豆腐乳、魚肉鬆、魚乾等
調味品	雞精、沙茶醬、蕃茄醬、豆瓣醬、味精、味噌、肉湯等
可使用白糖、白醋、花椒、八角、香菜、蔥薑蒜、肉桂等增加食物風味唷!!	

限制「磷」攝取

血磷過高易產生骨骼病變、皮膚搔癢及血管鈣化等問題。

常見高磷食品	
乳製品	鮮奶、優格、乳酪、優酪乳、發酵乳、起司
乾豆類	黑豆、蠶豆、紅豆、綠豆
全穀類	全穀飯、蓮子、薏仁、糙米、栗子、全麥製品、小麥胚芽、麥片
內臟類	動物的腦、肝、腎...等，例如:豬肝、豬心、豬腰、雞胗等
堅果類	杏仁果、開心果、腰果、核桃、花生、芝麻、芝麻粉
其他	酵母粉、汽水、可可、三合一飲品、蛋黃、肉鬆、蝦米、吻仔魚

限制「鉀」攝取

血鉀過高或排尿量小於**1000**毫升，須限制鉀的攝取。

常見高鉀食物	
水果類	美濃瓜、哈密瓜、木瓜、奇異果、聖女番茄、草莓、釋迦、香蕉、柳丁、龍眼乾及各種果汁

蔬菜類	川七、莧菜、菠菜、空心菜、紅莧菜、紅鳳菜、韭菜、青花菜、芹菜、地瓜葉、苜蓿芽、菇類、菜湯及精力湯等
肉類	勿食用濃縮湯汁及使用肉汁拌飯
飲料	避免咖啡、茶、雞精、人蔘精及運動飲料等。
其他	中草藥、堅果類、巧克力、梅子汁、番茄醬、乾燥水果乾及藥膳湯
調味品	薄鹽醬油及低鈉鹽，因含鉀高，不適合腎臟病患使用

嚴禁楊桃

限制「水分」

1. 每天測量體重，若發現體重突然增加很多，應注意降低水分的攝取。
2. 水分限制=前一天的尿量 + 500 ~ 700c.c.的水。
3. 注意食物中隱藏水分，如：仙草、愛玉、果凍等，需適量攝取。