

肝硬化病人易合併肝性腦病變

肝性腦病變是肝硬化患者普遍會發生的合併症之一。不管是急性或慢性肝臟疾病，是體液、電解質或酸鹼值不平衡，以及缺氧、便秘、消化道出血、高血氨症、感染和所用藥物如麻醉藥、鎮靜劑，以及蛋白質攝取過多而增加腸道中的蛋白質含量，致使腸道細菌分解產生較多的氮基物質等，都可能誘發肝性腦病變。

肝性腦病變的症狀是漸行性的緩慢發生，首先會以輕微意識混亂、精神運動功能降低來表現，嚴重者會嗜睡、木僵、昏迷。臨床上將肝性腦病變分為4期，**第1期**：輕微的意識混亂、焦慮、注意力不集中；**第2期**：嗜睡、意識混亂、人格行為改變、括約肌控制功能喪失；**第3期**：失憶、語無倫次、昏睡但仍可被喚醒；**第4期**：昏迷、對疼痛刺激無反應。

病人應遵循的飲食原則

為了預防發生肝性腦病變，肝硬化病人必須維持適當的營養，並預防各種併發症（如：高血糖症、腹水、水腫、肝昏迷等）的發生，其飲食原則如下：

● 攝取足夠的熱量及蛋白質，但不可過量

有關肝性腦病變患者對於蛋白質攝取量的爭論不斷，過去強調應限制蛋白質的攝取，但近年有學者指出在肝性腦病變發生時，限制蛋白質的攝取不見得有利，此時反而應攝取足夠的蛋白質（每公斤體重1-1.2公克），這麼做不僅能提供患者營養以確保蛋白質和能量的合成，更可維持正常肝細胞的功能。若過度限制蛋白質的攝取（每公斤體重低於0.6公克），且熱量攝取不及建議量，將會促使患者肌肉的分解代謝和胺基酸釋放，因血清氨增加，反而造成肝性腦病變的惡化。

● 戒酒

● 少量多餐，睡前吃些點心

肝病患者常伴隨食慾不振，以少量多餐的方式進食，不僅可以減少飽脹感，更能避免低血糖的發生。睡前吃些點心，亦可避免夜間空腹時間太長而導致低血糖與體組織異化。點心可以選擇優格、小餐包等。

● 避免攝取高產氨食物

高產氨食物包括乳酪、香腸、臘肉及筋皮肉類（如：牛筋）等。

● 植物性及酪蛋白食物來源，優於動物性蛋白

末期肝病患者血清中所含的支鏈胺基酸較低，而支鏈胺基酸為必須胺基酸，富含於植物性蛋白及酪蛋白之中（穀類、黃豆製品如豆腐、豆漿、豆皮及奶製品等）。研究顯示，若支鏈胺基酸濃度趨於正常，可促進蛋白質的合成並降低血漿中氨的濃度，進而增加氮的攝入，可促進蛋白質嚴重耐受不佳之肝硬化患者的蛋白質合成及代謝。植物性蛋白除了富含支鏈胺基酸，其膳食纖維亦可促進腸道蠕動與酸化腸道，增加氨從糞便中的排出。

● 若合併食道靜脈曲張，宜採取軟、流質飲食

患者應避免攝取過於粗糙、堅硬、大塊及油炸的食物，以免增加食道靜脈出血的風險。

● 若有嚴重腹水或水腫，須採取低鹽飲食及限制水分

嚴重腹水或水腫患者，每天的鹽分攝取應少於5公克，並以食用未加工的天然食物為宜。如有低血鈉症，每天的液體攝取量限制約1000-1500c.c.。

低鹽食物選擇表

食物種類	可食	忌食
奶類及其製品	全脂奶、脫脂奶及奶製品	乳酪
肉、魚、蛋類	肉、魚、蛋類	●加鹽或燻製的食品：中西式火腿、香腸、臘肉、牛肉乾、豬肉乾、燻雞、板鴨、肉鬆、魚鬆、鹹魚、皮蛋、魯味等 ●罐製食品：肉醬、肉燥、沙丁魚、鮪魚、鰻魚等。 ●速食品及其他成品：炸雞、漢堡、餡餅、各式肉丸、魚丸等
豆類及其製品	新鮮豆類及其製品： 豆腐、豆漿、豆花、豆干、素雞、花生等	醃製、罐製、滷製的成品：加味豆干、筍豆、豆腐乳、花生醬等
全穀根莖類	米飯、冬粉、米粉、自製麵食	鹹餅乾、蛋捲、奶酥、麵線、速食麵、速食米粉、義大利脆餅等
蔬菜類	新鮮蔬菜及自製蔬菜汁 （但芹菜、胡蘿蔔等含鈉量較高的蔬菜不宜製成果汁食用）	鹹餅乾、蛋捲、奶酥、麵線、速食麵、速食米粉、義大利脆餅等
水果類	新鮮水果及自製果汁	●乾果類：蜜餞、脫水水果 ●各類罐頭水果、果汁粉及加工果汁
油脂類	植物油：大豆油、花生油、紅花子油等	奶油、瑪琪琳、沙拉醬、蛋黃醬
調味品	●蔥、薑、蒜、白糖、白醋、肉桂、五香、八角、杏仁露、香草片等 ●少吃辣椒、胡椒、咖哩粉等較刺激的食品	味精、蒜鹽、花椒鹽、豆瓣醬、沙茶醬、辣醬油、蠔油、蝦油、甜麵醬、番茄醬、豆豉、味噌、芥末醬、烏醋等
其他	太白粉、茶	雞精、牛肉精、海苔醬、速食湯、油炸粉、洋芋片、爆米花、米果、運動飲料、碳酸飲料（如：汽水、可樂）等

（只要把握天然、少加工、少醬料的原則，便能輕鬆選擇食物！）

● 若胃口不佳，可考慮使用營養補充品

市售營養品可選用均衡營養配方；若合併腹水，可補充濃縮營養配方；若血氨偏高，可補充富含支鏈胺基酸的營養品。相關事宜請先諮詢醫師或營養師，以策安全。

適合肝病患者的營養品



奇異果優格



和風豆腐

● 益生菌與益菌生

益生菌就是俗稱的好菌，可在腸道進行發酵，分解醣類，產生乳酸或醋酸，使腸內環境保持酸性，抑制腐敗菌的增生。益菌生則是刺激腸道裡好菌生長的「食物」，同時可以抑制壞菌數量，使腸道更健康，這類物質包括膳食纖維和寡糖（如：果寡糖、菊糖）。

此外，足夠的膳食纖維能促進腸胃蠕動，使排便順暢，預防血氨濃度上升。近期雖有文獻指出，有輕微肝性腦病變的患者補充益生菌（100億以上的乳酸菌種）或益菌生（包含b葡聚醣、果膠、菊糖及抗性澱粉）30 天後，與控制組相比較，靜脈血氨濃度及血漿內毒素濃度均有改善，然而肝硬化病人補充益生菌或益菌生是否能夠預防肝性腦病變的發生，仍需更長期而完備的研究。

含有益菌生的天然食物

種類	食品
五穀根莖類	● 各種全穀類：蕎麥、燕麥、糙米、薏仁等 ● 馬鈴薯、芋頭、蕃薯、南瓜、乾豆類
豆類	大（黃）豆、毛豆
蔬菜類	牛蒡、蘆筍、洋蔥、花椰菜、甜菜、香菇、洋菇、黑木耳、白木耳、海藻（海苔、裙帶菜、海帶）
水果類	木瓜、香蕉、蘋果

營養師的叮嚀

每天攝取充足的蔬果並保持規律排便，杜絕飲酒，選擇天然非加工的食品，不吃來源不明的藥物及補品，才能照顧好自己的小肝！