

急性耳聾(俗稱「[耳中風](#)」)是一種突發性、原因不明的感音神經性聽力障礙，屬於耳鼻喉科急症。其定義為在 72 小時內，連續三個頻率的聽力受損超過 \ (30\) 分貝，通常單側發作，並伴隨耳鳴、耳悶脹感或眩暈。關鍵在於儘速就醫，發病 3 天內治療效果最佳，2 週內為黃金治療期。

急性耳聾的核心資訊

- 定義：72 小時內突然發生的感音神經性聽力損失。
- 黃金治療期：發病後的 3-14 天內，早期治療能大幅提高聽力恢復機會。
- 症狀：
 - 單側突然聽不見(約 90% 為單側)。
 - 伴隨耳鳴(嗡嗡聲)、耳朵悶脹、聽力下降。
 - 約 30%-50% 患者伴隨暈眩。
- 原因：多數為「原因不明」(約 85%-90%)，推測與病毒感染、內耳血管血循障礙、自體免疫攻擊有關。
- 風險因素：疲勞、熬夜、壓力大、季節交替時分。

治療與診斷

1. 立即就醫：若突然覺得單側聽力模糊、講電話有困難，請直接前往大型醫院耳鼻喉科急診或門診。
2. 檢查：包括聽力檢查、腦部核磁共振(MRI)以排除腫瘤、血管疾病等。
3. 治療方式：
 - 類固醇：口服、針劑或耳內注射，為最主要的消炎治療。
 - 血管擴張劑、循環促進劑：改善內耳微循環。
 - 高壓氧治療：作為輔助治療，能提升組織氧氣含量。
4. 預後：大約 1/3 治癒、1/3 改善、1/3 治療無效。