

發燒滿 24 小時算燒一天，例如星期一早上發燒，到星期二早上算燒一天。兒童的發燒有時會持續 3 到 5 天，建議每燒 3 天左右要再看診一次，接受醫師評估。

兒童燒的溫度高度通常比大人來得高，40、41°C 都很常見。但燒的天數、燒的頻率、溫度高度往往不是判斷疾病嚴重與否的指標。

要注意的嚴重度指標是

1) 精神活力：發燒/生病時精神一定會變差，我們要觀察的是退燒時的活力。若退燒時完全不願意碰平時喜歡的書本/玩具/電視/手機，甚至幾乎不跟人互動，就需要馬上再返診評估。

2) 食欲：生病時食欲也會變差，但若一整天的進食總量，尤其是水分少於平時的三分之一，甚至發覺尿量變少（換尿布頻率明顯變少、尿布重量明顯減輕），就需要馬上再返診評估。

兒童的退燒藥有兩種：

>38°C：當 耳/肛溫大於 38 度，或額溫大於 37.5 度時

- ☐ 安佳熱 (紅色藥水) Anti-phen
 - ☐ 愛舒疼 (藥丸) Acetaminophen
-

>39°C：當 耳/肛溫大於 39 度，或額溫大於 38.5 度時

- ☐ 普他寧栓劑 (肛門塞劑) Diclofenac
- ☐ 舒抑痛/依普芬/馬蓋先 (紫色藥水) Ibuprofen
- ☐ 伊普錠/漠疼錠 (藥丸) Diclofenac

發燒是身體在製造抗體對抗細菌病毒，退燒的目標是緩解兒童的不舒服。

退燒需要時間，用了退燒藥後一小時再量體溫。溫度有下降就可以了，沒有一定要退到 38°C 以下。比如從 40°C 退到 39 或 38.5°C，不舒服有改善就可以了。


若此時沒有退燒或只退一些人還是不舒服怎麼辦？我們有兩種退燒藥 A 類和 B 類，若先用 A 類，過一小時沒退燒就加用 B 類。反之亦然，若先用 B 類，過一小時沒退燒就加用 A 類。

兩種不同種類的退燒藥間隔 1 小時使用；

同種類的退燒藥（比如依普芬和塞劑）需間隔 4-6 小時。

兒童常常在藥效過了之後(4-6 小時後)又燒起來，我們可以適時給予退燒藥。發燒頻繁與否不是最敏感的嚴重度指標，觀察的重點在於上文所述的精神活力食欲。

肛門塞劑如何使用？

- 1** 單次劑量小於1顆者，打開包裝前先用乾淨剪刀裁去多餘部分。
- 2** 兒童呈「臥姿」提起臀部 或 嬰兒呈「俯躺」抬高雙腳
- 3** 塞劑尖端朝內，將塞劑推入肛門
- 4** 塞劑完全進入肛門後，以手夾緊雙臀約20-30秒即完成