

經神經學和電腦斷層檢查，目前為暫時性腦缺血=小小中風。

大中風：半邊手脚癱瘓、嚴重臉歪嘴斜/口齒不清

小中風：單側手脚/單手/單腳輕微到中度的無力、單側手脚/單手/單腳麻、輕微到中度的臉歪嘴斜/口齒不清

中風治療(抗血小板藥物，例如伯基/阿斯匹林)的目標：

- 1.降低變成大中風的幾率
- 2.降低日後二次中風的幾率

藥物只能盡量降低再中風的幾率，無法完全根除。若世上有這麼神奇的藥物，世上就不會有中風的人了。可惜沒有。

小中風不能用大中風的藥，比如血栓溶解劑。用了反而會變成腦出血。

“症狀”對於小中風惡化最為敏感。應密切注意是否出現以下症狀：

- 單側手脚無力更加嚴重
- 臉歪嘴斜更加嚴重
- 癲癇抽搐發作
- 持續頭暈嘔吐
- 意識變差，昏昏沉沉叫不醒

若有以上症狀，請儘快告知醫護人員或回診。

需要安排神經科門診，追蹤症狀、調藥、以及評估是否需要安排核磁共振(MRI)檢查，來證實是否真的為中風。核磁共振不是急診的常規檢查，需到門診安排。

中風的症狀來自凋亡的腦細胞。身體有復原力，凋亡的腦細胞周邊的腦細胞會來補上他們的功能，但這個過程需要幾個月到幾年的時間。即使恢復，往往也很難跟過去健康時一樣靈活。

三高(高血壓、高血糖、高血脂)也是中風的危險因子，從今天起需控制飲食和規律運動。但中風急性期時，身體會自然升高血壓，讓更多血流流向腦細胞。這期間血壓的目標為收縮壓 220mmHg 以下，舒張壓 120mmHg 以下，請勿把血壓降得太低。