


Lec 23. Projection.

least squares problem



$$A \vec{x} = \vec{b}$$

$$\begin{bmatrix} A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \end{bmatrix}$$

$\text{col}(A)$

Ex. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ $\vec{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

orthogonal set

Compute $\text{Proj}_{\text{col}(A)} \vec{b}$

$$= \frac{\vec{a}_1 \cdot \vec{b}}{\vec{a}_1 \cdot \vec{a}_1} \vec{a}_1 + \frac{\vec{a}_2 \cdot \vec{b}}{\vec{a}_2 \cdot \vec{a}_2} \vec{a}_2$$

$$= \frac{-1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{0}{1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$U \in \mathbb{R}^{n \times k}.$$

$U = [\vec{u}_1 \cdots \vec{u}_k]$ U has orthonormal columns

$$\text{if } \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = \begin{cases} 0, & \text{if } i \neq j \\ 1, & \text{if } i = j. \end{cases}$$

i.e., $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\}$ is an orthonormal set.

$$\underbrace{(U^T U)}_{\substack{\uparrow \\ \mathbb{R}^{k \times k}}}_{ij} = \vec{u}_i^T \vec{u}_j = \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j$$

$$\underline{U^T U = I_k.}$$

Special case: $k=n$.

$$U^T U = I_n \quad . \quad U \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

$\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ is ONB of \mathbb{R}^n .

$$\underline{U^{-1} = U^T} \quad . \quad \text{special when } k=n.$$

$$n \times k \begin{bmatrix} U \end{bmatrix} :$$

$$\begin{bmatrix} U^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_k \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} U \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U^T \end{bmatrix}$$

→ projection.

$$n \times n \begin{bmatrix} U \end{bmatrix}$$

$$\underline{U} U^T = U U^{-1} = I_n.$$

$U \in \mathbb{R}^{n \times n}$. ONB. Orthogonal matrix
orthonormal "

Confusing
notation!

Connect to projection.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$


$$U = [\vec{u}_1, \vec{u}_2] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Proj}_{\text{Col}(A)} \vec{b} &= \vec{u}_1 (\vec{u}_1 \cdot \vec{b}) + \vec{u}_2 (\vec{u}_2 \cdot \vec{b}) \\
 &= (\vec{u}_1 \vec{u}_1^T + \vec{u}_2 \vec{u}_2^T) \vec{b} \\
 &= \underline{\underline{U U^T}} \vec{b}
 \end{aligned}$$

$$(U U^T = [\vec{u}_1 \ \vec{u}_2] \begin{bmatrix} \vec{u}_1^T \\ \vec{u}_2^T \end{bmatrix} = \vec{u}_1 \vec{u}_1^T + \vec{u}_2 \vec{u}_2^T)$$

Def $W \subseteq \mathbb{R}^n$ is a subspace.

$$W^\perp = \{ \vec{v} \in \mathbb{R}^n \mid \vec{v} \perp \vec{w} \text{ for all } \vec{w} \in W \}$$



$$\vec{v} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow v_1 = 0.$$

Thm. 1) W^\perp is a subspace

$$2) (W^\perp)^\perp = W$$

Thm. (Uniqueness of projection)

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ is a subspace. any vector

$\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ has a unique decomposition

$$\vec{v} = \vec{w} + \vec{z}, \quad \vec{w} \in W, \quad \vec{z} \in W^\perp.$$

$$(\vec{w} = \text{Proj}_W \vec{v})$$

Pf: (of uniqueness).

$$\vec{v} = \vec{w} + \vec{z} = \vec{w}' + \vec{z}'$$

$$\vec{w}, \vec{w}' \in W$$

$$\vec{z}, \vec{z}' \in W^\perp$$

$$\Rightarrow \vec{w} - \vec{w}' = \vec{z}' - \vec{z}$$

$$(\vec{w} - \vec{w}') \cdot (\vec{w} - \vec{w}') = 0$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\|\vec{w} - \vec{w}'\|^2}$

$\Rightarrow \vec{w} = \vec{w}', \quad \vec{z} = \vec{z}'. \text{ Therefore}$
uniqueness

□

Ex. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ Find $\text{Col}(A)^\perp$

$$\text{Col}(A)^\perp = \left\{ \vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \mid \vec{a}_1 \cdot \vec{x} = 0, \vec{a}_2 \cdot \vec{x} = 0 \right\}$$

$$\begin{array}{l} x_1 + x_2 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 = 0 \end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow \text{sol set is } \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} c \mid c \in \mathbb{R} \right\},$$
$$= \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}.$$

More generally.

$$A = [\vec{a}_1 \cdots \vec{a}_k] \quad \text{col}(A)^\perp$$

$$\begin{cases} \vec{a}_1 \cdot \vec{x} = 0 \\ \vdots \\ \vec{a}_k \cdot \vec{x} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{a}_1^T \vec{x} = 0 \\ \vdots \\ \vec{a}_k^T \vec{x} = 0 \end{cases} \Rightarrow A^T \vec{x} = \vec{0}$$

$$\text{col}(A)^\perp = \text{Nul}(A^T)$$


Least Squares

$$A \vec{x} = \vec{b} \quad \text{has no sol.}$$

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad m > n$$

$$\begin{array}{c} n \\ \hline \begin{array}{c} m \\ \left[\begin{array}{c} A \end{array} \right] \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \left[\begin{array}{c} x \end{array} \right] \end{array} = \begin{array}{c} \begin{array}{c} m \\ \left[\begin{array}{c} b \end{array} \right] \end{array} \end{array}$$

In statistics



observations (x_i, y_i)


$$ax_i + b = y_i, \quad i = 1, \dots, m$$

unknowns are a, b .

$$\begin{bmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_m & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$$

$$A \vec{x} = \vec{b}$$

$$\Leftrightarrow \min_{\vec{x}} \| \underbrace{A \vec{x} - \vec{b}}_{\text{residual}} \|^2$$



$$\text{Proj}_{\text{Col}(A)} \vec{b} = A \vec{z}$$

minimal distance $\|\vec{z}\| = \|\vec{b} - \text{Proj}_{\text{Col}(A)} \vec{b}\|.$

