

AI 알고리즘

비선형계획법


비선형계획법 개요

비선형계획모형 소개

비선형계획모형 소개

❖ 비선형계획문제(Nonlinear Programming Problem)

- 선형계획법이 아니라면 최적해를 찾기 어려움
- 앞서 소개한 최적화 기법들은 목적 함수 및 제약식 모두 선형 함수(Linear Function)를 가정
- 정수계획법에서 다룬 모형 역시 정수해 조건을 제외한 나머지는 모두 선형 함수를 가정
- 현실 문제에서는 다양한 비선형 관계(Non-linear Relation)가 존재
- 선형이 아닌 비선형으로 표현된 최적화 문제를 비선형계획문제라고 함
- 최적해를 찾는 가장 좋은 해법이 없음




- 실수를 이어 놓으면 $1/x$ 형태의 함수의 형태가 짝 그려질 것
- 점점 밖으로 나가는 형태
- 반원 형태를 가지고 있음
- 실행 가능 영역 내에서 가장 좋은 걸 찾는 것

직선을 만족하는 x_1, x_2 에서
최적해가 일어나기 때문

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &= 16 \\ x_2 &= 16 - 2x_1 \end{aligned}$$

비선형계획모형 소개

❖ 비선형계획문제(Nonlinear Programming Problem)



$$\text{Max } x_1 x_2$$

$$\begin{aligned} x_1 x_2 &= x_1(16 - 2x_1) \\ &= -2x_1^2 + 16x_1 \\ &= -2(x_1^2 - 8x_1) \\ &= -2[(x_1 - 4)^2 - 16] \\ &= -2(x_1 - 4)^2 + 32 \end{aligned}$$

- 경계선상에 있다는 것을 알면 다른 함수 형태로 문제를 풀 수 있음
 - 문제를 이해하고, 최적해를 찾으려 노력
 - 기존의 알고리즘을 적용, 수정하고 새로운 알고리즘을 제작


$$\text{Max } 3x_1 + 4x_2$$

s. t.

$$x_1^2 + x_2^2 \leq 97$$

$$x_1 x_2 \leq 36$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



- 변수가 3개 이상인 경우
 - 실행가능 영역을 그릴 수 없음
 - 경계를 실제로 알 수 없음
 - 심플렉스법처럼 정점을 찾으면서 최적해를 찾을 수 없음

비선형계획모형 소개

❖ 선형계획문제와의 차이점

- 볼록집합(Convex Set)
 - 선형계획문제의 실행가능영역은 볼록집합
 - 목적함수가 선형 함수이기 때문에, 선형계획모형에서 최적해는 실행가능해영역의 꼭짓점(Extreme Point)에 존재
- 최적화 알고리즘의 부재
 - 휴리스틱 알고리즘
 - 최적해는 만들어내지 못하지만 최적해에 가까운 해 도출 가능
 - 비선형계획법에는 가장 좋은 알고리즘은 없음

비선형계획법 개요

볼록성과 오목성

볼록성과 오목성


❖ 선분

- 두 점을 이은 곧은 선
- 직선: 두 점을 곧게 이은 선을 한없이 늘인 모든 선


❖ 1차원

$$x = ax_1 + (1-a)x_2, 0 \leq a \leq 1$$

$$a = 0 \text{ 일 때, } x = x_2$$




❖ 2차원



$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} &= a \begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \end{bmatrix} + (1-a) \begin{bmatrix} x_1'' \\ x_2'' \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} ax_1' + (1-a)x_1'' \\ ax_2' + (1-a)x_2'' \end{bmatrix} \end{aligned}$$

❖ 볼록집합(Convex Set)




- 집합내 두 점을 연결한 선분이 항상 집합에 포함되면 볼록집합
 - 어떤 집합의 두 점을 선분으로 이용 → 선분상의 모든 점들이 집합에 속하면 볼록집합



볼록성과 오목성

❖ 볼록함수(Convex Function)


- 그래프의 위쪽 영역이 볼록집합(Convex Set)인 함수



볼록성과 오목성

❖ 테일러 전개(Taylor Expansion)

- 공간이동을 통해 최적의 방법을 구하는 것



- 특정점을 기준으로 함수를 근사하는 방법

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$


$$f(x) = (x - 6)^2 + 2$$

$a = 9$ 에서 접선

$$\begin{aligned} f(x) &= f(9) + f'(9)(x - 9) \\ &= 6x - 43 \end{aligned}$$

$$f(x_2) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1)$$

$$f''(x) \geq 0$$



Concave function

- 미분(기울기)
- 적분(면적)
- 거리/시간=속도
- 속도/시간=가속도
- 2차도함수