

14. כיצד יש לטפל בנפגע עם שבר פתוח בגפה?

- ליישר את העצם השבורה
- לקבע את האזור ולמנוע תנועה
- לנער את הגפה כדי לבדוק תחושה
- ללחוץ ישירות על העצם

15. מהם הסימנים העיקריים לשוק היפואלמי (אובדן נוזלים)?

- לחץ דם נמוך, דופק מהיר, עור קר ולח
- נשימה עמוקה ומהירה
- חיוורון קיצוני
- כל התשובות נכונות

16. מהו עומק הלחיצות המומלץ בביצוע עיסוי חזה במבוגר?

- 2-3 ס"מ
- 3-4 ס"מ
- 5-6 ס"מ
- 8-10 ס"מ

17. מה הטיפול הראשוני המומלץ לחולה סוכרת בהכרה הסובל מהיפוגליקמיה (סוכר נמוך)?

- הזרקת אינסולין מיידי
- מתן סוכר זמין (כמו מיץ ממותק, שוקולד או סוכרייה)
- מתן מים בלבד וצום
- השכבה עם רגליים מורמות בחדר חשן

18. מהו תפקידו העיקרי של מכשיר ה-AED (דפברילטור)?

- למדוד את רמת הסוכר בדם
- סיוע מילוי ומתן שוק בעת הצורך
- להנשים את המטופל באופן אוטומטי
- למדוד לחץ דם בצורה מדויקת

19. מהו סדר הפעולות הראשון במקרה של חנק מגוף זר בתינוק (מתחת לגיל שנה)?

- ביצוע תמרון היימליך רגיל בבטן
- 5 טפוחות בין השכמות ו-5 לחיצות חזה
- הנשמה מיידידת מפה לפה
- מתן מים לשתייה בבקבוק

ב. להוריד את התחבושת ולהניח חוסם עורקים

ג. להוסיף מעל התחבושת משולש לחץ

ד. לקבע את אזור הדמדם

8. מה הפעולה הראשונה שיש לבצע באדם שהתעלף?

- להרים את רגליו
- להשקות אותו במים
- לתת לו לנוח על הבטן
- לטלטל אותו בחוזקה

9. מהו הגורם המרכזי לשבץ מוחי איסכמי?

- קריש דם החוסם כלי דם במוח
- חוסר שינה
- עלייה זמנית בחום הגוף
- מחסור בחמצן לריאות

10. כיצד ניתן לזהות שוק אנפילקטי?

- דופק נמוך ולחץ דם תקין
- נפיחות בגרון, קוצר נשימה ופריחה
- עייפות פתאומית בלבד
- רגישות מוגברת לאור

11. היכן ממקמים מדבקות דפברילטור בתינוק?

- אחת על החזה ואחת על הגב
- אחת על הצוואר ואחת על הבטן
- שתייהן על הירכיים
- אחת על החזה ואחת על הזרוע

12. איזה כלי דם מוביל דם עשיר בחמצן מהלב לכל הגוף?

- וריד נבוב
- אבי העורקים (אורטה)
- עורק ריאתי
- וריד הכליות

13. כיצד ניתן לזהות אדם שלקה בשבץ מוחי?

- חולשה בצד אחד של הגוף
- בלבול פתאומי
- קושי בדיבור
- כל התשובות נכונות

1. מהי מטרת העזרה הראשונה?

- טיפול רפואי מתקדם לנפגעים
- מתן סיוע ראשוני עד להגעת צוות רפואי
- אבחון מחלות כרוניות
- ניתוח חירום במצבי טראומה

2. מה עלול לקרות אם המוח לא מקבל חמצן במשך יותר מ-6 דקות?

- ירידה זמנית בתפקוד
- נזק מוחי בלתי הפיך
- שיפור בזרימת הדם
- האטה בדופק בלבד

3. מה מהבאים ההסיפטום העיקרי לאוטם בשריר הלב (MI)?

- חיוורון
- בחילות והקאות
- דופק מהיר
- כאבים בחזה

4. למי נבצע תמרון הימליך (חנק)?

- אדם שלא לא מדבר, ומשתעל חזק, אדום בפנים
- תינוק שלא בוכה, ולא משתעל, אך בהכרה מלאה
- ילד שנחנק מתפוח ומשתעל, ולא בוכה
- אדם מבוגר, שכחול בפנים, לא מדבר, לא משתעל, ומחוסר הכרה

5. מהו הערך התקין של לחץ דם סיסטולי במבוגר?

- 90-120 מ"מ כספית
- 110-140 מ"מ כספית
- 50-80 מ"מ כספית
- 140-180 מ"מ כספית

6. כיצד ניתן לבדוק דופק באדם מחוסר הכרה?

- בעורק הרדיאלי (כף היד)
- בעורק הבריאלי (זרוע)
- בעורק הקרוטידי (צוואר)
- במרכז החזה

7. במידה והתחבושת אישית מאדמה, מה עליי לעשות?

- לפתוח ולהדק את התחבושת בצורה חזקה יותר