

## 1. מהם שלושת המרכיבים של

"משולש החיים"?

- א. מוח, לב, כבד.
- ב. מוח, לב, ריאה.
- ג. לב, ריאה, כלי דם.
- ד. מוח, ריאה, קיבה.

## 2. מהו הערך התקין של לחץ דם

סיסטולי במבוגר?

- א. 90-120 מ"מ כספית
- ב. 110-140 מ"מ כספית
- ג. 50-80 מ"מ כספית
- ד. 140-180 מ"מ כספית

## 3. תוך כמה זמן ללא חמצן מתחיל

להיווצר נזק מוחי בלתי הפיך?

- א. 1-2 דקות.
- ב. 2-4 דקות.
- ג. 4-6 דקות.
- ד. 10 דקות.

## 4. מהו עומק הלחיצות המומלץ

בביצוע עיסויי חזה במבוגר?

- א. 2-3 ס"מ.
- ב. 3-4 ס"מ.
- ג. 5-6 ס"מ.
- ד. 8-10 ס"מ.

## 5. מהו קצב הלחיצות (עיסויים)

המומלץ בדקה בזמן החייה?

- א. 60-80 בדקה.
- ב. 80-100 בדקה.
- ג. 100-120 בדקה.
- ד. 140-160 בדקה.

## 6. מהו סדר הפעולות הראשון

במקרה של חנק מגוף זר בתינוק

(מתחת לגיל שנה)?

- א. ביצוע תמרון היימליך רגיל בבטן.
- ב. 5 טפוחות בין השכמות ו-5 לחיצות חזה.
- ג. הנשמה מיידידת מפה לפה.
- ד. מתן מים לשתיה בבקבוק.

## 7. מהו תפקידו העיקרי של מכשיר

ה-AED (דפירילטור)?

- א. למדוד את רמת הסוכר בדם.
- ב. סיוע מילוי ומתן שוק בעת הצורך.
- ג. להנשים את המטופל באופן

אוטומטי. ד. למדוד לחץ דם בצורה מדויקת.

## 8. מהו טווח הדופק התקין במנוחה

עבור אדם מבוגר?

- א. 40-60 פעימות לדקה.
- ב. 60-100 פעימות לדקה.
- ג. 100-160 פעימות לדקה.
- ד. 120-140 פעימות לדקה.

## 9. מה מהבאים נחשב לסימן מעורר

חשד לשבץ מוחי (CVA)?

- א. חום גבוה מאוד ופריחה.
- ב. סטיית מבחן (פנים לא סימטריות), חולשה בחצי גוף וקשיים בדיבור.
- ג. כאב בטן עז המקרין לגב.
- ד. קושי בנשימה מלווה בצפצופים.

## 10. מהי הפעולה הראשונה שיש

לבצע בכל הגשת עזרה ראשונה (לפי

- "סכימת החייה")? א. בדיקת דופק.
- ב. שמירה על בטיחות המטפל והמטופל (Safety).
- ג. התקשרות למד"א (101).
- ד. פתיחת נתיב אוויר.

## 11. מה הטיפול הראשוני המומלץ

לחולה סוכרת בהכרה הסובל

מהיפוגליקמיה (סוכר נמוך)?

- א. הזרקת אינסולין מיידידת.
- ב. מתן סוכר זמין (כמו מיץ ממותק, שוקולד או סוכרייה).
- ג. מתן מים בלבד וצום.
- ד. השכבה עם רגליים מורמות בחדר חשך.

## 12. מה אסור לעשות בזמן שנפגע

חוזה התקף פרכוסים (אפילפסיה)?

- א. להרחיק חפצים מסוכנים מהנפגע.
- ב. להכניס חפצים לתוך הפה של הנפגע.
- ג. להגן על ראשו של הנפגע.
- ד. להזעיק עזרה רפואית.

## 13. מהו קצב הנשימה התקין במנוחה

למבוגר בדקה?

- א. 8-10 נשימות.
- ב. 12-20 נשימות.
- ג. 30-60 נשימות.
- ד. 24-30 נשימות.

## 14. מי נבצע תמרון הימליך {חנק}?

- א. אדם שלא לא מדבר, ומשתעל חזק, אדום בפנים.
- ב. תינוק שלא בוכה, ולא משתעל, אך בהכרה מלאה.
- ג. ילד שנחנק מתפוח ומשתעל, ולא בוכה.
- ד. אדם מבוגר, שכחול בפנים, לא מדבר, לא משתעל, ומחוסר הכרה.

## 15. מהו הטיפול המומלץ לאדם

הסובל מהתייבשות ונמצא בהכרה?

- א. לשפוך עליו מים
- ב. מנוחה בצל ושתייה מרובה של מים במנות קטנות.
- ג. מתן כדורים נגד חום.
- ד. ביצוע עיסויי חזה.

## 16. מהו "תמרון היימליך" ולמי הוא

מיועד?

- א. לחיצות בחזה למקרה של דום לב.
- ב. לחיצות ברום הבטן לחילוף גוף זר במקרה של חנק (מעל גיל שנה).
- ג. הרמת רגליים למקרה של עילפון.
- ד. בדיקת רפלקסים במקרה של שבץ מוחי.

## 17. מהו הגורם המרכזי לשבץ מוחי

איסכמי?

- א. קריש דם החוסם כלי דם במוח
- ב. חוסר שינה
- ג. עלייה זמנית בחום הגוף
- ד. מחסור בחמצן לריאות

## 18. מהם הסימנים העיקריים לשוק

היפולמי (אובדן נוזלים)?

- א. לחץ דם נמוך, דופק מהיר, עור קר ולח
- ב. נשימה עמוקה ומהירה
- ג. חיוורון קיצוני
- ד. כל התשובות נכונות

## 19. מה הפעולה הראשונה שיש

לבצע באדם שהתעלף?

- א. להרים את רגליו
- ב. להשקות אותו במים
- ג. לתת לו לנוח על הבטן
- ד. לטלטל אותו בחוזקה