BOCA

Piercing de labio (labret, monroe, medusa)

TIEMPO DE CURACIÓN	JOYA INICIAL HABITUAL	FECHA DE LA PERFORACIÓN
6 a 8 semanas	**Labret 1,2 × 10/12 mm**	____ / ____ / _____

Revisión y cambio de joya: Cambio a una barra más corta a las 2–4 semanas (protege dientes y encías). El cambio lo hacemos en el estudio, no lo hagas por tu cuenta.

Cómo limpiarlo (boca)

1. Enjuágate la boca con **enjuague sin alcohol** o con suero fisiológico **después de cada comida** y antes de dormir (30–60 segundos), unas 4–5 veces al día.
2. Cepíllate los dientes con un **cepillo nuevo de cerdas suaves** y guárdalo separado del resto. Cepilla también la joya con suavidad.
3. No uses enjuagues con alcohol ni agua oxigenada: retrasan la curación.
4. Lávate las manos antes de tocar la joya. **No juegues con ella** con los dientes ni la lengua.

Además, en un piercing oral:

- Evita alcohol, tabaco y vapeo: retrasan la curación y aumentan el riesgo de infección.
- Evita besos con lengua, sexo oral y compartir vasos o cubiertos hasta que cicatrice (unas 4 semanas).
- Come despacio, en trozos pequeños; evita picante, ácidos, muy caliente y chicle los primeros días.
- Para la hinchazón: hielo en trocitos y dormir con la cabeza elevada las primeras noches.

Cuidados especiales: labio (labret, monroe, medusa)

- Por fuera, limpia como un piercing de piel: suero fisiológico 2 veces al día.
- Por dentro, enjuagues sin alcohol después de comer.
- No muerdas ni juegues con el disco de dentro.
- Sin pintalabios, bálsamos ni maquillaje en la zona.

Es normal

- ✓ Rojez, calor e hinchazón leve los primeros días.
- ✓ Sangrado ligero puntual las primeras 24–48 horas.
- ✓ Líquido transparente o amarillo claro que forma costritas (es normal, no es pus).
- ✓ Molestia al tocar o rozar durante las primeras semanas.
- ✓ Que parezca curado por fuera antes de tiempo: **por dentro sigue cicatrizando**.

Señales de alarma

- ! Pus verde, gris u oscuro, o con mal olor.
- ! Rojez que se extiende, calor intenso o dolor que va a más pasados 3–4 días.
- ! Fiebre o malestar general.
- ! Bulto duro o doloroso alrededor del agujero.
- ! La joya se hunde en la piel o parece que se sale (rechazo).

Si notas estas señales, **no te quites la joya** (el agujero puede cerrarse y encerrar la infección) y **contacta con el estudio y con tu médico**. Ante fiebre alta, dificultad para respirar o tragar, acude a urgencias (112).

Esta información no sustituye el consejo de un profesional sanitario.
Basada en las recomendaciones actuales de la APP (Association of Professional Piercers).

Evita durante la curación

- ✕ Alcohol, agua oxigenada, povidona yodada (Betadine), Cristalmina, pomadas y cremas sobre la herida.
- ✕ Bañarte en el **mar, piscina, jacuzzi o bañera** hasta que esté bien cicatrizado (mínimo 3–4 semanas). Si no puedes evitarlo, usa un apósito impermeable y limpia al salir.
- ✕ Maquillaje, perfume, autobronceador o protector solar directamente sobre la zona.
- ✕ Tocarlo con las manos sucias o dejar que otras personas lo toquen.
- ✕ Quitar o cambiar la joya tú mismo antes de tiempo.
- ✕ Tomar el sol directamente sobre la perforación.

Consejos

- Descansa, come bien e hidrátate: ayuda a cicatrizar.
- Usa ropa y fundas de almohada limpias.
- No donar sangre en los 4 meses siguientes a la perforación.

¿Dudas o algo no te convence? **Escríbenos o pásate por el estudio** y lo revisamos.