CUERPO

Piercing de pezón

TIEMPO DE CURACIÓN	JOYA INICIAL HABITUAL	FECHA DE LA PERFORACIÓN
6 a 12 meses	**Barbell 1,6 × 10/12 mm**	**____ / ____ / _____**

Revisión y cambio de joya: Cambio a barra corta a los 2–3 meses. El cambio lo hacemos en el estudio, no lo hagas por tu cuenta.

Cómo limpiarlo

1. Lávate bien las manos con agua y jabón antes de tocar la zona (al menos 20 segundos).
2. Limpia **2 veces al día** (mañana y noche) con **suero fisiológico estéril** o spray salino para heridas: rocía o empapa una gasa y aplícala 1–2 minutos para ablandar las costras.
3. Retira las costras blandas con la gasa o un bastoncillo, **sin arrancarlas** nunca en seco.
4. Una vez al día puedes lavar en la ducha con jabón neutro suave y **aclarar muy bien** para que no queden restos.
5. Seca con gasa o papel desechable dando toquecitos (no uses toallas ni algodón: dejan pelusa y bacterias). También vale el secador en frío/tibio.
6. **No gires ni muevas la joya.** Ya no se recomienda: irrita el canal y mete suciedad dentro.

Cuidados especiales: pezón

- Usa un top o sujetador deportivo de algodón limpio que sujete sin apretar; ayuda a dormir.
- Es normal una pequeña secreción blanquecina las primeras semanas: límpiala con suero.
- Evita el contacto con saliva u otros fluidos durante la curación.
- Si piensas en un embarazo o lactancia, coméntalo con nosotros.

Es normal

- ✓ Rojez, calor e hinchazón leve los primeros días.
- ✓ Sangrado ligero puntual las primeras 24–48 horas.
- ✓ Líquido transparente o amarillo claro que forma costritas (es normal, no es pus).
- ✓ Molestia al tocar o rozar durante las primeras semanas.
- ✓ Que parezca curado por fuera antes de tiempo: **por dentro sigue cicatrizando**.

Señales de alarma

- ! Pus verde, gris u oscuro, o con mal olor.
- ! Rojez que se extiende, calor intenso o dolor que va a más pasados 3–4 días.
- ! Fiebre o malestar general.
- ! Bulto duro o doloroso alrededor del agujero.
- ! La joya se hunde en la piel o parece que se sale (rechazo).

Si notas estas señales, **no te quites la joya** (el agujero puede cerrarse y encerrar la infección) y **contacta con el estudio y con tu médico**. Ante fiebre alta, dificultad para respirar o tragar, acude a urgencias (112).

Evita durante la curación

- ✕ Alcohol, agua oxigenada, povidona yodada (Betadine), Cristalmina, pomadas y cremas sobre la herida.
- ✕ Bañarte en el **mar, piscina, jacuzzi o bañera** hasta que esté bien cicatrizado (mínimo 3–4 semanas). Si no puedes evitarlo, usa un apósito impermeable y limpia al salir.
- ✕ Maquillaje, perfume, autobronceador o protector solar directamente sobre la zona.
- ✕ Tocarlo con las manos sucias o dejar que otras personas lo toquen.
- ✕ Quitar o cambiar la joya tú mismo antes de tiempo.
- ✕ Tomar el sol directamente sobre la perforación.

Consejos

- Descansa, come bien e hidrátate: ayuda a cicatrizar.
- Usa ropa y fundas de almohada limpias.
- No donar sangre en los 4 meses siguientes a la perforación.

¿Dudas o algo no te convence? **Escríbenos o pásate por el estudio** y lo revisamos.