GUÍA PROFESIONAL · USO INTERNO

Anillado corporal

Agujas y catéteres · joyería · utensilios · técnica por zona
contraindicaciones · normativa de Canarias · vídeos de repaso

Freya Massage Plus · Costa Teguise, Lanzarote
Basada en el curso «Anillador corporal / Piercing básico» (Luis Amir)
y en recomendaciones actuales (APP) · noviembre de 2026

Contenido

1. Agujas y catéteres
2. Joyería y materiales
3. Utensilios
4. Técnica por zona y tiempos de curación
5. Contraindicaciones
6. Complicaciones durante y después: qué hacer
7. Normativa en Canarias (Decreto 154/2004)
8. Protocolo y checklist de cada perforación
9. Vídeos de repaso por zona
10. Fuentes

Cómo usar esta guía. La parte técnica (agujas, joyas, utensilios y procedimiento por zona) resume tu curso. Donde las recomendaciones actuales difieren del curso, se indica con una nota. Las **fichas de cuidados para clientes** van en archivos aparte, una por perforación, listas para enviar por WhatsApp o imprimir.

1. Agujas y catéteres

Código de colores

Color	Medida (curso)	Calibre	Ø catéter (ISO)	Uso según el curso
■ Rosa	1,0 mm	20G	1,1 mm	Reabrir agujeros hechos anteriormente, nariz.
■ Verde	1,2 mm	18G	1,3 mm	Casi todos, sobre todo cara (ceja, labio, tragus, rook, daith, frenillo, puente).
■ Gris	1,6 mm	16G	1,7–1,8 mm	Pezón, lengua, ombligo, concha, industrial, mejilla.
■ Naranja	2,0 mm	14G	2,1 mm	Genitales, pezón o abrir dilataciones.

El calibre y el diámetro nominal siguen el código de colores ISO 10555-5 de los catéteres periféricos; la medida «curso» es la de la joya que se coloca con cada color. La joya debe ser del **mismo calibre** que la perforación: usar una aguja mayor que la joya provoca más sangrado y cicatriz.

Partes del catéter (curso)

- **Cápsula o funda protectora** – protege la aguja hasta su uso.
- **Catéter** – la cánula de plástico que queda en el canal.
- **Cono de conexión** del catéter (color del calibre).
- **Aguja o fiador** – la que perfora.
- **Lengüeta de apoyo**, **cámara trasera de reflujo** y **filtro**.
- **Tapa de la cápsula.**

Técnica con catéter

→ Perforar con el conjunto catéter + aguja.

→ Retirar la aguja con su soporte; el catéter queda introducido.

→ Cortar el catéter con tijera estéril, dejando el tramo justo.

→ Introducir la joya en el tubo de plástico y tirar para pasarla.

→ Cerrar la joya y comprobar ajuste y longitud.

Otros tipos de aguja

- **Aguja hueca** (punta triangular, corte láser): la más usada en general; la joya sigue a la aguja dentro del canal.
- **Aguja de cánula / catéter**: la más común en el curso (técnica de arriba).
- **Aguja curva**: poco usada; tragus y otras zonas del oído, evita pinchar el otro lado de la oreja.
- **Punzón dérmico**: para grandes calibres; es instrumental médico y en algunas zonas su uso por piercers es ilegal.

2. Joyería y materiales

Sigla	Pieza	Uso habitual (curso)
BBL	Barbell recto	Lengua, tragus, concha, industrial, puente, mejilla, pezón.
BAN	Banana (barra curva)	Ceja, rook, daith, frenillo, septum (hombre), pezón.
CBB	Herradura (circular barbell)	Septum, frenillo superior, pezón.
BCR	Aro de bola cautiva	Nariz, pezón.
LAB	Labret (disco plano)	Labio, tragus; también lóbulo y hélix.
NBB	Banana de ombligo	Ombligo (1,6 × 12/14).
Nostril	Pieza de nariz	Aleta nasal.
TF	Teflón / PTFE (flexible)	Sustituto temporal (pruebas médicas, embarazo, rayos X).
Surface	Barra surface (90°)	Perforaciones superficiales (nuca, esternón, surface tragus…).

Materiales

- **Titanio grado implante (ASTM F-136)**: el más inerte e hipoalergénico. La mejor opción para perforación inicial.
- **Niobio**: muy inerte, apto para piel sensible; se puede anodizar en colores.

- **Acero quirúrgico 316L**: el más usado y económico, pero el menos inerte de los tres; debe cumplir normas para implante.
- **Platino y paladio**: alternativas seguras e hipoalergénicas.
- **Vidrio sin plomo** (borosilicato o soda-lima): muy liso; sin rosca, necesita junta (o-ring) de silicona.
- **Evitar**: oro de baja ley o aleaciones desconocidas y vidrio con plomo. Revisa también el material del perno y las bolas.

En Canarias, la joyería debe ser de material hipoalergénico y con garantía de origen y composición (Decreto 154/2004, art. 6.15). Guarda las facturas y certificados de tus proveedores.

3. Utensilios

Utensilio	Para qué se usa (curso)
Pinza fórceps	Lengua y superficiales grandes.
Pinza fórceps pequeña	Pezón, ombligo, tragus...
Pinza Pennington	Ceja, ombligo, mejilla (cheek), labio y superficiales grandes.
Pinza septum	Sujetar el septum.
Mosquito	Agarrar piercings, bolas...
Pinza de cierre / de apertura	Cerrar y abrir aros (BCR, CBB).
Tijera	Cortar el catéter tras retirar la aguja.
Tubo guía	Recibir la aguja (nariz, tragus, rook, daith, concha, industrial, frenillo inferior).
Barras dilatadoras	Dilatar / abrir agujeros.
Calibre	Medir grosores y largos.

4. Técnica por zona y tiempos de curación

Aguja, joya inicial, utensilio y dirección según el curso. La columna «curación» muestra el tiempo del curso y, debajo, el rango actual de curación completa que se da al cliente en su ficha.

Nota sobre girar la joya. El curso indica girar la joya 180° a partir del 4.º día. La recomendación actual de la APP y de la mayoría de estudios profesionales es **no girar ni mover la joya** durante la curación, porque irrita el canal y arrastra suciedad hacia dentro. Las fichas de clientes siguen el criterio actual: limpieza con suero fisiológico estéril, sin girar.

Zona	Aguja	Joya inicial	Utensilio	Dirección / notas	Curación curso → actual
Ceja	Verde 1,2	BAN 1,2 × 10/12	Pennington	De abajo arriba.	6–8 sem **6 a 12 semanas**
Nariz (nostril)	Rosa o verde 1,0–1,2	Nostril o aro (BCR)	Tubo guía + tijera	De fuera a dentro.	6–8 sem **3 a 6 meses (a veces hasta 1 año)**
Septum	Mujer verde 1,2 · Hombre gris 1,6	M: CBB 1,2 × 10 · H: CBB o BAN 1,6 × 10/12	Pinza septum	—	6–8 sem* **6 a 8 semanas (hasta 3 meses)**
Rook	Verde 1,2	BAN 1,2 × 10	Tubo guía	Horizontal: de dentro a fuera. Vertical: de arriba abajo.	6–8 sem* **6 a 12 meses**
Daith	Verde 1,2	BAN 1,2 × 10 (o aro)	Tubo guía	Mismo criterio que el rook (curso).	6–8 sem* **6 a 12 meses**
Tragus	Verde 1,2	BBL o LAB 1,2 × 10	Tubo guía	De fuera a dentro.	6–8 sem* **6 a 12 meses**
Concha	Gris 1,6	BBL 1,6 × 10	Tubo guía o recipiente de aguja	De dentro a fuera.	6–8 sem* **6 a 12 meses**
Industrial	Gris 1,6	BBL 1,6 × 28/30/32	Tubo guía	Desde la cabeza hacia fuera.	6–8 sem* **6 a 12 meses (a veces más)**
Mejilla (cheek)	Gris 1,6	BBL 1,6 × 16–22	Pennington	De fuera a dentro.	— **6 meses a 1 año**
Puente	Verde 1,2	BBL 1,2 × 10/12	Sin pinza	—	— **2 a 6 meses**
Labio	Verde 1,2	LAB 1,2 × 10/12	Pennington o fórceps	De fuera a dentro.	— **6 a 8 semanas**
Frenillo	Verde 1,2	Sup.: BAN o CBB 1,2 × 10 · Inf.: BAN 1,2 × 10	Tubo guía (inferior)	—	— **4 a 8 semanas**
Lengua	Gris 1,6	BBL 1,6 × 20	Fórceps	De abajo arriba.	3–6 sem **4 a 6 semanas**
Pezón	Gris 1,6	BBL, BAN, BCR o CBB 1,6 × 10 (H) / 10–12 (M)	Fórceps o Pennington	Hombre: por la areola (pezón pequeño). Mujer: por el pezón, nunca la areola.	2–4 meses **6 a 12 meses**
Ombligo	Gris 1,6	NBB 1,6 × 12/14	Fórceps pequeña o Pennington	De dentro a fuera.	6–8 sem **6 a 12 meses**
Lóbulo de la oreja	—	Labret o barbell de titanio 1,2 mm	—	*No detallado en el curso.*	— **6 a 8 semanas**
Hélix / cartílago superior	—	Labret de titanio 1,2 mm	—	*No detallado en el curso.*	— **6 a 12 meses**

Zona	Aguja	Joya inicial	Utensilio	Dirección / notas	Curación curso → actual
Surface (superficial)	—	Barra surface de titanio	—	*No detallado en el curso.*	— **6 meses a 1 año o más**

* El curso da 6–8 semanas para «oreja» en general (cartílago incluido). Ese plazo corresponde a la cicatrización superficial; el cartílago tarda bastante más en curar por dentro (6–12 meses).

5. Contraindicaciones

No realizar (aplazar la cita)

- × Embarazo y lactancia (especialmente ombligo, pezón y genitales; en general, mejor aplazar).
- × Fiebre, gripe, infección activa o enfermedad aguda ese día.
- × Lesiones de piel en la zona: lunares, manchas, verrugas, angiomas abultados, psoriasis, dermatitis, acné activo, quemadura solar, melanoma o cáncer de piel.
- × Antecedentes de queloides en la zona o tendencia a hacerlos (valorar muy bien; en cartílago, no recomendado).
- × Cliente bajo efectos de alcohol o drogas, o en ayunas prolongadas.
- × Menor de edad sin consentimiento expreso de su representante legal.
- × Anatomía no apta (industrial, daith, rook, ombligo, surface): proponer alternativa.

Requieren valoración y autorización médica

- ! Anticoagulantes o antiagregantes (aspirina, ibuprofeno de forma continuada).
- ! Hemofilia u otros trastornos de la coagulación.
- ! Diabetes, sobre todo mal controlada (peor cicatrización).
- ! Cardiopatías congénitas, válvulas cardíacas o antecedentes de endocarditis.
- ! Inmunodepresión: quimioterapia, corticoides, VIH, enfermedades autoinmunes.
- ! Epilepsia.
- ! Alergia a metales (níquel) o al látex: usar titanio implante y guantes de nitrilo.
- ! Tendencia alérgica en general.

El curso incluye como no recomendables: problemas inmunológicos, diabetes, hemofilia, epilepsia, anomalías cardíacas congénitas, tendencia alérgica y queloides.

Por zona

Zona	A tener en cuenta
Oral (lengua, labio, mejilla, frenillo)	Salud dental y de encías; riesgo de erosión dental y retracción de encía. Cambiar a barra corta al bajar la hinchazón. La lengua puede hincharse hasta comprometer la vía aérea.
Mejilla	Evitar el conducto de la glándula parótida (localizar con luz desde dentro). Hinchazón importante.
Pezón	Embarazo y lactancia; posible obstrucción de conductos y mastitis. Infección de prótesis mamarias.
Ombligo	Ombligo sin pliegue superior definido o zona de mucho roce. Embarazo. Cicatrización larga.
Cartílago (hélix, tragus, concha, industrial…)	Queloides y condritis/pericondritis; infecciones difíciles de tratar.
Surface	Zonas de mucha presión o movimiento; alto riesgo de migración y rechazo.

Tras un piercing la persona no puede donar sangre en 4 meses (inclúyelo en la información previa).

6. Complicaciones durante y después: qué hacer

Situación	Actuación
Mareo o desmayo	Parar. Tumbar con las piernas elevadas, aflojar ropa, ventilar. Si está consciente y se recupera, algo azucarado. No continuar hasta que esté bien. Si no se recupera, 112.
Sangrado excesivo	Presión directa con gasa estéril unos minutos, elevar la zona. En Canarias no se permiten lápices cortasangre: usar hemostático líquido local. Si no cede, derivar a urgencias.
Perforar un vaso grande	Presión directa mantenida y frío local. Si hay hematoma que crece o sangrado que no para, derivar.
Reacción alérgica	Cambiar a titanio implante o PTFE. Si aparecen habones generalizados, hinchazón de cara o dificultad para respirar: 112.
Infección	No retirar la joya (puede formarse un absceso). Derivar al médico; mantener la limpieza con suero.
Inflamación excesiva	Revisar la longitud de la joya (cambiar a una más larga si comprime). Frío local. En lengua con dificultad para respirar o tragar: urgencias.
Rechazo o migración	Piel fina y roja sobre la joya, la joya se ve más o se desplaza. Mejor retirarla antes de que salga sola para reducir la cicatriz.

7. Normativa en Canarias (Decreto 154/2004)

Reglamento de condiciones higiénico-sanitarias de la actividad de tatuaje, micropigmentación y perforado corporal (BOC n.º 225, 19-11-2004). Puntos clave para tu día a día:

- **Autorización administrativa** del establecimiento.
- **Consentimiento informado** antes de cada práctica, según el modelo del anexo VII. Si el cliente es **menor de edad no emancipado**, debe constar expresamente el del **representante legal** (art. 4.2).
- **Información al cliente** sobre características, riesgos y **cuidados posteriores hasta la cicatrización** (art. 4.2); disponible en papel y en carteles en la zona de espera (art. 4.3). Las fichas de cuidados cubren esta parte.
- **Registro de clientes y consentimientos** conservados al menos 5 años, cumpliendo protección de datos (art. 8.2).
- Aplicadores **vacunados de hepatitis B y tétanos** (art. 7.1); cubrir heridas propias o no atender si hay infección (art. 7.4).
- Joyería **hipoalergénica** y con garantía de origen y composición (art. 6.15).
- Prohibido fumar en el área de trabajo (art. 5.2.6); no se permiten lápices cortasangre (art. 6.5); cuchillas de rasurar desechables (art. 6.4).

Resumen orientativo, no sustituye al texto legal. Consulta la versión vigente en el Libro Azul del Gobierno de Canarias.

8. Protocolo y checklist de cada perforación

- ☐ Comprobar DNI y edad. Menores: representante legal presente y consentimiento firmado.
- ☐ Entrevista de salud (contraindicaciones) y preguntar si ha comido.
- ☐ Explicar riesgos, tiempo de curación y cuidados; firmar el consentimiento informado.
- ☐ Valorar la anatomía y elegir la joya (titanio implante, largo adecuado para la hinchazón).
- ☐ Lavado de manos, guantes nuevos, campo de trabajo limpio y material estéril abierto delante del cliente.
- ☐ Desinfectar la piel, marcar con rotulador quirúrgico y confirmar la posición con el cliente (espejo).
- ☐ Perforar según la técnica de la zona; insertar la joya y cerrarla.
- ☐ Limpiar la zona, comprobar sangrado y estado del cliente antes de que se levante.
- ☐ Entregar la ficha de cuidados de su zona (WhatsApp o papel) y anotar la fecha de revisión/cambio de joya.
- ☐ Anotar en el registro de clientes: fecha, zona, joya y lote.

9. Vídeos de repaso por zona

Toca el enlace o escanea el QR con el móvil. Son vídeos de terceros encontrados en YouTube; descarté los de «hacerlo en casa». Cada piercer tiene su técnica: si algo no coincide con el curso, quédate con lo aprendido en el curso y con la normativa. La columna TikTok abre una búsqueda con vídeos cortos de esa zona.

QR	Zona	Vídeos (YouTube)	TikTok
	**Básicos: tipos de piercing y medidas**	Javichín – Tutorial 1: tipos de piercing	Buscar en TikTok
	**Básicos: pinzas y material quirúrgico**	Javichín – Tutorial 2: pinzas, fórceps	Buscar en TikTok
	**Básicos: mesa de trabajo e higiene**	Javichín – Tutorial 4: mesa de trabajo Javichín – higiene y materiales	Buscar en TikTok
	**Hélix / cartílago**	Todo sobre el piercing en el hélix (ES) The Whole Truth – Helix (EN)	Buscar en TikTok
	**Tragus**	Tragus – procedimiento completo (ES)	Buscar en TikTok
	**Rook**	Javichín – cómo se hace el rook	Buscar en TikTok
	**Daith**	Daith – rápido y sin dolor (ES) Daith – instructional (EN)	Buscar en TikTok
	**Concha**	Javichín – cómo se hace el conch	Buscar en TikTok
	**Industrial**	Javichín – Tutorial 9: industrial	Buscar en TikTok
	**Ceja**	Piercing ceja – eyebrow (ES) Eyebrow: placement & procedure (EN)	Buscar en TikTok
	**Nariz (nostril)**	Javichín – piercing en la nariz Nostril con aro de inicio (ES)	Buscar en TikTok

QR	Zona	Vídeos (YouTube)	TikTok
	Septum	Javichín – Tutorial 7: septum Septum – instructional (EN)	Buscar en TikTok
	Puente (bridge)	Bridge piercing (ES)	Buscar en TikTok
	Labio	Javichín – piercing en el labio Javichín – Tutorial 15: labret vertical	Buscar en TikTok
	Mejilla (cheek)	Piercing en las mejillas (ES) Paired cheek – Luis Garcia (EN)	Buscar en TikTok
	Lengua	Javichín – Tutorial 12: lengua	Buscar en TikTok
	Frenillo (smiley)	Javichín – piercing smile / frenillo	Buscar en TikTok
	Ombligo	Javichín – piercing en el ombligo Ombligo con catéter (branula)	Buscar en TikTok
	Pezón	Pezón – tipos, anatomía y cómo se hace (ES) Pezón 1,6 × 16 con fórceps y catéter BD	Buscar en TikTok
	Surface	The Whole Truth – Surface (EN) Surface tragus (ES)	Buscar en TikTok

El QR abre el primer vídeo de cada fila.

10. Fuentes

- Curso «Anillador corporal» / «Piercing básico», Luis Amir – Escuela del Tatuaje (documento del curso).
- Decreto 154/2004 de Canarias – Libro Azul, Gobierno de Canarias
- Comunidad de Madrid – Modelo de consentimiento informado de piercing (2024)
- Michigan DHHS – Aftercare Instructions Piercing (no girar la joya)
- Neometal – Piercing aftercare (recomendaciones APP)
- Infinite Body Piercing (estudio APP) – Healing times
- Sutter Health – Body piercing: tiempos medios de curación
- HealthLinkBC – Body piercing healing times
- Colgate – Piercings linguales y salud oral
- American Pregnancy Association – Piercings y embarazo
- IntraMed / Am Fam Physician 2005 – Complicaciones del piercing
- Código de colores de catéteres periféricos (ISO 10555-5) – catálogo MSF