省油菜办公室关于印发 2024-2025年湖北省油菜生产技术指导意见的通知

2024-08-20 15:10 | 湖北省油菜办公室

各市、州、县农业技术推广（促进）中心：

为抓好2024-2025年油菜生产工作，根据《省农业农村厅办公室关于印发2024年湖北省耕地轮作项目实施方案的通知》（鄂农办发〔2024〕50号）和《省农业农村厅办公室关于印发2024年度部级绿色高产高效行动和油菜扩种水稻育秧项目实施方案的通知》（鄂农办发〔2024〕58号）等要求，我办组织有关专家制定了《2024-2025年湖北省油菜生产技术指导意见》（见附件），现印发给你们。请各县市按照要求，围绕稳面积提单产，认真抓好工作落实，确保油菜丰产丰收。

附件：2024-2025年湖北省油菜生产技术指导意见

湖北省油菜办公室

2024年8月19日

附件

2024-2025年湖北省油菜生产技术指导意见

为促进全省油菜面积稳定扩大，单产明显提升，更好地落实2024年耕地轮作、油菜扩种、油菜生产专项等工作要求，制定如下技术指导意见。

一、技术路径

因地制宜选择良种，有条件的地方推荐种子包衣技术，落实一播全苗、合理增密、科学施肥、精准调控、减损机收等单产提升关键技术。依据茬口选用早播秋发高产和迟播冬春双发稳产栽培技术模式。突出稻田周年粮油

兼丰，稳步扩大油菜面积、大幅提升单产。

二、技术要点

（一）优选品种。坚持油菜品种“双低化”，根据省农业农村厅发布的主导品种（鄂农发〔2023〕53号）和多年多点试验示范及大面积生产表现，优质高产品种推荐华油杂62、华油杂50、中油杂501、中油杂39、大地199、华油杂706、圣缘2号、利油杂1号、中油杂30、天油杂283、中油杂28、田油杂002等杂交种和华919、中双18、希望699等常规种；根肿病发生风险区推荐华油杂5R、圣光165R、华油杂115R等抗根肿病品种；高油酸油菜产业发展可选用华油2133。

（二）一播全苗。

1.精细整地。播种前开展灭茬、除草、旋耕、开沟做厢等整地工序，选用开沟性能好的联合播种机或旋耕机整地，整地深度20-25cm。稻草没有粉碎的田块用灭茬机碎草，还田稻草长度以3-5cm为宜，有条件的可开展稻草离田。可在旋耕后再用双圆盘开沟机等开沟，沟土分抛厢面。厢宽2m左右，厢沟深25cm、宽25cm左右；腰沟深30cm、宽30cm左右；围沟深35cm、宽35cm左右，做到厢沟、腰沟、围沟三沟相通并与田外排水渠相连。

2.种子处理。播种前采用在油菜上登记使用的噻虫嗪类及新美洲星等药肥拌种，严格按照规定的种药比例使用，以促进油菜速发快长并有效防治苗期病虫害。根肿病易发田块可用氰霜唑或氟啶胺等拌种。

3.适墒播种。坚持适墒整地、造墒播种，随整随播。水稻收获前10天排水晾田，防止机械下田收割时田间过湿，避免过度碾压形成烂泥田而增加油菜播种难度。墒情不足时可在播种开沟完成后采用沟灌渗厢的方式灌溉，确保厢面湿润3天以上，不仅可以使表土下沉紧实，促进油菜快速出苗，也可加速秸秆腐烂。

4.适期播种。按照早播、早发、快长的栽培原则，尽量适期早播。根据生态条件，我省油菜最佳播期为10月上中旬，鄂中北可提前至9月25日前后。

5.机械匀播。（1）联合机播（种肥同播）。适用于土壤偏砂性、排水较通畅、墒情较好的田块，选用能实现密植的种肥同播机，一次性完成旋耕、灭茬、开沟、起垄、施肥、镇压、播种、覆土和封闭除草等工序，省时节本高效，播种深度3cm。（2）旋耕飞播（人工撒播）。适用于腾茬早、土壤较粘重的田块。先旋耕灭茬、除草、施肥，再用无人机飞播或人工撒播。播种后立即开沟，沟土分抛厢面盖籽，沟土要尽量粉碎。（3）免耕套播。适用于晚熟田。稻田后期适当留墒（土壤相对含水量60-70%左右），保持收割机下田不留深痕为宜。采用带秸秆粉碎抛洒装置的联合收割机收割水稻，可留高茬40-50cm，秸秆粉碎均匀还田。水稻收获前1-3天用无人机飞播油菜，水稻收获后即施底肥，用开沟机开沟，沟土分抛厢面压草盖肥，沟土要尽量粉碎。

（三）合理密植。按照“以密增产、以密省肥、以密控草、以密补迟、以密适机”原则，实施精播、匀播，科学确定播量，提高成苗率、成株率。一般亩出苗数在5万株左右，成株数在2.5-3.5万株左右为宜。10月上中旬播种，机械联合播种亩用种量200-250克，人工撒播、无人机飞播亩用种量300-400克，干旱天气或播期延迟的情况下要适当增加用种量，亩用种量不超过500克。拌种处理的种子可适当减少播种量。可采用种肥、种子伴侣混合种子播种，在适应播种方式的同时减少用种量，提高播种质量，增加成苗率。

（四）科学施肥。施足底肥、看苗追肥、适施微肥，平衡施肥、控氮增钾、增施有机肥。

1.施足底肥。10月上中旬播种，底肥推荐宜施壮、新洋丰、三宁等油菜专用缓释肥（N-P_2O_5-K_2O为25-7-8，有效B含量≥0.15%）或其他相近配方油菜专用肥，亩施40公斤左右，优选含Mg、S等中量元素油菜专用肥。前茬为玉米、大豆、棉花、瓜菜等作物的旱地油菜，亩施肥量可减少至30-35公斤。底肥可在整地开沟前均匀撒施，也可随播种机侧位深施。根肿病易发田块可结合整地每亩用生石灰25-50公斤改良土壤。

2.看苗追肥。苗期出现脱肥现象应及时亩追施尿素5-7.5公斤。立冬前后的蕾薹肥必须施用，平均亩追施尿素2.5-5公斤和氯化钾3公斤左右。

3.适施微肥。苗期若遭遇不利天气可适量喷施中微量有机水溶肥增加油菜抗逆性。花期应喷施速效硼肥避免“花而不实”，角果发育期可施用硫酸镁等提高角果光合效能，增粒增重。

（五）精准调控。加强田间管理，实施全生育期动态调控，搭好丰产基础，形成合理产量结构，实现绿色高质高效生产。

1.控旺促壮。苗期密度过大的田块叶面喷施多效唑或者烯效唑增强抗倒性。冬至苗偏旺田块，叶面喷施烯效唑或多效唑控旺，防止早薹早花，减轻冻害影响。冬至前后可喷施新美洲星、芸薹素、胺鲜酯等生长调节剂，增强油菜抗冻性，防冻促壮。

2.化学除草。机播时或播种后选用精异丙甲草胺、乙草胺及其复配制剂等进行封闭除草。草害较重的田块，在油菜4-5叶期选用精喹禾灵、烯草酮、烯禾啶等防治禾本科杂草，选用草除灵、二氯吡啶酸等防治阔叶杂草。出现除草剂危害时可喷施碧护或者氨基酸叶面肥，观察5天后效果较慢的可再喷一次。

3.一促四防。“一促四防”是在油菜花期通过叶面喷施微肥及杀菌剂、杀虫剂、生长调节剂等混配液，促进油菜生长发育，防花而不实、防早衰、防菌核病及虫害、防高温逼熟，增加角果数和粒重的一项关键技术措施。初花后期，选用新美洲星+沃农硼或速乐硼、快乐硼+硫酸镁混合氟唑菌酰羟胺、啶酰菌胺、异菌脲·氟啶胺、菌核净、咪鲜胺等肥药进行喷施。菌核病重发田块，盛花期再喷施腐霉利一次。为提高防治效果，同一田块年际间要轮换用药。

（六）减损机收。推广直播密植、调氮增钾抗倒、施用微肥（B、Mg）增粒增重、干燥催枯收获等宜机化技术，促进农机农艺融合。因地制宜采用机械（人工）分段收获或一次性联合机收方式。原则上高产田、茬口紧张田块宜采取机械（人工）分段收获，低产或茬口不紧张的田块可采取一次性联合机收。

1.分段收获。在全田油菜70-80%角果外观颜色呈黄绿或淡黄时，可采用联合收割机或人工进行割晒，应在有效分枝部位以下割倒。就地晾晒后熟5-7天，油菜籽含水量降至18%以下时再用捡拾脱粒机进行捡拾、脱粒及清选作业。

2.联合收获。在全田油菜角果外观颜色全部变黄色或褐色、完熟度基本一致时用油菜联合收割机收获角果层。可在油菜八成熟时用无人机亩喷施100ml立收谷10倍液催枯干燥后再机收，能有效降低机收损失。

3.菜籽储藏。收获的油菜籽及时晾晒，积极推广烘干技术，水份含量≤9%时入库或放阴凉通风处储藏。

三、有关要求

（一）开展分类指导。根据各地土壤条件、茬口安排，选择合适的种植模式。针对各地灾害发生规律，做好抗灾减灾技术预案。技术人员分片包干，深入田间开展技术指导，确保技术到位。

（二）实施技物配套。各地要结合试验示范和常年田间表现，优选适宜本地区种植的品种及肥药。落实好产油大县奖励资金支持统一供种、耕地轮作、粮油生产保障资金等工作要求，规范采购生产物资，发挥好财政资金作用。

（三）建好示范样板。各县市要围绕单产提升建好“四新”示范片，16个单产提升整建制县要落实好“万千百”示范样板。依托示范样板开展现场观摩、技术指导培训工作，推广新模式、新技术、新产品、新装备，促进油菜单产提升行动取得实效。

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

中华人民共和国中央人民政府 | 中华人民共和国农业农村部 | 湖北省人民政府 | 省直部门网站

网站地图 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
主办单位：湖北省农业农村厅 地址：武汉市武珞路519号
鄂ICP备05011090号-1 鄂公网安备42010602000690号 政府网站标识码：4200000076
政府网站找错
TOP