湖北省油菜越冬期田管技术指导意见

2025-12-26 16:03 | 湖北省油菜办公室

据气象部门预报，今年冬季（12月至次年2月）平均气温大部5～7℃，与常年同期相比，东部较常年偏高0.2～0.5℃，西部接近常年。降水量鄂西南北部至鄂西北45～80毫米，鄂东南150～185毫米，其他大部80～150毫米，与常年同期相比，鄂西北北部较常年偏多1～3成，其他大部地区偏少1～2成。冷空气活动主要集中在12月下旬至1月上旬、1月下旬至2月上旬。极端最低气温北部-10～-9℃、南部-8～-7℃。最冷时段可能出现在1月下旬至2月上旬。偏暖偏干气候总体有利于油菜生长，但极端寒潮对油菜安全越冬危害较大。根据油菜冬至苗情和天气预报情况，现就油菜越冬期田管提出技术指导意见：

一、追肥促长。利用1月下旬极寒天气来临前气温偏高的有利条件抓紧看苗追肥。三类苗以追施速效氮肥为主，二次提苗，适时增施磷、钾肥、有机肥等。一般田块亩施5-7公斤尿素加2-3公斤氯化钾。墒情不足的田块施肥前后需补墒，或者采取无人机喷雾的方式施用液体肥料，做到肥水同步。同时叶面补施磷酸二氢钾、胺鲜酯、氨基酸水溶肥、有机水溶肥等增强抗冻性。一、二类苗一般不用追肥，有脱肥情形的亩适当追施7-10公斤复合肥稳苗。

二、化调抗冻。寒潮来临前或者冻害发生后及时叶面喷施碧护、抗冻宝、胺鲜酯、新美洲星、氨基酸水溶肥等，增强抗冻和恢复生长能力。有条件的地方增施草木灰、牛栏粪或者有机肥，或者采取覆盖碎秸秆、培土雍兜等措施增强油菜抗冻性。早薹早花的旺长田块受冻后趁晴天及时摘除冻死薹、叶并带出田外，同时亩追施3-5公斤尿素促长。

三、灌水补墒。及时清理沟渠，确保越冬期田间“三沟”配套。墒情不足（早晨田间霜少、地表无潮）的田块及时灌水补墒，为冬季发挥肥效创造条件，同时保土温增强抗冻性。一般田块可灌一次跑马水，干燥的田块需灌满厢沟，沟水润厢。喷灌需喷至所有叶片滴水，土层10-15厘米湿润为宜。开春抽薹期油菜需水量大，应密切关注土壤墒情，及时补充。

扫一扫在手机上查看当前页面

TOP

打印 关闭

中华人民共和国中央人民政府 | 中华人民共和国农业农村部 | 湖北省人民政府 | 省直部门网站

网站地图 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏

主办单位：湖北省农业农村厅 地址：武汉市武珞路519号

鄂ICP备05011090号-1 鄂公网安备42010602000690号 政府网站标识码：4200000076

政府网站找错

TOP