关于持续抓好油菜秋播生产的工作提示

2026-10-10 17:01品 湖北省油菜办公室

据气象部门预计，秋播期间气象条件总体有利。当前，我省正处油菜耕整播种关键期，各地要围绕大面积单产提升，以提高整地播种质量为关键，落实“两精两适”（精细整地、精量播种、适墒播种、适期播种）技术，着力培育冬前壮苗，夯实苗情基础。

一、力争适期播种。要总结2024年秋冬连旱和2025年持续阴雨天气影响播期的经验，千方百计推进适期播种。尤其江汉平原和鄂东沿江部分地区，水稻腾茬略晚，部分地区偏迟7-10天，该区域需进一步强化工作力度，力争在适播期内完成播种。

二、抓好药剂拌种。药剂拌种或包衣可有效提升播种出苗质量并减轻苗期病虫害，采用在油菜上登记使用的噻虫嗪类、新美洲星、拌种肥等，严格按照规定的比例和方法使用。根肿病易发田块可用氰霜唑、氟啶胺等拌种或者每亩施用15公斤氰氨化钙替代部分基施氮肥。油菜生产、轮作和冬种油菜项目区要用好项目资金，尽可能提高药剂拌种比例。

三、稻田开好“四沟”。水田油菜务必开好“四沟”，确保厢沟、腰沟、围沟和田外排水沟相通。一般厢沟深20-25厘米、宽25厘米左右，腰沟深25-30厘米、宽30厘米左右，围沟深30-35厘米、宽35厘米左右。尤其注意田内“三

沟”与田外排水沟相通，确保外排沟与田间围沟的高差明显，实现排灌顺畅。

四、适时开展深翻。水稻收获后，根据土壤墒情开展深翻，一般田块可每2-3年深翻一次，深度不低于30厘米，打破土壤紧实板结。茬口宽松的田块可先翻耕，在土壤绝对含水率为25%-40%的情况下播种作业，播种前用旋耕机整地或联合播种机一次性作业。

五、防范厄尔尼诺影响。受厄尔尼诺现象影响，预计我省冬季气温冷暖起伏大，降雨分布不均、旱涝并存，1月下旬至2月上旬可能发生阶段低温雨雪冰冻天气。今年秋播气象条件好于去年，病虫草害可能偏重发生，尤其注意防旺长、防冻害，通过控旺促壮，增强抗逆性。

中华人民共和国中央人民政府 (http://www.gov.cn/)

中华人民共和国农业农村部 (http://www.moa.gov.cn/)

湖北省人民政府 (http://www.hubei.gov.cn/)

省直部门网站

网站地图 (http://nyt.hubei.gov.cn/fzlm/wzdt/) | 联系我们 (http://nyt.hubei.gov.cn/fzlm/lxwm/) | 设为首页 | 加入收藏

主办单位：湖北省农业农村厅

地址：武汉市武珞路519号

鄂ICP备05011090号-1

鄂公网安备42010602000690号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=42010602000690)

政府网站标识码：4200000076





(http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=0B7CDE2785E91B81E053022819AC7944)