湖北省油菜冬前田间管理技术指导意见

2025-12-03 14:51 湖北省油菜办公室 湖北省油菜大面积单产提升专家指导组

当前，我省早播油菜旺长态势明显，晚播苗进入快速生长期，抓住冬至前20天田管“窗口期”至关重要。据气象部门预报，我省近期气温偏高，降水偏少，有利于开展田间管理。按照“控住一类苗、稳定二类苗、促进三类苗、保活四类苗”的技术路线，提出如下指导意见。

一、开沟降渍，养根促叶。要及时清理“三沟”，尤其前期因抢播整田质量较差、沟系配套不到位的田块，厢沟深度要达到20cm以上，腰沟、围沟逐渐加深，确保沟沟相通，保持合理墒情以提高根系活力，促进增加绿叶数。稻茬田、低洼田、冷浸田要保证厢宽2米以内，并每30米加开腰沟，做到雨止田干、沟无积水。抗湿播种的田块应在清沟排渍的基础上及时中耕松土，防止土壤板结，提高土壤通透性。鄂中北、鄂东南等丘陵岗地土壤湿度相对较小、冬春易旱的地区厢宽可适当放宽至3-4米，顺坡低洼处开沟，维持底墒足表土爽即可，增强抗旱抗寒能力促冬发。

二、合理追肥，控旺促弱。旺长田块要及时控旺。一二类苗要防止脱肥，可在冬至前后亩追施5-7.5公斤尿素加2-3公斤氯化钾或者10-15公斤的复合肥；三四类苗田块应采用“少吃多餐”的追肥方式，当前或移栽油菜活棵后亩施5-7.5公斤的尿素提苗，冬至前后再亩施5-7.5公斤尿素加2-3公斤氯化

钾或者10-15公斤的复合肥。水田油菜硝态氮、铵态氮和有效钾等流失较大，可适当加大用肥量。为提高肥料吸收利用率，应在降雨前或露水较大的天气用无人机或人工撒施。山区稀植移栽田尽量人工撒施或点施至油菜根部附近，旱地或者墒情不足的水田必要时在施肥后灌一次跑马水,沟水渗厢，快灌快排。叶面追肥可加入硫、镁等中微量元素肥料，可有效改善苗情。

三、间密补稀，优化群体。今年因播期推迟油菜播量增加，密度普遍偏大，在追肥、化调等田管措施之前采取人工或机械中耕等方式及时间苗，清理窝堆苗、拥挤苗，去密留稀、去弱留壮。当前单株叶片达8片以上的田块亩留苗3万株以内，多余的油菜苗可以移栽到迟播田或渍害田，实现间密补稀；间苗后可喷施多效唑降低株高，控制早薹早花。单株叶片4-6片的二类苗亩留苗4万株左右。单株叶片3片以下的三类苗亩留苗5万株左右。移栽田尤其注意补苗，11月上旬移栽的田块保证密度1万株左右，晚栽田可采取双株移栽提升密度至1.5万株左右。

四、综合调控，壮苗越冬。油菜叶龄8片叶及以上且亩密度超过4万株，可通过减施氮肥、亩用5%烯效唑45g或15%多效唑60克兑水40公斤喷雾控旺，避免高脚苗和早薹早花。9片叶以上开始起薹的旺长苗，正值花蕾发育关键期，不宜再用药剂控苗，可在冬前采用摘薹的方式控旺，实现“一菜两用”，摘薹后亩追施5-7.5公斤尿素促进分枝发育。叶龄5片且亩密度5万株以上已封行的田块亩用5%烯效唑30g或15%多效唑40克兑水40公斤喷雾，抑制地上部生长，促进根系发育，增加抗寒性、抗倒性。冬至前做好松土培土、追施腊肥、增加覆盖等措施，提高油菜抗冻性。寒潮前后叶面喷施碧护、胺鲜酯、芸苔素内酯、新美洲星、抗冻宝等调节剂能增强抗寒性，促进苗情转化。叶龄5叶以上草害较重的田块，可喷施烯草酮、草除灵等进行防治；晚播苗由于幼苗小，冬前不建议采用化学除草。今年可能出现暖冬天气，要密切监测蚜虫、小菜蛾等基数，围绕“压低越冬基数、避免弱苗受害”，按虫情阈值精准施药。鄂西山区等湿度较大油菜产区需喷施精甲霜灵、恶霉灵等防治霜霉病。江汉平原、鄂中北等根肿病区施用氟啶胺、石灰氮、生根剂等早防早治，减轻危害。

中华人民共和国中央人民政府 (http://www.gov.cn/)

中华人民共和国农业农村部 (http://www.moa.gov.cn/)

湖北省人民政府 (http://www.hubei.gov.cn/)

省直部门网站

网站地图 (http://nyt.hubei.gov.cn/fzlm/wzdt/) | 联系我们 (http://nyt.hubei.gov.cn/fzlm/lxwm/) | 设为首页 | 加入收藏

主办单位：湖北省农业农村厅

地址：武汉市武珞路519号

鄂ICP备05011090号-1

鄂公网安备42010602000690号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=42010602000690)

政府网站标识码：4200000076

(http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=0B7CDE2785E91B81E053022819AC7944)