当阳农业

当阳市2026年油菜秋冬播生产 技术指导意见

发布日期：2026-09-30　　来源：当阳市农业农村局

一、优选品种

选用油菜生育期200天左右、含油量45%以上、耐密多抗的“双低”油菜品种，有根肿病发病区域宜选用抗根肿病且高产稳产的油菜品种。

二、精播全苗

以墒情为核心抓手，稻茬油菜在水稻收获前7-10天排水晒田至土壤手握成团、落地即散时抢墒播种。稻田秸秆还田时应用带粉碎抛撒装置的收割机收获水稻，秸秆粉碎均匀还田。茬口宽松的田块宜在油菜播种前3-5天翻耕整地，稻草粉碎深埋还田。尽量于10月上中旬最优播期内播种。优先采用机械精量密植播种方式，亩用种量250-300克，播期每推迟5-10天，亩用种量可增加50克，确保密度2.5-3.5万株/亩；无人机精量飞播推荐播种量为500-600克。如播种时墒情不足，及时灌“跑马水”。播后5-7天查苗补缺，实现子叶出土率≥90%、亩有效苗3万株以上的全苗目标。

为确保苗齐苗壮，播种前做好种子包衣或药剂拌种，增强抗逆性，防菜青虫、蚜虫、猝倒病、根腐病、霜霉病等，并于播种后2天以内，选用播后苗前除草剂如精异丙甲草胺等药剂进行封闭除草，喷施后保证4个小时不下雨。

三、优化施肥

推荐使用40%（N-P_2O_5-K_2O为25-7-8,有效B含量≥0.15%）油菜专用缓释肥40-50公斤/亩，优选含硫、镁等中微量元素专用肥，减少施肥次数，提高肥料利用率。对于冬前苗期生长不足或叶色偏淡，可每亩适当追施5-7.5公斤尿素，且蕾薹初期每亩追施3-5公斤左右钾肥提高抗倒性；对于严重缺硼，或保肥能力差的沙壤土，薹期要求叶面喷施液体硼肥。

四、四沟配套

开好田内“三沟”，并连通田外大沟，开沟时注意沟要直，沟沟相通，四沟配套，确保旱能灌、涝能排，做到雨止田干。要求厢沟深20-25厘米，每块田四周开围沟，长度超过40米的田块每隔20-30米开一条腰沟，围沟、腰沟深25-30厘米。及时清沟理墒，保持“四沟”畅通，降渍防渍，促进根系生长，保证壮苗，提高抗病能力。

五、化调壮苗

冬至前，苗期偏旺的田块，在油菜6-9叶，油菜封行后叶面喷施15%多效唑60克兑清水30-40公斤控旺，或使用5%烯效唑30克进行化控；苗期长势偏弱的田块喷施芸苔素内酯等生长调节剂，促进壮苗形成；冻害来临前3-5天叶面喷施磷酸二氢钾等，防早薹早花，增加油菜越冬期的抗寒性、成熟期的抗倒性；冻害后施用化调产品减灾，冻害严重时每亩补施2-3公斤尿素和2-3公斤氯化钾，促进油菜恢复生长，防止倒伏。同时，喷施0.1%-0.2%硼肥溶液和多菌灵等广谱真菌杀菌剂，防治病害发生。

六、一促四防

初花期和盛花期采用无人机喷施氟唑菌酰羟胺、啶酰菌胺、戊唑·咪鲜胺、腐霉利异菌脲、异菌脲·氟啶胺等药剂，预防菌核病1-2次，间隔7-8天，宜轮换用药以提高防效；在角果初期喷施苯醚甲环唑、苯甲丙环唑等药剂预防角果黑斑病。防治菌核病时加入硼肥、植物生长调节剂等混配药剂，进一步促长早熟、防花而不实、防早衰、防病虫、防后期高温逼熟，同时在防控角果黑斑病时加入镁肥、多肽肥等，促籽粒充实、增产增收。

七、机收减损

在全田油菜90%以上角果外观颜色全部变黄色或褐色，完熟度基本一致的条件下，或在油菜成熟前3-5天，采用无人机每亩用立收谷干燥剂80-100毫升脱水干燥或者成熟前5-7天亩用40%乙烯利100毫升催熟，成熟后采用联合收获机一次性收获，一次性收获建议采用带“悬挂式油菜链式并行割台”(杂粮割台)的收割机，降低机收损失。或在油菜八成黄时，采用分段收获，即人工或机械割倒，4-5个晴天后(95%以上的角果已干燥)机械捡拾脱粒。

版权所有：当阳市农业信息中心
技术支持：三峡日报新媒体有限责任公司
违法和不良信息举报电话：0717-3233110

ICP备案号：鄂ICP备2021013580号-1
鄂公网安备42058202000153号

湖北省互联网违法和不良信息
举报平台

网上有害信息
举报专区