宜昌市农业农村局

http://nyj.yichang.gov.cn

2026年全市油菜生产技术意见

日期：2026-09-17 17:13来源：宜昌市农业技术推广中心
责任编辑：农技中心阅读量：

9月下旬开始，油菜进入播种阶段。专家分析，今年油菜秋冬种形势总体较好，长江流域主产区秋播期间气温适宜、底墒充足，利于整地播种和一播全苗。但部分县市区迟播中稻和晚稻、甘薯等作物腾茬偏晚，受厄尔尼诺影响冬季气温总体偏高、冷暖起伏大、降雨分布不均、病虫基数高，对油菜生产带来不利影响。各地要以保面积提产能为主线，以大面积单产提升为重点，以提高播种质量为关键，以落实落细技术措施为核心，适期适墒播种，培育冬前壮苗，确保安全越冬，夯实来年夏油丰产基础。

一、分区分类施策

1.分区落实播种方式。适宜机械作业的大田块采用机械精量匀播，提高播种效率，提升播种质量。零星分散小田块采用小型机械或人工整地开厢后人工条播（方便间苗、定苗）、撒播、育苗移栽。

2.分类落实播种模式。腾茬早的田块及早翻耕整地，适期适墒播种。腾茬迟的稻田可采取稻板田直播技术播种，争取适期播种。腾茬迟的旱地可育苗移栽。不适宜机械整地的稻田、低洼田可采取机械或人工开厢沥水后无人机飞播、人工撒播，确保适期播种。

3.因地制宜选择品种。优选“双低两高”抗逆高产优良油菜新品种，根肿病重发区必须采用抗根肿病新品种，海拔800米以上的山区选用耐寒品种，10月底11月初迟播油菜要选择生育期200天以内的品种。

二、落实关键措施

1.抢抓最佳播期。油菜抢抓10月上中旬最优播期，10月底前基本完成播种，11月10日前全面扫尾。针对茬口偏晚、收获延迟地块，推行抢收抢播、边收边播，最大限度压缩空窗期，坚决杜绝拖延晚播。

2.把好播前准备关。选用包衣种子或播种前药剂拌种，提前预防苗期根腐病、地下虫害，提升种苗抗逆性。播种前精准检修调试播种机械，防止漏播、断垄、重播，保障机械作业质量，实现播种均匀、深浅一致、覆土严实。播前及时翻耕、碎土、整平，提升土壤墒情，为精准播种创造良好条件。

3.严控播种标准。宜东油菜主产区全面推行标准化精量播种，分类精准管控播种密度、深度、用种量。适期正常田块严格按照品种规范标准定量播种。遇阴雨土壤偏湿、播期延后的地块，适度增加播种量20%—40%，最大播种量不超过600克/亩。遇干旱土壤缺墒，根据天气预报播后等墒或人工造墒播种。因干旱缺墒面积较小和腾茬迟的地块可以提前育苗或在长势较旺的田块取苗带土移栽，确保移栽成活率。育苗要在9月底10月初准备苗床育壮苗，苗本比为1：10-15。

4.抓好封闭除草。播种后及时开展土壤封闭处理，从源头控制杂草滋生，减少苗期杂草争肥争水问题。

5.科学施用底肥。结合土壤肥力精准配肥或采用油菜专用缓释肥，施足底肥，为出苗、壮苗生长提供充足养分，防止底肥不足导致的弱苗问题。

6.坚持开沟理墒。播种时同步或出苗前开好“三沟”，厢沟（深20—25厘米，宽20—30厘米）、腰沟（深25—35厘米，宽30—40厘米）、围沟（深35—50厘米，宽40—50厘米），旱地略浅、稻田和低洼田块宜深，同时畅通排灌沟渠，确保能够正常排灌，有效防范秋冬渍涝和干旱危害，保障苗期正常生长。

三、强化防灾减灾

1.防旺长。根据播种期合理确定播种量，早播田块适当降低密度，晚播田块以密补迟，确保构建合理的高产群体结构。对旺长田块，适时喷施多效唑或烯效唑，控旺促壮，增强抗逆性。

2.防渍害。播种后提前清理“三沟”、排水沟中的杂物，保证沟沟畅通。对于已经发生渍害的田块，要及时促进油菜恢复生长，喷施生长调节剂，增施速效氮肥和磷钾肥，减轻灾害损失。

3.抗干旱。提早备足水源，清理沟渠，采取抽水沟灌或喷灌等方式抗旱，也可通过叶面喷施抗逆调节剂增强植株抗旱能力。

4.防冻害。晚播弱苗要早中耕、早施肥，提升抗寒能力。寒潮来临前，通过叶面喷施0.2%-0.5%磷酸二氢钾溶液加芸苔素内酯增强抗寒性，有条件田块可灌一次“越冬水”，稳定地温。寒潮过后，及时察看苗情，对受冻田块及时采取补救措施。

5.防病虫。重点防治蚜虫、菜青虫和霜霉病，受冻后及时喷施多菌灵等药剂防病。

主办单位：宜昌市农业农村局
电话：0717-6777967　0717-6777927
邮编：443000

邮箱：ycsnyncj@yichang.gov.cn
地址：宜昌市西陵区港窑路64号

鄂公网安备 42050202000279号
鄂ICP备2026035533号-1
网站标识码：4205000008
技术支持：宜昌市政府网站群运维服务中心

- 微信二维码
-
-
-

Copyright 2018 YiChang China All Rights Reserved 宜昌市人民政府办公室主办 版权所有
网站地图

- 宜昌蜜桔
- 宜昌宜红
- 宜昌毛尖