孝感市油菜冬前技术指导意见

时间：2025-12-17 11:58 来源：市农业技术推广中心 作者： 阅读量: 字体：[大 中 小] 视力保护色：

当前，我市早播油菜旺长，晚播苗进入快速生长期，抓住冬至前田管“窗口期”至关重要。据气象部门预报，近期气温偏高，间歇性降温、降水，有利于开展田间管理。主要围绕促弱转壮、确保油菜安全越冬展开，提出技术指导意见如下：

一、控旺促弱

控旺：对于 10 月上旬前播种，叶龄 8 片叶及以上且亩密度超过 4 万株的油菜，可通过减施氮肥、喷施15%多效唑可湿性粉剂50—75 克/亩来控旺。

促弱：迟播晚栽、苗体较小、未带肥移栽或基肥用量不足的油菜田，亩施 5-10公斤尿素提苗，同时可喷施氨基酸水溶肥、芸苔素内酯等，促进苗情转化。

二、优化群体

今年油菜迟播，播量增加、密度普遍偏大，需及时间苗，清理窝堆苗、拥挤苗，去密留稀、去弱留壮。单株叶片达 8 片以上的田块亩留苗 3 万株以内，多余苗可移栽到迟播田或渍害田；单株叶片 4-6 片的二类苗亩留苗 4 万株左右；单株叶片 3 片以下的三类苗亩留苗 5 万株左右。

三、肥水管理

合理追肥：晚播油菜应采用“少量多次”的追肥策略，每亩按5公斤尿素+5公斤氯化钾，分2次在降雨前或灌溉前后撒施。注意不要过量施用氮肥。

水肥结合：弱苗或缺墒田块，结合追肥及施蕾薹肥，采取沟水渗厢方式进行灌溉，做到肥水结合。灌水要坚持沟水不上厢、明水不过夜原则，厢面湿润及时排出明水。

四、病虫害防控

5叶期叶龄草害重的田块，可喷施烯草酮、草除灵等进行防治；晚播苗由于幼苗小、草害轻，建议冬前不用化学除草剂除草。如果暖冬天气发生，要密切监测蚜虫、小菜蛾等基数，按虫情阈值精准施药。根据实际情况喷施多菌灵、精甲霜灵、恶霉灵等防治霜霉病、黑腐病，根肿病区采用氟啶胺、石灰氮等早防早治。

五、防寒抗冻

寒潮来临前，可喷施新美洲星、碧护、二氢卟吩铁等抗逆剂，增强油菜抗寒抗冻能力；土壤较干的田块适时冬灌，避免土温大幅度下降，减轻冻害。

孝感市农业技术推广中心

2025年12月13日

扫描分享

分享到：QQ好友 QQ空间 微信 新浪微博

- 主办:孝感市农业技术推广中心　技术支持:孝感市门户网站管理中心　网站地图
- 地址：孝感市孝南区北京路53号　电话：07122579018　邮编:432100　邮箱：xgsnyjstgzxbgs@163.com
- ICP备案：鄂ICP备05015859号　鄂公网安备42090202000171号　网站标识码：4209000002

【返回顶部】【关闭窗口】