2025年湖北省油菜苗期田间管理技术指导意见

2025-11-07 14:07 | 湖北省油菜办公室

11月份是油菜形成高产苗架的关键时期，在今年抗湿播种、迟晚播占比较大的情况下加强苗期田管尤为重要。10月份油菜适播期气温起伏大，前高后低，全省平均气温较常年略偏高，局部偏低，全省平均降雨量较常年偏多7成，鄂西大部较常年同期偏多约3成～2.3倍，重连阴雨天气排历史首位，严重影响了油菜播种出苗，导致当前苗情分化较为明显。天气预报11月份全省大部分地区降雨偏少1-4成，气温偏高0.5-1.5℃，有利于油菜田间管理。冬季总体偏暖但气温变幅大，有利于油菜冬发的同时增加了冻害风险。针对苗情及气候特点，省油菜办公室会同有关专家制定了油菜苗期田间管理技术指导意见，各地要抢抓有利时机因地制宜落实田管措施，培育壮苗越冬。

一、清沟降渍，改善土壤墒情

当前油菜田普遍湿度偏大，要及时清理疏通“三沟”，厢沟深度达到20cm以上，腰沟、围沟逐渐加深，确保沟沟相通、可排可灌，预防渍害，提高根系活力，促进油菜根系生长。稻茬田、低洼田、冷浸田要保证厢宽2米以内，并每30米加开腰沟，做到雨止田干、沟无积水。对于已经发生渍害的田块，应在清沟排渍的基础上及时中耕松土，提高土壤通透性。鄂西山区等移栽油菜田用中耕土雍蔸，利用秸秆覆盖行间，保墒保温。鄂中北、鄂东南等丘陵岗地土壤湿度相对较小、易发冬春旱情的地方厢宽可适当放宽至3-4米，沟中适当留墒，维持底墒足、表土爽即可，增强冬春抗旱抗寒能力。

二、移密补稀，确保基本苗

受连阴雨影响，油菜播种出苗整齐但苗势偏弱，局部缺苗。在油菜3-5叶期，采取人工或机械中耕等方式及时清理窝堆苗、拥挤苗，去密留稀、去弱留壮、移密补稀，做到叶不搭叶。早播田11月中旬油菜单株叶片数达到5片的田块亩留苗3万株，5片以下的田块亩留苗4-5万株，平均每少1片叶亩增加1万株。

三、科学用药，除草防病治虫

在间苗定苗时进行中耕除草，视草情开展化学除草。当前油菜单株绿叶数5片以上而田间杂草较少的田块可以不用化学除草。迟播草量较多，油菜难以盖住草的田块，应在晴天中午温度较高时进行选择性除草，防止草荒苗。可用高效盖草能、烯草酮或高效氟吡甲禾灵等防除禾本类杂草，用高特克、草除灵等防除阔叶杂草。秋冬季化学除草因温度偏低，见效时间相对春夏季偏长，切忌盲目加大剂量致产生药害。鄂西山区等移栽油菜田不提倡化学除草，在中耕培土时机械除草。

土壤湿度大、气温偏高时油菜苗期容易发生猝倒病、根腐病、菌核病、霜霉病等病害，菜青虫、跳甲、蚜虫、螟虫等虫害，可提前喷施多菌灵、百菌清等预防，病害发生后，也可用多菌灵、百菌清、恶霉灵等防治。有根肿病发生地区应注意监控，可在全天最高温度低于15℃时，施用生根剂促进生根，减轻危害。密切监视虫情，及时喷药防治。

四、分类调控，培育壮苗越冬

定好苗防好草后开展分类调控，控旺促弱健株。当前长势较旺、单株绿叶5片以上的田块，晴天亩用5%烯效唑30克或15%多效唑60克兑水40公斤喷雾控旺，抑制地上部生长，促进根系发育，增加抗寒性、抗倒性。早播开始起薹的旺长苗，正值花蕾发育关键期，不宜再用药剂控苗，可在冬前采用摘薹的方式控旺，实现“一菜两用”，摘薹后亩追施尿素5-7.5公斤促进分枝发育。迟播苗势较弱田块，提早在3叶期亩追施尿素5-7.5公斤提苗。抗湿播种等渍水弱苗田块，应在追施提苗肥后苗情转好之际，亩追施5-7.5公斤复合肥，弥补土壤流失的养分。鄂西山区等移栽油菜活棵后及时追肥，亩追施3-5公斤的尿素和5-7公斤的复合肥为宜，有条件的将农家肥施在行间。早栽的单株绿叶达到6片以上时要准备好冬前起薹后及时摘薹控旺，摘薹后亩追施尿素5-7.5公斤促进分枝发育。追肥应在雨天前后趁墒施用，直播田用无人机均匀撒施，移栽田人工定点施至每株油菜栽植穴处。降温前叶面喷施“新美洲星”等水溶性肥料、碧护、芸苔素内酯、胺鲜酯等生长调节剂能增强抗寒性，促进苗情转化。

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

中华人民共和国中央人民政府 中华人民共和国农业农村部 湖北省人民政府 省直部门网站

网站地图 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏

主办单位：湖北省农业农村厅 地址：武汉市武珞路519号

鄂ICP备05011090号-1 鄂公网安备42010602000690号 政府网站标识码：4200000076

政府网站找错

TOP