## Exercise 1:

1. On considère une subdivision en  $n \in \mathbb{N}^*$  intervalles de  $[a,b] \subset \mathbb{R}$ ,

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b.$$

On note  $\omega_k$  le point milieu de chaque intervalle  $[x_{k-1}, x_k]$ , pour  $k \in \{1, \dots, n\}$ . Quelle est l'expression de  $\omega_k$ ?

$$\square \ \omega_k = \frac{x_{k-1} - x_k}{2}$$

$$\square \ \omega_k = \frac{x_{k-1} \cdot x_k}{2}$$

$$\square \ \omega_k = \frac{x_{k-1} + x_k}{2}$$

$$\square \ \omega_k = \frac{x_{k-1}/x_k}{2}$$

☐ Aucune des réponses ci-dessus

2. On considère une subdivision en  $n \in \mathbb{N}^*$  intervalles de  $[a,b] \subset \mathbb{R}$ ,

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b.$$

En la supposant équidistante, quelle est l'expression de  $x_k$ , pour  $k \in \{0, \dots, n\}$ ?

$$\Box x_k = \frac{b-a}{n} \cdot k$$

$$\square \ x_k = \frac{b-a}{k} \cdot k + a$$

$$\square x_k = \frac{b-a}{n} \cdot k + x_0$$

$$\Box x_k = \frac{b-a}{n} \cdot k + a$$

☐ Aucune des réponses ci-dessus

3. Quelle formule correspond à l'approximation de  $\int_1^3 x^2 dx$  par la somme de Riemann  $\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^4 f(x_k)$ , où n=4 et où la subdivision est équidistante?

$$\Box \ \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{4} (k^2 + k + 1)$$

$$\Box \ \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{4} \left( \frac{k^2}{4} + k + 1 \right)$$

$$\Box \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{4} (k^2 + k + 1)$$

$$\Box \ \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{4} \left( \frac{k^2}{4} + k + 1 \right)$$

 $\Box$  Aucune des réponses ci-dessus

4. Quelle formule correspond à l'approximation de  $\int_1^3 x^2 dx$  par la méthode des trapèzes avec n=4?

$$\Box \frac{1}{16} \sum_{k=1}^{4} (2k^2 + 6k + 5)$$

$$\Box \frac{1}{8} \sum_{k=1}^{4} (2k^2 + 6k + 5)$$

$$\Box \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{4} (2k^2 + 6k + 5)$$

☐ Aucune des réponses ci-dessus

5. En utilisant la méthode des trapèzes pour approximer l'intégrale  $\int_0^2 3x dx$ , estimez la différence en valeur absolue, notée  $\delta$ , entre cette approximation et la valeur exacte de l'intégrale.

$$\Box 0.1 < \delta < 0.2$$

$$\Box 0.01 < \delta < 0.02$$

$$\Box 0.001 < \delta < 0.002$$

$$\square \ 0.0001 < \delta < 0.0002$$

☐ Aucune des réponses ci-dessus

6. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont des primitives de  $f(x) = 2x(x^2 + 1)^8$ ?

$$\Box F(x) = \frac{x^2}{9}(x^2+1)^9$$

$$\Box F(x) = \frac{1}{9} ((x^2 + 1)^9 + 4)$$

$$\square F(x) = \frac{1}{9} \left( \sum_{k=0}^{9} {9 \choose k} x^{2k} + 4 \right)$$
 (Indication: Formule du binôme de Newton)

$$\Box 32x^{2}(x^{2}+1)^{7}+2(x^{2}+1)^{8}$$

$$\square$$
 Aucune des réponses ci-dessus

7. Quelles sont les égalités correctes ?

$$\Box \int (1+x^2)e^{-x}dx = -2xe^{-x} + \int (1+x^2)e^{-x}dx$$

$$\Box \int (1+x^2)e^{-x}dx = x^2\left(\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}\right)e^{-x} + \int x^2\left(\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}\right)e^{-x}dx$$

$$\Box \int (1+x^2)e^{-x}dx = -2xe^{-x} - \int (1+x^2)e^{-x}dx$$

$$\Box \int (1+x^2)e^{-x}dx = x^2\left(\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}\right)e^{-x} - \int x^2\left(\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}\right)e^{-x}dx$$

- $\hfill \square$  Aucune des réponses ci-dessus
- 8. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont des primitives de  $f(x) = x\sqrt{1+x}$ ? (Indication: faire une intégration par parties.)

$$\Box F(x) = \frac{2}{3}x(1+x)^{3/2}$$

$$\Box F(x) = \frac{2}{15}(3x+2)(1+x)^{3/2}$$

$$\Box F(x) = \frac{2}{15}(3x - 2)(1+x)^{3/2}$$

$$\Box F(x) = \frac{2}{5}x(1+x)^{3/2}$$

- ☐ Aucune des réponses ci-dessus
- 9. Quelles sont les fonctions f(u) et g(x) telles que

$$\int \frac{x}{x-4} dx = \int f(g(x)) \cdot g'(x) dx ?$$

$$\Box f(u) = e^u + 4 \text{ et } g(x) = \ln(x - 4)$$

$$\Box f(u) = e^{u+4} \text{ et } g(x) = \ln(x) - 4$$

$$\Box f(u) = \ln(u-4) \text{ et } g(x) = e^x + 4$$

$$\Box f(u) = \ln(u) - 4 \text{ et } g(x) = e^{x+4}$$

- ☐ Aucune des réponses ci-dessus
- 10. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont des primitives de  $h(x) = (3x^3 1)^{16}8x^2$ ? (<u>Indication:</u> faire une intégration par substitution.)

$$\Box H(x) = \frac{1}{153} \left( 23 + 8(3x^3 - 1)^{17} \right)$$

$$\Box H(x) = \frac{8}{153}(3x^3 - 1)^{17}$$

$$\Box H(x) = \frac{1}{136} \left( 23 + 9(3x^3 - 1)^{17} \right)$$

$$\Box \ H(x) = \frac{9}{153} (3x^3 - 1)^{17}$$

☐ Aucune des réponses ci-dessus

## Exercise 2:

Calculer l'ensemble des primitives des fonctions suivantes:

1. 
$$f(x) = x^2 - 2x + 3$$

2. 
$$g(x) = x^{2\alpha+1}, \alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq -1 \Rightarrow 2\alpha + 1 \neq 1$$

## Université de Genève **Mathématiques I** Mucyo Karemera

3. 
$$h(x) = (x+1)^2$$

4. 
$$i(x) = exp(2x+5)$$

5. 
$$j(x) = x^2 + \frac{1}{x}$$

6. 
$$l(x) = \frac{1+x}{(1-x)x}$$
 (Indication: écrire la fonction sous la forme  $\frac{A}{1-x} + \frac{B}{x}$ )

7. 
$$m(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

## Exercise 3:

Calculer les intégrales suivantes:

$$1. \int_{0}^{1} x e^{-x} dx$$

$$2. \int_{0}^{1} x 2^{x} dx$$

3. 
$$\int_{2}^{3} \ln(x^2 - 1) dx$$

$$4. \int_{0}^{1} \left(x^2 + 1\right) \cos(x) \mathrm{d}x$$

$$5. \int_{1}^{e} x \ln(x) dx$$