

根据你补充的信息，最适合你的不是六天高强度训练，而是：

每周 4 次力量训练 + 2 次低强度有氧或游泳。

这样既能利用你每天放学后去健身房的习惯，也能让肌肉和颈部获得足够恢复。你的视觉目标是胸、肩、背部更宽，因此训练量会略微偏向上半身；但腿部仍然需要认真训练，否则容易出现体态、力量和恢复方面的短板。

ACSM 在 2026 年更新的阻力训练指南中强调：比起复杂的训练技巧，更重要的是规律训练，并让主要肌群每周至少接受两次刺激。以增肌为目标时，可以逐步接近每个主要肌群每周约 10 个有效训练组。普通健身者也没有必要频繁练到力竭。[\(ACSM\)](#)

一、先明确你的目标

你目前 22 岁，身高 185 cm，体重约 85 kg。你的目标可以定义为：

在体重缓慢下降的同时，提高力量和肌肉量，使腰围逐渐下降，并让胸部、肩部和背部的轮廓更加明显。

对于健身新手，这种身体重组通常比单纯追求快速减重更合理。腹部脂肪不能通过大量卷腹精准消除：一项随机对照试验发现，连续六周进行腹部训练可以提升腹肌耐力，但不足以显著减少腹部皮下脂肪。[\(PubMed\)](#)

因此，你可以训练腹部，但真正决定肚子是否变小的仍然是总体热量控制、日常活动量和长期坚持。

二、每周训练安排

你每周往返学校六次，每次步行约 5 km，相当于每周已经有约 30 km 的步行量。这是很好的低强度活动基础。

建议先执行以下计划 **6 周**：

星期	训练内容	强度
周一	上肢 A：胸部、背部、肩部	中等
周二	下肢 A：深蹲模式、臀腿、核心	中等
周三	游泳或坡度快走	轻量恢复
周四	上肢 B：背部、肩部、胸部	中等

星期	训练内容	强度
周五	下肢 B：髋关节主导、臀腿、核心	中等
周六	轻量有氧，可选少量手臂和侧平举	轻量
周日	完全休息	—

NHS 对成年人提出的基础目标是：每周至少完成 150 分钟中等强度有氧活动，并至少安排两天覆盖主要肌群的力量训练。你的步行、游泳和健身房训练可以共同完成这一目标。([nhs.uk](https://www.nhs.uk))

三、具体训练动作

周一：上肢 A，以胸部和水平拉动作为重点

动作	组数 × 次数	注意事项
坐姿器械推胸 Chest Press	3 × 8–12	初期比自由卧推更容易稳定控制
胸托划船 Chest-Supported Row	3 × 8–12	胸口贴住靠垫，减少颈部代偿
上斜哑铃卧推 Incline Dumbbell Press	2 × 8–12	椅背约 15–30 度，不要过高
中立握高位下拉 Neutral-Grip Lat Pulldown	3 × 8–12	拉向上胸，不要拉到颈后
绳索侧平举 Cable Lateral Raise	2 × 12–20	重量轻一些，避免耸肩
绳索下压 Triceps Pushdown	2 × 10–15	肘部固定
哑铃弯举 Dumbbell Curl	2 × 10–15	不要晃动身体

你的视觉重点是肩宽和背宽，因此高位下拉、划船和侧平举非常重要。胸托划船比俯身杠铃划船更适合你当前阶段，因为更容易保持颈部中立。

周二：下肢 A，以股四头肌为重点

动作	组数 × 次数	注意事项
腿举 Leg Press	3 × 8–12	膝盖方向与脚尖基本一致
哑铃罗马尼亚硬拉 Dumbbell RDL	3 × 8–12	先学习髋关节后移
腿屈伸 Leg Extension	2 × 10–15	顶端不要猛甩
腿弯举 Leg Curl	2 × 10–15	控制回程
小腿提踵 Calf Raise	3 × 12–20	顶端停顿
平板支撑 Plank	2 × 30–60 秒	不要抬头看前方

周三：低强度有氧或游泳

二选一即可：

选择	安排
游泳	轻松游 20–30 分钟，不追求速度
跑步机	坡度快走 25–40 分钟
单车或椭圆机	25–40 分钟

强度控制在可以正常说话，但呼吸略快的程度。游泳过程中，若某种泳姿让左侧颈部不舒服，就立即改用其他方式。蛙泳抬头过多、自由泳单侧换气不自然时，都可能让部分人的颈部更加紧张。

周四：上肢 B，以背部和肩部为重点

动作	组数 × 次数	注意事项
辅助引体向上或高位下拉	3 × 8–12	先追求控制，不追求重量
坐姿绳索划船 Seated Cable Row	3 × 8–12	肩膀不要向耳朵靠近
坐姿器械推胸	2 × 8–12	维持胸部每周训练量
反向飞鸟 Reverse Pec Deck	2 × 12–20	训练后束和上背
哑铃侧平举	3 × 12–20	肩部视觉宽度的重点动作
面拉 Face Pull	2 × 12–20	轻重量，动作不应引发颈部不适
弯举或绳索下压	各 2 × 10–15	手臂辅助训练

暂时不要急着做大重量杠铃肩推。你的肩部仍然会通过推胸、侧平举、反向飞鸟和面拉获得足够刺激。

周五：下肢 B，以臀腿后侧为重点

动作	组数 × 次数	注意事项
史密斯深蹲 Smith Squat	3 × 8–12	先用轻重量学习轨迹
罗马尼亚硬拉 RDL	3 × 8–12	可以继续使用哑铃
臀推 Hip Thrust	2 × 8–12	顶端夹紧臀部，不要过度抬头
腿弯举	2 × 10–15	控制离心阶段
小腿提踵	3 × 12–20	动作完整

动作	组数 × 次数	注意事项
卷腹或悬垂抬膝	2 × 10–15	避免用手拉扯颈部

周六：恢复日

选择一种低强度有氧做 20–40 分钟即可。

状态较好时，可以增加：

动作	组数 × 次数
侧平举	2 × 15–20
绳索弯举	2 × 12–15
绳索下压	2 × 12–15

这些动作属于可选项。睡眠不足、颈部紧张或身体明显疲劳时，直接省略。

四、颈部旧伤的处理原则

你的左颈曾经拉伤，所以前四至六周不需要尝试任何让颈部承受较大压力的动作。

暂时避免：

- 大重量杠铃肩推；
- 颈后推举和颈后下拉；
- 大重量耸肩；
- 直立划船；
- 需要明显憋气和用力顶住颈部的动作；
- 动作过程中反复仰头观察镜子。

训练时保持下巴轻微收回，视线自然向前。肩部动作一旦变成不断耸肩，就降低重量。

NHS 建议颈部不适时仍保持适量活动，但不要让颈部长时间维持同一姿势。若疼痛持续数周没有改善，或者出现手臂麻木、针刺感、手臂发冷等症状，应当联系 GP 或物理治疗师。([nhs.uk] (<https://www.nhs.uk/symptoms/neck-pain-and-stiff-neck/> "Neck pain

- NHS"))

你经常在学校学习后直接健身，因此还有一个细节很重要：每学习 45–60 分钟，起来活动两三分钟。长时间低头看电脑也可能让左侧颈部更加紧张。([nhs.uk]

(<https://www.nhs.uk/symptoms/neck-pain-and-stiff-neck/> "Neck pain

- NHS"))
-

五、重量怎么选

每一组做完后，保留大约 **2-3 次余力**。

例如，你做高位下拉 10 次以后，感觉最多还能保持动作质量再做 2 次，这个重量就比较合适。

不要一开始就反复挑战极限重量，也不要每组练到动作变形。ACSM 的新版指南指出，对于普通成年人而言，规律训练比复杂技巧更加关键；机器与自由重量都能有效训练，练到力竭也不是获得效果的必要条件。(ACSM)

渐进超负荷规则

每个动作设置一个次数范围，例如 8-12 次：

- 第一次完成：10、9、8 次；
- 几次训练后完成：12、12、12 次；
- 下一次增加最小档位；
- 增加重量后重新从 8-10 次开始积累。

上肢动作通常每次增加 1-2.5 kg，下肢动作通常增加 2.5-5 kg。器械档位较大时，增加最小档位即可。

八、记录方式

你不需要同时使用很多 App。两个已经足够。

Hevy：记录力量训练

Hevy 适合记录每个动作的重量、次数、组数和历史训练表现。其官方页面和应用商店页面显示，基础版本可以免费使用，也没有广告。(Hevy)

你可以先建立四个模板：

- Upper A；
- Lower A；

- Upper B；
- Lower B。

每次训练只需要照着模板完成，并记录重量。

Cronometer：记录饮食

Cronometer 适合记录热量、蛋白质、碳水化合物和脂肪。其官方页面显示，它支持免费条形码扫描，也可以查看较详细的营养数据。([Cronometer](#))

刚开始不需要永久记录每一口食物。先认真记录两周，建立对份量和热量的直觉。

九、每周只看这些数据

指标	频率	怎么看
早晨空腹体重	每周 4-7 次	看七天平均值
腰围	每周一次	固定在早晨测量
正面、侧面照片	每四周一次	使用相同光线和角度
动作重量和次数	每次训练	用 Hevy 记录
睡眠时长	每天	尽量达到 7-9 小时
颈部不适程度	每次训练后	观察哪些动作会诱发症状

体重单日上下波动很正常。盐分、饮水、睡眠、碳水摄入和排便情况都会造成变化。真正重要的是两到四周的趋势。
