

Datenaufbereitung

Im Rahmen der Datenaufbereitung wurden zuerst die Datensätze beider Messzeitpunkte mittels IBM SPSS Statistics (Version 31.0.0.0) zusammengefügt. Zudem wurden die Vollständigkeit der Fragebögen und Schreibaufgaben im Datensatz mit 0 (nicht erfüllt) und 1 (erfüllt) kodiert, um auf dieser Basis die Stichprobe filtern zu können.

Anschließend folgte die Bereinigung der Stichprobe. Der detaillierte Teilnehmendenverlauf von der Rekrutierung bis zur finalen Analysestichprobe ist dem Flussdiagramm (Abbildung 1) zu entnehmen. Die ursprüngliche Stichprobe umfasste N = 45 Personen (IG: n = 23; KG: n = 22). Im Studienverlauf schieden n = 14 Personen aufgrund fehlender Fragebogendaten (t0 oder t1) sowie der Erfüllung von weniger als 6 Schreibaufgaben aus. Es beendeten insgesamt 31 Teilnehmende die Studie (IG: n = 16; KG: n = 15), was einer Dropout-Rate von 31,1 % entspricht.

Nach Abschluss der Erhebungsphase wurden die verbleibenden 31 Datensätze auf das Einschlusskriterium Erststudium sowie auf Instruktionstreue geprüft. Hierbei wurden folgende Kriterien betrachtet:

- Formal: Wurden die Texte handschriftlich und in ganzen Sätzen verfasst?
- Thematisch: Wurde in der IG über Emotionen und Herausforderungen geschrieben, während in der KG ausschließlich faktenbasierte Texte verfasst wurden?
- Umfang (exklusiv für die IG geprüft): Entspricht die Textlänge glaubhaft einer Schreibzeit von mindestens 15 Minuten?

Bei Verletzung mindestens eines Kriteriums galt die Instruktionstreue eines Teilnehmenden als nicht erfüllt. Im Datensatz wurde dies mit 0 (nicht erfüllt) und 1 (erfüllt) kodiert. Im Anschluss an die Kodierung wurden alle geschriebenen Texte aufgrund des zugesagten Datenschutzes vernichtet. Aufgrund dieses Kriteriums wurden weitere acht Personen von den Analysen ausgeschlossen, sodass die finale Analysestichprobe N = 23 Personen umfasste (IG: n = 12; KG: n = 11).

Fehlende Werte in der Variable Alter wurden als solche definiert und von den Berechnungen ausgeschlossen. Die übrigen Skalen wiesen keine fehlenden Werte auf. Anschließend wurden alle negativ gepolten Items rekodiert. Hierbei ist

anzumerken, dass abweichend vom Manual alle Freude-Items des PSQ20 invertiert wurden, sodass ein hoher Wert in diesen Items einem hohen wahrgenommenen Stress entspricht. Damit wurde die Interpretation der Freude-Skala an die der übrigen Subskalen angeglichen.


In Vorbereitung auf die Auswertung wurden Mittelwertsvariablen für die SESW (SESW-Skala zu t0 und t1) sowie den wahrgenommenen Stress (PSQ20 zu t0 und t1) gebildet. Die berechneten Variablen wurden anschließend auf Ausreißer und Normalverteilung geprüft. Die Prüfung auf potenzielle Ausreißer erfolgte grafisch mittels Boxplots. Vereinzelt zeigten sich Extremwerte; da sich diese jedoch innerhalb des vorgegebenen Antwortformats der 5-stufigen Likert-Skala bewegten, wurden sie als inhaltlich valide Ausprägungen bewertet und in der Auswertung belassen.

Auch für die vier Subskalen des PSQ20 wurden zunächst Mittelwertsvariablen erstellt, auf eine Auswertung der Subskalen dann jedoch verzichtet. Dies begründet sich einerseits durch den Hinweis der Autoren, dass sich die faktorielle Struktur der Skala in verschiedenen Stichproben nicht zuverlässig replizieren ließ (Fliege et al., 2001), und andererseits darin, dass eine berechnete Korrelationsmatrix (Anhang F) hohe Korrelationen zwischen den Subskalen zeigte. Dadurch, dass die Einzelskalen sowohl in der Validierungsstudie als auch in der vorliegenden Arbeit hoch miteinander korrelierten und somit nicht zuverlässig trennscharf auszuwerten sind, wird nachfolgend lediglich die Gesamtskala betrachtet.

Zusätzlich zu den Mittelwertsvariablen wurde für eine ergänzende Auswertung eine Differenzvariable gebildet, welche die Reduktion des wahrgenommenen Stresses der Teilnehmenden von t0 zu t1 abbildet.

Abbildung 1

Flussdiagramm des Teilnehmendenverlaufs



Anmerkung. Eigene Darstellung in Anlehnung an die APA-JARS-Richtlinien für quantitative Forschung (Appelbaum et al., 2018). N = Gesamtzahl der Teilnehmenden, n = Teilstichprobe, t0 = erster Messzeitpunkt, t1 = zweiter Messzeitpunkt.