

Первая медицинская помощь при электротравме на рабочем месте учителя информатики

Конспект подготовила студентка 1 курса ПОО Терехина Елизавета.

1. Признаки поражения электрическим током

- Судорожные сокращения мышц (пострадавший не может отпустить провод)
- Потеря сознания (от кратковременного обморока до глубокой комы)
- Нарушение или остановка дыхания
- Отсутствие пульса
- Ожоги в местах входа и выхода тока (чаще на руках)
- Слабость, тошнота, головокружение (при легкой степени)

2. Обеспечение безопасности спасателя

Ни в коем случае нельзя прикасаться к пострадавшему, пока он находится под напряжением, иначе можно так же пострадать от тока.

Как обесточить:

- **Лучший вариант** - выключить рубильник, автомат, выдернуть вилку из розетки.
- **Если выключатель далеко** - отбросить провод от пострадавшего сухим предметом (деревянная палка, линейка, пластиковая бутылка, книга в сухой обложке).
- **Оттащить пострадавшего** - только за сухую одежду, одной рукой, вторую держать за спиной, чтобы ток не замкнулся через вас.
- **Защитить себя** - встать на сухой резиновый коврик, сухую доску или свернутую одежду; надеть резиновые перчатки или обмотать руки сухой тканью.

3. Алгоритм оказания первой помощи

После отключения электротока:

Шаг	Действие
1	Вызвать скорую помощь - 103 (с мобильного) или 03 (со стационарного)
2	Положить пострадавшего на спину на жесткую поверхность (пол, парта).

Шаг	Действие
3	Проверить пульс на сонной артерии (два пальца на шее сбоку от кадыка) и дыхание (прослушать ухом у рта и носа, увидеть движение грудной клетки).
4	Если нет пульса и дыхания - немедленно начать сердечно-легочную реанимацию (СЛР).
5	Если пульс есть, но нет дыхания - делать искусственное дыхание.
6	Если пульс и дыхание есть, но без сознания - повернуть пострадавшего на правый бок (чтобы не запал язык и не захлебнулся рвотой).
7	Наложить сухие стерильные повязки на места ожогов (чистая ткань, бинт). Ни в коем случае ничем не мазать.
8	Обязательно дождаться скорой и передать пострадавшего врачам - даже если пострадавший чувствует себя хорошо, необходима госпитализация для наблюдения за сердечной деятельностью как минимум 24 часа.