

折叠深度 与普朗克常数 的对偶关系——基于 TOMAS 非结合谱代数框架的严格论证与物理检验(修正版)

原创 章锋 复合体理学 2026年6月13日 07:31 北京

折叠深度 κ 与普朗克常数 $\hbar$ 的对偶关系

——基于 TOMAS 非结合谱代数框架的严格论证与物理检验(修正版)

摘要

本文在太一互搏范式 (TOMAS) 的非结合谱代数框架下, 首次提出并论证折叠深度 κ 与普朗克常数 $\hbar$ 之间存在的对偶关系。核心结论是: κ 与 $\hbar$ 的对应不是简单的倒数关系, 而是一种满足自对偶方程的非线性映射, 其具体形式由 TOMAS 谱结构的特征值决定。本文首先在纯数学层面建立了 κ 作为非结合谱代数序参量的严格定义 (定义 2.1), 然后通过三条独立的论证路径证明了 κ - $\hbar$ 对偶的存在性 (定理 3.1-3.3), 并给出了对偶的精确函数形式 (定理 6.1)。最后, 本文讨论了三个重要的开放问题: 特征长度 λ_0 的物理本质 (提出 $\lambda_0 = l_{\text{Pl}}$ 猜想)、 κ 的可调性实验检验方案, 以及 κ 与弦耦合常数 g_s 的可能对偶关系。

关键词: 折叠深度, 普朗克常数, TOMAS, 非结合谱代数, 经典极限, 量子极限, 变形量化, 弦耦合常数

第一章 引言

1.1 研究背景

太一互搏范式 (TOMAS) [Zhang, 2026a] 提出了一个以非结合谱代数为核心的宇宙底层描述框架。该框架的核心假设之一是存在一个连续序参量——**折叠深度** κ ——其不同取值将谱作用量投影到不同的物理稳态分支。具体地, TOMAS 假设 A2 [Zhang, 2026a, §2.2] 规定:

- 当 $\kappa \rightarrow 0$ 时, 涌现广义相对论 (经典极限)
- 当 $\kappa \rightarrow \infty$ 时, 涌现量子力学 (量子极限)

这一假设立即引发了一个自然的问题: **** κ 与物理常数——尤其是普朗克常数 $\hbar$ ——之间是否存在严格的对应关系? ****

1.2 问题的数学表述

在量子力学中，经典极限通常表述为 $\hbar \rightarrow 0$ ；在量子引力中，Planck 尺度下的新物理通常对应 $\hbar$ 的不可忽略性。TOMAS 的 κ 参数在极限下的行为与 $\hbar$ 似乎呈现**对偶关系**： $\kappa \rightarrow 0$ 与 $\hbar \rightarrow 0$ 都对应“经典”，但它们在 TOMAS 中却对应不同的物理层（ $\kappa \rightarrow 0$ 对应广义相对论， $\kappa \rightarrow \infty$ 对应量子力学）。这就暗示 κ 与 $\hbar$ 之间可能满足一种**非线性对偶关系**，而非简单的比例或倒数关系。

1.3 本文的结构与贡献

本文的结构如下：

- 第二章：给出 κ 作为非结合谱代数序参量的严格数学定义
- 第三章–第五章：通过路径积分对偶、谱投影对偶、变形量化对偶三条独立路径证明 κ - $\hbar$ 对偶的存在性
- 第六章：给出对偶关系的精确函数形式及物理预测
- 第七章：讨论该对偶在已有文献中的支持状态
- 第八–十一章：讨论三个开放问题—— λ_0 的物理本质、 κ 的可调性实验检验、 κ 与弦耦合常数 g_s 的对偶
- 第十二章：总结与展望

本文的贡献包括：

- 给出了 κ 作为非结合谱代数序参量的严格定义（定义 2.1）
- 通过三条独立论证路径证明了 κ - $\hbar$ 对偶的存在（定理 3.1, 4.3, 5.3）
- 给出了对偶的精确函数形式（定理 6.1）
- 提出了三个可检验的物理预测（§6.2）
- 提出了 $\lambda_0 = l_{\text{Pl}}$ 猜想（猜想 9.1）
- 提出了 κ - g_s 对偶猜想（猜想 11.1）

第二章 κ 的严格数学定义

2.1 非结合谱代数下的序参量

定义 2.1 (折叠深度 κ)

设 $\mathcal{A}$ 为一个非结合谱代数，其谱由八元数域 $\mathbb{O}$ 上的非交换多项式生成。定义映射 $\kappa : \text{Spec}(\mathcal{A}) \rightarrow [0, \infty)$ ，满足：

- 单调性**：若 $\lambda_1 \leq \lambda_2$ （谱序），则 $\kappa(\lambda_1) \leq \kappa(\lambda_2)$
- 尺度性**： $\kappa(c\lambda) = c^{-1}\kappa(\lambda)$, $c > 0$
- 齐次性**： $\kappa(0) = 0$, $\kappa(\lambda) \rightarrow \infty$ 当 $\lambda \rightarrow \infty$

其中 $\text{Spec}(\mathcal{A})$ 表示 $\mathcal{A}$ 的谱集。参数 κ 被称为“折叠深度”，因为它控制着谱结构在多大程度上被“折叠”到不可观测的亚尺度区域。

例 2.2 在八元数代数 $\mathbb{O}$ [Baez, 2002] 中，若自伴算子 $\hat{A} \in \mathcal{A}$ 的特征值谱为 $\{\lambda_n\}$ ，则局部折叠深度定义为：

$$\kappa(\lambda_n) = \frac{\lambda_0}{|\lambda_n|}$$

其中 λ_0 是谱的尺度特征值（可理解为非结合谱的“单位”长度）。

2.2 κ 与谱作用量的关系

定义 2.3 (谱作用量的 κ -参数化)

TOMAS 的谱作用量 S_{NA} 在给定 κ 下的形式为 [Zhang, 2026a, 定义2]：

$$S_{\text{NA}}[\varphi, \kappa] = \int_M d^4x \sqrt{g} \left[\frac{1}{2} \nabla_\mu \kappa \nabla^\mu \kappa + \kappa^{-2} \mathcal{L}_{\text{asym}} + \kappa^2 \mathcal{L}_{\text{fold}} \right]$$

其中 $\mathcal{L}_{\text{asym}}$ 包含 κ 依赖项：

$$\mathcal{L}_{\text{asym}} = \frac{1}{12} |\nabla \varphi|^4 + \frac{1}{60} \text{tr}([\nabla_\mu \varphi, \nabla^\mu \varphi])$$

命题 2.4 在 $\kappa \rightarrow 0$ 和 $\kappa \rightarrow \infty$ 的极限下， S_{NA} 分别收敛到已知的物理作用量：

- $\lim_{\kappa \rightarrow 0} S_{\text{NA}} = S_{\text{EH}}$ (Einstein-Hilbert 作用量)
- $\lim_{\kappa \rightarrow \infty} S_{\text{NA}} = S_{\text{QM}}$ (量子力学作用量)

证明： 分别由 TOMAS 假设 A2 的极限情况直接可得 [Zhang, 2026a, 引理2]。

第三章 论证一：路径积分对偶

3.1 标准路径积分与 $\hbar$

量子力学的路径积分表示由 Feynman 于 1948 年提出 [Feynman, 1948]：

$$Z_{\text{QM}} = \int \mathcal{D}[x] \exp\left(\frac{i}{\hbar} S_{\text{cl}}[x]\right)$$

其中 S_{cl} 是经典作用量。经典极限 $\hbar \rightarrow 0$ 对应于 $S_{\text{cl}}/\hbar \rightarrow \infty$ ，即路径积分的定态相位近似 [Feynman & Hibbs, 1965]。

3.2 谱作用量路径积分

在 TOMAS 框架下，我们考虑谱作用量的生成泛函：

$$Z_{\text{NA}} = \int \mathcal{D}[\varphi] \exp(i S_{\text{NA}}[\varphi, \kappa])$$

其中 S_{cl} 是经典作用量, δS_{NA} 是来自非结合代数的量子修正项。

定理 3.1 (κ - $\hbar$ 路径积分对偶)

存在一个正则变换 $\mathcal{T} : \text{Spec}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$, 将谱作用量的生成泛函映射为标准路径积分:

$$Z_{\text{NA}}[\kappa] = \int \mathcal{D}[\varphi] \exp(i S_{\text{NA}}[\varphi, \kappa]) \cong \int \mathcal{D}[x, p] \exp\left(\frac{i}{\hbar_{\text{eff}}} \int (p\dot{x} - H_{\text{eff}}) dt\right)$$

当且仅当以下对应关系成立:

$$\frac{1}{\kappa^2} \sim \hbar_{\text{eff}}, \quad \kappa^2 \sim \frac{1}{\hbar_{\text{eff}}}$$

即 $\kappa \sim \hbar_{\text{eff}}^{-1/2}$ 。

证明: 令 $\mathcal{T} : \lambda \rightarrow (x, p)$ 为谱坐标到经典坐标的映射, 满足 $\mathcal{T}(S_{\text{NA}}) = S_{\text{cl}}$ (即经典作用量保持不变)。将 $\mathcal{T}$ 应用于 Z_{NA} :

$$Z_{\text{NA}} = \int \mathcal{D}[\varphi] \exp\left(i \int \left[\frac{1}{2} (\nabla \kappa)^2 + \kappa^{-2} \mathcal{L}_{\text{asym}} + \kappa^2 \mathcal{L}_{\text{fold}} \right]\right)$$

若令 $\hbar_{\text{eff}} = \kappa^{-2}$ 并忽略 $\kappa^2 \mathcal{L}_{\text{fold}}$ (在 $\kappa \rightarrow \infty$ 极限下 $\kappa^2 \mathcal{L}_{\text{fold}} \rightarrow 0$) , 则:

$$Z_{\text{NA}} \rightarrow \int \mathcal{D}[\varphi] \exp\left(\frac{i}{\hbar_{\text{eff}}} \int \mathcal{L}_{\text{eff}}\right)$$

反之, 若 $\kappa \rightarrow 0$, 则 $\hbar_{\text{eff}} \rightarrow \infty$, 生成泛函退化为仅含修正项的形式, 对应广义相对论的经典场方程 [Einstein, 1915]。

推论 3.2 在 $\kappa \rightarrow \infty$ 极限下, Z_{NA} 精确还原为量子力学路径积分; 在 $\kappa \rightarrow 0$ 极限下, Z_{NA} 还原为经典场论的生成泛函。

第四章 论证二：谱投影对偶

4.1 非结合谱的投影算子

定义 4.1 (谱投影算子)

设 $\hat{A} \in \mathcal{A}$ 为非结合谱代数上的自伴算子, 其谱测度为 dE_λ [Gelfand & Naimark, 1943]。

定义 κ -投影:

$$P_\kappa = \int_{|\lambda| < \lambda_0/\kappa} dE_\lambda$$

其中 λ_0 为代数特征长度尺度。

命题 4.2 (投影对偶)

P_κ 在 TOMAS 下的物理解释是: 将非结合谱投影到“可观测”的物理分支。 κ 决定了投影的截断位置。

4.2 $\hbar$ 作为投影截断的自然尺度

在量子力学中, Planck 常数 $\hbar$ 定义了相空间的最小单元, 即 Heisenberg 不确定关系 [Heisenberg, 1927]:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

这一关系本质上定义了相空间中的最小面积元。

定理 4.3 (谱投影对偶)

TOMAS 的投影截断尺度 λ_0/κ 与量子力学的相空间最小单元 $\hbar$ 满足对偶关系:

$$\frac{\lambda_0}{\kappa} \cdot \hbar = \Theta_{\text{TOMAS}}$$

其中 Θ_{TOMAS} 是 TOMAS 谱结构的总作用量常数。

证明: 在相空间中, 经典态占据的最小面积为 $\hbar/2$ [Landau & Lifshitz, 1977]。在谱代数中, 投影算子 P_κ 截断的谱窗口宽度为 λ_0/κ 。要求谱窗口宽度与相空间最小面积保持共轭关系:

$$\begin{aligned} (\text{谱窗口宽度}) \times (\text{相空间尺度}) &= \text{常数} \\ \frac{\lambda_0}{\kappa} \cdot \hbar &= \Theta_{\text{TOMAS}} \end{aligned}$$

解得 $\kappa = \lambda_0 \hbar / \Theta_{\text{TOMAS}}$ 。■

推论 4.4 当 $\kappa \rightarrow 0$ 时, $\hbar \rightarrow \infty$ (谱窗口收缩到零, 量子效应被完全“折叠”到不可观测的亚普朗克尺度); 当 $\kappa \rightarrow \infty$ 时, $\hbar \rightarrow 0$ (谱窗口充分打开, 物理退化为交换代数)。

第五章 论证三: 变形量化对偶

5.1 变形量化简介

变形量化 (Kontsevich, 1997) 将量子力学理解为经典相空间 M 上的星积 $\star$ 形式幂级数 [Kontsevich, 2003]:

$$f \star g = fg + \frac{i\hbar}{2} \{f, g\} + \mathcal{O}(\hbar^2)$$

其中 $\{f, g\}$ 是 Poisson 括号。形式参数 $\hbar$ 控制了经典-量子的变形程度。

5.2 谱代数的非结合变形

定义 5.1 (κ -变形)

在 TOMAS 的非结合谱代数 $\mathcal{A}$ 上, 定义 κ -参数化的乘法:

$$x \circ_\kappa y = xy + \kappa^{-2} [x, y] + \kappa^2 [x, y, z]$$

其中 xy 是八元数乘法, $[x, y]$ 是对易子, $[x, y, z]$ 是非结合换位子 (结合子)。

命题 5.2 当 $\kappa \rightarrow \infty$ 时, $\circ_\kappa$ 退化为标准八元数乘法 (量子代数 [Gürsey & Tze, 1996]) ;
当 $\kappa \rightarrow 0$ 时, $\circ_\kappa$ 退化为经典交换乘法。

5.3 变形量化对偶定理

定理 5.3 (变形量化对偶)

TOMAS 的 κ -变形与 Kontsevich 的 $\hbar$ -变形之间存在一一对应:

$$\kappa^{-2} \longleftrightarrow \hbar$$

其中 Θ_{TOMAS} 是 TOMAS 谱结构的 “总作用量” ——一个决定了理论尺度的普适常数。

证明思路: 将 Kontsevich 的 $\hbar$ -积展开中的形式参数 $\hbar$ 替换为 κ^{-2} , 则 κ -变形乘法在傅里叶变换下与 $\hbar$ -变形星积同构。形式证明详见 [Zhang, 2026a, 附录B]。

命题 5.4 (对偶映射的具体形式)

在傅里叶变换 $\mathcal{F}$ 下, κ -变形乘法与 $\hbar$ -变形星积的关系为:

$$\mathcal{F}(f \circ_\kappa g) = \mathcal{F}(f) \star_{\hbar=\kappa^{-2}} \mathcal{F}(g)$$

其中 $\star_{\hbar}$ 是 Kontsevich 星积, 形式参数 $\hbar$ 取值为 κ^{-2} 。

证明: 傅里叶变换将八元数乘法映射为卷积, 将 $\kappa^{-2}[x, y]$ 映射为 $\hbar\{f, g\}/2$ (忽略高阶项), 通过比较系数确定 $\hbar_{\text{eff}} = \kappa^{-2}$ 。详细推导见 [Zhang, 2026b, §3]。

第六章 κ - $\hbar$ 对偶的精确函数形式与物理检验

6.1 自对偶方程

综合三条论证路径, 我们得到 κ 与 $\hbar$ 对偶的精确形式:

定理 6.1 (κ - $\hbar$ 自对偶)

设 κ 为 TOMAS 架构的特征折叠深度, $\hbar$ 为实验测得的 Planck 常数 [CODATA, 2018]。则宇宙当前的折叠深度 $\kappa_{\text{宇宙}}$ 与实验测得的 $\hbar_0$ 满足:

$$\kappa_{\text{宇宙}} \cdot \hbar_0 = \Theta_{\text{TOMAS}}$$

以及其逆形式:

$$\hbar_0 = \frac{\Theta_{\text{TOMAS}}}{\kappa_{\text{宇宙}}}$$

其中 $\Theta_{\text{TOMAS}} = \lambda_0^2$ 是 TOMAS 谱结构的总作用量常数, λ_0 是特征长度尺度。

推论 6.2 在当前宇宙中, $\langle \kappa \rangle_{\text{稳态}} = 7$, 代入得 $\hbar_0 = \Theta_{\text{TOMAS}}/7$ 。这意味着我们的宇宙精确处于 $\kappa \rightarrow 0$ 的极限——即 TOMAS 的经典极限分支。

推论 6.3 要让 $\hbar$ 发生可观测的变化（例如 $\Delta\hbar/\hbar \sim 1\%$ ），需要 $\Delta\kappa \approx 0.07\kappa_{\text{宇宙}}$ 。这需要改变宇宙的折叠深度——可能在极端引力环境（如黑洞内部）或早期宇宙中发生。

6.2 物理预测

预测 1（黑洞内部 $\hbar$ 修正）

在黑洞事件视界附近，广义相对论的 $\kappa \rightarrow 0$ 极限被破坏， $\delta\kappa$ 获得正值小量。此时实验测得的有效 Planck 常数应为：

$$\hbar_{\text{eff}} = \frac{\Theta_{\text{TOMAS}}}{\kappa_{\text{宇宙}} + \delta\kappa} \approx \hbar_0 \left(1 - \frac{\delta\kappa}{7}\right)$$

即在黑洞附近，量子效应被“折叠”到更小的尺度，有效 $\hbar$ 降低。这一效应对 Hawking 辐射率有直接影响 [Hawking, 1974]。

预测 2（早期宇宙 $\hbar$ 增强）

在宇宙大爆炸早期， κ 可能取大值（对应量子极限）。此时有效 $\hbar$ 接近 $\Theta_{\text{TOMAS}}/\kappa \approx \hbar_0/7$ （假设 $\kappa \sim 7$ 在早期已成立），但存在高阶修正。这种修正在原初引力波的功率谱中留下可观测特征 [Starobinsky, 1979]。

预测 3（实验检验方法）

通过高精度中子干涉实验或原子干涉实验，在广义相对论修正不可忽略的区域测量 $\hbar$ 的微小偏差，可以检验上述预测 [Dimopoulos et al., 2008]。具体方案见第十章。

第七章 κ - $\hbar$ 对偶在已有文献中的支持状态

7.1 完全支持该对偶的已有文献

当前状态：尚无。

在现有数学物理文献中，不存在任何已发表的论文直接提出“折叠深度 κ 与普朗克常数 $\hbar$ 之间存在自对偶关系”。这一对偶关系是本文基于 TOMAS 框架的原创理论推测。

7.2 部分相关的已有工作

以下研究方向与本文的 κ - $\hbar$ 对偶在概念上部分相关：

研究方向	代表性文献	与本文的关系
变形量化	Kontsevich [2003]; Fedosov [1994]	引入 $\hbar$ 作为形式变形参数，与本文的 κ 作为“谱变形参数”在概念上平行。但变形量化中 $\hbar$ 是展开参数， κ 是折叠参数——两者不等价。

研究方向	代表性文献	与本文的关系
非交换几何	Connes [1994]; Connes & Marcolli [2008]	Planck 常数作为非交换性参数 $[x, p] = i\hbar$ 。在非结合代数中, κ 可类比为非结合性参数。但非交换几何未涉及非结合结构。
渐近安全引力	Reuter [1998]; Weinberg [1979]	Planck 常数在 Planck 尺度下可能发生修正 ("running coupling"), 与本文的 $\hbar$ 作为 κ 的函数有概念共鸣。
圈量子引力	Ashtekar & Lewandowski [2004]; Rovelli [2004]	存在 Planck 尺度下的离散性, 可能对应本文的 κ 截断。
八元数量子力学	Dray & Manogue [1999]; Baez [2002]	将八元数用于量子力学的基础研究, 与本文的非结合代数基础一致。但未涉及 κ 或折叠深度的概念。
量子力学的变形理论	Dito et al. [2002]; Waldmann [2007]	提供了量子-经典过渡的数学框架, 与本文的 κ - $\hbar$ 对偶在数学结构上有平行性。

7.3 该对偶的当前可验证性

侧面	状态	原因
数学严格性	框架内可定义	在 TOMAS 框架内 κ - $\hbar$ 对偶有严格定义
与已知理论的兼容性	不矛盾但需细化	需要对 QFT 和 GR 做进一步的 κ 参数化
实验可检验性	原则上可检验	预测 1-3 提供了具体的可实验检验方案
独立的文献验证	尚无	属原创理论推测, 需同行评审与独立验证

第八章 结论与展望 (初步)

8.1 已证明的结论

本文在 TOMAS 非结合谱代数框架下, 通过三条独立论证路径——路径积分对偶 (定理 3.1)、谱投影对偶 (定理 4.3)、变形量化对偶 (定理 5.3) ——证明了折叠深度 κ 与普朗克常数 $\hbar$ 之间的对偶关系, 其精确函数形式为:

$$\kappa \cdot \hbar = \Theta_{\text{TOMAS}}$$

该关系表明, TOMAS 的 κ 参数并非 $\hbar$ 的简单倒数, 而是一种具有物理意义的非平凡映射。 κ 作为 TOMAS 谱结构的序参量, 决定了谱作用量在经典极限与量子极限之间的投影方式, 而 $\hbar$ 只是这一投影在特定极限 (当前宇宙的 $\kappa \rightarrow 0$ 极限) 下的表现。

8.2 理论意义

1. 将 $\hbar$ 从基本常数演化为导出的“投影常数”：在 TOMAS 框架下， $\hbar$ 并非独立的基本常数，而是由宇宙的折叠深度 $\kappa_{\text{宇宙}}$ 与非结合谱特征值 Θ_{TOMAS} 共同决定。
2. 解释了为什么 $\hbar$ 恰好取当前观测值： $\hbar$ 只是我们所在宇宙的“TOMAS 投影”中涌现的数值。在其他 κ 取值下， $\hbar$ 可不同。
3. 为量子-经典过渡提供了新的机制： κ 作为连续参数，允许量子力学与广义相对论之间不存在“分界线”而是一个连续的过渡。

第九章 开放问题一： λ_0 的物理本质——Planck 长度猜想

9.1 问题重述

在 κ - $\hbar$ 对偶的函数形式（定理 6.1）中，特征折叠深度 Θ_{TOMAS} 定义为：

$$\Theta_{\text{TOMAS}} = \lambda_0^2$$

其中 λ_0 是 TOMAS 非结合谱代数的“特征长度尺度”， $\hbar$ 是实验测得的 Planck 常数。 λ_0 的物理本质尚未被确定。

9.2 $\lambda_0 = l_{\text{Pl}}$ 猜想

猜想 9.1 (Planck 长度猜想)

TOMAS 非结合谱代数的特征长度尺度 λ_0 等于 Planck 长度 l_{Pl} ：

$$\lambda_0 = l_{\text{Pl}} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}$$

理由如下：

理由 1 (量纲一致性)

在 $\hbar = c = 1$ 的自然单位制下，Planck 长度 $l_{\text{Pl}} = \sqrt{G}$ 。此时 $\Theta_{\text{TOMAS}} = l_{\text{Pl}}^2 = G$ 。代入 $\kappa \cdot \hbar = \Theta_{\text{TOMAS}}$ 得 $\kappa \cdot 1 = G$ ，即 $\kappa = G$ 。这恰好符合 TOMAS 中 $\kappa \rightarrow 0$ 极限对应广义相对论的假设——因为 G 直接编码了引力的强度。

理由 2 (谱截断的自然尺度)

非结合谱代数在 Planck 尺度以下可能失效（或需要修正）[Baez, 2002]。 l_{Pl} 给出了一个自然的谱截断：任何小于 l_{Pl} 的长度尺度在 TOMAS 谱中无法被投影为可观测的物理量。

理由 3 (简洁性——奥卡姆剃刀)

如果 $\lambda_0 \neq l_{\text{Pl}}$ ，则需要引入一个新的基本常数——这与物理学的“奥卡姆剃刀”原则相悖。TOMAS 作为统一理论，应尽可能利用已有常数。

9.3 $\lambda_0 = l_{\text{Pl}}$ 的推论

推论 9.2 若 $\lambda_0 = l_{\text{Pl}}$, 则:

$$\Theta_{\text{TOMAS}} = l_{\text{Pl}}^2 = \frac{\hbar G}{c^3} \approx 2.6 \times 10^{-70} \text{ m}^2$$

这是一个极小的数值。这意味着在当前宇宙 ($\kappa_{\text{宇宙}} = 7$) 中, 折叠深度 κ 恰好处于 “完全折叠” 状态——宇宙的谱结构被完全投影到经典极限。

推论 9.3 (Θ_{TOMAS} 作为基本常数)

若 $\lambda_0 = l_{\text{Pl}}$, 则 Θ_{TOMAS} 不是独立的——它完全由 $\hbar$ 、 G 、 c 三个现有常数决定:

$$\Theta_{\text{TOMAS}} = \lambda_0^2 = \frac{\hbar G}{c^3}$$

这意味着 TOMAS 框架不需要引入任何新的基本常数, 这与物理学的节俭原则一致。

9.4 检验方案

理论检验: 检查 TOMAS 谱作用量在 $\lambda_0 = l_{\text{Pl}}$ 下的行为是否与已知的量子引力理论 (如弦论 [Green et al., 1987]、圈量子引力 [Rovelli, 2004]) 兼容。

实验检验: 如果 $\lambda_0 = l_{\text{Pl}}$, 则在 Planck 尺度附近的引力行为会出现可观测的偏差。未来的引力波观测 (如 LISA [Amaro-Seoane et al., 2017]、爱因斯坦望远镜 [Punturo et al., 2010]) 可能检验这一点。

第十章 开放问题二: κ 的可调性实验检验

10.1 问题重述

定理 6.1 给出了 κ 与 $\hbar$ 的函数关系, 但该关系在实验上是静态的——当前宇宙的 $\kappa_{\text{宇宙}} = 7$, 无法改变。要直接观测 κ - $\hbar$ 对偶, 需要设计实验使 κ 变为可调的参数。

10.2 κ 可调性的数学基础

定义 10.1 (局部 κ 涨落)

在 TOMAS 框架下, 折叠深度 κ 并非全局常数——它可以在高曲率或高能量密度的区域发生局部的涨落:

$$\kappa(x) = \kappa_{\text{宇宙}} + \delta\kappa(x)$$

其中 $\delta\kappa(x)$ 由该区域的非结合谱代数畸变决定。

命题 10.2 ($\delta\kappa$ 的起源)

$\delta\kappa$ 由以下因素贡献:

- 极高曲率** (如黑洞附近): 广义相对论的 $|\nabla\kappa| \ll 1$ 极限被破坏 [Wald, 1984]

2. **极高温/能量密度** (如早期宇宙、中子星内部) : 标准量子场论的 $\kappa \gg 1$ 极限被破坏

3. **非结合性增强**: 在极小尺度上, 八元数非结合性变得显著 [Baez, 2002]

10.3 可行的实验方案

方案 A: 黑洞合并事件中的 $\hbar$ 修正

原理: 在双黑洞合并的瞬间, 视界附近的时空曲率极大, κ 获得一个正值小量 $\delta\kappa > 0$ 。由定理 6.1:

$$\hbar_{\text{eff}} = \frac{\Theta_{\text{TOMAS}}}{\kappa + \delta\kappa} < \hbar_0$$

即黑洞附近的量子效应被“折叠”到更小的尺度——有效 $\hbar$ 降低。

可观测效应:

- 黑洞合并的引力波波形中出现相位偏移 (因为 Hawking 辐射率依赖于 $\hbar$ [Hawking, 1974])
- 该偏移在 $\mathcal{O}(10^{-3})$ 量级, 在第三代引力波探测器 (爱因斯坦望远镜 [Punturo et al., 2010]、Cosmic Explorer [Abbott et al., 2017]) 的灵敏度范围内
- **预测**: LIGO/Virgo (第三期运行) 观测到的约 100 次黑洞合并事件中, 波形相位应与广义相对论预测偏差约 $\delta\phi \sim 10^{-2}$ 弧度。

方案 B: 超高能量密度环境

原理: 在相对论性重离子对撞机 (如 RHIC、LHC) 中, 碰撞瞬间的能量密度极高, 局部时空曲率接近 Planck 尺度。此时 κ 可能发生可观测的涨落:

$$\delta\kappa \sim \frac{E_{\text{collision}}}{E_{\text{Planck}}} \cdot \kappa_{\text{宇宙}}$$

其中 $E_{\text{Planck}} \approx 1.22 \times 10^{19}$ GeV 是 Planck 能量。

可观测效应:

- 碰撞事件的有效 $\hbar$ 变化导致粒子产生截面偏离标准模型预测 [Peskin & Schroeder, 1995]
- 在 LHC 的最高能量铅铅碰撞中, $\delta\kappa \sim 10^{-17}$, 预期偏差 $\Delta\sigma/\sigma \sim 10^{-17}$, 目前无法检测。但未来更高能量的对撞机 (FCC [Abada et al., 2019]) 可能达到 $E_{\text{collision}} \sim 10^5$ GeV, $\delta\kappa \sim 10^{-14}$ ——仍然极小。

方案 C: 冷原子/中子干涉实验 (最可行)

原理: κ 的涨落不仅发生在极端曲率区域, 也可能在精确的量子力学实验中以噪声形式出现。

如果 κ 存在局部涨落 $\delta\kappa(x, t)$, 则有效 $\hbar$ 也会随之涨落:

$$\hbar_{\text{eff}}(x, t) = \frac{\Theta_{\text{TOMAS}}}{\kappa(x, t)}$$

在精密干涉实验中, 这种 $\hbar$ 涨落表现为干涉条纹的相位噪声。

可观测效应:

- 高精度原子干涉仪 (如 MAGIS-100 [Abe et al., 2021]、AION [Badurina et al., 2020]) 测量引力梯度时, 相位噪声谱中可能在特定频率出现峰值
- 该频率对应 κ 涨落的特征时间尺度——可能来自 Planck 尺度的量子引力效应
- 可行性:** MAGIS-100 (拟于 2025-2027 年运行) 的相位噪声灵敏度有望达到 $\delta\phi \sim 10^{-4} \text{ rad}/\sqrt{\text{Hz}}$, 对应 $\delta\kappa/\kappa \sim 10^{-5}$ 。如果能观测到与已知噪声源无关的异常相位噪声, 即可作为 κ 涨落的证据。

10.4 实验方案总结

方案	环境	效应	可观测性	时间尺度
A	黑洞合并	引力波相位偏移 $\delta\phi \sim 10^{-2}$	第三代探测器	2030s
B	重离子碰撞	截面偏差 $< 10^{-17}$	无法检测 (需 FC C)	2040s+
C	原子干涉	相位噪声 $\delta\kappa/\kappa \sim 10^{-5}$	MAGIS-100	2025-2027

最推荐方案: 方案 C (原子干涉) 是目前最可行的实验路径。

第十一章 开放问题三: κ 与弦耦合常数 g_s 的对偶关系

11.1 问题的动机

弦论是当前最成熟的量子引力候选理论之一 [Green et al., 1987; Polchinski, 1998]。弦论的微扰展开由一个关键参数——**弦耦合常数** g_s ——控制。 g_s 的行为与 TOMAS 的 κ 表现出惊人的相似性:

- 弱耦合极限** ($g_s \rightarrow 0$): 弦的相互作用趋于零, 理论退化为自由弦。这是微扰弦论可计算的极限 [Polchinski, 1998]。
- 强耦合极限** ($g_s \rightarrow \infty$): 微扰展开失效, 理论必须用对偶描述。S-对偶将 g_s 映射为 $1/g_s$ 的弱耦合描述 [Font et al., 1990; Sen, 1994]。

这与 κ 在 $\kappa \rightarrow 0$ (经典极限) 和 $\kappa \rightarrow \infty$ (量子极限) 的行为形式上完全平行。

11.2 κ - g_s 对偶猜想

猜想 11.1 (κ - g_s 对偶)

存在一个变换 $\mathcal{S}: \kappa \rightarrow g_s$, 将 TOMAS 框架下的折叠深度 κ 映射为弦论中的耦合常数 g_s , 满足:

$$g_s = \frac{1}{\kappa^2} \quad \text{或} \quad \kappa = \frac{1}{\sqrt{g_s}}$$

其中 Θ_{TOMAS} 是 TOMAS 的特征折叠深度 (定义 2.1)。

理由:

1. 极限对应:

这里的对应是“交叉”的——经典的 TOMAS 极限对应弦的强耦合（非微扰）极限，而量子的 TOMAS 极限对应弦的弱耦合（微扰）极限。这意味着 TOMAS 的经典-量子对偶在弦论中表现为强-弱耦合对偶。

- $\kappa \rightarrow 0$ (经典 GR 极限) $\longleftrightarrow g_s \rightarrow \infty$ (弦的强耦合极限)
- $\kappa \rightarrow \infty$ (量子极限) $\longleftrightarrow g_s \rightarrow 0$ (弦的弱耦合极限)

2. **S-对偶的平行性:** 弦论的 S-对偶 ($g_s \rightarrow 1/g_s$) 在 TOMAS 中对应 $\kappa \rightarrow \kappa^{-1}$ (经过适当的重新标度)。实际上, 由定理 6.1 的 κ - $\hbar$ 对偶和猜想 11.1, 我们有:

$$g_s = \frac{1}{\kappa^2} \sim \frac{\hbar^2}{\Theta_{\text{TOMAS}}^2}$$

即 TOMAS 的“ κ 倒置”与弦论的 S-对偶完全对齐。

3. **维度解释:** 弦论的耦合常数 g_s 可视为弦世界面的“折叠”参数—— g_s 控制世界面瞬间图形的拓扑复杂度 (即弦的圈数) [Polchinski, 1998]。TOMAS 的 κ 控制“谱的折叠深度”。两者在概念上统一为“折叠参数”。

11.3 形式化的对应映射

构造 11.2 ($\kappa \leftrightarrow g_s$ 映射)

设 $\mathcal{M}_{\text{TOMAS}}$ 为 TOMAS 谱代数对应的模空间, $\mathcal{M}_{\text{string}}$ 为弦论的模空间 [Witten, 1995]。

定义映射 $\Phi: \mathcal{M}_{\text{TOMAS}} \rightarrow \mathcal{M}_{\text{string}}$, 使得以下对应成立:

TOMAS 对象	弦论对应物
折叠深度 κ	弦耦合常数 g_s (逆比例)
非结合谱代数 $\mathcal{A}$	弦的世界面 CFT [Belavin et al., 1984]
特征长度 λ_0	弦长 l_s [Green et al., 1987]
谱作用量 S_{NA}	弦论的有效作用量 [Polchinski, 1998]
$\kappa \rightarrow 0$ (经典 GR)	$g_s \rightarrow \infty$ (强耦合弦)
$\kappa \rightarrow \infty$ (量子)	$g_s \rightarrow 0$ (弱耦合弦)

11.4 推论与检验

推论 11.3 (TOMAS-弦论对偶)

如果上述对应成立，则 TOMAS 框架与弦论互为对偶描述：TOMAS 的 $\kappa \rightarrow 0$ 极限对应弦论的微扰展开 ($g_s \rightarrow 0$)，而 TOMAS 的 $\kappa \rightarrow \infty$ 极限对应弦论的非微扰效应 ($g_s \rightarrow \infty$)。

推论 11.4 (弦耦合常数的决定性)

在 TOMAS 框架下，弦耦合常数 g_s 不再是自由参数——它由宇宙的折叠深度 $\kappa_{\text{宇宙}}$ 决定：

$$g_s = \frac{\Theta_{\text{TOMAS}}}{\kappa_{\text{宇宙}}^2}$$

如果 $\kappa_{\text{宇宙}} = 7$ (当前宇宙处于经典极限)，则 $g_s \approx \Theta_{\text{TOMAS}}/49 \ll 1$ 。这意味着我们所在的宇宙对应弦论的弱耦合极限——微扰弦论可能直接描述我们的宇宙。

推论 11.5 (TOMAS 可能提供弦论的非微扰定义)

如果 $\text{TOMAS} \cong \text{弦论}$ ，且 TOMAS 可以非微扰地定义 (因为 κ 是一个连续参数，不存在展开问题)，则 TOMAS 可能成为弦论的一个非微扰定义——一个 κ 可任意取值的框架，而非仅在 $g_s = 0$ 附近展开 [Polyakov, 1998]。

11.5 该猜想的支持文献状态

对应侧面	支持状态
κ - g_s 的直接对应	无已发表文献直接支持 , 属原创推测
S-对偶作为 κ 倒置的平行	有大量文献支持 S-对偶 [Font et al., 1990; Sen, 1994; Witten, 1995]
弦论作为非微扰定义的缺失	公认的开放问题 [Polyakov, 1998; Witten, 2007]
弦论与某“非结合”结构的关系	有少量文献 : Baez [2002] 讨论八元数与弦论的关联; Ramond [1999] 讨论八元数与超弦


第十二章 总结与路线图

12.1 三个开放问题的一致性

问题	核心疑问	最可能的答案	当前支持度
λ_0 的本质	$\lambda_0 = l_{\text{Pl}}$ 或 $\neq l_{\text{Pl}}$?	强猜想: $\lambda_0 = l_{\text{Pl}}$	量纲一致性 + 简洁性原则

问题	核心疑问	最可能的答案	当前支持度
κ 的可调性	能否实验改变 κ ?	局部涨落可观测	推荐实验方案 C
κ 与 g_s 的关系	对偶或同一?	对偶可能	形式平行, 缺直接证据

12.2 整体路线图



12.3 最优先的下一步

- 理论层面**：严格证明 $\lambda_0 = l_{Pl}$ 的推论与量子引力兼容
- 实验层面**：设计原子干涉实验搜索 κ 涨落噪声的具体方案
- 文献层面**：查找非结合代数在弦论中已有的应用（如八元数超弦 [Ramond, 1999]、 E_8 统一理论 [Lisi, 2007]），与 $\kappa-g_s$ 对偶进行比较

参考文献

[1] Abada, A., et al. (FCC Collaboration). (2019). FCC Physics Opportunities. *European Physical Journal C*, **79**(6), 474.

[2] Abbott, B. P., et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration). (2016). Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger. *Physical Review*

Letters, **116**(6), 061102.

[3] Abbott, B. P., et al. (LIGO Scientific Collaboration). (2017). Exploring the Sensitivity of Next Generation Gravitational Wave Detectors. *Classical and Quantum Gravity*, **34**(4), 044001.

[4] Abe, M., et al. (MAGIS-100 Collaboration). (2021). Matter-wave Atomic Gradiometer Interferometric Sensor (MAGIS-100). *Quantum Science and Technology*, **6**(4), 044003.

[5] Amaro-Seoane, P., et al. (LISA Collaboration). (2017). Laser Interferometer Space Antenna. arXiv preprint: 1702.00786.

[6] Ashtekar, A., & Lewandowski, J. (2004). Background Independent Quantum Gravity: A Status Report. *Classical and Quantum Gravity*, **21**(15), R53–R152.

[7] Badurina, L., et al. (AION Collaboration). (2020). AION: An Atom Interferometer Observatory and Network. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, **2020**(5), 011.

[8] Baez, J. C. (2002). The Octonions. *Bulletin of the American Mathematical Society*, **39**(2), 145–205.

[9] Belavin, A. A., Polyakov, A. M., & Zamolodchikov, A. B. (1984). Infinite Conformal Symmetry in Two-Dimensional Quantum Field Theory. *Nuclear Physics B*, **241**(2), 333–380.

[10] CODATA. (2018). Recommended Values of the Fundamental Physical Constants. National Institute of Standards and Technology.

[11] Connes, A. (1994). *Noncommutative Geometry*. Academic Press.

[12] Connes, A., & Marcolli, M. (2008). *Noncommutative Geometry, Quantum Fields and Motives*. American Mathematical Society.

[13] Dimopoulos, S., Graham, P. W., Hogan, J. M., & Kasevich, M. A. (2008). General Relativistic Effects in Atom Interferometry. *Physical Review D*, **78**(4), 042003.

[14] Dito, G., & Sternheimer, D. (2002). Deformation Quantization: Genesis, Developments and Metamorphoses. In *Deformation Quantization* (pp. 9–54). Walter de Gruyter.

[15] Dray, T., & Manogue, C. A. (1999). Octonionic Quantum Mechanics. In *Clifford Algebras and their Applications in Mathematical Physics* (pp. 221–240). Springer.

[16] Einstein, A. (1915). Die Feldgleichungen der Gravitation. *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften*, 1915, 844–847.

- [17] Fedosov, B. V. (1994). A Simple Geometrical Construction of Deformation Quantization. *Journal of Differential Geometry*, **40**(2), 213–238.
- [18] Feynman, R. P. (1948). Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics. *Reviews of Modern Physics*, **20**(2), 367–387.
- [19] Feynman, R. P., & Hibbs, A. R. (1965). *Quantum Mechanics and Path Integrals*. McGraw-Hill.
- [20] Font, A., Ibáñez, L. E., Lüst, D., & Quevedo, F. (1990). Strong-Weak Coupling Duality and Non-Perturbative Effects in String Theory. *Physics Letters B*, **249**(1), 35–43.
- [21] Gelfand, I. M., & Naimark, M. A. (1943). On the Imbedding of Normed Rings into the Ring of Operators in Hilbert Space. *Matematicheskii Sbornik*, **12**(54), 197–217.
- [22] Green, M. B., Schwarz, J. H., & Witten, E. (1987). *Superstring Theory* (Vols. 1–2). Cambridge University Press.
- [23] Gürsey, F., & Tze, C.-H. (1996). *On the Role of Division, Jordan and Related Algebras in Particle Physics*. World Scientific.
- [24] Hawking, S. W. (1974). Black Hole Explosions? *Nature*, **248**(5443), 30–31.
- [25] Heisenberg, W. (1927). Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. *Zeitschrift für Physik*, **43**(3–4), 172–198.
- [26] Kontsevich, M. (2003). Deformation Quantization of Poisson Manifolds. *Letters in Mathematical Physics*, **66**(3), 157–216.
- [27] Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (1977). *Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory* (3rd ed.). Pergamon Press.
- [28] Lisi, A. G. (2007). An Exceptionally Simple Theory of Everything. arXiv preprint: 0711.0770.
- [29] Peskin, M. E., & Schroeder, D. V. (1995). *An Introduction to Quantum Field Theory*. Westview Press.
- [30] Polchinski, J. (1998). *String Theory* (Vols. 1–2). Cambridge University Press.
- [31] Polyakov, A. M. (1998). The Wall of the Cave. *International Journal of Modern Physics A*, **13**(8), 1209–1214.
- [32] Punturo, M., et al. (Einstein Telescope Collaboration). (2010). The Einstein Telescope: A Third-Generation Gravitational Wave Observatory. *Classical and Quantum Gravity*, **27**(19), 194002.

[33] Ramond, P. (1999). Octonions in Particle Physics. *Group Theory and its Applications*, Proc. of the VIII International Conference on Group Theoretical Methods in Physics, 7–14.

[34] Reuter, M. (1998). Nonperturbative Evolution Equation for Quantum Gravity. *Physical Review D*, **57**(2), 971–985.

[35] Rovelli, C. (2004). *Quantum Gravity*. Cambridge University Press.

[36] Sen, A. (1994). Strong-Weak Coupling Duality in Four-Dimensional String Theory. *International Journal of Modern Physics A*, **9**(21), 3701–3750.

[37] Starobinsky, A. A. (1979). Spectrum of Relict Gravitational Radiation and the Early State of the Universe. *JETP Letters*, **30**, 682–685.

[38] Wald, R. M. (1984). *General Relativity*. University of Chicago Press.

[39] Waldmann, S. (2007). *Poisson-Geometry and Deformation Quantisation*. Springer.

[40] Weinberg, S. (1979). Ultraviolet Divergences in Quantum Theories of Gravitation. In *General Relativity: An Einstein Centenary Survey* (pp. 790–831). Cambridge University Press.

[41] Witten, E. (1995). String Theory Dynamics in Various Dimensions. *Nuclear Physics B*, **443**(1–2), 85–126.


[42] Witten, E. (2007). New Results in Non-Perturbative String Theory. arXiv preprint: 0706.3359.


[43] Zhang, F. (2026a). 太一互搏范式 (TOMAS) ——基于非结合谱图代数NASGA的通用人工智能理论 (v2.0) . 复合体物理学研究中心技术报告.

[44] Zhang, F. (2026b). 折叠深度 κ 与普朗克常数 $\hbar$ 的对偶关系——基于TOMAS非结合谱代数框架的严格论证与物理检验. 复合体物理学研究中心技术报告.

[45] Zhang, F., & Dai, Y. (2025). 基于全学科自举AGI的泛化推理理论. arXiv preprint: 2501.XXXXX.

附录A： κ - $\hbar$ 对偶关系图





附录B：符号表

符号	定义	单位
κ	折叠深度	无量纲 (或 s/kg)
Θ_{TOMAS}	特征折叠深度 (λ_0^2)	m ² 或 s ² /kg ²
$\kappa_{\text{宇宙}}$	当前宇宙的折叠深度	无量纲 (取 7)
$\hbar$	Planck 常数 ($h/2\pi$)	J·s
$\hbar_0$	实验测得的 Planck 常数	J·s
λ_0	TOMAS 特征长度	m
l_{Pl}	Planck 长度 ($\sqrt{\hbar G/c^3}$)	m
g_s	弦耦合常数	无量纲
$\mathcal{A}$	非结合谱代数	—
S_{NA}	TOMAS 谱作用量	—
P_κ	κ -投影算子	—
Θ_{TOMAS}	TOMAS 总作用量 (λ_0^2)	J·s (或 s/kg?)

[全文完]

© 2026 复合体理学研究中心。

本文是 TOMAS-AGI v2.0 论文系列的第三篇，对应工程全集《太乙互搏 AGI (TOMAS-AGI) 工程全集 v2.0》。

κ 与 $\hbar$ 的对偶将TOMAS框架从纯几何理论扩展到了量子力学的基础——我们既不是生活在经典世界，也不是生活在量子世界，而是生活在一个 $\kappa = 7$ 的稳态投影之中。

