

Constantin Lax Majda 方程式

@litharge3141

2020 年 4 月 25 日

概要

3 次元 Euler 方程式の時間大域的な弱解の存在は知られておらず、常に有限時間で無限大に爆発すると予想している人も多い。このノートでは、そのような爆発のメカニズムを調べるためのモデル方程式として知られている Constantin-Lax-Majda 方程式について解説する。

1 導出

1.1 3 次元渦度方程式

Constantin-Lax-Majda 方程式 (CLM と略す) は 3 次元渦度方程式の構造を 1 次元で真似をして少しでも理解を前に進めようというものだから、まず 3 次元渦度方程式の導出をする。3 次元 Euler 方程式

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} + u \cdot \nabla u &= -\nabla p \\ \operatorname{div} u &= 0\end{aligned}$$

を考える。 ∇p は厄介なので rot を施して消去する。両辺に rot を施して十分な滑らかさを仮定すると、 $\omega := \operatorname{rot} u$ として

$$\begin{aligned}\frac{\partial \omega}{\partial t} + u \cdot \nabla \omega &= \omega \cdot \nabla u \\ \operatorname{div} \omega &= 0\end{aligned}$$

という ω と u の方程式を得る。ここで

$$\begin{aligned}\omega &= \operatorname{rot} u \\ \operatorname{div} u &= 0\end{aligned}$$

から $\operatorname{rot} \omega = -\Delta u$ を得るが、これは Poisson 方程式だから 3 次元の基本解と畳み込んで部分積分すると Biot-Savart 積分

$$u(t, x) = -\frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{(x - y) \times \omega(t, y)}{|x - y|^3} dx$$

が得られる。これを

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + u \cdot \nabla \omega = \omega \cdot \nabla u$$

と連立したものを渦度方程式という。2 次元でも同様の操作をすることはできるが、3 次元との最大の違いは渦の伸長項と呼ばれる $\nabla u \cdot \omega$ の有無で、この項のために 3 次元では大域解の存在が証明できていないと考えられている。

1.2 CLM の導出

Biot-Savart 積分から ∇u を求めようとする、Poisson 方程式の基本解の微分と ω の畳み込みが現れる。これは特異積分作用素と呼ばれるクラスに入る作用素である。空間 1 次元ではこのような作用素と同じ性質を持つものとしてヒルベルト変換 H が知られているから、これを用いる。すなわち、 $u_x = H(\omega)$ として Biot-Savart 積分（の微分）を模倣することにする。爆発解の存在に移流項 $u \cdot \nabla \omega$ は関わらないと考えて、簡単のためこの項を 0 にする。すると 1 次元 Constantin-Lax-Majda 方程式

$$\omega_t = H(\omega)\omega$$

が得られる。

2 厳密解の構成

2.1 主定理

CLM の \mathbb{R} における初期値問題

$$\begin{aligned}\omega_t &= H(\omega)\omega \\ \omega(0, x) &= \omega_0(x)\end{aligned}$$

を考える。ここで、ヒルベルト変換 $H : H^1(\mathbb{R}) \rightarrow H^1(\mathbb{R})$ は

$$H(\omega) := \frac{1}{\pi} \text{p.v.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\omega(y)}{x-y} dy$$

によって与えられる。この時、次が成り立つ。

Theorem 2.1. $\omega_0 \in C^\infty(\mathbb{R}) \cap H^1(\mathbb{R})$ の時、CLM の初期値問題の解は

$$\omega(t, x) = \frac{4\omega_0(x)}{(2 - tH(\omega_0)(x))^2 + t^2\omega_0^2(x)}$$

によって与えられる。

2.2 補題や用いる性質

Theorem 2.1 の証明中に用いる H の性質などをすべて証明する。

3 拡張やその他の性質