cluster	TE	seTE		g	95% CI	weight
Baker, 2019	0.05	0.0599		0.05	[−0.07; 0.16]	7.9%
Borman, 2012	−0.04	0.0442		−0.04	[−0.13; 0.04]	9.0%
Cohen et al.	0.02	0.1700		0.02	[−0.32; 0.35]	2.7%
Dee, 2015	0.00	0.0413		0.00	[−0.08; 0.08]	9.2%
Gutmann, 2019	−0.12	0.1002		−0.12	[−0.32; 0.08]	5.3%
Hadden, 2019	0.05	0.0961		0.05	[−0.14; 0.24]	5.6%
Harackiewicz et al.	−0.02	0.0817		−0.02	[−0.19; 0.14]	6.4%
Harackiewicz, 2016	0.06	0.0877		0.06	[−0.11; 0.23]	6.1%
Jordt, 2017	0.28	0.0457		0.28	[0.19; 0.37]	8.9%
Kinias (Study 2), 2016	−0.14	0.1117		−0.14	[−0.35; 0.08]	4.8%
Lokhande, 2019	−0.02	0.0934		−0.02	[−0.20; 0.17]	5.7%
Miyake et al.	−0.15	0.1158		−0.15	[−0.37; 0.08]	4.6%
MWAP	0.04	0.0659		0.04	[−0.09; 0.16]	7.5%
Protzko, 2016	0.04	0.1415		0.04	[−0.23; 0.32]	3.6%
Purdie−Greenaway, under review	0.53	0.3954		0.53	[−0.25; 1.30]	0.6%
Serra−Garcia (Study 2), under review	−0.08	0.2604		−0.08	[−0.59; 0.43]	1.4%
Sherman (Study 2), 2013	−0.02	0.1834		−0.02	[−0.38; 0.34]	2.4%
Sherman et al.	−0.13	0.1771		−0.13	[−0.47; 0.22]	2.6%
Turetsky, under review	0.24	0.1733		0.24	[−0.10; 0.58]	2.7%
Woolf, 2009	0.05	0.1573		0.05	[−0.26; 0.36]	3.1%
Overall effect				**0.02**	**[−0.04; 0.08]**	**100.0%**
Prediction interval					**[−0.20; 0.24]**	

Heterogeneity: $I^2 = 57\%$, $p < 0.01$