

Nombre	Precio	Indicaciones	Componentes	Posologia	Contraindicaciones	Efectos Secundarios	Advertencias	Almacenamiento	Laboratorio	Distribuidor
Ibuprofeno	10.05	Alivio de los signos y síntomas de artritis reumatoide, osteoartritis, trastornos reumáticos, reducción de la fiebre, etc	Núcleo: celulosa microcristalina, fosfato tricálcico, croscarmelosa sódica, povidona, ácido esteárico, talco. Recubrimiento: hipromelosa, dióxido de titanio (E-171) y macrogol 6000, talco.	El médico debe indicarla. Sin embargo. La dosis máxima en adultos mayores y Adolescentes consta de 8 capletas al día.	Riesgos de sufrir ataques cardíacos si se consume durante largos períodos de tiempo. Esto varía dependiendo de la condición física del consumidor.	Úlceras, hemorragias, o perforaciones en el esófago.	No consumir si fuma o tiene colesterol alto.	Temperaturas inferiores a 30°C	1	
Sal Andrews	51.1	Alivia rápidamente el malestar estomacal, la acidez, la sensación de llenura, la indigestión y otras molestias por excesos en comer o beber, restaurando suavemente la regularidad intestinal.	Bicarbonato de sodio, 2.18 g, Sulfato de Magnesio: 0.8825 g; Excipiente: Ácido cítrico, Carbonato de sodio, Sacarina sódica 2.5mg	Un sobre hasta 4 veces al día	Si tienes alergia a algunos de los componentes, es recomendado no usar; tampoco puede ser administrado a pacientes con problemas en los riñones o hígado	Raramente produce dolor abdominal	No tomar ningún laxante si presenta dolor abdominal	Temperaturas inferiores a 30°C		