物理学中的微分几何与李群

刘长礼

LIUCL78 AT qq.com

LaTeX 源码见 https://github.com/liucl78

2026 年 11 月 4 日

自序

本书是写给理论物理工作者的，主要是为相对论学者提供一份微分几何的初级读物．与类似的纯数学书籍相比，在深度、广度以及严谨性方面自然是逊色的，这是物理工作者撰写数学书籍的必然结果．

整本书中几乎没有我的原创或首创内容，但几乎每个公式我都计算过．唯一的原创、首创（见附录B）是：用解存在性需求阐述了源守恒定律为何独立于场方程；这纠正了过去一个多世纪以来理论物理最底层存在的错误．具体来说，对于电磁场，电荷守恒定律独立于麦克斯韦方程组；麦氏散度方程（$\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho,\ \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$）独立于麦氏旋度方程，它们不能看成旋度方程的初始条件．对于引力场，源运动方程（$\nabla^a T_{ab}=0$）独立于爱因斯坦引力场方程（$G_{ab}=8\pi T_{ab}$）．

严格说来，整本书是我的读书笔记．笔者主要研读了陈省身和陈维桓 [70]名著，此教材以“浓缩”著称，不易阅读．陈维桓教授的几本教材[71-72]相对容易多了，本书较多参考了这几本书．除了上述书籍，笔者还参考了 O'Neill [45]的专著；此书是深入学习广义相对论的必备数学书籍．

目录

第一章 古典微分几何简介 **1**

1.1 三维欧几里得空间 1

1.2 一维曲线 3

1.2.1 正则曲线 3

1.2.2 曲率、挠率与 Frenet 公式 5

1.3 二维曲面基本属性 6

1.4 第一、第二基本形式 8

1.4.1 张量记号 10

1.4.2 曲面上的活动标架 11

1.5 曲面上的曲率 12

1.6 曲面上的平行移动 15

1.7 度量与空间分离 18

第二章 数学准备知识 **20**

2.1 数个代数概念 20

2.2 点集拓扑基本概念 25

2.3 度量空间 27

2.4 连续性 29

2.5 拓扑空间的数个重要属性 31

第三章 多重线性代数 **35**

3.1 矢量空间 35

3.1.1 例子 37

3.1.2 微分线性相关定义 39

3.1.3 商空间 . . . 40
3.2 线性映射 . . . 42
3.3 对偶空间 . . . 45
3.4 双线性映射 . . . 49
3.4.1 同空间双线性函数 . . . 51
3.4.2 对称双线性函数 . . . 53
3.4.3 不定对称双线性函数 . . . 55
3.4.4 多重线性映射 . . . 57
3.5 物理学中的多重线性代数 . . . 58
3.6 张量积 . . . 59
3.6.1 线性空间张量积 . . . 60
3.6.2 张量积性质 . . . 62
3.6.3 线性变换张量积 . . . 65
3.6.4 矩阵张量积 . . . 67
3.7 张量定义 . . . 68
3.8 外代数 . . . 71
3.8.1 广义 Kronecker 记号 . . . 73
3.8.1.1 缩并 . . . 75
3.8.1.2 乘积 . . . 77
3.8.2 外积 . . . 78
3.8.2.1 定义 . . . 78
3.8.2.2 反对称化表示 . . . 80
3.8.2.3 矢量变换 . . . 81
3.8.2.4 外型式 . . . 83
3.9 抽象指标记号 . . . 86

第四章 微分流形 90

4.1 平直的广义欧几里得空间 . . . 90
4.1.1 定义 . . . 90
4.1.2 平直空间度规张量的表示 . . . 91
4.1.3 矢量抽象化 . . . 93
4.1.3.1 方向导数抽象化 . . . 94

4.1.3.2 定理 4.3 的证明 96
4.1.4 欧氏空间切映射 97
4.1.5 经典张量分析 98
4.2 微分流形基本概念 99
4.2.1 微分流形定义 100
4.2.2 笛卡尔积流形 106
4.2.3 小结 107
4.3 流形的映射 108
4.4 切空间 111
4.4.1 切矢量 111
4.4.2 切空间基矢 113
4.4.3 余切空间 114
4.4.4 局部坐标变换 115
4.4.5 张量 116
4.5 诱导映射 117
4.6 子流形 120
4.6.1 浸入、嵌入与淹没 122
4.6.2 浸入与嵌入区别 123
4.7 切矢量丛 125
4.8 切矢量场 127
4.8.1 切矢量场几何定义 128
4.8.2 Poisson 括号 131
4.8.3 场上的诱导映射 132
4.8.4 ϕ-相关矢量场 134
4.9 张量场 135
4.10 单参数变换群 136
4.11 李导数 142

第五章 外微分型式 **147**
5.1 外微分型式场 147
5.2 外微分 150
5.3 Frobenius 定理 157

5.4 Frobenius 定理的外型式表述 160
5.5 流形定向与带边流形 165
5.5.1 流形定向 165
5.5.2 带边流形 167
5.6 单位分解定理 167
5.7 流形上的积分 168
5.8 Stokes–Cartan 定理 172

第六章 仿射联络与曲率 178
6.1 仿射联络 178
6.1.1 联络系数 179
6.1.2 张量场协变导数 182
6.1.2.1 普通偏导数算符 183
6.1.2.2 协变导数算符 184
6.1.3 挠率 185
6.1.4 无挠联络的存在性 186
6.1.5 无挠联络的优点 186
6.1.5.1 李导数 187
6.1.5.2 外微分 187
6.1.5.3 无挠联络系数为零的局部坐标系 188
6.1.6 平行移动 188
6.2 黎曼曲率张量 190
6.2.1 黎曼曲率是张量之证明 192
6.2.2 黎曼曲率对称性 194
6.3 曲率型式 195
6.3.1 联络型式 197
6.3.2 标架变换 198
6.3.3 Cartan 结构方程 199
6.3.4 Bianchi 恒等式 200
6.4 平直与弯曲 202

第七章 纤维丛初步 **205**
7.1 丛 . . . 205
7.2 矢量丛定义 . . . 206
7.3 矢量丛例子 . . . 209
7.4 矢量丛联络 . . . 214
7.4.1 张量丛联络 . . . 214
7.4.2 局部标架表示 . . . 216
7.4.3 拉回丛上的诱导联络 . . . 217
7.5 矢量丛曲率 . . . 220
7.6 纤维丛极简概要 . . . 222
7.7 标架丛 . . . 224
7.7.1 切标架丛 . . . 227
7.8 矢量丛与规范场概述 . . . 228
7.8.1 曲率相关内容的分量表述 . . . 229
7.8.2 平直时空规范场 . . . 231
7.9 张量值型式 . . . 232

第八章 黎曼几何 **235**
8.1 黎曼流形 . . . 235
8.1.1 黎曼流形定义 . . . 235
8.1.2 曲线长度 . . . 238
8.1.3 广义黎曼流形之积 . . . 241
8.2 曲率张量 . . . 242
8.2.1 $\binom{0}{4}$ 型黎曼曲率张量 . . . 242
8.2.2 Ricci 曲率和标量曲率 . . . 244
8.2.3 爱因斯坦张量 . . . 244
8.2.4 Weyl 张量 . . . 246
8.2.5 四维流形的曲率 . . . 246
8.3 一般仿射联络 . . . 247
8.4 等距映射 . . . 250
8.4.1 线性空间等距 . . . 250
8.4.2 微分流形等距 . . . 252

8.4.3 等距同胚保联络不变 . . . 253
8.5 Killing 切矢量场 . . . 258
8.5.1 基本性质 . . . 259
8.5.2 Killing 切矢量场与曲率关系 . . . 261
8.5.3 平直闵氏空间的 Killing 切矢量场 . . . 263
8.6 广义黎曼流形上的算子 . . . 265
8.6.1 体积元 . . . 265
8.6.2 黎曼流形上的积分 . . . 269
8.6.3 Hodge 星对偶算子 . . . 269
8.6.4 散度及相关 . . . 274
8.6.5 应用一例：麦克斯韦方程组 . . . 275
8.7 黎曼曲率型式 . . . 277
8.7.1 黎曼度规下的型式理论 . . . 277
8.7.2 局部广义欧几里得空间 . . . 278
8.7.3 刚性标架 . . . 279
8.7.4 黎曼曲率张量的计算 . . . 280
8.7.4.1 计算 Ricci 旋转系数 . . . 280
8.7.4.2 黎曼张量的分量表示之一 . . . 281
8.7.4.3 黎曼张量的分量表示之二 . . . 282
8.7.4.4 例题 . . . 282
8.8 E^3 中的活动标架法 . . . 288
8.8.1 正交归一标架场 . . . 290
8.9 截面曲率 . . . 292
8.9.1 常曲率空间 . . . 293
8.10 共形变换 . . . 295

第九章 测地线 302
9.1 测地线概念 . . . 302
9.1.1 测地线的存在唯一性 . . . 303
9.1.2 仿射变换 . . . 304
9.1.3 弧长参数 . . . 304
9.1.4 例 . . . 305

9.2 指数映射与法坐标系 307
9.2.1 指数映射 307
9.2.2 黎曼法坐标系 308
9.2.2.1 广义克氏符号 310
9.2.2.2 法坐标展开 311
9.3 测地完备性 313
9.4 弧长变分公式 314
9.4.1 变分概念 314
9.4.2 第一、二变分公式 315
9.4.3 Gauss 引理 316
9.5 Jacobi 场 318
9.5.1 法 Jacobi 场 322
9.5.2 常曲率空间 324

第十章 子流形 326
10.1 子流形基本理论 327
10.1.1 子流形联络 328
10.1.2 法联络 330
10.1.3 子流形基本方程 330
10.2 活动标架法 332
10.2.1 子流形联络型式 333
10.2.2 Gauss-Codazzi-Ricci 方程的型式表示 334
10.2.3 子流形结构方程 335
10.3 子流形测地线 336
10.4 超曲面一：基本概念 337
10.4.1 归一化法矢量 337
10.4.2 超曲面之诱导度规 338
10.4.3 超曲面之外曲率 340
10.5 超曲面二：应用 342
10.5.1 超曲面正交性与 Frobenius 可积性 342
10.5.2 诱导体积元 344
10.5.3 散度定理 346

10.5.4 超曲面之 Gauss-Codazzi-Ricci 方程 348
10.5.5 超曲面之爱因斯坦张量 348
10.6 超曲面三：二次超曲面 349
10.6.1 基本属性 350
10.6.2 超球面 352
10.6.3 伪球空间 354
10.6.4 伪双曲空间 355
10.6.5 双曲空间 355
10.7 超曲面四：相对论时空 358
10.7.1 ADM 分解 359
10.7.2 时间导数 360
10.7.3 同步参考系 362

第十一章 零模 364
11.1 广义欧氏子空间 364
11.2 类光超曲面 368
11.2.1 法矢量 368
11.2.2 诱导退型 368
11.2.3 基本方程 370
11.2.4 几条属性 371
11.3 Newman–Penrose 基本结构 373
11.3.1 基矢构造 373
11.3.2 参量定义 375
11.3.3 四基矢协变导数 378
11.4 Newman–Penrose 基本方程 378
11.4.1 对易关系 379
11.4.2 NP 方程 379
11.4.2.1 黎曼曲率分量 380
11.4.3 Bianchi 恒等式 381
11.4.4 麦克斯韦方程组和爱因斯坦方程组 383
11.5 Petrov 分类 384
11.5.1 四类光基矢变换 384

11.5.2 主类光矢量方法 388
11.6 类光曲线 391
11.7 Goldberg–Sachs 定理 392

第十二章 复几何初步 **394**
12.1 复变函数极简概要 394
12.2 复线性空间 395
12.2.1 厄米双线性函数 396
12.2.2 酉空间 398
12.3 复结构 400
12.3.1 复结构定义 400
12.3.2 复化与实形 403
12.4 复流形 404

第十三章 李群与李代数初步 **405**
13.1 李群与李代数定义 405
13.1.1 一维李代数 406
13.1.2 二维李代数 407
13.2 李群与李代数例子 408
13.2.1 李群例子 408
13.2.2 李代数例子 410
13.3 李群同态与表示 413
13.3.1 同态、表示定义 413
13.3.2 半直积群 415
13.4 左不变切矢量场 416
13.4.1 两点间矢量变换 417
13.4.2 切矢量场 418
13.4.3 李群李代数结构常数 420
13.4.4 例题 420
13.4.5 左不变仿射联络 423
13.4.6 右不变切矢量场 424
13.5 Maurer–Cartan 型式场 425

13.6 可解、幂零李代数 . . . 426
13.7 李群、李代数基本定理 . . . 430
13.8 单参数子群与指数映射 . . . 432
13.8.1 单参数子群 . . . 432
13.8.2 指数映射 . . . 434
13.8.3 矩阵群的指数映射 . . . 437
13.9 伴随表示与 Killing 型 . . . 440
13.9.1 伴随表示 . . . 440
13.9.2 李代数 Killing 型 . . . 443
13.10 常用矩阵李群 . . . 446
13.10.1 几个定理 . . . 446
13.10.2 一般线性群 . . . 447
13.10.3 特殊线性群 . . . 447
13.10.4 保度规群 . . . 448
13.10.4.1 正交群 . . . 450
13.10.4.2 SO(3) 群 . . . 451
13.10.4.3 广义正交群 . . . 453
13.10.4.4 酉群 . . . 455
13.10.4.5 辛群 . . . 456
13.10.5 古典李群、李代数 . . . 456
13.11 物理中常用等距李群 . . . 457
13.11.1 等距映射补遗 . . . 457
13.11.2 平移群 . . . 459
13.11.3 欧几里得群 . . . 461
13.11.3.1 $ISO(2)$ . . . 462
13.11.3.2 李代数收缩一：几何形式的 $\mathfrak{so}(3) \to \mathfrak{iso}(2)$ . . . 464
13.11.4 Lorentz 群 . . . 465
13.11.4.1 空间反射、时间反演 . . . 466
13.11.4.2 纯空间固有转动 . . . 466
13.11.4.3 伪转动 . . . 467
13.11.4.4 Lorentz 矩阵分解 . . . 470

13.11.4.5 Lorentz 代数 472
13.11.5 Poincaré 群 474
13.11.5.1 Poincaré 代数 I 476
13.11.6 Galilei 群 477
13.11.6.1 保 Galilei 变换不变的退型 478
13.12 紧致李群的不变积分 479
13.13 黎曼群 481
13.13.1 左不变 482
13.13.2 双不变 483
13.14 李变换群 485
13.15 李群 $I(M)$ 492
13.16 复化与实形 494
13.17 半单李代数 496

第十四章 对称空间与齐性空间 499
14.1 局部对称空间 499
14.2 整体对称空间初步 506
14.3 齐性空间 513
14.3.1 基本属性 513
14.3.2 陪集流形 515
14.3.3 标准球面例子 516
14.4 空间型式 517
14.4.1 最大对称空间 520
14.5 具有最大对称子空间的空间 522
14.5.1 定理证明 523
14.5.2 应用 527

第十五章 李群与李代数（续） 530
15.1 李群表示论概要 530
15.1.1 Schur 引理 530
15.1.2 紧致李群表示正交定理与特征函数 532
15.1.3 非紧致李群表示 535

15.1.4 例：可对易李群 535
15.2 $SU(2)$ 群 537
15.2.1 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的同态关系 537
15.2.2 $S^3(1) \cong SU(2)$ 539
15.2.3 $SU(2)$ 群上的积分 540
15.2.4 $SU(2)$ 群表示 542
15.2.4.1 表示的幺正性 542
15.2.4.2 表示的特征函数、不等价性、不可约性 543
15.2.5 $SO(3)$ 群表示 545
15.2.6 李代数 $\mathfrak{su}(2)$ 和 $\mathfrak{so}(3)$ 546
15.2.7 角动量 549
15.3 经典到量子的实用性约定 552
15.4 $SL(2,\mathbb{C})$ 群 553
15.4.1 $SL(2,\mathbb{C})$ 与 $SO^+(1,3)$ 的同态关系 553
15.4.2 $SL(2,\mathbb{C})$ 群有限维复表示 557
15.4.3 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 二维实形式李代数 562
15.4.4 $(\mathfrak{su}(2))^{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 563
15.4.5 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \cong \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$ 564
15.5 旋量代数 568
15.5.1 旋量度规 568
15.5.2 高阶旋量 570
15.5.3 旋量基 571
15.6 $SL(2,\mathbb{C})$ 旋量与 Lorentz 张量 573
15.7 量子场论中的 Poincaré 群 574
15.7.1 Poincaré 代数 II 574
15.7.2 Poincaré 代数的 Casimir 算子 577
15.7.3 单粒子态的 Wigner 分类 579
15.7.3.1 正时固有 Lorentz 变换下的单粒子态 580
15.7.3.2 李代数收缩二：矩阵形式的 $\mathfrak{so}(3) \to \mathfrak{iso}(2)$ . . . 584
15.7.3.3 有质量粒子、无质量粒子正能态的统一表述 . . . 586
15.7.4 量子场 589

第十六章 Hilbert 空间简引 **594**
16.1 赋范空间 594
16.2 Hilbert 空间 596
16.2.1 完备化 597
16.2.2 连续对偶空间 598
16.2.3 正交集 599
16.2.4 Hilbert 空间上的有界线性算符 600
16.2.5 Hilbert 空间上的无界线性算符 602
16.3 Hilbert 空间在量子力学中的几例应用 604
16.3.1 Hilbert 空间的 Dirac 记号表示 604
16.3.2 量子力学基本对易关系的 Weyl 表述 604

附录 A Fermi–Walker 导数 **606**
A.1 牛顿力学中的刚体运动 606
A.2 四维时空刚体运动 608

附录 B 源守恒定律独立于场方程 **612**
B.1 当前文献观点 612
B.2 微分方程的公理体系 613
B.3 麦克斯韦方程组 614
B.4 无源麦氏方程组 615
B.5 爱因斯坦引力场方程组 616

参考文献 **617**

名词索引 **624**

插图

1.1 切矢量 4

2.1 a, b, c 的拓扑 26

3.1 交换图一 61
3.2 交换图二 61
3.3 交换图三 61
3.4 交换图四 61
3.5 交换图五 66

4.1 坐标卡与相容性 102
4.2 指数函数 f 110
4.3 指数函数积 g 110

10.1 双曲空间 356

13.1 欧拉角：临时轴 N 是 y 轴 452
13.2 欧拉角：临时轴 N 是 x 轴 452
13.3 等距——指数映射交换图 458
13.4 两参考系速度差 $\boldsymbol{v}$ 与坐标系的关系 468
13.5 等变性交换图 492

表格

1.1 Gauss 记号和张量记号对照表 10

3.1 抽象指标对比 §3.7 记号 88

8.1 独立黎曼曲率分量 247
8.2 不同文献的基矢表示 301

13.1 $O(p,q)$ 群的分类记号 454
13.2 常用矩阵李群 457
13.3 Lorentz 变换分类 466

14.1 具有最大对称子空间的空间的例子 528

A.1 不同导数对比 611

B.1 微分方程的公理体系 613

第一章　古典微分几何简介

本章讲述三维欧几里得空间中的一维曲线和二维曲面论；由于高维、抽象的黎曼几何很难有具体图像，只有退化到二维曲面才有可想象的图像，故这部分十分重要．在这份简介中只列出主要的结论，并给出主要的证明、计算；所忽略的定理证明、计算以及更为详尽的描述可查阅[86]或类似文献．

1.1　三维欧几里得空间

仿射空间是与线性空间（定义见3.1）相伴随的，两者既有区别又有联系．

定义 1.1 设 V 是 m 维线性空间．A 是一个非空集合，A 中的元素称为**点**．如果存在一个差映射 $\overrightarrow{\circ\circ}: A\times A\to V$，它把 A 中任意一对有序的点 P、Q 映射为 V 中的一个矢量 $\overrightarrow{PQ}\in V$；且有 $\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{QS}=\overrightarrow{PS}$．则称 A 是 m 维**仿射空间**，V 是与 A 伴随的线性空间．

把定义1.1中的关系式 $\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{QS}=\overrightarrow{PS}$ 三个点取成相同的点，即 $\overrightarrow{PP}+\overrightarrow{PP}=\overrightarrow{PP}$；因 $\overrightarrow{PP}$ 是线性空间中元素，由线性空间加法可得 $\overrightarrow{PP}=0$.

三维欧几里得空间 E^3 就是一个仿射空间，其伴随的线性空间是 $\mathbb{R}^3$．$\mathbb{R}^3$ 中的元素就是我们通常接触到的矢量（或向量），是一个有大小、有方向的量，通常用黑体表示，比如 $\boldsymbol{a}$；常见的矢量有位移、速度、力等等．

我们在 E^3 中取定一点 O，当作原点；然后再选取三个相互正交归一的、固定不变的基矢量 $\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{j}$、$\boldsymbol{k}$，它们构成右手坐标系．由这个标架 $\{O;\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}\}$ 给出的坐标系称为**笛卡尔坐标系**[1] 或**直角坐标系**．笛卡尔坐标系贯穿本章．

设 $\mathbb{R}^3$ 中有两个矢量 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$，它们在 $\{O;\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}\}$ 上的分量分别是 (a_1,a_2,a_3)、

[1]René Descartes 是法国数学家，根据法语发音其名翻译为**勒内 · 笛卡尔**．其姓氏 Descartes（被认为是 Des Cartes ）在拉丁化后为 Cartesius（译为：卡提修斯）；Cartesius 发音与“笛卡尔”相去甚远．

(b_1,b_2,b_3)；则它们的**点乘**和**叉乘**是（读者应非常熟悉）：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=&\big(a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k}\big)\cdot\big(b_1\boldsymbol{i}+b_2\boldsymbol{j}+b_3\boldsymbol{k}\big)=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3.\\ \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=&\big(a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k}\big)\times\big(b_1\boldsymbol{i}+b_2\boldsymbol{j}+b_3\boldsymbol{k}\big)\\ =&(a_1b_2-a_2b_1)(\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j})+(a_2b_3-a_3b_2)(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{k})+(a_3b_1-a_1b_3)(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{i})\\ =&\left(\begin{vmatrix}a_2&a_3\\b_2&b_3\end{vmatrix},\quad -\begin{vmatrix}a_1&a_3\\b_1&b_3\end{vmatrix},\quad \begin{vmatrix}a_1&a_2\\b_1&b_2\end{vmatrix}\right).\end{aligned}$$

设 E^3 中有两个点 A、B，它们在 $\{O;\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}\}$ 上的坐标分别是 (x_1,y_1,z_1)、(x_2,y_2,z_2)；则 $\overrightarrow{AB}$ 的**欧氏距离**为：

$$\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB}}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}. \tag{1.1-1}$$

在 E^3 中再任意指定一点 $P\in E^3$．所谓 E^3 中的**标架场**是指点 P 和其伴随矢量空间 $\mathbb{R}^3$ 中的一组基底 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\}$ 组成的总体 $\{P;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\}$；将 E^3 中全体标架的集合记为 $\widetilde{\mathscr{P}}$．将全体正交归一标架场记为 $\mathscr{P}$，显然 $\mathscr{P}$ 是 $\widetilde{\mathscr{P}}$ 的子集．

标架 $\{P;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\}$ 的基矢可能不是固定不变的，称为**活动标架**；标架可能非正交归一，可能逐点不同；$\{P;\boldsymbol{e}_i\}$ 可在 $\{O;\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}\}$ 上表示为：

$$\begin{cases}\overrightarrow{OP}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k},\\ \boldsymbol{e}_1=a_{11}\boldsymbol{i}+a_{21}\boldsymbol{j}+a_{31}\boldsymbol{k},\\ \boldsymbol{e}_2=a_{12}\boldsymbol{i}+a_{22}\boldsymbol{j}+a_{32}\boldsymbol{k},\\ \boldsymbol{e}_3=a_{13}\boldsymbol{i}+a_{23}\boldsymbol{j}+a_{33}\boldsymbol{k}.\end{cases} \tag{1.1-2}$$

我们要求上式中的标架是正交归一的且是右手的，即

$$\boldsymbol{e}_i\cdot\boldsymbol{e}_j=\sum_{k=1}^{3}a_{ik}a_{jk}=\delta_{ij}=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j.\end{cases}\quad 1\leqslant i,j\leqslant 3. \tag{1.1-3}$$

$$\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_3,\quad \boldsymbol{e}_2\times\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{e}_1,\quad \boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{e}_2. \tag{1.1-4}$$

$$(\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_2)\cdot\boldsymbol{e}_3=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{21}&a_{31}\\a_{12}&a_{22}&a_{32}\\a_{13}&a_{23}&a_{33}\end{vmatrix}=1. \tag{1.1-5}$$

式(1.1-3)说明变换矩阵是正交矩阵．常见的柱坐标系、球坐标系都是活动标架．

矢量函数是指从它的定义域到 $\mathbb{R}^3$ 的映射，也就是三个有序的实函数．比如定义在区间 $[a,b]$ 上的矢量函数是：

$$\boldsymbol{r}(t)=\big(x(t),\ y(t),\ z(t)\big),\qquad t\in[a,b]. \tag{1.1-6}$$

如果 $x(t),y(t),z(t)$ 都是 t 的连续（可微）函数，则称 $\boldsymbol{r}(t)$ 是连续的（可微的）．再比如定义在二维矩形 $[a,b]\times[c,d]$ 上的矢量函数是：

$$\boldsymbol{r}(u,v)=\big(x(u,v),\ y(u,v),\ z(u,v)\big),\qquad u\in[a,b],\quad v\in[c,d]. \tag{1.1-7}$$

连续（可微）定义与一维的相仿．

矢量函数的导数与积分就是分量的导数与积分：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(x(t)\boldsymbol{i}+y(t)\boldsymbol{j}+z(t)\boldsymbol{k}\big)\xlongequal[\text{导数恒为零}]{\text{常矢量}\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}}\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{i}+\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{j}+\frac{\mathrm{d}z(t)}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{k}.$$

$$\int_a^b\boldsymbol{r}(t)\mathrm{d}t\xlongequal[\text{可提到积分号外}]{\text{常矢量}\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}}\boldsymbol{i}\int_a^b x(t)\mathrm{d}t+\boldsymbol{j}\int_a^b y(t)\mathrm{d}t+\boldsymbol{k}\int_a^b z(t)\mathrm{d}t.$$

命题 1.2 设有处处非零的可微矢量函数 $\boldsymbol{r}(t)$，它的长度是常数的充分必要条件是：$\boldsymbol{r}'(t)\cdot\boldsymbol{r}(t)=0$.

证明 . 直接计算即可：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\boldsymbol{r}(t)|^2=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\boldsymbol{r}(t)\cdot\boldsymbol{r}(t)\big)=2\boldsymbol{r}'(t)\cdot\boldsymbol{r}(t).$$

由上式即可看出 $|\boldsymbol{r}(t)|^2$ 是常数的充要条件是 $\boldsymbol{r}'(t)\cdot\boldsymbol{r}(t)=0$. ■

1.2 一维曲线

1.2.1 正则曲线

设我们现实生活的 E^3 空间中有一个点 p，当时间 t 变化时，p 在 E^3 中描绘的轨迹是一条曲线．我们命矢量函数 $\boldsymbol{r}(t)=\overrightarrow{Op}$，则 $\boldsymbol{r}(t)$ 的参数表示为

$$\boldsymbol{r}(t)=\overrightarrow{Op}=x(t)\boldsymbol{i}+y(t)\boldsymbol{j}+z(t)\boldsymbol{k}=\big(x(t),\ y(t),\ z(t)\big),\quad t\in\mathbb{R}. \tag{1.2-1}$$

我们称矢量函数 $\boldsymbol{r}(t)$ 是 E^3 中的一条**参数曲线**.

我们仅以平面上曲线来说明切矢量的概念（见图1.1）. 取定平面上直角坐标系 $\{O;\boldsymbol{i},\boldsymbol{j}\}$，那么曲线可以表示成 $\boldsymbol{r}(t)=x(t)\boldsymbol{i}+y(t)\boldsymbol{j}$，将参数曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 对 t 求导，有

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t)}{\mathrm{d}t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\boldsymbol{r}(t+\Delta t)-\boldsymbol{r}(t)}{\Delta t}=x'(t)\boldsymbol{i}+y'(t)\boldsymbol{j}. \tag{1.2-2}$$

上式的意义是：曲线上有点 $\boldsymbol{r}(t+\Delta t)$ 和点 $\boldsymbol{r}(t)$，两点连线便是曲线的割线，当 $\Delta t\to 0$ 时，割线趋于蓝色切线位置. 我们称参数曲线的切线方向矢量 $\boldsymbol{r}'(t)$ 是该参数曲线的**切矢量**. 此式及图1.1生动地解释了：一条曲线的切线和微分（导数）是同一概念.




图 1.1: 切矢量

若参数曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 的切矢量 $\boldsymbol{r}'(t)$ 处处不为零，且 $\boldsymbol{r}(t)$ 至少三次连续可微；则称曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 是**正则曲线**，并且把参数 t 增大的方向称为曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 的**正向**，故 $\boldsymbol{r}'(t)$ 是指向正向的.

下面来处理正则曲线弧长. 仍以图1.1为例，该图中只画了点 $\boldsymbol{r}(t)$ 和 $\boldsymbol{r}(t+\Delta t)$，先将其改记为 $\boldsymbol{r}(t_i)$ 和 $\boldsymbol{r}(t_{i+1})$，并且设想在该曲线上存在 $n+1$ 个这样的分点，即 $a=t_0<t_1<\cdots<t_n=b$，也就是说我给区间 $[a,b]$ 作了一个划分（图中没有，自己想像）. 当 t_i 与 t_{i+1} 无限接近时，图1.1中的割线长度与点 $\boldsymbol{r}(t_i)$ 和点 $\boldsymbol{r}(t_{i+1})$ 间的弧线长度无限接近；这样便有（其中 $\lambda=\max\{|\Delta t_i|;i=0,\cdots,n-1\}$）

$$\lim_{\substack{\lambda\to 0\\ n\to\infty}}\sum_{i=0}^{n-1}|\boldsymbol{r}(t_{i+1})-\boldsymbol{r}(t_i)|=\int_a^b|\boldsymbol{r}'(t)|\mathrm{d}t\overset{def}{=}s. \tag{1.2-3}$$

上式便是曲线在 $[a,b]$ 间的**弧长公式**；由于我们要求曲线是正则的，故在闭区间 $[a,b]$ 上曲线没有奇点，也不会趋于无穷远点；这样式(1.2-3)中积分一定收敛.

如果用其它参数来描述曲线，比如存在变换 $t=t(u)$，则 $\boldsymbol{r}(t)\to\boldsymbol{r}\big(t(u)\big)=\boldsymbol{r}(u)$；需对变换 $t=t(u)$ 作如下要求（**容许变换**）：函数 $t=t(u)$ 三次连续可微，并且 $t'(u)>0$ 处处成立．在这样要求下，这种变换并不改变曲线长度．

$$s=\int_a^b|\boldsymbol{r}'(u)|\mathrm{d}u=\int_a^b\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}\big(t(u)\big)}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t(u)}{\mathrm{d}u}\right|\mathrm{d}u=\int_{t(a)}^{t(b)}|\boldsymbol{r}'(t)|\mathrm{d}t.$$

现在将正则曲线 $\boldsymbol{r}(u)$ 的弧长积分上限改为变数 t，下限仍是固定值 a．

$$s(t)=\int_a^t|\boldsymbol{r}'(u)|\mathrm{d}u\xRightarrow[t\text{求导}]{\text{对参数}}\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}=|\boldsymbol{r}'(t)|>0.\tag{1.2-4}$$

上式满足容许变换要求，故我们总可以用弧长 s 作为正则曲线的参数．以后为简单起见，都用弧长作为曲线的参数，称为**自然参数**；请读者验证当选用自然参数时，有：$\boxed{|\boldsymbol{r}'(s)|=1}$.

1.2.2 曲率、挠率与 Frenet 公式

从上一节我们知道正则曲线 C 的切矢量 $|\boldsymbol{r}'(s)|=1$；现定义：

$$\boldsymbol{T}(s)\overset{def}{=}\boldsymbol{r}'(s).\tag{1.2-5}$$

我们研究一下这个单位长的切矢量 $\boldsymbol{T}(s)$．设正则曲线 $C(s)$ 上有两个临近点 s、$s+\Delta s$，此两点的单位长切矢量分别是 $\boldsymbol{T}(s)$、$\boldsymbol{T}(s+\Delta s)$．将 $\boldsymbol{T}(s+\Delta s)$ 平移至 s 点处，并令两个切矢量的起点重合，它们的终点一般说来是不重合的，两者之差是 $\boldsymbol{T}(s+\Delta s)-\boldsymbol{T}(s)$；两个矢量 $\boldsymbol{T}(s)$、$\boldsymbol{T}(s+\Delta s)$ 的夹角是 $\Delta\theta$．则有

$$\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}\right|=\lim_{\Delta s\to0}\left|\frac{\boldsymbol{T}(s+\Delta s)-\boldsymbol{T}(s)}{\Delta s}\right|\xlongequal[|\boldsymbol{T}|=1]{\text{利用}}\lim_{\Delta s\to0}\frac{\left|2\sin\frac{\Delta\theta}{2}\right|}{|\Delta s|}=\lim_{\Delta s\to0}\frac{|\Delta\theta|}{|\Delta s|}.\tag{1.2-6}$$

式(1.2-6)表明：在正则曲线 $C(s)$ 上，随着弧长 s 变化，单位长切矢量 $\boldsymbol{T}(s)$ 对弧长的导数 $|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}|$ 标志着切矢量 $\boldsymbol{T}(s)$ 在 E^3 中转动的快慢；它刻画了此条曲线的弯曲程度．令

$$\kappa(s)\equiv\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}\right|=|\boldsymbol{r}''(s)|.\tag{1.2-7}$$

我们称 $\kappa(s)$ 是曲线 $\boldsymbol{r}(s)$ 在 s 处的**曲率**，$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}$ 为**曲率矢量**.

不难证明：$C(s)$ 是 E^3 中一条直线的充要条件是它的曲率 $\kappa(s)\equiv0$.

假设正则曲线 $C(s)$ 的曲率 $\kappa(s)\neq 0$. 因 $|\boldsymbol{T}(s)|=1$，由命题1.2可知：$\boldsymbol{T}(s)\cdot\boldsymbol{T}'(s)=0$，即 $\boldsymbol{T}(s)\perp\boldsymbol{T}'(s)$. 故 $\boldsymbol{T}'(s)$ 是曲线 C 的一个法矢量，且方向完全确定，将这个方向的单位矢量记为 $\boldsymbol{N}(s)$，称为正则曲线 $C(s)$ 的**主法矢量**；很明显，有 $\boxed{\boldsymbol{T}'(s)=\kappa(s)\boldsymbol{N}(s)}$.

由曲线 $C(s)$ 的切矢 $\boldsymbol{T}$ 和主法矢 $\boldsymbol{N}$ 定义**副法矢量**：$\boldsymbol{B}(s)\overset{def}{=}\boldsymbol{T}(s)\times\boldsymbol{N}(s)$.

通过以上叙述，不难得到：在 $\kappa(s)\neq 0$ 的点，正则曲线 $C(s)$ 存在一个右手单位标架：$\{\boldsymbol{r}(s);\ \boldsymbol{T}(s),\boldsymbol{N}(s),\boldsymbol{B}(s)\}$；称为曲线在该点的 **Frenet 标架**. 在 $\kappa(s)=0$ 的点，Frenet 标架定义较为复杂，我们不再讨论，请参阅相关文献.

我们已知 $\boldsymbol{B}(s)\cdot\boldsymbol{T}(s)=0$，对此式求导得：

$$0=\boldsymbol{B}'(s)\cdot\boldsymbol{T}(s)+\boldsymbol{B}(s)\cdot\boldsymbol{T}'(s)\xrightarrow[\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{N}=0]{\boldsymbol{T}'=\kappa\boldsymbol{N}}\boldsymbol{B}'(s)\cdot\boldsymbol{T}(s)=0.$$

又因 $|\boldsymbol{B}(s)|=1$，故 $\boldsymbol{B}(s)\cdot\boldsymbol{B}'(s)=0$；最终，$\boldsymbol{B}'(s)\parallel\boldsymbol{N}(s)$. 不妨假设：

$$\boldsymbol{B}'(s)=-\tau(s)\boldsymbol{N}(s). \tag{1.2-8}$$

其中 $\tau(s)$ 为曲线 $C(s)$ 的**挠率**. 易得 $\tau(s)=-\boldsymbol{B}'(s)\cdot\boldsymbol{N}(s)$ 和 $|\tau(s)|=|\boldsymbol{B}'(s)|$.

可以证明：非直线的正则曲线 $C(s)$ 是平面曲线的充要条件是它的挠率为零.

因 $|\boldsymbol{N}(s)|=1$，故 $\boldsymbol{N}(s)\cdot\boldsymbol{N}'(s)=0$；故可设 $\boldsymbol{N}'(s)=a\boldsymbol{T}(s)+c\boldsymbol{B}(s)$，则有

$$a=\boldsymbol{T}\cdot\boldsymbol{N}'=-\boldsymbol{T}'\cdot\boldsymbol{N}=-\kappa(s),\quad c=\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{N}'=-\boldsymbol{B}'\cdot\boldsymbol{N}=\tau(s).$$

最后，可将本小节中的公式总结为：

$$\boldsymbol{r}'(s)=\boldsymbol{T}(s) \tag{1.2-9a}$$

$$\boldsymbol{T}'(s)=\kappa(s)\boldsymbol{N}(s) \tag{1.2-9b}$$

$$\boldsymbol{N}'(s)=-\kappa(s)\boldsymbol{T}(s)+\tau(s)\boldsymbol{B}(s) \tag{1.2-9c}$$

$$\boldsymbol{B}'(s)=-\tau(s)\boldsymbol{N}(s) \tag{1.2-9d}$$

式(1.2-9)称为 **Frenet–Serret 公式**，这是 E^3 一维曲线论中最重要的公式.

1.3 二维曲面基本属性

相对来说，E^3 一维曲线论较为简单，而 E^3 的二维曲面论则要复杂的多；我们将分数节来讨论这个议题. 二维曲面论中的理论，经过改造后可以形式不变地推广到高维流形上. 首先给出正则曲面的定义.

我们将 E^2 中的一个连通开子集 D 映射到 E^3 中，即 $S:D\to E^3$；并在 E^2、E^3 中分别建立了笛卡尔坐标系，用 (u,v) 表示 E^2 中的点，用 (x,y,z) 标记 E^3 中的点，则参数曲面S 可以表示为：

$$\boldsymbol{r}(u,v)=\big(x(u,v),\ y(u,v),\ z(u,v)\big),\qquad (u,v)\in D. \tag{1.3-1}$$

假设 x、y、z 对 u、v 有三次以上的连续可微偏导数，以后不再单独声明.

设曲面 S 在 $p\in S$ 点（坐标是 u_0,v_0）有两个切矢量

$$\boldsymbol{r}_u(u_0,v_0)\equiv\left.\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial u}\right|_{(u_0,v_0)},\qquad \boldsymbol{r}_v(u_0,v_0)\equiv\left.\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial v}\right|_{(u_0,v_0)}. \tag{1.3-2}$$

若这两个切矢量是线性无关的，即 $(\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v)|_{(u_0,v_0)}\neq 0$，则称曲面 S 在 p 点**正则**；若曲面 S 上每一点都是正则的，则称之为**正则曲面**. 之后，只讨论正则曲面.

不难看出，S 上任意一条连续可微参数曲线可以表示成：$u=u(t),\ v=v(t)$，其中 t 是实参数；把它写成 E^3 中曲线参数方程为：

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}\big(u(t),v(t)\big),\qquad t\in\mathbb{R}. \tag{1.3-3}$$

设曲面 S 有 p 点，经过 p 的任意一条曲线在该点的切矢量称为曲面 S 在 p 点的**切矢量**. 显然，式(1.3-2)中的 $\boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v$ 是 p 点的切矢量，称它们为 p 点的**自然切矢量**；其实过 p 点的任意切矢量都可以表示成自然切矢量的线性组合，即

$$\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(u,v)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}=\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{r}_u\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\boldsymbol{r}_v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}. \tag{1.3-4}$$

上式中切矢均在 p 点取值. 反之，如果点 $p\in S$ 处有矢量

$$\boldsymbol{v}=\alpha\boldsymbol{r}_u+\beta\boldsymbol{r}_v,\quad \text{切矢均在 } p \text{ 点取值，常数}\alpha,\beta\in\mathbb{R}. \tag{1.3-5}$$

则曲面 S 上一定存在一条过 p 点的曲线 $C(t)$ 使得它在 p 点切矢量是 $\boldsymbol{v}$. 令

$$u(t)=u_0+\alpha(t-t_0),\quad v(t)=v_0+\beta(t-t_0), \tag{1.3-6}$$

于是 S 上曲线

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}\big(u(t),v(t)\big)=\boldsymbol{r}\big(u_0+\alpha(t-t_0),\ v_0+\beta(t-t_0)\big). \tag{1.3-7}$$

便满足这个要求；直接对上式求导就可验证.

由此可以得出：曲面 S 上过 p 点所有曲线的切矢量构成一个二维线性空间；我们称这个二维线性空间为曲面 S 在 p 点的**切平面**，记为 T_pS；切平面上的矢量称为曲面 S 在 p 点的**切矢量**；$\boldsymbol{r}_u|_{(u_0,v_0)}, \boldsymbol{r}_v|_{(u_0,v_0)}$ 是 T_pS 的一组基矢量.

由于曲面是正则的，故 T_pS 的法矢量可按如下方式定义

$$\boldsymbol{n}(u_0,v_0) \overset{def}{=} \left.\frac{\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v}{|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|}\right|_{(u_0,v_0)} = \frac{\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v}{\sqrt{EG-F^2}}. \tag{1.3-8}$$

这样，$(\boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_v, \boldsymbol{n})$ 构成了 p 点的 E^3 中一个右手标架；当 p 点遍历 S 上每一点时，这个标架构成一个标架场，称为正则曲面 S 的**自然标架场**. 曲面 S 上任意一个矢量，不论它是否属于 S 的切平面，只要起始点在 S 上，都可以在这个标架场下展开. 式(1.3-8)中第二个等号的证明见下节.

1.4 第一、第二基本形式

设正则曲面 S 上有两个临近的点 $p(u,v)$ 及 $p'(u+\Delta u, v+\Delta v)$，它们的矢径分别是 $\boldsymbol{r}(u,v)$、$\boldsymbol{r}(u+\Delta u, v+\Delta v)$. 于是，在 E^3 中可以应用 Taylor 展开式，不难得到（只展开到一阶）：

$$\overrightarrow{pp'} = \Delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u+\Delta u, v+\Delta v) - \boldsymbol{r}(u,v) = \boldsymbol{r}_u\Delta u + \boldsymbol{r}_v\Delta v + O(\Delta u^2, \Delta v^2).$$

故由上式可以得到矢径的微分关系（只取线性部分）如下：

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_u\mathrm{d}u + \boldsymbol{r}_v\mathrm{d}v. \tag{1.4-1}$$

当 p' 点无限接近 p 点时，也就是 $\Delta u \to 0, \Delta v \to 0$，我们就把 $\overrightarrow{pp'}$ 在 E^3 中的长度的线性主部定义为曲面 S 上这两个无限接近点的距离 $\mathrm{d}s$，即有

$$(\mathrm{d}s)^2 = \mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_u(\mathrm{d}u)^2 + 2\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_v\mathrm{d}u\mathrm{d}v + \boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{r}_v(\mathrm{d}v)^2.$$

定义

$$E \equiv \boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_u, \qquad F \equiv \boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_v, \qquad G \equiv \boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{r}_v. \tag{1.4-2}$$

则有

$$\mathrm{I} \equiv \mathrm{d}s^2 = E\mathrm{d}u^2 + 2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v + G\mathrm{d}v^2. \tag{1.4-3}$$

这个二次微分式就是曲面 S 的**第一基本形式**，也称为曲面的**线元**；而 E,F,G 称为曲面 S 的**第一基本形式系数**；我们已把第一基本形式记为 I.

由于第一基本形式是个内积，即 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，故它是正定二次型，即

$$E>0,\quad G>0,\quad EG-F^2>0. \tag{1.4-4}$$

设 $C(t)$ 是正则曲面 S 上一条正则曲线，它的参数方程为：$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}\big(u(t),v(t)\big)$，其中 $a\leqslant t\leqslant b$. 从第一基本形式可以得到这条曲线的线长为

$$L=\int_a^b \mathrm{d}s=\int_a^b \sqrt{E\Big(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\Big)^2+2F\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+G\Big(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\Big)^2}\,\mathrm{d}t. \tag{1.4-5}$$

现考虑正则曲面 S 上一块无穷小面积. 曲面上由参数曲线

$$u=u_0,\quad u=u_0+\Delta u;\quad v=v_0,\quad v=v_0+\Delta v;\quad \Delta u>0,\ \Delta v>0.$$

所围成的一小块，它的面积近似等于在点 $\boldsymbol{r}(u_0,v_0)$ 处的切平面上由矢量 $(\Delta u)\boldsymbol{r}_u$ 和 $(\Delta v)\boldsymbol{r}_v$ 所张成的平行四边形的面积，而这个平行四边形面积是：

$$\begin{aligned}&\big|(\Delta u)\boldsymbol{r}_u\times(\Delta v)\boldsymbol{r}_v\big|=\sqrt{(\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v)\cdot(\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v)}\Delta u\Delta v=\sqrt{\boldsymbol{r}_u\cdot\big(\boldsymbol{r}_v\times(\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v)\big)}\Delta u\Delta v\\&=\sqrt{\boldsymbol{r}_u\cdot\big((\boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{r}_v)\boldsymbol{r}_u-(\boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{r}_u)\boldsymbol{r}_v\big)}\Delta u\Delta v=\sqrt{EG-F^2}\Delta u\Delta v.\end{aligned}$$

此式也完成了式(1.3-8)最后一步的计算. 由上式可知曲面 S 的**面积元素**可以表示为：$\mathrm{d}\sigma\equiv\sqrt{EG-F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$. 曲面 S 的面积可以表示为：

$$A=\iint_D \mathrm{d}\sigma=\iint_D \sqrt{EG-F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v. \tag{1.4-6}$$

为描述曲面偏离切平面的程度，需引入第二基本形式. 此时，将 $\overrightarrow{pp'}$ 展开到一阶就不够了，我们将 $\overrightarrow{pp'}$ 展开到二阶：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{pp'}=&\Delta\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u+\Delta u,v+\Delta v)-\boldsymbol{r}(u,v)\\=&\boldsymbol{r}_u\Delta u+\boldsymbol{r}_v\Delta v+\frac{1}{2}\big[\boldsymbol{r}_{uu}(\Delta u)^2+2\boldsymbol{r}_{uv}\Delta u\Delta v+\boldsymbol{r}_{vv}(\Delta v)^2\big]+O(\Delta u^3,\Delta v^3).\end{aligned}$$

由上式可计算 $p'(u+\Delta u,v+\Delta v)$ 点到 $p(u,v)$ 点切平面 T_pS 的垂直距离：

$$\delta=\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{pp'}=\frac{1}{2}\big[\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}_{uu}(\Delta u)^2+2\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}_{uv}\Delta u\Delta v+\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}_{vv}(\Delta v)^2\big]+O(\Delta u^3,\Delta v^3).$$

Gauss 引入如下记号：

$$L = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{r}_{uu}, \quad M = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{r}_{uv}, \quad N = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{r}_{vv}. \tag{1.4-7}$$

令 $\Delta u \to 0$、$\Delta v \to 0$，则可以得到曲面 S 的**第二基本形式**：

$$\mathrm{II} = 2\delta = L\mathrm{d}u^2 + 2M\mathrm{d}u\mathrm{d}v + N\mathrm{d}v^2. \tag{1.4-8}$$

1.4.1 张量记号

我们将第一、第二基本形式换成现代微分几何的记号，见表1.1.

表 1.1: Gauss 记号和张量记号对照表

Gauss 记号	u	v	$\boldsymbol{r}_u$	$\boldsymbol{r}_v$	E	F	G	L	M	N
张量记号	u^1	u^2	$\boldsymbol{r}_1$	$\boldsymbol{r}_2$	g_{11}	g_{12}, g_{21}	g_{22}	b_{11}	b_{12}, b_{21}	b_{22}

这样，二维曲面 S 的度规矩阵为

$$g = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}; \; g^{-1} = \begin{pmatrix} g^{11} & g^{12} \\ g^{21} & g^{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{|g|} \begin{pmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{21} & g_{11} \end{pmatrix}. \tag{1.4-9}$$

第一、第二基本形式可以表示成：

$$\mathrm{I} = \mathrm{d}s^2 = g_{11} \left(\mathrm{d}u^1\right)^2 + 2g_{12}\mathrm{d}u^1\mathrm{d}u^2 + g_{22} \left(\mathrm{d}u^2\right)^2 = \sum_{\alpha,\beta=1}^{2} g_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\alpha\mathrm{d}u^\beta. \tag{1.4-10}$$

$$\mathrm{II} = b_{11} \left(\mathrm{d}u^1\right)^2 + 2b_{12}\mathrm{d}u^1\mathrm{d}u^2 + b_{22} \left(\mathrm{d}u^2\right)^2 = \sum_{\alpha,\beta=1}^{2} b_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\alpha\mathrm{d}u^\beta. \tag{1.4-11}$$

经过数位微分几何大师的研究，终于认识到仅用 g 表示出来的二维曲面上的几何量可以形式不变地推广到高维情形；故我们称由式(1.4-9)表示的几何量为**内蕴量**，比如弧长、面积等等．只讨论式(1.4-9)以及由它生成的量的几何学称为**内蕴几何学**，由这些量决定的几何性质称为**内蕴性质**．

涉及到第二基本形式的几何学称为**外蕴几何学**，一般说来把曲面嵌入到高维空间的几何学都属于外蕴的．外蕴几何一般不能直接推广到高维空间．比如类似于球面的二维曲面可以嵌入三维欧氏空间；但像 Klein 瓶这种不可定向的二维流形是不能嵌入三维空间的，需要嵌入四维或更高维度空间；虽然都是二维流形，但被嵌入的空间以及嵌入的光滑函数必然有很大差别，因此所涉及的外蕴几何很难以形式不变的方式推广到高维空间．

1.4.2 曲面上的活动标架

$\boldsymbol{r}_\alpha \equiv \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u^\alpha}$（$\alpha = 1, 2$）只是对 $\boldsymbol{r}$ 的一次偏微分；我们需要对它再次求偏导，即 $\frac{\partial \boldsymbol{r}_\alpha}{\partial u^\beta}$；显然 $\frac{\partial \boldsymbol{r}_\alpha}{\partial u^\beta}$ 仍是 E^3 中的矢量，故它可以在标架 $\{\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{n}\}$ 上展开：

$$\frac{\partial \boldsymbol{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \frac{\partial^2 \boldsymbol{r}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} = \sum_{\delta=1}^{2} \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta} \boldsymbol{r}_\delta + c_{\alpha\beta} \boldsymbol{n}; \quad \frac{\partial \boldsymbol{n}}{\partial u^\beta} = \sum_{\delta=1}^{2} \omega_\beta^\delta \boldsymbol{r}_\delta + c_\beta \boldsymbol{n}. \tag{1.4-12}$$

我们顺带也把法矢量 $\boldsymbol{n}$ 的微分也写了出来．下面来求出这些系数的表达式．用单位法矢量 $\boldsymbol{n}$ 点乘式(1.4-12)，经过一些运算可得到

$$c_{\alpha\beta} = b_{\alpha\beta} \quad \text{和} \quad c_\beta = 0. \tag{1.4-13}$$

用 $\boldsymbol{r}_\sigma$ 点乘式(1.4-12)中第二式，经过一些运算可得到

$$-\omega_\gamma^\beta = \sum_{\sigma=1}^{2} g^{\beta\sigma} b_{\sigma\gamma} \overset{def}{=} b_\gamma^\beta. \tag{1.4-14}$$

注意到 $g_{\alpha\beta} = \boldsymbol{r}_\alpha \cdot \boldsymbol{r}_\beta$；式(1.4-12)中第一式 $\boldsymbol{r}_{\alpha\beta}$、$b_{\alpha\beta}$ 关于下标 α、β 是对称的，由此不难得到 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} = \Gamma_{\beta\alpha}^{\gamma}$；用 $\boldsymbol{r}_\sigma$ 点乘式(1.4-12)中第一式，有

$$\boldsymbol{r}_\sigma \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \sum_{\delta=1}^{2} \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta} \boldsymbol{r}_\delta \cdot \boldsymbol{r}_\sigma \;\Rightarrow\; \frac{\partial g_{\alpha\sigma}}{\partial u^\beta} = \sum_{\delta=1}^{2} \left(\Gamma_{\alpha\beta}^{\delta} g_{\delta\sigma} + \Gamma_{\sigma\beta}^{\delta} g_{\delta\alpha} \right). \tag{1.4-15}$$

轮换角标 $\alpha\sigma\beta$，有

$$\frac{\partial g_{\sigma\beta}}{\partial u^\alpha} = \sum_{\delta=1}^{2} \left(\Gamma_{\sigma\alpha}^{\delta} g_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\alpha}^{\delta} g_{\delta\sigma} \right), \quad \frac{\partial g_{\beta\alpha}}{\partial u^\sigma} = \sum_{\delta=1}^{2} \left(\Gamma_{\beta\sigma}^{\delta} g_{\delta\alpha} + \Gamma_{\alpha\sigma}^{\delta} g_{\delta\beta} \right). \tag{1.4-16}$$

后两式相加再减掉第一式（注意利用 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} = \Gamma_{\beta\alpha}^{\gamma}$），得

$$\Gamma_{\alpha\sigma}^{\delta} = \frac{1}{2} g^{\delta\beta} \left(\frac{\partial g_{\sigma\beta}}{\partial u^\alpha} + \frac{\partial g_{\beta\alpha}}{\partial u^\sigma} - \frac{\partial g_{\alpha\sigma}}{\partial u^\beta} \right). \tag{1.4-17}$$

上式说明 $\Gamma_{\alpha\sigma}^{\delta}$ 只和度量有关，是内蕴量，称为**联络系数**．这样式(1.4-12)为：

$$\frac{\partial \boldsymbol{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \frac{\partial^2 \boldsymbol{r}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} = \sum_{\delta=1}^{2} \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta} \boldsymbol{r}_\delta + b_{\alpha\beta} \boldsymbol{n}; \quad \frac{\partial \boldsymbol{n}}{\partial u^\beta} = -\sum_{\delta=1}^{2} b_\beta^\delta \boldsymbol{r}_\delta. \tag{1.4-18}$$

式(1.4-18)为二维曲面论中的**基本公式**，第一式称为 **Gauss 公式**，第二式称为 **Weingarten 公式**．这两个公式在第十章有适当的推广．

1.5 曲面上的曲率

我们已对空间曲线的性质有了初步了解，定义了曲率等；我们将借助曲线曲率来陈述曲面曲率，以及它的几何性质．本节将会省略较多推导，请参阅[86]§2.4.

给定正则曲面 S 上的正则曲线 $C(s)=\boldsymbol{r}(s)$，它的切矢量是：$\boldsymbol{T}=\frac{\mathrm{dr}}{\mathrm{d}s}=\sum_{\alpha=1}^{2}\boldsymbol{r}_\alpha\frac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s}$．根据式(1.2-9b)可知

$$\kappa\boldsymbol{N}=\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s^2}=\sum_{\delta=1}^{2}\left(\frac{\mathrm{d}^2u^\delta}{\mathrm{d}s^2}+\sum_{\alpha,\beta=1}^{2}\Gamma^\delta_{\alpha\beta}\frac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s}\right)\boldsymbol{r}_\delta+\sum_{\alpha,\beta=1}^{2}b_{\alpha\beta}\frac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{n}. \tag{1.5-1}$$

由式(1.5-1)可定义曲线 $C(s)$ 的**法曲率**κ_n**：**

$$\kappa_n\overset{def}{=}\boldsymbol{n}\cdot(\kappa\boldsymbol{N})=\sum_{\alpha,\beta=1}^{2}b_{\alpha\beta}\frac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{II}}{\mathrm{I}}. \tag{1.5-2}$$

经过略显繁琐的推导与叙述（略）可以得到：给定曲面 S 上任意一点 p 以及该点的法线 $\boldsymbol{n}$；包含法线 $\boldsymbol{n}$ 的平面 Π 会在正则曲面 S 上截出一条曲线，当 Π 绕着 $\boldsymbol{n}$ 旋转一周后，所截取的曲线的法曲率会有一个最大值 κ_1 和一个最小值 κ_2，两者都称为**主曲率**；κ_1 所对应的曲线的切矢量记为 $\boldsymbol{e}_1$，κ_2 所对应的曲线的切矢量记为 $\boldsymbol{e}_2$，可以证明 $\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2=0$（忽略脐点情形）．由两个主曲率可以定义**总曲率**或称为 **Gauss 曲率**（高斯曲率）**：**

$$K\overset{def}{=}\kappa_1\kappa_2=\frac{\det b_{\alpha\beta}}{\det g_{\gamma\delta}}=\frac{b_{11}b_{22}-(b_{12})^2}{g_{11}g_{22}-(g_{12})^2}=\frac{LN-M^2}{EG-F^2}. \tag{1.5-3}$$

在 E^3 中的偏导数是可以交换次序的，比如

$$\frac{\partial^3\boldsymbol{r}}{\partial u^\alpha\partial u^\beta\partial u^\gamma}=\frac{\partial^3\boldsymbol{r}}{\partial u^\alpha\partial u^\gamma\partial u^\beta},\qquad\frac{\partial^2\boldsymbol{n}}{\partial u^\alpha\partial u^\beta}=\frac{\partial^2\boldsymbol{n}}{\partial u^\beta\partial u^\alpha}. \tag{1.5-4}$$

我们将利用式(1.5-4)导出几个重要结论．将式(1.4-18)代入式(1.5-4)得

$$\frac{\partial}{\partial u^\gamma}\left(\sum_{\delta=1}^{2}\Gamma^\delta_{\alpha\beta}\boldsymbol{r}_\delta+b_{\alpha\beta}\boldsymbol{n}\right)=\frac{\partial}{\partial u^\beta}\left(\sum_{\delta=1}^{2}\Gamma^\delta_{\alpha\gamma}\boldsymbol{r}_\delta+b_{\alpha\gamma}\boldsymbol{n}\right), \tag{1.5-5}$$

$$\frac{\partial}{\partial u^\gamma}\left(\sum_{\delta=1}^{2}b^\delta_\beta\boldsymbol{r}_\delta\right)=\frac{\partial}{\partial u^\beta}\left(\sum_{\delta=1}^{2}b^\delta_\gamma\boldsymbol{r}_\delta\right). \tag{1.5-6}$$

将式(1.5-5)展开，并且再次用式(1.4-18)，整理之后得到：

$$\sum_{\delta=1}^{2}\left(\frac{\partial}{\partial u^{\gamma}}\Gamma^{\delta}_{\alpha\beta}-\frac{\partial}{\partial u^{\beta}}\Gamma^{\delta}_{\alpha\gamma}+\sum_{\eta=1}^{2}\left(\Gamma^{\eta}_{\alpha\beta}\Gamma^{\delta}_{\eta\gamma}-\Gamma^{\eta}_{\alpha\gamma}\Gamma^{\delta}_{\eta\beta}\right)-b_{\alpha\beta}b^{\delta}_{\gamma}+b_{\alpha\gamma}b^{\delta}_{\beta}\right)\boldsymbol{r}_{\delta}$$
$$+\sum_{\delta=1}^{2}\left(\Gamma^{\delta}_{\alpha\beta}b_{\delta\gamma}-\Gamma^{\delta}_{\alpha\gamma}b_{\delta\beta}+\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}}-\frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}}\right)\boldsymbol{n}=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\{\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{n}\}$ 是处处线性无关的，所以上式的系数必须为零，即有

$$\frac{\partial}{\partial u^{\gamma}}\Gamma^{\delta}_{\alpha\beta}-\frac{\partial}{\partial u^{\beta}}\Gamma^{\delta}_{\alpha\gamma}+\sum_{\eta=1}^{2}\left(\Gamma^{\eta}_{\alpha\beta}\Gamma^{\delta}_{\eta\gamma}-\Gamma^{\eta}_{\alpha\gamma}\Gamma^{\delta}_{\eta\beta}\right)=b_{\alpha\beta}b^{\delta}_{\gamma}-b_{\alpha\gamma}b^{\delta}_{\beta}, \tag{1.5-7}$$

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}}-\frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}}=\sum_{\delta=1}^{2}\left(\Gamma^{\delta}_{\alpha\gamma}b_{\delta\beta}-\Gamma^{\delta}_{\alpha\beta}b_{\delta\gamma}\right). \tag{1.5-8}$$

式(1.5-7)、(1.5-8)分别称为 **Gauss 方程**、**Codazzi 方程**；式中所有希腊字母取值范围是：1, 2．从式(1.5-6)出发会再次得到 Codazzi 方程．

容易看出式(1.5-7)的左边只是由曲面 S 的第一类基本量 $g_{\alpha\beta}$（度规）的不高于二阶的偏导数构成的量，我们把它记成

$$R^{\delta}{}_{\alpha\beta\gamma}\overset{def}{=}+\frac{\partial}{\partial u^{\beta}}\Gamma^{\delta}_{\alpha\gamma}-\frac{\partial}{\partial u^{\gamma}}\Gamma^{\delta}_{\alpha\beta}+\sum_{\eta=1}^{2}\left(\Gamma^{\eta}_{\alpha\gamma}\Gamma^{\delta}_{\eta\beta}-\Gamma^{\eta}_{\alpha\beta}\Gamma^{\delta}_{\eta\gamma}\right). \tag{1.5-9}$$

我们称 $R^{\delta}{}_{\alpha\beta\gamma}$ 为曲面 S 的第一类基本量的**黎曼记号**，它与第二基本型式无关；这个记号是黎曼在 1854 年引入的，它可以形式不变的推广到任意有限维空间．可以证明式(1.5-9)中的记号是个张量，并且有诸多对称性；可以证明在二维曲面时，$R^{\delta}{}_{\alpha\beta\gamma}$ 实质上只有一个独立分量；可参见 §8.2.1．

下面叙述 Gauss 绝妙定理；为此先把黎曼记号的上指标降下来：$R_{\delta\alpha\beta\gamma}\equiv\sum_{\eta=1}^{2}g_{\delta\eta}R^{\eta}{}_{\alpha\beta\gamma}$．由于只有一个独立分量，式(1.5-7)变为

$$R_{1212}=b_{11}b_{22}-(b_{12})^2. \tag{1.5-10}$$

将上式两边除以 $g_{11}g_{22}-(g_{12})^2$ 得到：

$$\frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22}-(g_{12})^2}=\frac{b_{11}b_{22}-(b_{12})^2}{g_{11}g_{22}-(g_{12})^2}\overset{1.5-3}{=\!=\!=}K. \tag{1.5-11}$$

虽然 Gauss 曲率(1.5-3)包含第一、第二基本形式，但由上式可知：实质上 Gauss 曲率只由第一基本形式构成．这便是 **Gauss 绝妙定理**（Theorema egregium）：

定理 1.3 二维曲面的 Gauss 曲率只由它的第一基本形式决定.

其实一般情形下把绝妙定理叙述成：在局部等距映射下，Gauss 曲率不变. 由于在本章我们没有引入等距的定义，故把它叙述成定理1.3的形式. Gauss 绝妙定理推广到一般情形便是定理8.35；该处用到了等距概念.

1827 年 Gauss 经过非常复杂的计算证明了上述定理，这是微分几何发展史上一个里程碑式的定理，这开创了微分几何的一个新纪元——内蕴几何学. 这个定理说明：**(1)** 无需把二维曲面嵌入 E^3 之中，我们只需研究第一基本形式（无需第二基本形式）便可研究曲面的弯曲情况（总曲率）；**(2)** 这种内蕴属性表明可以用单纯的二维语言来研究二维曲面，无需借用 E^3. 1854 年黎曼（Gauss 学生）发展了 Gauss 绝妙定理的内蕴思想. 在此之前，学者们一般把二维曲面嵌入到三维欧氏空间进行研究；通过三维欧氏空间的度规（正定单位矩阵）诱导得到二维曲面的度规，没有认识到二维度规可以独立于二维曲面本身而存在. 黎曼独辟蹊径，他将二维曲面本身看成一个独立的几何实体，而不仅仅是三维欧氏空间的一个子集；由此他认识到二维曲面的第一基本形式（即今天的黎曼度规）是加在二维曲面上的一个附加结构，不是二维曲面（二维光滑流形）自带结构，两者可以分离. 然后，黎曼把二维曲面中成立的内蕴几何推广到任意有限维空间，即今天的黎曼几何.

例 1.4 闭合圆环面（torus，即轮胎面）的黎曼曲率.

在 E^3 中，有笛卡尔直角坐标系 $\{O;x,y,z\}$. 闭合圆环面的大圆圆心处于原点 O，大圆位于 $x-y$ 平面上，大圆半径为 R. 一个半径为 r 的小圆沿着大圆绕 z 轴旋转，这样旋转一周后的小圆便形成了闭合圆环面. 要求 $R>r>0$. 设大圆旋转半径与 x 轴夹角为 u，小圆旋转半径与 $x-y$ 平面夹角为 v；那么圆环面的参数方程为：

$$x(u,v)=(R+r\cos v)\cos u,\quad y(u,v)=(R+r\cos v)\sin u,\quad z(u,v)=r\sin v.$$

对上面三式取微分，有：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}x=&-(R+r\cos v)\sin u\mathrm{d}u-r\sin v\cos u\mathrm{d}v,\\ \mathrm{d}y=&(R+r\cos v)\cos u\mathrm{d}u-r\sin v\sin u\mathrm{d}v,\\ \mathrm{d}z=&r\cos v\mathrm{d}v.\end{aligned}$$

由此可以得到环面上线元：

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2 = (R + r\cos v)^2\mathrm{d}u^2 + r^2\mathrm{d}v^2.$$

容易读出环面在局部坐标 $\{u, v\}$ 下的度量为：

$$g_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} (R + r\cos v)^2 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}.$$

利用式(1.4-17)计算可以得到非零克氏符：

$$\Gamma^u_{uv} = \Gamma^u_{vu} = \frac{-r\sin v}{R + r\cos v}, \qquad \Gamma^v_{uu} = \frac{1}{r}(R + r\cos v)\sin v. \tag{1.5-12}$$

遂得非零黎曼曲率分量，以及 Gauss 曲率（见式(1.5-9)、(1.5-11)）：

$$R_{1212} = r\cos v(R + r\cos v); \qquad K = \frac{\cos v}{r(R + r\cos v)}. \tag{1.5-13}$$

式(1.5-13)中 Gauss 曲率的分母必然大于零，而分子可正、可负、可零. ■

练习 1-1 (1) 补全例题1.4中式(1.5-12)的计算过程，包括为零的部分的计算. **(2)** 补全式(1.5-13)的计算过程，只计算 R_{1212}.

练习 1-2 使用第一、第二基本形式的方法从新计算例题1.4.

1.6 曲面上的平行移动

在三维欧氏空间中平行移动是绝对的、熟知的：把始点为 P 的矢量 $\boldsymbol{v}$ 平移到始点为 P' 的矢量 $\boldsymbol{v}'$，绝对平行移动是指在同一笛卡尔坐标系下，$\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{v}'$ 的分量相同.

本节将讨论曲面上不同点处的切平面中的矢量的平行移动. 设 $p(u)$、$p(u+\mathrm{d}u)$ 是二维曲面 S 上的两个无限邻近点；可以把 S 想象为二维球面，上述两个点分别是北极点 N 和 N 附近的一点. 为了简洁起见，记 $p(u)$ 为 p，$p(u+\mathrm{d}u)$ 为 p^*；又设 T_p、T_p^* 分别是 p、p^* 点的切平面；一般说来 T_p 和 T_p^* 是不重合的. 什么时候才能说 T_p 中的矢量 $\boldsymbol{v}$ 与 T_p^* 中的矢量 $\boldsymbol{v}^*$ 是平行的呢？

我们要求新平移定义可以形式不变地推广到高维空间，故必然要求这种平移定义是内蕴的. 我们不能简单地用 E^3 中绝对平移方法将 $\boldsymbol{v}^*$ 平移到 p 点后所

得到的矢量 $\boldsymbol{v}'^*$ 称作为 $\boldsymbol{v}^*$ 的平行矢量，因为这样做的话，移动后的矢量甚至可能不落在 T_p 中；换句话说，按照绝对平移，平移后的矢量 $\boldsymbol{v}'^*$ 不属于切平面 T_p，自然不能和 T_p 中的矢量 $\boldsymbol{v}$ 作差或相比较（指内蕴方式作差，不是外蕴方式）. 我们需另寻其它办法.

我们先用 E^3 中绝对平移方法将 $\boldsymbol{v}^*$ 平移到 p 点，所得到的矢量是 $\boldsymbol{v}'^*$，然后在 E^3 中作差，即令 $\mathrm{d}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}'^*-\boldsymbol{v}$；利用式(1.4-18)，只保留线性项，有

$$\mathrm{d}\boldsymbol{v}=\mathrm{d}\sum_{\sigma=1}^{2}v^\sigma\boldsymbol{r}_\sigma=\sum_{\sigma,\alpha,\beta=1}^{2}\left(\mathrm{d}v^\sigma+\Gamma^\sigma_{\alpha\beta}v^\alpha\mathrm{d}u^\beta\right)\boldsymbol{r}_\sigma+\sum_{\sigma,\beta=1}^{2}v^\sigma b_{\sigma\beta}\mathrm{d}u^\beta\boldsymbol{n}. \tag{1.6-1}$$

式(1.6-1)中最后一项是沿曲面 S 的法向 $\boldsymbol{n}$ 的，倒数第二项是切于曲面 S 的，属于切平面 T_p. 如果我们将上式向切平面 T_p 投影，即只保留切于 T_p 的分量，消去法方向的分量，则式(1.6-1)只剩下倒数第二项，并将其记为：

$$\mathrm{D}\boldsymbol{v}\equiv\sum_{\sigma,\alpha,\beta=1}^{2}\left(\mathrm{d}v^\sigma+\Gamma^\sigma_{\alpha\beta}v^\alpha\mathrm{d}u^\beta\right)\boldsymbol{r}_\sigma. \tag{1.6-2}$$

式(1.6-2)只有切于曲面 S 的分量，并且只包含内蕴量，不再含有第二基本形式；称为 $p\in S$ 点切平面 T_p 上矢量 $\boldsymbol{v}$ 的**协变微分**或**绝对微分**.

设有曲面 S 上有正则曲线 $C(s)$，矢量 $\boldsymbol{v}$ 还定义在 $C(s)$ 上，即 $\boldsymbol{v}$ 的起始点在 $C(s)$ 上，但未必是 $C(s)$ 的切线. 对式(1.6-2)除以 $\mathrm{d}s$，有

$$\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}s}\equiv\sum_{\sigma,\alpha,\beta=1}^{2}\left(\frac{\mathrm{d}v^\sigma}{\mathrm{d}s}+\Gamma^\sigma_{\alpha\beta}v^\alpha\frac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s}\right)\boldsymbol{r}_\sigma. \tag{1.6-3}$$

式(1.6-3)称为矢量 $\boldsymbol{v}$ 在曲线 $C(s)$ 上的**协变导数**.

定理 1.5 设有二维曲面 S，S 上有曲线 $C(s)$；$\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 是定义在 $C(s)$ 上的切矢量场，f 是定义在 $C(s)$ 上的标量函数场，则有 **(1)** $\mathrm{D}(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})=\mathrm{D}\boldsymbol{v}+\mathrm{D}\boldsymbol{w}$； **(2)** $\mathrm{D}(f\boldsymbol{v})=(\mathrm{d}f)\boldsymbol{v}+f\mathrm{D}\boldsymbol{v}$； **(3)** $\mathrm{d}(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w})=(\mathrm{D}\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{w}+\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{D}\boldsymbol{w}$.

证明 . (1)、(2) 是容易验证的. 下面证明第 (3) 条.

$$\begin{aligned}&(\mathrm{D}\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{w}+\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{D}\boldsymbol{w}\\&=\sum_{\sigma,\alpha,\beta=1}^{2}\left(\mathrm{d}v^\sigma+\Gamma^\sigma_{\alpha\beta}v^\alpha\mathrm{d}u^\beta\right)\boldsymbol{r}_\sigma\cdot\boldsymbol{w}+\boldsymbol{v}\cdot\sum_{\sigma,\alpha,\beta=1}^{2}\left(\mathrm{d}w^\sigma+\Gamma^\sigma_{\alpha\beta}w^\alpha\mathrm{d}u^\beta\right)\boldsymbol{r}_\sigma\end{aligned}$$

$$= \sum_{\sigma,\alpha,\beta,\pi=1}^{2} \left(g_{\pi\sigma}w^{\pi}\mathrm{d}v^{\sigma} + g_{\pi\sigma}v^{\pi}\mathrm{d}w^{\sigma} + g_{\pi\sigma}\Gamma^{\sigma}_{\alpha\beta}w^{\pi}v^{\alpha}\mathrm{d}u^{\beta} + g_{\pi\sigma}\Gamma^{\sigma}_{\alpha\beta}w^{\alpha}v^{\pi}\mathrm{d}u^{\beta}\right)$$

$$\overset{1.4-15}{=\!=\!=} \sum_{\alpha,\pi=1}^{2} \left(g_{\pi\alpha}w^{\pi}\mathrm{d}v^{\alpha} + g_{\pi\alpha}v^{\alpha}\mathrm{d}w^{\pi} + w^{\pi}v^{\alpha}\mathrm{d}g_{\pi\alpha}\right) = \mathrm{d}(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}).$$

本定理中前两条被推广成联络定义，见第178页定义6.1；第三条是联络与度规相互容许的表达式，见第236页式(8.1-1). ■

联络定义的推广并不是一帆风顺的；德国数学家 Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866) 于 1854 年创立黎曼几何；德国数学家 Elwin Bruno Christoffel (1829-1900) 于 1869 年引入克氏符，用来定义黎曼曲率，故也有人称此曲率为 Riemann–Christoffel 曲率；意大利数学家 Gregorio Ricci-Curbastro (1853-1925) 在 1887-1896 年间发展了绝对微分学，1900 年他与自己的学生 Tullio Levi-Civita（意大利数学家，1873-1941）完善了绝对微分学（即协变导数）；1918 年 Levi-Civita 才用平行移动解释协变导数，至此学者们意识到协变导数与度量可以分离，不必由度量唯一决定；直到 1950 年，法国数学家 Jean-Louis Koszul(1921-2018) 给出矢量丛上的联络定义7.18，Koszul 定义隐藏了局部坐标卡；同是 1950 年，同是法国数学家 Charles Ehresmann (1905-1979) 给出了主纤维丛联络定义.

我们需要抓住 E^3 中绝对平移的某些属性，把它应用到二维曲面；很明显不是所有属性都能转移到二维曲面的. E^3 中两个矢量的绝对平移有一个属性是：移动后两个矢量的差恒为零，也就是矢量的普通微分恒为零. 略加修改这个属性，即可推广到二维曲面；我们给二维曲面上切矢量场的平行下个定义：

定义 1.6 设有二维曲面 S，S 上有曲线 $C(s)$；$\boldsymbol{v}$ 是定义在 $C(s)$ 上的切矢量场，$\boldsymbol{v}$ 是**平行的**是指它沿 $C(s)$ 的协变导数恒为零（见式(1.6-3)），即 $\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}s}\big|_{C(s)} = 0$.

使用协变导数代替普通微分是因为协变导数是内蕴的，而普通微分不是. 协变导数几何意义是清楚的，即先把 $\boldsymbol{v}^*$ 绝对平移至 p 点，然后再向 T_p 投影.

我们把这个新的平行移动定义应用到 E^3 上. 因为 E^3 的度规是单位矩阵（笛卡尔直角坐标系），故它的所有联络系数 $\Gamma^k_{ij} = 0$，所以它的协变微分就是普通微分；故新的平行移动定义在 E^3 中就是原来的绝对平移.

二维曲面上一个矢量 $\boldsymbol{v}$ 沿闭合曲线 $C(s)$ 按定义1.6平行移动一周回到起点后，一般说来不会和原来的矢量重合，会有一个夹角；完成此计算需要用 Gauss–Bonnet 公式，可参考[86]§2.7.4或类似书籍.

1.7 度量与空间分离

在 §1.1中，我们并没有特别强调欧氏空间的度规（metric，也译为度量）是正定的单位矩阵；如果读者没有接触过微分几何或拓扑学，那么往往意识不到这个度规的存在．我们举例来说明度规与空间是分离的．设空间是 $\mathbb{R}^2$，先给出欧几里得度规和二维球面度规，它们的表达式分别为

$$\delta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \qquad g = \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & R^2 \sin^2\theta \end{pmatrix}. \tag{1.7-1}$$

我们生活在地球表面；如果我们只关心短距离（比如几百米），那么地球表面可以近似成一个二维平面，此时是欧氏度量 δ．设有 A、B 两点，它们位于 x 轴上，A 点坐标取为 $(0,0)$，B 点坐标取为 $(\pi,0)$；由此得两点间距离：

$$\int_{(0,0)}^{(\pi,0)} \left[(\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{d}x \\ \mathrm{d}y \end{pmatrix} \right]^{1/2} = \int_0^{\pi} \mathrm{d}x = \pi. \tag{1.7-2}$$

由于积分沿 x 轴，故上式中 $\mathrm{d}y \equiv 0$．欧氏度量是单位矩阵，往往被忽略掉．但是，如果你认为坐标本身（比如上述 x 轴上的 A、B 点）自带欧氏度量，那就错了！度量和空间是分离的！

如果我们关心地球表面长距离的表述（比如南北极点间的距离），此时就不能再近似成二维平面了，需用球面度量 g．二维球面的坐标是极角 θ 和方位角 ϕ，它们的取值范围是 $(\theta,\phi) \in [0,\pi] \times [0,2\pi] \subset \mathbb{R}^2$，很明显它们的定义域是空间 $\mathbb{R}^2$ 的子集．我们取北极点 N 的坐标是 $(0,0)$（为简单起见已令方位角 $\phi = 0$），南极点 S 坐标为 $(\pi,0)$；它们之间的距离是

$$\int_{(0,0)}^{(\pi,0)} \left[(\mathrm{d}\theta\ \mathrm{d}\phi) \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & R^2 \sin^2\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{d}\theta \\ \mathrm{d}\phi \end{pmatrix} \right]^{1/2} = \int_0^{\pi} R\mathrm{d}\theta = \pi R. \tag{1.7-3}$$

由于我们求经线长度，故上式中 $\mathrm{d}\phi \equiv 0$．上述例子表明：相同的空间 $\mathbb{R}^2$，相同的坐标点 $(0,0)$、$(\pi,0)$，配上不同的度量会有不同的距离．既然能配两个度量，自然可以配上无穷多个度量；故空间与度量是分离的，空间坐标不能自带度量．同时，也能看到度量源于现实生活，不是凭空想象出来的．

既然空间与度量是分离的，那么由空间定义的矢量、张量等概念必须摆脱度量；否则矢量、张量定义必然依附于某种特殊度量（比如欧式度量），没有普适

性. 举个例子，很多时候我们把矢量定义成有大小、有方向的量；所谓的“大小”是指矢量的长度，此处的长度自然是欧式度量（单位矩阵）给出的；矢量的这个定义无法推广到非欧几何. 我们把此例限制在二维空间便有：二维欧式度量（二维单位矩阵）定义的长度、正交和指标升降不能直接照搬到非欧曲面（例如二维球面）；原因很简单：**二维单位矩阵无法度量二维非欧曲面（例如二维球面）**. 我们将在第三章给出张量的一般性定义，该处的定义不依赖于度量.

可能有的读者觉得没必要了解复杂的非欧几何；然而，我们生活在地球表面，它近似是二维球面，它的 Gauss 曲率非零，是非欧几何；非欧几何就在我们身边，了解与否完全取决于读者你自己.

注 1.7 上面的“非欧几何”是指可嵌入 E^3（度量是单位矩阵）中的 Gauss 曲率非零的二维曲面；更严谨的描述见 §8.7.2.

注 1.8 若不能将度量与空间分离，将难以理解微分几何中的几何结构！自带欧式度量的坐标是无法描述非欧几何的.

小结

本章扼要地复习了古典微分几何，并用后面黎曼几何中符号重新描述了古典微分几何中定理、公式；微分几何大师们正是通过这种改写，才顺利地将二维曲面论中的结论推广到高维空间. 读者在了解后面黎曼几何知识时，请经常退化到本章二维曲面论，以便加深认知.

从本页起一直到 §4.1之前，度规只是若隐若现地出现，不会有实质性作用；然后从 §4.2直到 §8.1之前都不会用到度规这个几何量；之后，度规（微分几何的核心量之一）才会真正的起作用.

第二章　数学准备知识

2.1　数个代数概念

本小节只罗列一些后面章节会用到的代数概念，详尽内容请参考[81]或类似文献．列出这些概念的目的是为了便于查阅，以免再去频繁翻看其它书籍．

定义 2.1 设有两个集合 M 和 N，从 M 到 N 的**映射**σ 是指一个法则，它使 M 中每一个元素 a 都在 N 中存在唯一确定的元素 b 与之对应，记为 $\sigma(a)=b$．M 称为 σ 的**定义域**，N 称为 σ 的**陪域**，集合 $\sigma(M)\subset N$ 称为 σ 的**值域**．

元素 b 称为 a 在映射 σ 下的**像**；而 a 称为 b 在映射 σ 下的**原像**．

若 $\forall a_1,a_2\in M$ 都有 $\sigma(a_1)\neq\sigma(a_2)$，则称映射 σ 是单一的，或**单射**．

若 $\forall b\in N$ 在 M 中都至少存在一个原像 a，则称映射 σ 是满的，或**满射**．

既单又满的映射 σ 称为**双射**或**一一映射**；双射的逆是存在的，记为 σ^{-1}．

定义 2.2 设 $\mathbb{F}$ 是由一些复数组成的集合，其中包括 0 与 1；如果 $\mathbb{F}$ 中任意两个数（可以是相同的两个数）的和、差、积、商（除数不为 0）仍是 $\mathbb{F}$ 中的数（即对上述运算有封闭性），则称 $\mathbb{F}$ 为一个**数域**．

由 $1+1=2,2+1=3,\cdots$ 可知自然数是 $\mathbb{F}$ 中的元素；再由 $0-1=-1,0-2=-2,\cdots$ 全体整数也属于此集合；还可继续作除法运算，任意两个整数的商也属于 $\mathbb{F}$，故全体有理数都是 $\mathbb{F}$ 的元素；所有有理数的和、差、积、商仍是有理数，可见有理数集合 $\mathbb{Q}$ 是一个数域．任何其它数域必包含有理数域作为其子集．

本书只会涉及：实数域和复数域，即要么 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$，要么 $\mathbb{F}=\mathbb{C}$．

定义 2.3 设 G 是一个非空集合，定义 G 上的一个二元运算“$*$”，称为**群乘法**，从集合 G 中任意两个元素 a 和 b（两者可相等）得到的 $a*b$ 恒在 G 中（即群乘法是**封闭的**）．再给出关于群乘法的三条性质：

甲 结合律：即 $\forall a,b,c\in G$，恒有 $(a*b)*c=a*(b*c)$；

乙 单位元（幺元）：存在幺元 $e \in G$ 使得 $\forall a \in G$ 有 $a * e = e * a = a$；

丙 逆元：$\forall a \in G$，都存在元素 $b \in G$ 使得 $a * b = b * a = e$；记 $a^{-1} = b$.

如果集合 G 和群乘法只满足封闭性，那么称 G 为**原群**（Magma）. 如果原群和群乘法只满足性质甲，那么称 G 为**半群**. 如果原群和群乘法只满足性质甲和乙，那么称 G 为**幺半群**. 如果原群和群乘法满足性质甲、乙和丙，那么称 G 为**群**. 通常情况下会省略群乘号“$*$”.

群元素的数目称为群的**阶**，记为 g. 若 g 是有限的，则称为**有限群**；否则称为**无限群**. 一般说来两个群元的乘积是不可交换的，即 $ab \neq ba$；如果对于任意两个群元都可以交换，称此群为 **Abel 群**或**交换群**.

例 2.4 设集合只有一个元素 $G = \{e\}$，规定群乘法为 $e * e = e$，显然这符合群定义各条性质，这是最简单的群，只有一个单位元. 称之为**平凡群**.

例 2.5 $\mathbb{Z}_2 \equiv \{+1, -1\}$，规定群乘法为整数乘法，它对该乘法构成群.

例 2.6 全体整数对加法构成群，记为 $(\mathbb{Z}, +)$. 注：整数集不是数域.

例 2.7 将集合 G 取为数域 $\mathbb{F}$，规定群乘法为此数域的加法，则 $(\mathbb{F}, +)$ 符合群定义各条性质，称之为数域 $\mathbb{F}$ 的**加法群**；比如 $(\mathbb{R}, +)$ 等等.

例 2.8 将集合 G 取为扣除零元素之后集合 $\mathbb{F}^* = \mathbb{F} \backslash \{0\}$，规定群乘法为此数域的数的乘法，则 $(\mathbb{F}^*, \times)$ 符合群定义各条性质，称之为 $\mathbb{F}^*$ 的**乘法群**.

定义 2.9 设 H 是群 G 的非空子集；在与 G 相同的群乘法下，如果集合 H 构成群（满足群的定义2.3）；则称 H 为 G 的**子群**.

定义 2.10 设 H 为 G 的子群，由固定的 $g \in G$ 可生成子群 H 的**左陪集**：$gH = \{gh \mid \forall h \in H\}$；同样可生成子群 H 的**右陪集**：$Hg = \{hg \mid \forall h \in H\}$.

定义 2.11 设 H 为 G 的子群，若对于任意 $g \in G$ 都有 $ghg^{-1} \in H$, $\forall h \in H$；则称 H 为 G 的**正规子群**或**不变子群**.

定义 2.12 若从群 G 到群 F 存在一个映射 $\phi : G \to F$ 保持群乘法不变，即 $\forall g, h \in G$ 都有 $\phi(gh) = \phi(g)\phi(h)$；则称映射 ϕ 为群 G 到群 F 的**同态映射**；若 ϕ 是满射，则称为**满同态**；若 ϕ 是单射，则称为**单同态**；若 ϕ 为双射，则称之为**同构映射**，记为 $G \cong F$.

定义 2.13 若 ϕ 是 G 到 F 的同态映射，F 单位元 e 的原像集合 $\ker\phi = \phi^{-1}(e) = \{x \in G \mid \phi(x) = e\}$ 称为 ϕ 的**同态核**，简称**核** .

定义 2.14 群 G 的**中心**定义为：$C(G)=\{x\in G\mid xy=yx,\forall y\in G\}$.

如果群 G 有不变子群 H，则可以证明[81]§1.3商集 G/H 也是群，称为群 G 对 H 的**商群**. 商群 G/H 中的元素是 G 中 H 的所有陪集，单位元是 H. 存在从 G 到 G/H 的映射 $\boxed{\pi(g)=gH,\ \forall g\in G}$，则 π 是同态映射，称为**自然同态**. 我们不加证明地引入群同态基本定理（证明见[81]§1.7或类似书籍）：

定理 2.15 f 是群 G 到群 K 的同态映射，则有如下结论：**(1)** $\ker f$ 是群 G 的不变子群. **(2)** 设 π 是从 G 到商群 $G/\ker f$ 的自然同态，则有从 $G/\ker f$ 到 K 上的同构映射 $\bar{f}$ 使得 $f=\bar{f}\circ\pi$. **(3)** 若另有 G 的不变子群 N，并且 $\ker f\subset N$，则 $G/N\cong K/f(N)$（同构）. **(4)** 继 (3) 中记号；π' 是从 G 到 G/N 的自然同态，另有 G 的不变子群 H，并且 $H\subset N$；则将 (3) 中的 K 换成 G/H，f 换成 π'，有 $G/N\cong(G/H)/(N/H)$（同构）.

例 2.16 全体可逆、$\mathbb{F}$ 数值、n 维矩阵构成一个集合，并取矩阵的乘法为群乘法，则此集合构成一个群，称为 $\mathbb{F}$ 值**一般线性群**（General Linear group），记为 $GL(n,\mathbb{F})$. 比如实一般线性群 $GL(n,\mathbb{R})$，复一般线性群 $GL(n,\mathbb{C})$.

例 2.17 给定 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V，空间 V 上全体可逆线性变换构成一个集合，取群乘法为两个线性变换相继作用，则此集合构成群，也称为**一般线性群**，记作 $GL(n,V)$. 因为选定基底后，可逆线性变换与可逆矩阵有双射关系，所以 $GL(n,\mathbb{F})$ 同构于 $GL(n,V)$.

定义 2.18 如果存在从群 G 到一般线性群 $GL(n,V)$ 的同态映射 $\phi:G\to GL(V)$，则称 (ϕ,V) 为群 G 的一个 n 维**线性表示**，简称**表示**. 如果 ϕ 是单同态（$\ker\phi=e$），则称为**忠实表示**. 非空的 V 是表示空间，其维数称为表示的**维数**.

定义 2.19 群 G 的线性表示 (ϕ,V) 的子空间 V_1 若满足 $\phi(g)V_1=V_1,\forall g\in G$，则 V_1 称为 G 的**不变子空间**；于是 $(\phi|_{V_1},V_1)$ 可称为表示 (ϕ,V) 的**子表示**.

定义 2.20 若除 $\{0\}$ 和 V 外，G 的表示 (ϕ,V) 没有不变子空间，则称 ϕ 是**不可约表示**；否则称为**可约表示**. 若对任意不变子空间 V_1（除 $\{0\}$ 和 V 外），存在不变子空间 V_2 使得 $V=V_1\oplus V_2$（直和），则称 G 的表示 (ϕ,V) 是**完全可约的**；此时记 $\phi=\phi|_{V_1}\oplus\phi|_{V_2}$，称 ϕ 是子表示 $\phi|_{V_1}$ 与 $\phi|_{V_2}$ 的**直和**.

定义 2.21 设 (ϕ,V) 和 (ψ,U) 是群 G 的两个表示；若存在线性同构映射 $\mathcal{A}:V\to U$ 使得 $\mathcal{A}\phi(g)=\psi(g)\mathcal{A},\forall g\in G$ 成立，则称表示 (ϕ,V) 和 (ψ,U) **等价**.

定义 2.22 设 Ω 是任一非空集合，Ω 到自身的所有双射组成的集合（记为 $S(\Omega)$）

对映射乘法构成一个群，称之为 Ω 上的**全变换群**；$S(\Omega)$ 的任一子群称为 Ω 上的**变换群**. 当 Ω 是 n 个有限元素的集合时，Ω 到自身的双射称为一个$\boldsymbol{n}$ **元置换**；$S(\Omega)$ 上的全体变换称为$\boldsymbol{n}$ **元对称群**，记为 S_n；S_n 自身及子群也称为**置换群**.

例 2.23 本例给出置换群具体形式. 设有 n 相同的抽屉，每个抽屉上贴有编号，从 1 到 n；1 号抽屉里面放着物体 A，2 号抽屉里面放着物体 B，……，以此类推. 现在我们将第 1 抽屉中的物体放到第 a_1 个抽屉，将第 2 抽屉中的物体放到第 a_2 个抽屉，……，将第 n 抽屉中的物体放到第 a_n 个抽屉. 我们将这个操作记成：$\left(\begin{smallmatrix}1 & 2 & \cdots & n\\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n\end{smallmatrix}\right)$ 其中 $1,2,\cdots,n$ 表示物体所在原来的抽屉，$a_1,a_2,\cdots,a_n$ 表示物体所在新的抽屉编号，且 $\{a_i\}$ 两两不等. 这些操作的集合构成 n 元置换群S_n. 下面以三个客体 A,B,C 为例来说明这个操作该过程.

$$\boxed{A}\boxed{B}\boxed{C} \xrightarrow{\left(\begin{smallmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{smallmatrix}\right)} \boxed{C}\boxed{A}\boxed{B} \xrightarrow{\left(\begin{smallmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{smallmatrix}\right)} \boxed{B}\boxed{C}\boxed{A} \xrightarrow{\left(\begin{smallmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{smallmatrix}\right)} \boxed{A}\boxed{B}\boxed{C}$$

设有两个置换 $S=\left(\begin{smallmatrix}1 & 2 & \cdots & n\\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n\end{smallmatrix}\right)$、$T=\left(\begin{smallmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n\end{smallmatrix}\right)$ 则两个置换的乘法定义为：

$$TS \equiv \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}.$$

即先实行置换操作 S，再实施置换操作 T. ■

定义 2.24 设 R 是非空集合，在此集合上定义了两个代数运算（对运算有封闭性），一个叫做**加法**，记作 $a+b$，另一个叫做**乘法**，记作 ab；并且这两个运算满足如下六条规则：

(1) 加法结合律，即 $(a+b)+c=a+(b+c)$；

(2) 加法交换律，即 $a+b=b+a$；

(3) 在 R 中存在零元素 0，使得 $a+0=a$；

(4) 对 R 中元素 a，存在 $d\in R$ 使得 $a+d=0$，d 称为 a 的负元素；

(5) 乘法结合律，即 $(ab)c=a(bc)$；

(6) 乘法对加法有左右分配律，即 $a(b+c)=ab+ac,\ (b+c)a=ba+ca$.

其中 a,b,c 是 R 中任意元素，则称 R 是一个**环**（ring）.

环 R 对其加法构成交换群，对其乘法构成半群.

容易证明环 R 中的零元和负元是唯一的；利用负元可以定义减法. 如果环 R 中有一个元素 e 对乘法具有如下性质：$ea=ae=a,\ \forall a\in R$；则称 e 是 R 中

的**幺元**或单位元，此时环 R 称为**幺环**或者有单位元的环；可证单位元是唯一的，通常会用“1”来代替 e.

如果环 R 的乘法还有交换律，即 $ab=ba$，则称其为**交换环**.

在幺环 R 中，对于 $a\in R$，如果存在 $b\in R$，使得 $ab=ba=1$，则称 a 是可逆的，b 称为 a 的逆元，逆元是唯一的，一般记为 a^{-1}.

如果环 R 中有元素 $b\neq 0$，存在元素 $a\neq 0$ 使得 $ab=0$（或 $ba=0$），则称元素 a 为 R 的一个**左**（或**右**）**零因子**，两者都可简称为**零因子**. 元素 0 也可称为（平凡）零因子. 任何两个非零元素之积不为零的环称为**无零因子环**.

例 2.25 一切数域都是环；且是有幺元的交换环.

例 2.26 整数集 $\mathbb{Z}$ 对其自身的加法和乘法构成环，称为**整数环**. 此环不是数域.

定义 2.27 如果环 R 的非零元素集合对乘法构成群（且 $1\neq 0$），则称为**体**.

定义 2.28 可交换的体称为**域**，即环 R 中非零元素集合对乘法构成交换群.

环和域还有特征（Characteristic）的概念（省略不写）；此处想声明的是：所有数域特征为零.（比如可参阅[81]§3.1中叙述，或查阅类似文献）

若 $\mathbb{F}$ 上每一个非常值一元多项式在 $\mathbb{F}$ 中都有根（即全部根都属于 $\mathbb{F}$），则域 $\mathbb{F}$ 称为**代数闭域**. 由代数基本定理，可知复数域是代数闭的. 多项式 $f(x)=x^2+1$ 在实数域没有根，故实数域不是代数闭的.

例 2.29 四元数 $\mathbb{H}$（quaternion）.

爱尔兰数学家、力学家哈密顿（1805～1865）于 1843 年发明了四元数：

$$a+b\mathbb{i}+c\mathbb{j}+d\mathbb{k},\qquad \forall a,b,c,d\in\mathbb{R}. \tag{2.1-1}$$

其中符号 $\mathbb{i},\mathbb{j},\mathbb{k}$ 满足：

$$\mathbb{i}^2=\mathbb{j}^2=\mathbb{k}^2=-1;\quad \mathbb{i}\mathbb{j}=-\mathbb{j}\mathbb{i}=\mathbb{k},\quad \mathbb{j}\mathbb{k}=-\mathbb{k}\mathbb{j}=\mathbb{i},\quad \mathbb{k}\mathbb{i}=-\mathbb{i}\mathbb{k}=\mathbb{j}.$$

所有四元数组成的集合记为 $\mathbb{H}$，规定 $\mathbb{H}$ 的加法和乘法为：

$$a+b\mathbb{i}+c\mathbb{j}+d\mathbb{k}+a'+b'\mathbb{i}+c'\mathbb{j}+d'\mathbb{k}\overset{def}{=}(a+a')+(b+b')\mathbb{i}+(c+c')\mathbb{j}+(d+d')\mathbb{k}.$$

$$\begin{aligned}(a+b\mathbb{i}+c\mathbb{j}+d\mathbb{k})(a'+b'\mathbb{i}+c'\mathbb{j}+d'\mathbb{k})&\overset{def}{=}aa'-bb'-cc'-dd'\\&+(ab'+ba'+cd'-dc')\mathbb{i}+(ac'+ca'-bd'+db')\mathbb{j}+(ad'+da'+bc'-cb')\mathbb{k}.\end{aligned}$$

很明显四元数对于乘法不具有对易性. 容易验证全体四元数 $\mathbb{H}$ 是体，但不是域. 由此可见定义2.2将取值范围限制在复数集合是合理的. ■

定义 2.30 设 R 是一交换环，有一个非空的集合 M，如它满足下列条件：**(1)** M 中有加法“$+$”，而对“$+$”而言，M 是一交换群；取此加法群的幺元为 0. **(2)** $\forall a \in R,\ m \in M$，有二元运算（通常称为乘法“$*$”）存在，使 $a * m \in M$，及 $1 * m = m$，其中“1”（$1 \neq 0$）是环 R 乘法的幺元（乘法符号“$*$”经常忽略不写）. **(3)** 交换环 R 的加法、乘法，M 的加法及 R 与 M 之间的乘法都适合结合律及分配律，即（其中任取 $a, b \in R;\ m, n \in M$）

$$(ab)m = a(bm), \quad (a+b)m = am + bm, \quad a(m+n) = am + an.$$

则称 M 为 R-**模**，或简称为**模**.

例 2.31 数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V（见定义3.1）可以看成 $\mathbb{F}$-模.

练习 2-1 请验证四元数是体.

2.2 点集拓扑基本概念

我们先给出点集拓扑的一些概念（都取自[43]相应章节），这些概念大都晦涩难懂；之后我们把这些概念应用到度量空间上（如 $\mathbb{R}^m$），以便更好的理解.

定义 2.32 非空集合 X 上的一子集族 $\mathscr{T}$，若它满足如下条件：**(1)** X 和 $\varnothing$ 都在 $\mathscr{T}$ 中；**(2)** $\mathscr{T}$ 的任意子族元素的并在 $\mathscr{T}$ 中；**(3)** $\mathscr{T}$ 任意两个子族元素的交在 $\mathscr{T}$ 中. 则称集合 X 指定了一个**拓扑**$\mathscr{T}$；称 X 为**拓扑空间**，记为 $(X, \mathscr{T})$，可简记为 X；$\mathscr{T}$ 中元素称为**开集**.

只要满足上面定义中的三条公理就可以称为拓扑.

例 2.33 设 X 是由三个元素 $\{a, b, c\}$ 组成的集合，其上有很多拓扑；参见图2.1.

左上 $\mathscr{T}_1$：开集有 X、$\varnothing$.
左中 $\mathscr{T}_2$：开集有 X、$\varnothing$、$\{b\}$.
左下 $\mathscr{T}_3$：开集有 X、$\varnothing$、$\{a, b\}$.
中上 $\mathscr{T}_4$：开集有 X、$\varnothing$、$\{a\}$、$\{a, b\}$.
中中 $\mathscr{T}_5$：开集有 X、$\varnothing$、$\{a\}$、$\{b, c\}$.
中下 $\mathscr{T}_6$：开集有 X、$\varnothing$、$\{a\}$、$\{b\}$、$\{a, b\}$.
右上 $\mathscr{T}_7$：开集有 X、$\varnothing$、$\{b\}$、$\{a, b\}$、$\{b, c\}$.
右中 $\mathscr{T}_8$：开集有 X、$\varnothing$、$\{b\}$、$\{c\}$、$\{a, b\}$、$\{b, c\}$.
右下 $\mathscr{T}_9$：开集有 X、$\varnothing$、$\{a\}$、$\{b\}$、$\{c\}$、$\{a, b\}$、$\{a, c\}$、$\{b, c\}$. ■




图 2.1: a, b, c 的拓扑

定义 2.34 设 $(X, \mathscr{T})$ 为拓扑空间，$\forall x \in N \subset X$，如果存在开集 $U \in \mathscr{T}$ 使得 $x \in U \subset N$，则称 N 为 x 的**邻域**. 如果 N 本身是开集，则称为**开邻域**. 我们称 x 为 N 的**内点**，所有内点的集合称为 N 的内部，记作 $\overset{\circ}{N}$.

定义 2.35 若 A 是拓扑空间 X 的一个子集，x 是 X 的一个点，如果 x 的任意一个邻域与 A 的交含有异于 x 的点，我们称 x 为 A 的一个**极限点**（或**聚点**）. A 所有极限点的集合与 A 的并集称为它的**闭包**，记作 $\bar{A}$.

注意：如果 x 属于 $A - \{x\}$ 的闭包，则 x 便是 A 的一个极限点. 这个点 x 可以在 A 中，也可以不在 A 中，在此定义中 x 是否在 A 中是无关紧要的.

定义 2.36 拓扑空间 X 中任意两个不同点 x 和 y，若有不相交的邻域 U 和 V 分别包含它们，即 $x \in U$、$y \in V$ 且 $U \cap V = \varnothing$，则称 X 为 **Hausdorff 空间**.

定义 2.37 设 U 是拓扑空间 X 的子集，若 $X - U$ 是开集，则称 U 为**闭集**.

定义 2.38 一个拥有无限多个元素的集合 A，如果其中元素和正整数集合有双射关系，则称 A 是**无穷可数的**（countable）；否则称为**不可数**.

有限集合自然可以和正整数集合的某个子集建立双射关系，故必然可数.

定义 2.39 拓扑空间 X 的子集 A 称为**稠密的**（dense）是指 $\bar{A} = X$. 如果 X 有可数的稠密子集，则称 X 是**可分的**（separable）拓扑空间.

定义 2.40 设有两个非空集合 A 和 B，所有有序偶对 (a,b)（其中 $a\in A, b\in B$）的集合定义为**笛卡尔积**，简称为**积**，记为 $A\times B=\{(a,b)|a\in A, b\in B\}$.

需要注意 a 和 b 的顺序不能随意调换；定义2.40可以拓展到有限个集合情形. 这里只给出了最简单“积”的概念，更详细描述见文献[43]§1, §5, §15, §19.

2.3 度量空间

定义 2.41 集合 X 的**度量**是一个函数：$d: X\times X\to\mathbb{R}$；它使得以下性质成立：**(1)** $\forall x,y\in X$，$d(x,y)\geqslant 0$；等号当且仅当 $x=y$ 时成立. **(2)** $\forall x,y\in X$，$d(x,y)=d(y,x)$. **(3)** $\forall x,y,z\in X$，$d(x,y)+d(y,z)\geqslant d(x,z)$.

定义 2.42 集合 X 连同给定的度量 d 称为**度量空间**，记为 (X,d).

定义2.41中的度量是集合 X 上的度量. 之后，我们还会在线性空间、黎曼流形上引入度量概念；若它们是正定的（比如欧式、黎曼度量），则符合定义2.41；若它们是不定的（比如 Lorentz 度量），则不符合定义2.41中的第 (1)、(3) 条.

给定 X 一个度量 d，实数 $d(x,y)$ 通常称为 x 和 y 之间在 d 下的**距离**. 对于 $\varepsilon>0$，考虑所有与 x 的距离小于 ε 的点 y 的集合

$$B_d(x,\varepsilon)\equiv\{y\mid d(x,y)<\varepsilon\}. \tag{2.3-1}$$

$B_d(x,\varepsilon)$ 称为**以 x 为中心的 ε-球**. 在不引起混淆的前提下，可以记成 $B(x,\varepsilon)$.

例如 $\mathbb{R}^m$ 具有下列两个常用度量（请读者验证下两式符合度量定义）：

$$d_b(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|=\sqrt{(x^1-y^1)^2+\cdots+(x^m-y^m)^2}, \tag{2.3-2a}$$

$$d_c(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|=\max\{|x^1-y^1|,\cdots,|x^m-y^m|\}. \tag{2.3-2b}$$

分别称为欧几里得度量和确界度量；欧几里得度量的几何意义是以 x 为中心的 ε-球 $B_d(x,\varepsilon)$；确界度量的几何意义是以 $\boldsymbol{x}$ 为中心以 ε 为半边长的开立方体，记为 $C(\boldsymbol{x},\varepsilon)$. 不难验证不等式 $|\boldsymbol{x}|\leqslant\|\boldsymbol{x}\|\leqslant\sqrt{m}|\boldsymbol{x}|$ 成立，它导致下列包含关系：

$$B(\boldsymbol{x},\varepsilon)\subset C(\boldsymbol{x},\varepsilon)\subset B(\boldsymbol{x},\sqrt{m}\varepsilon). \tag{2.3-3}$$

例 2.43 仿照 $\mathbb{R}^m$ 中度量(2.3-2)，我们定义 $\mathbb{C}^m$ 中度量：

$$d_b(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\sqrt{|x^1-y^1|^2+\cdots+|x^m-y^m|^2}, \tag{2.3-4a}$$

$$d_c(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \max\{|x^1-y^1|,\cdots,|x^m-y^m|\}. \tag{2.3-4b}$$

当 $m=1$ 时，$|x-y|$ 就是两个复数 x、y 之差的模长. ■

需要强调的是拓扑空间定义并不需要度量，但由度量诱导的拓扑更加直观. 为了描述简单起见，我们尽量使用度量诱导出来的拓扑（比如 $\mathbb{R}^m$ 中的拓扑），这样更容易想象出几何图像.

定理 2.44 $B_d(x,\varepsilon)$ 会诱导出 (X,d) 上的一个拓扑.

证明 . 规定 X 子集族 $\mathscr{T}_d \equiv \{U \mid U\text{是若干 }\varepsilon\text{-球的并集}\}$. 下面证明 $(X,\mathscr{T}_d)$ 符合拓扑空间定义2.32. 证明过程就是验证 $(X,\mathscr{T}_d)$ 符合定义2.32中的三个公理.

需要指出的是 $B_d(x,\varepsilon)$ 中的 ε 可以等于 $+\infty$ 或零；这样 $\mathscr{T}_d$ 包含 $\varnothing$ 和 X 本身；故 $\mathscr{T}_d$ 满足定义2.32中的第 (1) 条.

很明显，任意个 ε-球的并集仍在 $\mathscr{T}_d$ 中；验证了2.32中的第 (2) 条.

为了证明第 (3) 条，我们需要先证明一个引理. 设 $B_d(x_1,\varepsilon_1)$、$B_d(x_2,\varepsilon_2)$ 是 $(\mathbb{R}^m,d)$ 的两个 ε-球，再假设它们的交集非空，即 $\varnothing \neq U = B_d(x_1,\varepsilon_1)\cap B_d(x_2,\varepsilon_2)$. $\forall y\in U$，不难得到：$\varepsilon_i - d(y,x_i) > 0\,(i=1,2)$. 记 $\varepsilon_y = \min\{\varepsilon_1 - d(y,x_1),\ \varepsilon_2 - d(y,x_2)\}$，易证 $B_d(y,\varepsilon_y)\subset U$；于是有 $U=\bigcup_{y\in U} B_d(y,\varepsilon_y)$，也就是：$(X,d)$ 上任意两个 ε-球的交集是若干 ε-球的并集.

设 $U,U'\in\mathscr{T}_d$，记 $U=\bigcup_\alpha B_d(y_\alpha,\varepsilon_\alpha)$、$U'=\bigcup_\beta B_d(y'_\beta,\varepsilon'_\beta)$. 那么

$$U\cap U' = \left(\bigcup_\alpha B_d(y_\alpha,\varepsilon_\alpha)\right)\cap\left(\bigcup_\beta B_d(y'_\beta,\varepsilon'_\beta)\right) = \bigcup_{\alpha,\beta}\left(B_d(y_\alpha,\varepsilon_\alpha)\cap B_d(y'_\beta,\varepsilon'_\beta)\right).$$

根据刚刚证明的引理，对于任何 α,β，$B_d(y_\alpha,\varepsilon_\alpha)\cap B_d(y'_\beta,\varepsilon'_\beta)\in\mathscr{T}_d$；再由拓扑公理 (2) 可以得出 $U\cap U'\in\mathscr{T}_d$. 这便证明了 $\mathscr{T}_d$ 满足第 (3) 条公理. ■

定理2.44中的 $\mathscr{T}_d$ 称为由度量 d 诱导出来的**度量拓扑**.

下面讨论 $\mathbb{R}^m$ 上**标准开集**的概念；需要注意标准开集的概念是人为规定的. 实数轴 $\mathbb{R}$ 中的开区间 (a,b) 是标准开集；闭区间 $[a,b]$ 和半开半闭区间 $[a,b)$、$(a,b]$ 和单点集都不是标准开集. 推而广之，以 x 为中心的 ε-球(2.3-1)是 $\mathbb{R}^m$ 中的标准开集. 很明显，开球 $B_d(x,\varepsilon)$ 是定义2.34中所描述的开邻域中的一种.

$\mathbb{R}^m$ 上一般开集定义（包括各种非标准开集）可参阅[43]§12,§13. 由于我们基本不会涉及这些非标准开集，故之后的行文中将省略“标准”二字.

例 2.45 因 (a,b) 是 $\mathbb{R}$ 中的开集，由定义2.37可知 $(-\infty,a]$、$[b,+\infty)$ 以及单点集都是闭集．$[a,b]$ 称为 (a,b) 的**闭包**．而半开半闭集合既不是开集也不是闭集，不是 $(\mathbb{R},\mathscr{T}_d)$ 中的元素．

注 2.46 上述 $\mathbb{R}^m$ 中的标准开集是通过度量(2.3-2)诱导得到的；若黎曼几何中（见后面章节）的附加度量是正定的，那么这种定义标准开集的方式是妥当的．若黎曼几何附加不定度量，那么不定黎曼度量与度量(2.3-2)可能存在逻辑上的不自洽．其实可以通过“序拓扑”方式引入 $\mathbb{R}^m$ 中的标准开集，序拓扑定义的标准开集与上面由度量(2.3-2)诱导得到的标准开集完全相同；可参见[43]§10,§14,§15．

包含关系(2.3-3)蕴涵着下列定理：

定理 2.47 若 X 是 $\mathbb{R}^m$ 的一个子空间，那么无论是用 X 上的欧几里得度量还是按确界度量，X 的开集族是相同的；对于 X 的闭集族也同样成立．

定理2.47表明：对于拓扑问题来说，$\mathbb{R}^m$ 上的这两个度量是等价的．

定义 2.48 设 A 是拓扑空间 $(X,\mathscr{T})$ 的一个非空子集，构建如下子集族 $\mathscr{T}_A\equiv\{U\cap A\mid U\in\mathscr{T}\}$．称 $\mathscr{T}_A$ 是 A 上的**子空间拓扑**或从 $(X,\mathscr{T})$ 得到的**诱导拓扑**．

我们对诱导拓扑做一下解释．现有二维平面 $\mathbb{R}^2$ 和一维实直线 $\mathbb{R}$，二维平面采用标准拓扑，即开圆盘 $B(x,\varepsilon)$ 之并．$\mathbb{R}$ 显然是 $\mathbb{R}^2$ 的非空子集；通过诱导拓扑定义2.48可以看到：实直线与开圆盘 $B(x,\varepsilon)$ 交集就是开区间，因此诱导拓扑就是实直线上的标准拓扑．还有一点需要注意，这个诱导拓扑用二维平面上开集（开圆盘）来衡量并不是开集，因为没有宽度的实直线不可能装下开圆盘．

定义 2.49 设有拓扑空间 $(X,\mathscr{T})$，以及 X 上的一组开集族 $\mathscr{B}$．若 $\forall A\in\mathscr{T}$，它都可以表示成 $\mathscr{B}$ 中若干元素的并集，则称 $\mathscr{B}$ 是拓扑空间 $(X,\mathscr{T})$ 的**拓扑基**．

不难验证开球 $B_d(x,\varepsilon)$ 是度量空间 (X,d) 的拓扑基．

2.4 连续性

定义 2.50 设 X 和 Y 是两个拓扑空间，存在映射 $f:X\to Y$；如果对于 Y 中的每个开子集 V，$f^{-1}(V)$ 是 X 中的一个开子集，则称映射 f 为**连续的**．

我们解释一下定义2.50中的集合

$$f^{-1}(V)=\{x\in X\mid f(x)\in V\},\tag{2.4-1}$$

它是 X 中所有使得 $f(x)\in V$ 的点 x 的集合；如果 V 与 f 的像集无交，则 $f^{-1}(V)=\varnothing$. 特别需要注意 f^{-1} 不是逆映射，是逆像的集合.

设 X、Y 中分别有度量 d_X、d_Y，函数 f 在 x_0 点连续；那么，对任意 $\varepsilon>0$，都存在一个相应的 $\delta>0$ 使得当 $d_X(x,x_0)<\delta$ 时，$d_Y\big(f(x),f(x_0)\big)<\varepsilon$ 成立. 这就是连续性的经典 $\varepsilon-\delta$ 表述法.

注意到对给定的 $x_0\in X$，也可能恰巧对每个 $\delta>0$，x_0 的 δ 邻域只包含 x_0 点. 在这种情况下，将 x_0 称为 X 的孤立点，任何函数 $f:X\to Y$ 在孤立点自动是连续的.

例 2.51 连续性和 X、Y 拓扑的关系.

比如 X 选为 $\mathbb{R}$，拓扑是标准拓扑. Y 也选为 $\mathbb{R}$，但将拓扑选为所谓的下限拓扑，即 $\mathbb{R}$ 中的半开半闭区间 $[a,b)$ 是开集，同时将其记为 $\mathbb{R}_\ell$. 写到这里需要对拓扑再做些说明，拓扑的规定是十分任意的，也是人为的，只要符合拓扑三公理即可，下限拓扑完全符合拓扑三公理，请读者自行验证或参考[43]§13中的 $\mathbb{R}_K$ 拓扑定义. 现在，我们选恒等映射

$$\imath:\mathbb{R}\to\mathbb{R}_\ell,\quad \text{即对于任意一个实数}x,\ \imath(x)=x. \tag{2.4-2}$$

但是映射 $\imath$ 不是一个连续函数. 因为 $\mathbb{R}_\ell$ 中的开集 $[a,b)$ 的原像还是 $[a,b)$，它不是 $\mathbb{R}$（标准拓扑）中的开集. ■

定义 2.52 设 X 和 Y 是两个拓扑空间，如果存在双射 $f:X\to Y$，并且 f 和 f^{-1} 是连续的，则称映射 f 为**同胚**. 此处指整体同胚.

正是因为有例2.51这种情形，定义2.52中必须同时满足 f、f^{-1} 连续. 在同胚映射下不变的属性称为**拓扑性质**，比如紧致性、连通性、可分性等.

定义 2.53 设 X 为具有可数拓扑基的 Hausdorff 空间，若它的每一点 x 都有一个开邻域 U 同胚于 $\mathbb{R}^m$ 中的一个标准开子集，则称 X 为 m 维**拓扑流形**.

定义2.53中维数是一个很复杂的问题，请参阅[43]§50. 此处我们简单地认为流形 X 只有一个维数，就是 m；不考虑其它复杂情形. 代数拓扑学中有一个基本定理：设有两个非空标准开集 $U\subset\mathbb{R}^m$、$V\subset\mathbb{R}^n$，如果 U、V 相互同胚，那么它们的维数相等，即 $m=n$.

微积分中有许多定理可以推广到度量空间中，我们不加证明（可参考[43]定理 18.2、18.4、21.5）的叙述两个. 下面定理中 X、Y 均是度量空间.

定理 2.54 **(1)** 若 $f: X \to Y$ 将整个 X 映射为 Y 中一个点 y_0，则 f 是连续的；即常值映射是连续的. **(2)** 令 $x_0 \in A$，这里 A 是 X 的一个子空间. 如果 $f: X \to Y$ 在 x_0 点是连续的，那么限制函数 $f|_A: A \to Y$ 在 x_0 点也是连续的. **(3)** 令 $f: X \to Y$，$g: Y \to Z$. 若 f 在 x_0 点连续且 g 在 $y_0 = f(x_0)$ 点连续，那么 $g \circ f: X \to Z$ 在 x_0 点连续.

定理 2.55 **(1)** 令 $f: X \to \mathbb{R}^m$ 具有下列形式：$f(x) = \big(f_1(x), \cdots, f_m(x)\big)$. 那么当且仅当每个函数 $f_i: X \to \mathbb{R}$ 在 x_0 点连续时，f 在 x_0 点连续；各 f_i 称为 f 的分量函数. **(2)** 令 $f, g: X \to \mathbb{R}$ 在 x_0 点连续；那么 $f+g, f-g$ 及 $f \cdot g$ 均在 x_0 点连续，并且当 $g(x_0) \neq 0$ 时 f/g 在 x_0 点连续. **(3)** 投影函数 $\pi_i(\boldsymbol{x}) = x_i$（$x_i$ 是 $\boldsymbol{x}$ 第 i 分量）是连续的.

2.5 拓扑空间的数个重要属性

我们不加证明（可参考[43]）地列举一些拓扑空间的定理、例题.

定义 2.56 度量空间 (X, d) 上的点列 $\{x_n\}$ 叫作收敛到 x_0 是指：当 $n \to \infty$ 时，$d(x_n, x_0) \to 0$；记作 $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$. 注 x_0 一定属于 X.

定义 2.57 设 (X, d) 是一个度量空间，A 为其一子集. 若 A 中的任意点列在 X 中有一个收敛子列，则称 A 是**列紧的**；若收敛子列极限点属于 A，则称 A 是**自列紧的**. 若空间 X 是自列紧的，则称 X 为**自列紧空间**.

定义 2.58 给定拓扑空间 $(X, \mathscr{T})$，设 $\{U_\alpha\}, \alpha \in I$ 是 X 的一个子集族，如果 $\{U_\alpha\}$ 的成员之并等于 X，则称 $\{U_\alpha\}$ 为 X 的**覆盖**. 若 $\{U_\alpha\}$ 每个成员都是开子集，则称为**开覆盖**.

定义 2.59 若拓扑空间 X 任意开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 都有有限子族能覆盖 X，则称 X 为**紧致的**. 注：紧致性是联系无穷与有限的桥梁.

定理 2.60 设 (X, d) 是一个度量空间；X 是紧致的充要条件是 X 为自列紧的.

命题 2.61 紧致空间的每一个闭子集都是紧致的.

命题 2.62 Hausdorff 空间的每一个紧致子空间都是闭的.

命题 2.63 紧致空间在连续映射下的像集也是紧致的.

命题 2.64 有限个紧致空间的笛卡尔积也是紧致的.

命题 2.65 $\mathbb{R}^m$ 中子集 A 是紧致的充要条件是 A 是闭集且在度量(2.3-2)下有界.

定义 2.66 空间 X 在**点** x **是局部紧致的**是指：若存在 X 的一个紧致子空间 C 包含着 x 的一个邻域. 若 X 在每一点都是局部紧致的，则称 X 是**局部紧致的**.

实直线并不是紧致空间，然而它是局部紧致的；$\forall x \in \mathbb{R}$，存在一个包含它的开邻域 $x \in (a,b)$，而这个开邻域必然包含在紧致子集 $[a,b]$ 之中. 推而广之，$\mathbb{R}^m$ 是局部紧致的，但整体上并非紧致.

定理 2.67 Hausdorff 空间 X 在 x 处局部紧致的充要条件是：对于 x 的任意邻域 U，存在 x 的一个邻域 V，使得 $\bar{V}$ 紧致并且 $x \in \bar{V} \subset U$.

命题 2.68 设 X 是局部紧致的 Hausdorff 空间，A 是 X 的子集. 若 A 是 X 的闭子集或开子集，则 A 是局部紧致的.

命题 2.69 $(\mathbb{R}^m, d_b)$ 是具有可数拓扑基的 Hausdorff 空间.

命题 2.70 Hausdorff 空间的拓扑子空间仍是 Hausdorff 空间.

命题 2.71 有可数拓扑基的 Hausdorff 空间的拓扑子空间也有可数拓扑基.

命题 2.72 设 $\{U_i\}$、$\{V_j\}$ 分别是拓扑空间 X、Y 的拓扑基，那么 $\{U_i \times V_j\}$（笛卡尔积）是 $X \times Y$（笛卡尔积）的拓扑基.

命题 2.73 Hausdorff 空间的笛卡尔积空间仍是 Hausdorff 空间.

命题 2.74 有可数拓扑基的空间的笛卡尔积空间仍有可数拓扑基.

定义 2.75 若拓扑空间 X 没有既开又闭的子集（除 $X, \varnothing$ 外），则称 X **连通**.

命题 2.76 连通空间在连续映射下的像集也是连通的.

命题 2.77 有限个连通空间的笛卡尔积也是连通的.

定义 2.78 给定度量空间 (X,d). X 中的 Cauchy 序列 $\{x_n\}$ 是指：$\forall \epsilon > 0$，存在正整数 N 使得 $d(x_n, x_m) < \epsilon$, $\forall n, m > N$ 成立. 如果 X 中的每个 Cauchy 序列都是收敛的（极限点属于 X），则称 X 是**度量完备**的，简称**完备**.

命题 2.79 对于度量(2.3-2)（(2.3-4)）而言，欧氏空间 $\mathbb{R}^m$（$\mathbb{C}^m$）是完备的.

定理 2.80 紧致度量空间（即自列紧度量空间）必是度量完备空间.

注 2.81 不同度量下，空间的完备属性可能不同（例如参见[29]$^{1.5\text{-}5,\ 1.5\text{-}9}$）.

例 2.82 在度量(2.3-2b)意义下，有 $\mathbb{R}$ 中开区间 $(-1,1)$ 的序列 $\{x_n = 1 - 1/n\}$，此序列的极限点是 1，然而 $1 \notin (-1,1)$，故它不完备.

已知 $(-1,1)$ 同胚于实直线 $\mathbb{R}$，而 $\mathbb{R}$ 是完备的；故完备不是拓扑属性． ■

虽然上面叙述了很多完备空间，但并不是所有空间都是完备的．比如可数的有理数域 $\mathbb{Q}$ 就是不完备的，其中的序列可能收敛于一个无理数．但有理数域的闭包 $\bar{\mathbb{Q}}(=\mathbb{R})$ 是完备的．也就是说，不完备的空间可以延拓成完备空间；这一结论在更大范围内也是成立的，为此先给出等距定义．

定义 2.83 设 (X,d)、(Y,ρ) 是两个度量空间．若存在双射 $\phi: X\to Y$ 使得

$$d(x,x')=\rho\big(\phi(x),\phi(x')\big),\qquad \forall x,x'\in X$$

成立，则称 (X,d) 和 (Y,ρ) 是**等距同构的**，并称 ϕ 为**等距同构映射**．

若 (X,d) 等距于 (Y,ρ) 的某个子空间，则称 X 可等距嵌入到 Y 中．

定理 2.84 对于任意度量空间 (X,d)，一定存在一个完备度量空间 $(\hat{X},\hat{d})$，使得它的稠密子空间 $\widehat{W}\subset\hat{X}$ 与 X 等距同构．如果对等距空间不加区分，则空间 $\hat{X}$ 是唯一的；也就是说，若 $(\tilde{X},\tilde{d})$ 是另一个完备度量空间且有稠密子空间 $\widetilde{W}$ 和 X 等距，则 $(\tilde{X},\tilde{d})$ 与 $(\hat{X},\hat{d})$ 是等距同构的．

例 2.85 l^p 序列空间；其中 $p\geqslant 1$ 是一个固定的实常数．

l^p 中每个元素是一个无穷复数列 $(\xi_1,\xi_2,\cdots)$，它满足 $\sum_{i=1}^{\infty}|\xi_i|^p<\infty$．

l^p 上的度量定义为（(ξ)、(η) 都是 l^p 中的元素）：

$$d(\xi,\eta)=\left(\sum_{i=1}^{\infty}|\xi_i-\eta_i|^p\right)^{1/p}. \tag{2.5-1}$$

可以证明（略）：l^p 序列空间是度量空间，且可分、完备．证明上述属性时会用到如下不等式．设 $p\geqslant 1$，且是固定不变的实常数．再定义 q 为：

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1. \tag{2.5-2}$$

Hölder 不等式和 Minkowski 不等式为（其中 $(\xi_j)\in l^p$、$(\eta_j)\in l^q$、$(\zeta_j)\in l^p$）：

$$\sum_{j=1}^{\infty}|\xi_j\eta_j|\leqslant\left(\sum_{k=1}^{\infty}|\xi_k|^p\right)^{1/p}\left(\sum_{i=1}^{\infty}|\eta_i|^q\right)^{1/q}, \tag{2.5-3}$$

$$\left(\sum_{j=1}^{\infty}|\xi_j+\zeta_j|^p\right)^{1/p}\leqslant\left(\sum_{k=1}^{\infty}|\xi_k|^p\right)^{1/p}+\left(\sum_{i=1}^{\infty}|\zeta_i|^p\right)^{1/p}. \tag{2.5-4}$$

若 $p=2$（则 $q=2$），这时式(2.5-3)给出著名的 Cauchy–Schwarz 不等式.

当 $p=2$ 时，便得到了最为常用的 Hilbert 序列空间 l^2. ■

代数拓扑完全超出了本书的范畴，请参阅[43]；我们只给出一个定义.

定义 2.86 设 E、B 均是连通的 Hausdorff 空间，$p:E\to B$ 是连续映射. 若 $\forall b\in B$ 有开邻域 U 使 $p^{-1}(U)$ 为 E 的一族两两不相交的开集 $\{V_\alpha\}$ 的并集，并且 p 把每个 V_α 同胚地映射成 U，则称 p 为**覆叠映射**；(E,p) 为 B 上的**覆叠空间**，B 为 E 的**底空间**；称 U 为 b 的**基本邻域**；每个 V_α 叫作 $p^{-1}(U)$ 的**分支**；$\forall b\in B$，$p^{-1}(b)$ 称为 b 上的**纤维**.

小结

本章初步介绍了点集拓扑的知识，是不完备的；详尽内容可参考文献[43].

第三章　多重线性代数

本章讲述多重线性代数；具体安排是：先复习线性空间的概念，之后讲述线性函数、对偶空间、双线性映射、多重线性映射、张量积、外代数等.

本章中线性空间限定在有限维（显示标明的除外）；无限维理论比有限维情形复杂得多，初步论述可参阅第十六章，以及该章的参考文献.

3.1　矢量空间

定义 3.1 设 V 是一个非空集合，$\mathbb{F}$ 是一数域. 在 V 的元素之间定义了一种代数运算，叫做**加法**；这就是说，给出了一个法则，对于 V 中任意两个元素 α 和 β，在 V 中都有唯一的一个元素 γ 与它们对应，称为 α 与 β 的**和**，记为 $\gamma=\alpha+\beta$. 在数域 $\mathbb{F}$ 与集合 V 之间还定义了一种运算，叫做**数量乘法**；这就是说，对于数域 $\mathbb{F}$ 中任意一个数 k 与 V 中任意一元素 α，在 V 中都有唯一的一个元素 δ 与它们对应，称为 k 与 α 的**数量乘积**（或纯量乘积），记为 $\delta=k\cdot\alpha=\alpha\cdot k$（通常省略乘号）. V 中元素对于数量乘法和加法两种运算是**封闭的**，即运算结果仍在 V 中. 如果上面定义的加法和数量乘法满足如下规则，那么 V 称为数域 $\mathbb{F}$ 上的**线性空间**，也叫**矢量空间**，或向量空间.

加法满足如下四条规则：

条件 (1)　$\alpha+\beta=\beta+\alpha$；

条件 (2)　$(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$；

条件 (3)　在 V 中有一个元素 $\mathbf{0}$，对于 V 中任意一个元素 α 都有 $\alpha+\mathbf{0}=\alpha$，具有这个性质的元素称为**零元素**，也记为 O 或 $\mathbf{0}$；很多时候不用黑体，而用普通字体来表示，即 0；

条件 (4)　对于 V 中每一个元素 α，都有 V 中的元素 β，使得 $\alpha+\beta=0$，β 称为 α 的**负元素**，记作 $\beta=-\alpha$；

数量乘法满足如下两条规则：

条件 (5) $1\alpha=\alpha,\ 1\in\mathbb{F}$；

条件 (6) $k(l\alpha)=(kl)\alpha$；

数量乘法和加法满足下面两条规则：

条件 (7) $(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$；

条件 (8) $k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$.

在上面规则中，$\forall\alpha,\beta,\gamma\in V$，$\forall k,l\in\mathbb{F}$. 集合 V 中的元素称为**矢量**. ■

线性空间还可以定义在一般的域上（不仅仅是数域），这种情形对物理学来说貌似没有特别意义；故我们只考虑定义在数域上的线性空间. 下面给出实数域上的内积空间.

定义 3.2 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的矢量空间，在 V 上定义一个二元运算，有实数 c 与之对应，称为**内积**，记成 $c=\langle\alpha,\beta\rangle$，它需满足如下性质：

条件 (1) $\langle\alpha,\beta\rangle=\langle\beta,\alpha\rangle$；

条件 (2) $\langle\alpha,k\beta\rangle=\langle\alpha,\beta\rangle\,k$；

条件 (3) $\langle\alpha,\beta+\gamma\rangle=\langle\alpha,\beta\rangle+\langle\alpha,\gamma\rangle$；

条件 (4) $\langle\alpha,\alpha\rangle$ 是非负实数，当且仅当 $\alpha=0$ 时，$\langle\alpha,\alpha\rangle=0$.

其中 $\forall\alpha,\beta,\gamma\in V$，$\forall k\in\mathbb{R}$. 这样的线性空间称为**欧几里得空间**.

定义了内积的矢量空间称为**内积空间**. 内积空间专指正定情形，即 $\langle\alpha,\alpha\rangle\geqslant 0$；以后还会介绍标量积（也称为半内积）概念，此时 $\langle\alpha,\alpha\rangle$ 可正可负可为零. 为了与内积区分，我们使用了“标量积”这个术语，有的文献未作此区分.

设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的矢量空间，$\alpha_1,\cdots,\alpha_r(r\geqslant 1)$ 是 V 中一组矢量，$k_1,\cdots,k_r$ 是数域 $\mathbb{F}$ 中的数，那么矢量 $\alpha=k_1\alpha_1+\cdots+k_r\alpha_r$ 称为矢量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_r$ 的线性组合. 也说成矢量 α 可以由矢量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_r$ 线性表出.

定义 3.3 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的矢量空间，V 中矢量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r(r\geqslant 1)$ 称为 **$\mathbb{F}$-线性相关**，是指在数域 $\mathbb{F}$ 中存在 r 个不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_r$ 使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r=0$ 成立. 如果是上式只有在 $k_1=k_2=\cdots=k_r=0$ 时才成立，那么 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 称为 **$\mathbb{F}$-线性独立**，也称为 **$\mathbb{F}$-线性无关**.

很多时候会把前缀“$\mathbb{F}$-”去掉；之后我们还会介绍 $C^r(M)$-线性（见第127页及135页），此时前缀“$C^r(M)$”是不能省略的. 如果线性空间 V 中有 n 个线性独立的矢量，并且任何 $n+1$ 个矢量组都是线性相关的，那么就称空间 V 是 **n 维**的. 如果 V 中可以找到任意多个线性独立的矢量，那么就称空间 V 是**无限维**

的．n 维空间 V 中任意 n 个线性无关的矢量称为这个空间的**基矢**或**基底**.

定义 3.4 对于无限维空间 V 的任意子集 M，若 M 的每一非空有限子集都是线性无关的，则称 M 是线性无关的；否则，则称 M 是线性相关的.

在 §1.7中，我们指出把矢量定义成有大小、有方向的量是无法向非欧几何推广的．Peano 于 1888 年给出矢量的代数定义3.1，将矢量表示成八条公理形式；这个定义摆脱了度量，无法给出矢量的长短，但可以描述矢量方向（见下）．矢量大小可由定义3.2给出．数学家们将矢量定义抽象化到这个程度自然是为了推广到不同的数学、物理领域．设数域 $\mathbb{F}$ 上有 n 维线性空间 V，它有 n 个线性无关的基矢 $\{\boldsymbol{\epsilon}_i\}$（$i=1,\cdots,n$），那么 $\forall\alpha\in V$ 可以用这组基矢展开：

$$\alpha=\alpha_1\boldsymbol{\epsilon}_1+\cdots+\alpha_n\boldsymbol{\epsilon}_n. \tag{3.1-1}$$

其中 $\alpha_i\in\mathbb{F}$ 是展开系数，我们将其记成 $(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$；这组展开系数便体现了矢量 α 在基矢 $\{\boldsymbol{\epsilon}_i\}$ 下的**方向**．$\forall\alpha,\beta\in V$，根据定义3.1有

$$\alpha+\beta=(\alpha_1+\beta_1)\boldsymbol{\epsilon}_1+\cdots+(\alpha_n+\beta_n)\boldsymbol{\epsilon}_n. \tag{3.1-2}$$

$$k\alpha=(k\alpha_1)\boldsymbol{\epsilon}_1+\cdots+(k\alpha_n)\boldsymbol{\epsilon}_n,\qquad\forall k\in\mathbb{F}. \tag{3.1-3}$$

这与欧式空间（指第一章）矢量加法、数乘完全一致．可见矢量的代数定义3.1保留了欧式空间矢量（指第一章）的诸多属性（加法、数乘）；只祛除了度量.

3.1.1 例子

例 3.5 数域 $\mathbb{F}$ 上的空间 V 只有一个零元，这个空间是 0 维的.

例 3.6 数域 $\mathbb{F}$ 可看作自身加法和乘法的 1 维线性空间.

很容易验证上两例符合定义3.1中的八个条件．需要注意，矢量空间涉及两个因素，一个是数域 $\mathbb{F}$，一个是集合 V，两者不可或缺.

例 3.7 全体复数的集合 $V=\mathbb{C}$ 可以看成实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

取实数域 $\mathbb{R}$，那么集合 $V=\mathbb{C}$ 是一个 2 维线性空间，基矢可以选为 $\epsilon_1=1,\epsilon_2=\mathbb{i}$；[1] 这样任意一个复数均可表示成这两个基矢的线性组合 $z=x\cdot1+y\mathbb{i}=x\epsilon_1+y\epsilon_2$，其中 x 和 y 是实数域 $\mathbb{R}$ 中的常数．这里用到的数量乘法是两个实数

[1] 其中 $\mathbb{i}$ 是一个符号，称为虚数单位，它代表 $\sqrt{-1}$；自然有 $\mathbb{i}^2=-1$.

相乘．复数乘法以及取复数共轭运算都不是定义3.1在实数域中的代数运算，需要另外再定义．V 中两个矢量 1 和 $\mathbb{i}$ 在本例中是线性无关的． ■

例 3.8 全体复数的集合 $V=\mathbb{C}$ 同样可以看成复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间．

把全体复数的集合 V 建立在复数域 $\mathbb{C}$ 上，这时候我们只需选取一个基矢 $\epsilon=1$ 即可，因任意一个复数均可以表示成基矢 1 乘以某个复数 $z=z\cdot 1=z\cdot\epsilon$．复数乘法可以看作是定义3.1在复数域中的数量乘法，不需要额外给定的．V 中两个矢量 1 和 $\mathbb{i}$ 在本例中是线性相关的．复共轭不是代数运算（加减乘除）． ■

从上面两例可以看出同样的集合 V，对不同的数域来说，维数可能是不同的．所以建立线性空间，数域 $\mathbb{F}$ 和集合 V 两者都不可缺少．

例 3.9 量子物理中沿 x,y 方向动量算符和绕 z 轴的角动量算符是否线性相关？

建立在复数域 $\mathbb{C}$ 上的，沿 x 和 y 轴的动量算符 $\hat{P}_x$ 和 $\hat{P}_y$；绕 z 轴的角动量算符是 $\hat{L}_\phi\equiv\hat{y}\hat{P}_x-\hat{x}\hat{P}_y$．写成这种形式时，几乎所有人都能看出三个矢量线性无关；因为算符 $\hat{y}$ 和 $-\hat{x}$ 是 Hilbert 空间（一种线性空间）中的量，不是数域 $\mathbb{C}$ 中的量．很多时候，会把位置矢量算符 $\hat{x},\hat{y}$ 上的小尖帽省略，记成 $\hat{L}_\phi\equiv y\hat{P}_x-x\hat{P}_y$；这个时候，有可能会被误认为三者线性相关，但这是不正确的．即便系数变成了 y 和 $-x$，它们也是线性空间中的量，不是数域 $\mathbb{C}$ 中的量．或者这样理解：依照定义3.3，因为其系数 y 和 $-x$ 是变量，不是数域 $\mathbb{C}$ 中常数，所以三个矢量 $\hat{P}_x,\hat{P}_y,\hat{L}_\phi$ 是线性无关的．另外一个与此类似的例子是 Killing 场，见 §8.5． ■

因线性空间的元素十分广泛，不可能所有类型元素都与数域 $\mathbb{F}$ 有什么关联；可能存在某些类型线性空间（比如 $\mathbb{F}^n$）中的矢量与数域中的数有密切关系，也存在其它类型线性空间（比如一堆算符构成的空间或例3.5）中的元素与数域中的数几乎没有直接关联．为了使线性相关定义具有通用性，在考虑矢量间是否线性相关时不能让定义3.3 中的 $\mathbb{F}$ 值系数 k_i 随线性空间中矢量内部参量改变而变化，所以定义3.3中系数只能是 $\mathbb{F}$ 值常数．这种抽象地解释显得不够明了，以多项式为例再次解释一遍更有教益；有多项式

$$f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n,\qquad a_i\in\mathbb{F} \tag{3.1-4}$$

上式中 x 是一个符号，可能是算符、矩阵，也可能是实数等等．一般线性代数书中都会介绍：把此式看成线性空间，那么它是 $n+1$ 维的，可选 $\{1,x^1,\cdots,x^n\}$ 为此空间基矢．比如我们把符号 x 选为矩阵，那么几乎没有人（也没有理由）认为基矢 1（单位矩阵）和基矢 x 线性相关．如果我们把符号 x 选为 $\mathbb{F}$ 值数，可能

有人（也有理由）认为 1 和 x 线性相关；比如选择系数 $k_1=-1,\ k_2=x^{-1}$，那么 $k_1\cdot 1+k_2\cdot x=0$. 如果这种理解正确，那么多项式作为线性空间的维数是不定的，当 x 是矩阵时维数是 $n+1$，当 x 是数时维数是 1；这使线性空间失去了一般性、普适性、通用性，为保持线性空间的一般性、普适性、通用性，定义3.3中系数只能是 $\mathbb{F}$ 值常数，不能是变数.

例 3.10 实数轴上全体 r 阶连续可微复值函数 $C^r[a,b]$ 是无穷维线性空间.

首先，我们验证函数空间是个线性空间. $\forall x\in[a,b]$，对于任意函数 $f,g\in C^r[a,b]$，给定加法为 $(f+g)(x)\overset{def}{=}f(x)+g(x)$，数量乘法为 $(\lambda\cdot g)(x)\overset{def}{=}\lambda\cdot(g(x)),\forall\lambda\in\mathbb{R}$. 容易验证上述定义符合线性空间定义3.1；其中零矢量是对任意实数 x 取值恒为零的函数.

我们从两个角度来理解空函数间 $C^r[a,b]$ 维数是无穷大这件事情. 首先，对于任意固定的 $x\in[a,b]$ 来说，函数空间 $C^r[a,b]$ 的像空间是一维的；我们只需选取此线性空间基矢为“1”，那么任意函数 f 取值只是基矢“1”的 $f(x)$ 倍. 然而区间 $[a,b]$ 是连续的，这个区间有无穷多个值，当 x 取值连续变化时，函数空间 $C^r[a,b]$ 便是无穷多个一维线性空间之和，其维数自然是无穷大.

其次，选取 $C^r[a,b]$ 的一个子空间：全体多项式. 我们将多项式的基矢选为 $\{1,x,x^2,\cdots,x^n,\cdots\}$，很明显多项式基矢有无穷多个，即基矢 x^n 的幂次 $n\to\infty$；全体多项式构成的子空间维数是无穷大的. 既然子空间是无穷维的，那么空间 $C^r[a,b]$ 的维数不可能是有限的. ■

3.1.2 微分线性相关定义

给定线性偏微分方程组

$$\begin{cases}\sum\limits_{ij}a_{ij}^{(1)}(x)\dfrac{\partial y_j}{\partial x_i}+f_1(x)=0\\ \vdots\\ \sum\limits_{ij}a_{ij}^{(n)}(x)\dfrac{\partial y_j}{\partial x_i}+f_n(x)=0\end{cases}\tag{3.1-5}$$

其中 x_i 是自变量，y_j 是未知量，$a_{ij}^{(k)}(x)$ 是线性系数，$f_k(x)$ 是非齐次项.

令 $Z_k\equiv\sum_{ij}a_{ij}^{(k)}\frac{\partial y_j}{\partial x_i}+f_k$，给出两个定义.

定义 3.11 给定数域 $\mathbb{F}$，如果存在不全为零的系数 $c_k\in\mathbb{F}$，使得 $\sum_k c_kZ_k=0$ 成立，则称偏微分方程组(3.1-5)是线性相关的；否则线性独立.

定义 3.12 若数域 $\mathbb{F}$ 中存在不全为零的系数 c_k, d_{kl} 使得 $\sum_k c_k Z_k + \sum_{kl} d_{kl} \frac{\partial Z_k}{\partial x_l} = 0$ 成立，则称方程组(3.1-5)是**微分**线性相关的；否则线性独立.

注 3.13 定义3.12仅适用于那些存在潜在微分恒等式的方程式，比如包含 $\nabla \times \boldsymbol{u}$ 的方程式（因 $\nabla \cdot \nabla \times \boldsymbol{u} \equiv 0$）. 若不包含潜在微分恒等式，则需用定义3.11.

不难看出定义3.11是定义3.3在微分方程领域的翻版. 显然，如果 $d_{kl} \equiv 0$，则定义3.12就退化到定义3.11.

定义3.12的描述方式取自文献[79]. 这个定义的本质是包含微分恒等式；当方程包含微分恒等式时，在定义3.11中要放弃未知量个数与方程个数相等这个事情；需要在定义3.12下让两者相等. 对于存在微分恒等式的偏微分方程来说，定义3.12比定义3.11更合适. 比如麦克斯韦方程组，爱因斯坦引力场方程组，应力、应变形式的弹性力学平衡方程组，单旋度散度方程组等等在定义3.11意义下是超定的，然而在定义3.12意义下是确定的. [2]

定义3.12在 Courant, Hilbert [9, p.16]中有类似叙述；在更早的文献中也应该有类似描述，究竟谁是最早给出的定义，已很难查询. 虽然 Courant 给出了类似定义，但在他的书中仍旧称定义3.12下未知量个数与方程个数相等的方程为超定 （见[9]p.16例子，与本书例5.15相同），只把定义3.11下两者相等的方程称为确定. 这与我们的称呼并不相同.

需要指出的是：用不那么准确的数学语言来说，偏微分方程相当于不可数无穷多个常微分方程. 所以定义3.12仅仅是表观上把偏微分方程变成确定.

3.1.3 商空间

设有三维欧几里得空间 E^3，在其上建立直角坐标系 $O-xyz$. 此处需对 E^3 和 $\mathbb{R}^3$ 略作区分，E^3 是点空间，$\mathbb{R}^3$ 是矢量空间；在 E^3 中将原点 O 算作起点，任意一点 A 算作终点，则有向线段 $\overrightarrow{OA}$ 便是一个矢量，此矢量与 $\mathbb{R}^3$ 中矢量有双射关系. 设 W 是 xy 平面，则与 W 平行的所有平面以及 W 给出了 E^3 的一个划分. 设 π 是平行于 W 的一个平面，$\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 都属于 π（指点 A 和 B 在平面 π 上）的充要条件是 $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA} \in W$；由于规定矢量起点是原点 O，故需先将 $\overrightarrow{BA}$ 平移，令 B 和 O 重合，此时作为矢量的 $\overrightarrow{BA}$ 是 W 中元素.

[2] “确定”是指 well-determined 或 proper-determined，偶尔也有人将这个词儿翻译成“适定”. 这与另外一个词儿 well-posed 的翻译（通常翻译成“适定”）容易混淆.

由此受到启发，为了在数域 $\mathbb{F}$ 的线性空间 V 上建立一个二元关系且使它是一个等价关系，可以先取 V 的一个子空间 W，然后规定：

$$\alpha \sim \beta \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha - \beta \in W. \tag{3.1-6}$$

这样就建立了 V 上的一个二元关系“$\sim$”. 由于 $\alpha-\alpha=0\in W$，因此 $\alpha\sim\alpha, \forall\alpha\in V$，即“$\sim$”具有反身性. 若 $\alpha\sim\beta$，即 $\alpha-\beta\in W$，从而 $\beta-\alpha=-(\alpha-\beta)\in W$，于是 $\beta\sim\alpha$，即“$\sim$”具有对称性. 若 $\alpha\sim\beta$ 且 $\beta\sim\gamma$，则 $\alpha-\beta\in W$ 且 $\beta-\gamma\in W$；从而 $\alpha-\gamma=(\alpha-\beta)+(\beta-\gamma)\in W$，即“$\sim$”具有传递性. 从而由式(3.1-6)定义的二元关系“$\sim$”是 V 上的一个等价关系. 对于 $\alpha\in V$，α 的等价类 $\bar{\alpha}$ 为

$$\begin{aligned}\bar{\alpha} =&\{\beta\in V\mid \beta\sim\alpha\}=\{\beta\in V\mid \beta-\alpha\in W\}=\{\beta\in V\mid \beta=\alpha+\gamma,\gamma\in W\}\\ =&\{\alpha+\gamma\mid \gamma\in W\}.\end{aligned} \tag{3.1-7}$$

把式(3.1-7)最后一个集合记作 $\alpha+W$，称它为 W 的一个**陪集**，α 称为这个陪集的代表. 从而 $\beta\in\alpha+W \iff \beta\sim\alpha \iff \beta-\alpha\in W$. 于是 $\bar{\alpha}=\alpha+W$. 据等价类的性质可得

$$\bar{\alpha}=\bar{\beta} \iff \alpha+W=\beta+W \iff \alpha-\beta\in W \iff \alpha\sim\beta. \tag{3.1-8}$$

由式(3.1-8)看出，一个陪集 $\alpha+W$ 的代表不唯一. 如果 $\alpha-\beta\in W$，那么 β 也可以作为这个陪集的代表.

对于上述等价关系，记 $V/\sim$ 为 V/W，称它是V 对子空间 W 的商集，即

$$V/\sim \equiv V/W=\{\alpha+W\mid \alpha\in V\}. \tag{3.1-9}$$

如何在商集 V/W 中规定加法与数量乘法运算？容易想到尝试如下规定：

$$(\alpha+W)+(\beta+W)\overset{def}{=}(\alpha+\beta)+W, \quad k(\alpha+W)\overset{def}{=}k\alpha+W. \tag{3.1-10}$$

这样规定是否合理？需要证明它们与陪集代表的选择无关. 设 $\alpha_1+W=\alpha+W, \beta_1+W=\beta+W$，则 $\alpha_1-\alpha\in W, \beta_1-\beta\in W$. 从而

$$(\alpha_1+\beta_1)-(\alpha+\beta)=(\alpha_1-\alpha)+(\beta_1-\beta)\in W; \quad k\alpha_1-k\alpha=k(\alpha_1-\alpha)\in W.$$

因此 $(\alpha_1+\beta_1)+W=(\alpha+\beta)+W$, $k\alpha_1+W=k\alpha+W$. 这证明了上述规定与陪集代表的选取无关，从而是合理的. 容易验证上述加法满足交换律和结合律，

$0+W$（即 W）是 V/W 的零元，$(-\alpha)+W$ 是 $\alpha+W$ 的负元；上述数量乘法满足线性空间定义中关于数量乘法的几条运算法则，从而 V/W 成为数域 $\mathbb{F}$ 上的一个线性空间；我们称 V/W 是 V 对于 W 的**商空间**（Quotient Spaces）.

注意：商空间 V/W 的元素是 V 的一个等价类，而不是 V 的一个矢量. 例如上面列举的三维欧几里得空间 E^3 的例子，E^3 对于 W 平面的商空间 E^3/W 的一个元素是平行于 W 的一个平面或者 W 自身，而不是几何空间 E^3 中的矢量. 容易直观地看出商空间 E^3/W 是 1 维的，即 $\dim E^3/W = \dim E^3 - \dim W$. 可以证明（请参考[85]p.219定理 1）这个结论能推广到数域 $\mathbb{F}$ 上任一有限维线性空间 V 对子空间 W 的商空间 V/W 中.

定理 3.14 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上有限维线性空间，W 是 V 的一个子空间；那么商空间维数是：$\dim(V/W) = \dim V - \dim W$.

从线性空间 V 到商空间 V/W 有一个自然的映射：

$$\pi : V \to V/W, \qquad \alpha \to \alpha + W, \quad \forall \alpha \in V. \tag{3.1-11}$$

一般称式(3.1-11)为**标准映射**. 显然 π 是满射.

3.2 线性映射

有了矢量空间，就可以定义空间上的线性映射.

定义 3.15 设 V, W 是数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间，若 $f : V \to W$ 有如下线性性质

$$f(k\alpha + \beta) = k \cdot f(\alpha) + f(\beta); \qquad \forall k \in \mathbb{F}; \quad \forall \alpha, \beta \in V. \tag{3.2-1}$$

则称映射 f 是从 V 到 W 的**线性映射**；若 $W \equiv V$，则称 f 是**线性变换**；若 $W \equiv \mathbb{F}$，则称 f 是**线性函数**（或线性泛函）. 把 V 到 W 的全体线性映射组成的集合记为 $\mathrm{Hom}(V, W)$；将 V 上全体线性变换记成 $\mathrm{End}(V)$（Endomorphisms）.

由例题3.6可知数域 $\mathbb{F}$ 也是线性空间，故线性映射概念包含线性函数（线性泛函）概念. 只不过数域 $\mathbb{F}$ 略显特殊，单起一个名字而已.

例 3.16 由定义3.15可知 $f\big((k+1)\alpha\big) = f(k\alpha+\alpha) = k\cdot f(\alpha) + f(\alpha) = (k+1)\cdot f(\alpha)$. 再令 $k=1$，有 $f(\alpha+\beta) = f(\alpha) + f(\beta)$. 可见定义3.15与一般文献上的定义等价.

线性空间中的元素是非常广泛的，在讨论线性空间基本性质时我们无需关心元素的具体信息，只需要关心它的代数性质即可. 因元素的复杂性，线性函数

f 的具体形式很多时候无法确切表示，但我们只需记住函数 f 将 V 中元素映射为数域 $\mathbb{F}$ 中的一个具体数值即可.

线性映射是代数学中非常重要的内容，详细可参阅文献[85]第九章（近 200 页）. 下面我们着重讲述较为简单的线性函数.

例 3.17 线性函数有如下几条简单的性质.

$$f(0)=f(0\cdot\alpha)=0\cdot f(\alpha)=0. \tag{3.2-2}$$

$$f(-\alpha)=f\big((-1)\cdot\alpha\big)=-f(\alpha). \tag{3.2-3}$$

从上可以看到，任何线性函数都将零矢量映射为数字零.

定理 3.18 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间，$\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\epsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_n$ 是 V 的一组基矢，$a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是数域 $\mathbb{F}$ 中的任意 n 个数. 则存在唯一的线性函数 f 使得 $f\left(\boldsymbol{\epsilon}_i\right)=a_i$，其中 $i=1,2,\cdots,n$.

证明 . 先给出线性函数的一般形式. V 中任意一个矢量 X 都可以表示成这个基矢的线性组合 $X=\sum_i x_i\boldsymbol{\epsilon}_i$，其中 x_i 是矢量 X 在基矢 $\boldsymbol{\epsilon}_i$ 上的分量. 对于空间 V 上的任意线性函数 g，有

$$g(X)=g\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\boldsymbol{\epsilon}_i\right)=\sum_{i=1}^{n}x_i g\left(\boldsymbol{\epsilon}_i\right),\qquad g(\boldsymbol{\epsilon}_i)\in\mathbb{F}. \tag{3.2-4}$$

很显然函数 $g(X)$ 由 $\mathbb{F}$ 值 $g(\boldsymbol{\epsilon}_i)$, $i=1,2,\cdots,n$ 唯一确定；任何一个线性函数都可以表示成式(3.2-4)的形式；表示成这个形式的函数一定是线性函数.

任意给定数域 $\mathbb{F}$ 中的 n 个数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，仿照式(3.2-4)形式，我们构造 V 上一个函数 f：

$$f\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\boldsymbol{\epsilon}_i\right)\overset{def}{=}\sum_{i=1}^{n}x_i a_i,\qquad \text{其中 }\forall X=\sum_{i}^{n}x_i\boldsymbol{\epsilon}_i\in V. \tag{3.2-5}$$

容易验证函数 f 是线性的，且将空间 V 中的矢量 X 映射为数域 $\mathbb{F}$ 中的数值. 既然已经构造出函数 f，即说明了“存在性”. 由式(3.2-5)易得 $f\left(\boldsymbol{\epsilon}_i\right)=a_i$，其中 $i=1,2,\cdots,n$.

用反证法来证明“唯一性”. 假设有不同于 f 的线性函数 $h(\boldsymbol{\epsilon}_i)=a_i$，那么有 $h(\boldsymbol{\epsilon}_i)=a_i=f(\boldsymbol{\epsilon}_i)\Rightarrow(f-h)(\boldsymbol{\epsilon}_i)=0$，这是说 $(f-h)$ 作用在每个基矢（进而也就是 V 中每个矢量）上都为零，那么 $(f-h)$ 必为零函数，也就是(3.2-5)式中 f 是唯一的. ■

命题 3.19 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间，f 是定义其上的线性函数．断言“f 只将零矢量映射为零值”，等价于，断言“线性函数 f 是单一的”．

证明 . 先证“$\Rightarrow$”，用反证法．假设 f 不单一，则存在 V 中非零且不等的矢量 α,β，使得 $f(\alpha)=f(\beta)$ 成立，则自然有 $f(\alpha-\beta)=0$，但是已知 $\alpha\neq\beta$；也就是 f 将非零矢量映射为零，与已知条件矛盾，必然是假设错误，故 f 单一．

再证“$\Leftarrow$”. 不论 f 是否单一，必有 $f(0)=0$. 因 f 单一，故 $\forall\alpha\neq 0, f(\alpha)\neq f(0)=0$；由此可知 f 只将零矢量映射为零值． ■

定义 3.20 数域 $\mathbb{F}$ 上有两个线性空间 V 和 V'，若存在双射 $\sigma: V\to V'$，且 σ 满足式(3.2-1)；则称映射 σ 是从 V 到 V' 的**线性同构映射**，记为 $V\cong V'$.

线性同构 σ 有逆映射 $\sigma^{-1}: V'\to V$，这个逆映射同样是同构映射．同构的两个空间 V 和 V' 具有相同的维数．关于同构映射，有如下基本定理：

定理 3.21 $\mathbb{F}$ 上两个有限维矢量空间线性同构的充要条件是它们有相同的维数．

证明 .“$\Rightarrow$”部分证明过程很简单，略．可参考[85]§8.3.

“$\Leftarrow$”部分．设数域 $\mathbb{F}$ 上有两个线性空间 V 和 V'，它们维数都是 n．在 V 和 V' 中各取一组基矢 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_n$ 和 $\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$；建立一个关系 $\sigma: V\to V'$ 如下

$$\sigma(\alpha)\equiv\sigma\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\boldsymbol{\epsilon}_i\right)\overset{def}{=}\sum_{i=1}^{n}a_i\boldsymbol{\eta}_i,\qquad\forall\alpha\in V. \tag{3.2-6}$$

上式第二步已将 α 在基矢上展开，系数 a_i 是唯一确定的．在空间 V' 中与 α 对应的矢量是 $\sum_{i=1}^{n}a_i\boldsymbol{\eta}_i$，基矢确定、系数确定，这个矢量也是确定的，同时也是唯一的（在基矢 $\{\boldsymbol{\eta}\}$ 上）．这样定义的 σ 符合映射定义2.1.

如果 V 矢量的系数 a_i 不同，则在 V' 所对应的矢量也不同，所以映射 σ 是单一的．因 $\{\boldsymbol{\eta}\}$ 是基矢，所以 $\sum_{i=1}^{n}a_i\boldsymbol{\eta}_i$ 已包含 V' 中所有矢量，映射 σ 保证了 V' 中所有矢量都有原像（即 $\sum_{i=1}^{n}a_i\boldsymbol{\epsilon}_i$），所以映射 σ 是满的．这样映射 σ 是双射．容易验证上述定义的映射 σ 是线性的．所以映射 σ 是线性同构． ■

此定理的证明在任一本线性代数中都有陈述，摘录于此的目的是：(3.2-6)式构造映射的方式具有代表性，后面诸多命题证明都会用到．

这个定理没有考虑线性空间的元素是什么，也没有考虑空间运算的具体定义，只涉及矢量空间的代数性质；从这个观点来看，在研究代数结构时，同构的

线性空间可以不加区分，视为等同．而维数是线性空间唯一本质特征．由此定理立刻可以得到：数域 $\mathbb{F}$ 上的任意 n 维线性空间 V 皆线性同构于 $\mathbb{F}^n$；因此，原则上我们只需要研究 $\mathbb{F}^n$ 即可．需要指出的是：同构不代表不可区分．比如三维欧氏空间中位移 $\boldsymbol{r}$ 张成的线性空间与力 $\boldsymbol{F}$ 张成的线性空间是同构的；但两个空间绝不等同，不能认为两个空间就是同一个空间；因为 $\boldsymbol{r}+\boldsymbol{F}$ 是没有任何意义的，也就是说线性空间中最基本的矢量加法都不满足．

命题 3.22 给定数域 $\mathbb{F}$ 及两个线性空间 V 和 V'，两者间有线性映射 $\sigma: V \to V'$．则 σ 是单射的充要条件是：$\ker\sigma = 0$；即只把 V 中零矢量映射成 V' 中零矢量．

命题 3.23 给定数域 $\mathbb{F}$ 及两个 n 维线性空间 V 和 V'，有线性映射 $\sigma: V \to V'$，那么 σ 是单射当且仅当 σ 是满射．

证明 ．上面两个命题证明可参阅任意线性代数教材，比如文献[85]§9.2命题 2 和定理 3．命题3.23说明，只要 σ 是单的或满的，则它必是线性同构映射． ■

练习 3-1 请证明命题3.22、3.23．

3.3 对偶空间

在数域 $\mathbb{F}$ 上建立一个 n 维线性空间 V，V 上全体线性函数组成的集合记为 $\mathscr{L}(V,\mathbb{F})$．我们用自然的方式定义 $\mathscr{L}(V,\mathbb{F})$ 中的加法和数量乘法如下：

$$(f+g)(\alpha) \overset{def}{=} f(\alpha)+g(\alpha);\quad \text{其中 } \forall\alpha\in V;\ \forall f,g\in\mathscr{L}(V,\mathbb{F}). \tag{3.3-1a}$$

$$(kf)(\alpha) \overset{def}{=} k\big(f(\alpha)\big);\quad \text{其中 } \forall\alpha\in V;\ \forall k\in\mathbb{F};\ \forall f\in\mathscr{L}(V,\mathbb{F}). \tag{3.3-1b}$$

这样定义的加法和数量乘法符合定义3.1，验证过程留给读者．也就是说 $\mathscr{L}(V,\mathbb{F})$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的一个线性空间．

矢量组 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_n$ 是线性空间 V 的一组基矢．空间 V 中任意矢量 X 可以表示成 $X=\sum_{i=1}^n x^i\boldsymbol{\epsilon}_i$，其中 x^i 是矢量 X 在基底 $\{\boldsymbol{\epsilon}\}$ 上的第 i 个分量．定义函数 $f^j: V\to\mathbb{F}$ 为：在固定基底 $\{\boldsymbol{\epsilon}\}$ 下取矢量 X 的第 j 个分量，即

$$f^j(X)=f^j\left(\sum\nolimits_{i=1}^n x^i\boldsymbol{\epsilon}_i\right)=x^j. \tag{3.3-2}$$

容易验证这个函数是线性的. 此种函数共有 n 个，$f^1, f^2, \cdots, f^n$，[3] 它们作用到基矢上，有

$$f^i(\boldsymbol{\epsilon}_j) = \delta^i_j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j. \end{cases} \qquad \forall i, j = 1, 2, \cdots, n. \tag{3.3-3}$$

定理3.18保证了式(3.3-3)中 n 个线性函数的存在性、唯一性. 用反证法证明这 n 个线性函数在空间 $\mathscr{L}(V, \mathbb{F})$ 是线性无关的. 假设存在数域 $\mathbb{F}$ 中 n 个不全为零的数字 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 使得 $c_1 f^1 + c_2 f^2 + \cdots + c_n f^n = 0$，依次将基矢 $\boldsymbol{\epsilon}_j$ 代入，即可看到全部系数 $c_i = 0$；因此 f^i 在线性空间 $\mathscr{L}(V, \mathbb{F})$ 中是线性无关的.

对于 $\mathscr{L}(V, \mathbb{F})$ 中的任意线性函数 g，我们有

$$g(X) = g(x^i \boldsymbol{\epsilon}_i) = g(\boldsymbol{\epsilon}_i) x^i = g(\boldsymbol{\epsilon}_i) f^i(X).$$

因矢量 X 的任意性，所以有

$$g = g(\boldsymbol{\epsilon}_i) f^i. \tag{3.3-4}$$

提醒一下，$g(\boldsymbol{\epsilon}_i)$ 是 $\mathbb{F}$ 中数值. 前面，已经说明 n 个函数 f^i 在线性空间 $\mathscr{L}(V, \mathbb{F})$ 中是线性无关的，式(3.3-4)又说明任意线性函数 g 皆可由 f^i 展开，那么易得下面定理：

定理 3.24 函数空间 $\mathscr{L}(V, \mathbb{F})$ 的维数等于矢量空间 V 的维数，由式(3.3-3)定义的函数 f^i 可以作为函数空间 $\mathscr{L}(V, \mathbb{F})$ 的基矢.

定义 3.25 函数空间 $\mathscr{L}(V, \mathbb{F})$ 称为矢量空间 V 的**对偶空间**. 由式(3.3-3)定义的基函数 f^i 称为基矢 $\boldsymbol{\epsilon}_i$ 的**对偶基矢**. 记 V 的对偶空间为 $V^* \equiv \mathscr{L}(V, \mathbb{F})$.

注 3.26 前面为了不引起混淆，将函数空间 $\mathscr{L}(V, \mathbb{F})$ 的基矢记为 f^i；在定义了对偶基矢后，我们将其改为 $\boldsymbol{\epsilon}^{*i}$，并用黑体表示；这样更能体现对偶. 也就是式(3.3-3)改成如下形式

$$\left\langle \boldsymbol{\epsilon}^{*i}, \boldsymbol{\epsilon}_j \right\rangle \equiv \boldsymbol{\epsilon}^{*i}(\boldsymbol{\epsilon}_j) = \delta^i_j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j. \end{cases} \qquad \forall i, j = 1, 2, \cdots, n. \tag{3.3-5}$$

[3] 一般习惯用上标来标记 $\mathscr{L}(V, \mathbb{F})$ 中的线性函数. 从现在起，要区分上下标. 指标在上叫逆变（或反变）指标，指标在下的叫协变（或共变）指标. 采用**求和约定**（即省略求和号 $\sum$，使公式简洁些）：必须是一上一下两相同指标才表示求和，即 $a^i b_i \equiv \sum_i a^i b_i$. 如果存在两个相同上标 (或下标)，即 $a^i b^i$(或 $a_j b_j$)，则是错误表示. 此后，一律采用求和约定（另有约定除外）. 如果显示写出求和符号（Σ），则求和约定失效.

上标中的星号“$*$”代表**对偶**. 因有 $\boldsymbol{\epsilon}^{*1}(\boldsymbol{\epsilon}_2)=0$ 和 $\boldsymbol{\epsilon}^{*1}(\boldsymbol{\epsilon}_3)=0$ 等等，故 $\boldsymbol{\epsilon}^{*i}$ 并非单射. 符号 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是矢量和对偶矢量的**配合**（pair）.

注 3.27 约定 $T^i_{\cdot j}$（或 $T^i{}_j$）就是一般的矩阵 T，指标在前代表行，指标在后代表列，不论指标在上还是在下，只分前后（或者左右）. 行列指标中的点“$\cdot$”（或空格）表示预留的对齐空位.

设 n 维线性空间 V 中有两组基矢 $\boldsymbol{\epsilon}$ 和 $\boldsymbol{\eta}$，它们之间的变换关系是：

$$(\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n)=(\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_n)\begin{pmatrix} a^1{}_1 & \cdots & a^1{}_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a^n{}_1 & \cdots & a^n{}_n \end{pmatrix} \iff \boldsymbol{\eta}_i=\boldsymbol{\epsilon}_j a^j{}_i \iff \boldsymbol{\eta}=\boldsymbol{\epsilon}A.$$

上式最后已用上下指标来表示，显然这个矩阵 A 是可逆的，称为两组基矢间的**过渡矩阵**. 与这两组基矢相对应，对偶空间 V^* 中也有两组对偶基，分别是：

$$\boldsymbol{\epsilon}^{*i}(\boldsymbol{\epsilon}_j)=\delta^i_j, \qquad \boldsymbol{\eta}^{*i}(\boldsymbol{\eta}_j)=\delta^i_j. \tag{3.3-6}$$

则有如下定理：

定理 3.28 如果矢量空间 V 的两组基矢间的过渡矩阵是 A，那么它的对偶空间 V^* 相应对偶基矢间的过渡矩阵是 $(A^T)^{-1}$，可简记为 A^{-T}.

证明 . 记 $A=\{a^i{}_j\}$, $B=\{b_k{}^i\}$（见注解3.27）. 假设对偶基矢间的变换关系是 $\boldsymbol{\eta}^{*i}=\boldsymbol{\epsilon}^{*k}b_k{}^i \iff \boldsymbol{\eta}^*=\boldsymbol{\epsilon}^*B$；则有

$$\delta^i_j=\boldsymbol{\eta}^{*i}(\boldsymbol{\eta}_j)=\left(\boldsymbol{\epsilon}^{*k}b_k{}^i\right)\left(\boldsymbol{\epsilon}_l a^l{}_j\right)=b_k{}^i a^l{}_j\boldsymbol{\epsilon}^{*k}(\boldsymbol{\epsilon}_l)=b_k{}^i a^l{}_j\delta^k_l=b_k{}^i a^k{}_j. \tag{3.3-7}$$

如读者不习惯这种指标分上下的记号方式，可以将指标都降下来. 即写成：令 $\boldsymbol{\eta}_j=\sum_l \boldsymbol{\epsilon}_l a_{lj}$, $\boldsymbol{\eta}^*_i=\sum_k \boldsymbol{\epsilon}^*_k b_{ki}$；其中 $\boldsymbol{\eta},\boldsymbol{\epsilon}$ 是 V 的基矢，$\boldsymbol{\eta}^*,\boldsymbol{\epsilon}^*$ 是 V^* 的基矢.

$$\delta_{ij}=\boldsymbol{\eta}^*_i(\boldsymbol{\eta}_j)=\left(\sum_k \boldsymbol{\epsilon}^*_k b_{ki}\right)\left(\sum_l \boldsymbol{\epsilon}_l a_{lj}\right)=\sum_{kl} b_{ki}a_{lj}\boldsymbol{\epsilon}^*_k(\boldsymbol{\epsilon}_l)=\sum_{kl} b_{ki}a_{lj}\delta_{kl}=\sum_k b_{ki}a_{kj}.$$

可见过渡矩阵间的关系是 $B^T=A^{-1} \iff B^{-1}=A^T$.

也可以用 $\{\boldsymbol{\eta}\}$ 表示 $\{\boldsymbol{\epsilon}\}$，$\boldsymbol{\epsilon}_j=\boldsymbol{\eta}_i b_j{}^i$ 和 $\boldsymbol{\epsilon}^{*j}=\boldsymbol{\eta}^{*i}a^j{}_i$. 用矩阵表示更显简洁：$\boldsymbol{\eta}=\boldsymbol{\epsilon}A$，$\boldsymbol{\eta}^*=\boldsymbol{\epsilon}^*B=\boldsymbol{\epsilon}^*A^{-T}$，和 $\boldsymbol{\eta}B^T=\boldsymbol{\eta}A^{-1}=\boldsymbol{\epsilon}$，$\boldsymbol{\eta}^*A^T=\boldsymbol{\epsilon}^*$. ■

我们在数域 $\mathbb{F}$ 上建立线性空间 V，然后再建立其对偶空间 V^*. 取定 V 中的一个确定矢量 x，定义 V^* 上的一个函数 x^{**} 如下

$$x^{**}(f) \stackrel{def}{=} f(x), \qquad \forall f \in V^*. \tag{3.3-8}$$

显然映射 x^{**} 对于自变量是线性的，即

$$x^{**}(f+g)=(f+g)(x) = f(x)+g(x) = x^{**}(f)+x^{**}(g); \quad x^{**}(kf)=kf(x) = kx^{**}(f).$$

映射 x^{**} 对于自身的加法与数量乘法也是线性的，即

$$\begin{aligned}(x+y)^{**}(f)&=f(x+y) = f(x)+f(y) = x^{**}(f)+y^{**}(f);\\ (kx)^{**}(f)&=f(kx) = kf(x) = kx^{**}(f).\end{aligned}$$

以上四式中 $k \in \mathbb{F}$，$x, y \in V$. 这样定义的加法和数乘可以构成一个线性空间，记为 V^{**}，称为空间 V 的对偶空间的对偶空间.

定理 3.29 *在数域 $\mathbb{F}$ 上建立线性空间 V，然后再建立其对偶空间的对偶空间 V^{**}，那么 V 中确定矢量 x 到 V^{**} 中矢量的映射：$x \to x^{**}$ 是一个同构映射.*

证明 . 首先证明映射式(3.3-8)是单一的；即证明，如果线性空间 V 中两个任意不同的矢量 x 和 y，一定有 $x^{**} \neq y^{**}$. x^{**} 与 y^{**} 相等是指对于任意 $f \in V^*$ 都有 $x^{**}(f) = y^{**}(f)$；很显然这是不可能的，比如取 V^* 的 n 个基矢 $\boldsymbol{\epsilon}^{*i}$, $i = 1, \cdots, n$ 作为测试函数来证明，分别是 $x^{**}(\boldsymbol{\epsilon}^{*i}) = x^i$ 和 $y^{**}(\boldsymbol{\epsilon}^{*i}) = y^i$. 因前面已声明作为矢量 $x \neq y$，那么式子 $x^i = y^i$ 不可能对所有的 $i = 1, 2, \cdots, n$ 成立. 因此映射 $x \to x^{**}$ 和映射 $y \to y^{**}$ 是不同的，这也就说明了映射(3.3-8)是单一的. 虽然上面的证明用到了具体基矢，但换成另外任意一套基矢证明过程也完全成立，也就是说证明过程不依赖于某套具体基矢.

最终，由命题3.23可知映射 $x \to x^{**}$ 是同构映射. ■

上面我们建立空间 V^{**} 的方式，与从本节开头建立对偶空间 V^* 的方式是相同的，所以空间 V^{**} 的维数是：$\dim(V^{**}) = \dim(V^*) = \dim(V)$. 由定理3.21可知这三个空间是彼此线性同构的，但是同构映射很难与特定基矢无关. 而从 V 到 V^{**} 的映射(3.3-8)不依赖于特定基矢，我们称之为**自然同构**. 从而可以把 x 和 x^{**} 看成等同，进而把 V 到 V^{**} 等同. 从这个角度，我们也可以称 V 是 V^* 的

对偶空间，这说明只需做一次对偶即可，再做对偶就得到了原空间. 这也是对偶空间名字的由来.

定理3.21中“充分性”部分的同构映射是与基矢相关的（参见式(3.2-6)），读者可以与此处的自然同构映射对比，以加深理解两者异同.

3.4 双线性映射

在（单）线性映射的基础上，我们介绍双线性映射概念.

定义 3.30 设 V_1, V_2 和 W 是数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间，如果映射 $f: V_1 \times V_2 \to W$ 具有如下线性性质: $\forall k \in \mathbb{F}$; $\forall \alpha, \alpha_1, \alpha_2 \in V_1$; $\forall \beta, \beta_1, \beta_2 \in V_2$，

$$f(\alpha, k\beta_1 + \beta_2) = k \cdot f(\alpha, \beta_1) + f(\alpha, \beta_2);$$
$$f(k\alpha_1 + \alpha_2, \beta) = k \cdot f(\alpha_1, \beta) + f(\alpha_2, \beta).$$

则称映射 f 是从线性空间笛卡尔积 $V_1 \times V_2$ 到线性空间 W 的**双线性映射**；若 $W \equiv \mathbb{F}$，则称 f 是**双线性函数**. 记全体双线性映射的集合为 $\mathscr{L}(V_1, V_2; W)$.

此定义是说将映射 $f(\alpha, \beta)$ 中的一个变元固定时，另一个变元是线性的.

用自然的方式定义 $\mathscr{L}(U, V; W)$ 中的加法和数量乘法如下：

$$(f+g)(\alpha, \beta) \overset{def}{=} f(\alpha, \beta) + g(\alpha, \beta); \quad \forall \alpha \in U, \beta \in V; \ \forall f, g \in \mathscr{L}(U, V; W).$$
$$(kf)(\alpha, \beta) \overset{def}{=} k\big(f(\alpha, \beta)\big); \quad \forall \alpha \in U, \beta \in V; \ \forall k \in \mathbb{F}; \ \forall f \in \mathscr{L}(U, V; W).$$

这样定义的加法和数量乘法使得 $\mathscr{L}(U, V; W)$ 构成线性空间，请读者验证之.

例 3.31 设线性空间 V 上有两个线性函数 $f(\alpha)$ 和 $g(\beta)$，那么容易验证：

$$h(\alpha, \beta) = f(\alpha)g(\beta), \qquad \forall \alpha, \beta \in V. \tag{3.4-1}$$

是空间 V 上的一个双线性函数.

例 3.32 设 $U = \mathbb{F}^{m\times l}, V = \mathbb{F}^{l\times n}, W = \mathbb{F}^{m\times n}$，即它们都是矩阵. 定义映射 Φ 为矩阵乘法 $\Phi(A, B) = AB$, $\forall A \in U, B \in V$，则不难验证 Φ 是一个双线性映射.

例 3.33 设 $V = C[a, b]$，令

$$f\big(g(x), h(x)\big) = \int_a^b g(x)h(x)\mathrm{d}x, \qquad \forall g(x), h(x) \in C[a, b]. \tag{3.4-2}$$

则 $f(\cdot, \cdot)$ 是 $C[a, b]$ 上的一个双线性函数.

下面我们来看双线性映射的一般形式. 设数域 $\mathbb{F}$ 上有线性空间 U、V 和 W，其中 U 和 V 的基矢分别是 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_m$ 和 $\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$. 对于 U 中任意矢量 X 和 V 中任意矢量 Y，在它们各自基矢下展开系数分别为 $(x^1,\cdots,x^m)$ 和 $(y^1,\cdots,y^n)$. 那么容易得到双线性映射 $f:U\times V\to W$ 的表达式：

$$f(X,Y)=f\left(x^i\boldsymbol{\epsilon}_i,y^j\boldsymbol{\eta}_j\right)=x^iy^jf\left(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\eta}_j\right),\qquad f\left(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\eta}_j\right)\in W. \tag{3.4-3}$$

其中

$$f\left(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\eta}_j\right)=\begin{pmatrix} f\left(\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\eta}_1\right) & \cdots & f\left(\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\eta}_n\right)\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ f\left(\boldsymbol{\epsilon}_m,\boldsymbol{\eta}_1\right) & \cdots & f\left(\boldsymbol{\epsilon}_m,\boldsymbol{\eta}_n\right)\end{pmatrix}. \tag{3.4-4}$$

如果线性空间 W 上有基矢 $\{\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_l\}$，则 $f\left(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\eta}_j\right)$ 可在此基矢下展开；但下面的叙述并不需要这个展开式.

式(3.4-4)称为双线性映射 $f(\cdot,\cdot)$ 在基底 $\{\boldsymbol{\epsilon},\boldsymbol{\eta}\}$ 下的**广义度量**. 之所以加上“广义”二字，是因为此度量可能不是方阵，也可能是退化的.

式(3.4-3)和(3.4-4)是双线性映射的一般形式.

反之，给定线性空间 W 中的 $m\times n$ 个元素（即矢量，为避免混淆暂且用“元素”称之），将它们排成 $m\times n$ 级矩阵 A 形式：

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{m1} & \cdots & a_{mn}\end{pmatrix},\qquad \text{其中 } a_{ij}\in W. \tag{3.4-5}$$

对 m 维线性空间 U 中任意矢量 $X=(\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_m)(x^1,\cdots,x^m)^T$（已将其展开），以及 n 维线性空间 V 中任意矢量 $Y=(\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n)(y^1,\cdots,y^n)^T$，用

$$f(X,Y)\overset{def}{=}x^iy^ja_{ij}=X^TAY\ \in W \tag{3.4-6}$$

来定义的映射 $f:U\times V\to W$ 是双线性的（既然已经定义出来，自然解决了双线性映射 f 的存在性问题）；容易验证上式在基底 $\{\boldsymbol{\epsilon},\boldsymbol{\eta}\}$ 下度量矩阵是 A. 由此可得到如下定理（与定理3.18相对应；唯一性证明也与之类似）.

定理 3.34 *定义3.30中的双线性映射 f，在选定基底后，与一个 $m\times n$ 级矩阵(3.4-5)之间存在双射关系；两者相互唯一确定.*

下面开始着重讲述双线性函数．由定理3.34易得空间 $\mathscr{L}(U,V;\mathbb{F})$ 的基矢：

$$\begin{pmatrix}1&0&\cdots\\0&0&\cdots\\\vdots&\vdots&\ddots\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}0&0&\cdots\\1&0&\cdots\\\vdots&\vdots&\ddots\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}0&0&\cdots\\0&1&\cdots\\\vdots&\vdots&\ddots\end{pmatrix},\quad\cdots\tag{3.4-7}$$

也就是令 $m\times n$ 元矩阵中某一个矩阵元为 1 其它矩阵元为 0；这样的矩阵共有 mn 个，也就是双线性函数是 mn 维的．这可以叙述成如下定理：

定理 3.35 双线性函数空间 $\mathscr{L}(U,V;\mathbb{F})$ 的基矢是 $\delta_{is}\delta_{jt}$（i,j 取固定值，s,t 变动；即把式(3.4-7)用 Kronecker 记号来表示），且有 $\dim\mathscr{L}(U,V;\mathbb{F})=\dim U\cdot\dim V$．

3.4.1 同空间双线性函数

鉴于双线性函数的重要性，我们单列一节来讲述．将定义3.30中的 V_1 和 V_2 取成相同的线性空间，即 $V_1=V=V_2$，且映射值域 W 取为数域 $\mathbb{F}$，则双线性映射变成单空间 V 上的双线性函数．

例 3.36 欧氏空间内积3.2是双线性函数．

定义 3.37 设有非退化方阵 X，再设有方阵 A,B,C，它们维数相同．若 $B=X^TAX$，$C=X^{-1}AX$；则 B 与 A 是**合同关系**（Congruent），记为 $B\overset{c}{\sim}A$；C 与 A 是**相似关系**（Similar），记为 $C\overset{s}{\sim}A$．

同一个双线性函数在不同的基底下矩阵是不同的，设 n 维线性空间 V 中有两组基矢 $\boldsymbol{\epsilon}$ 和 $\boldsymbol{\eta}$，它们之间的变换关系是：

$$(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n)=(\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\epsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_n)\,C.\tag{3.4-8}$$

其中 C 是 $\mathbb{F}$ 值可逆矩阵．V 中矢量 α,β 在两组基底下分别为：

$$\begin{aligned}\alpha&=(\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\epsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_n)\,X=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n)\,X_1\Rightarrow X=CX_1,\\\beta&=(\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\epsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_n)\,Y=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n)\,Y_1\Rightarrow Y=CY_1.\end{aligned}$$

双线性函数 $f(\alpha,\beta)$ 在基底 $\boldsymbol{\epsilon}$ 和 $\boldsymbol{\eta}$ 下的度量矩阵分别为 A 和 B，则有

$$\begin{aligned}f(\alpha,\beta)&=f\left(X_1^i\boldsymbol{\eta}_i,Y_1^j\boldsymbol{\eta}_j\right)=X_1^iY_1^jf\left(\boldsymbol{\eta}_i,\boldsymbol{\eta}_j\right)=X_1^TBY_1,\\f(\alpha,\beta)&=f\left(X^i\boldsymbol{\epsilon}_i,Y^j\boldsymbol{\epsilon}_j\right)=X^iY^jf\left(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\epsilon}_j\right)=X^TAY=X_1^TC^TACY_1.\end{aligned}$$

从而得到双线性函数在不同基底下度量矩阵关系为：合同关系，即

$$B = C^T AC \quad \Longleftrightarrow \quad f(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\eta}) = C^T f(\boldsymbol{\epsilon}, \boldsymbol{\epsilon}) C. \tag{3.4-9}$$

定义 3.38 设 f 是空间 $V \times V$ 上的一个双线性函数，如果从“$\forall \alpha \in V$ 且 $f(\alpha, \beta) = 0$”必然推出 $\beta = 0$，那么称双线性函数 f 是**非退化的**.

我们来看一下非退化意味着什么？选定空间 V 的基底为 $\boldsymbol{\epsilon}$，矢量 α, β 在此基底下有 $\alpha = \boldsymbol{\epsilon} X$, $\beta = \boldsymbol{\epsilon} Y$，双线性函数 f 在此基底下的度量矩阵为 A，那么有 $f(\alpha, \beta) = X^T AY$. 从上面定义可知，要求 $X^T AY = 0$ 对于任意 X 成立；那么必然可以得到 $AY = 0$. 当 A 是退化矩阵时，方程 $AY = 0$ 中的 Y 有非零解；当 A 是非退化矩阵时，方程 $AY = 0$ 中的 Y 只有零解. 这说明双线性函数非退化的充要条件是其度量矩阵为非退化矩阵；因不同基矢下度量矩阵关系是合同变换（见式(3.4-9)），所以此度量矩阵在任意基底下都是非退化的. 因此定义3.38可表述成如下命题：

命题 3.39 n 维线性空间 V 上双线性函数 $f(\cdot, \cdot)$ 非退化的充要条件是它在任意基底下的度量方矩阵(3.4-4)为非退化.

定理 3.40 给定数域 $\mathbb{F}$ 和其上的 n 维线性空间 V，设 $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上的非退化双线性函数，对 V 中一个元素 α，定义其对偶空间 V^* 中的一个元素 α^*：

$$\alpha^*(\beta) \overset{def}{=} f(\alpha, \beta), \qquad \forall \beta \in V. \tag{3.4-10}$$

那么，从 V 到 V^* 的映射 $\alpha \to \alpha^*$ 是一个同构映射.

证明 . 因为 f 是双线性函数，所以 $\alpha^*(\cdot) \equiv f(\alpha, \cdot)$ 相当于对偶空间 V^* 中的一个元素. 先来证 α^* 是线性的，令 $\alpha, \beta, \gamma \in V$, $k \in \mathbb{F}$，有

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta)^*(\gamma) &= f(\alpha + \beta, \gamma) = f(\alpha, \gamma) + f(\beta, \gamma) = \alpha^*(\gamma) + \beta^*(\gamma), \\ (k\alpha)^*(\gamma) &= f(k\alpha, \gamma) = kf(\alpha, \gamma) = k \cdot \alpha^*(\gamma). \end{aligned}$$

这说明映射 α^* 是线性的.

用反证法证明单一性. 假设 V 中有两个不同元素 α 和 α' 对应对偶空间 V^* 中同一元素，即 $f(\alpha, \cdot) = f(\alpha', \cdot)$；此式等价于 $\forall \beta \in V$ 有 $f(\alpha, \beta) = f(\alpha', \beta) \Rightarrow f(\alpha - \alpha', \beta) = 0$；因 f 是非退化双线性函数，所以必有 $\alpha = \alpha'$；与假设矛盾，所以映射 $\alpha \to \alpha^*$ 必然单一.

由命题3.23可知这个映射也是满的，进而是同构映射．证明过程不依赖于某一套具体基矢，这个同构是**自然同构**． ■

注 3.41 定理3.29指明了对偶空间的对偶空间 V^{**} 与 V 是自然同构的．如果在 V 中定义了非退化双线性函数，由定理3.40可知对偶空间 V^* 与 V 之间也存在自然同构．需要注意：V^{**} 与 V 间的自然同构只依赖于 V 自身的代数结构，故可以直接记 $V^{**}=V$；V^* 与 V 间的自然同构需要依赖于附加的非退化双线性函数，一般情形下不能记 $V^*=V$，只能记为 $V^*\cong V$．

3.4.2 对称双线性函数

一般方阵不好处理，然而处理对称方矩阵却容易得多；可引入如下定义：

定义 3.42 设 $f(\alpha,\beta)$ 是线性空间 V 上的一个双线性函数，若 $\forall\alpha,\beta\in V$ 都有 $f(\alpha,\beta)=f(\beta,\alpha)$ 成立，则称 f 是**对称双线性函数**．

例 3.43 欧氏内积3.2是非退化、对称双线性函数．

显然对称双线性函数 $f(X,Y)$ 在任意基底 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\epsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_n$ 下，都有 $f(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\epsilon}_j)=f(\boldsymbol{\epsilon}_j,\boldsymbol{\epsilon}_i)$，故其度量矩阵也是对称的．反之，如果双线性函数 $f(X,Y)$ 在某一基底下的度量矩阵 A 是对称的；由于不同基底下矩阵关系为合同关系（见式(3.4-9)），所以在其它任意基底下的矩阵仍是对称的，即 $B^T=(C^TAC)^T=C^TAC=B$．

定理 3.44 设 $f(\alpha,\beta)$ 是 $n(>0)$ 维线性空间 V 上的一个对称双线性函数，那么在线性空间 V 中存在一组基 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\epsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_n$ 使得度量矩阵 $f(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\epsilon}_j)$ 为对角矩阵．

证明 ．只需找到一组基矢 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\epsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_n$ 使得：当 $i\neq j$ 时，$f(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\epsilon}_j)=0$ 即可．

如果 f 是零函数，那么度量矩阵必然是对称的，矩阵元都是零．

下面假设 f 不是零函数情形．那么必然存在矢量 $\boldsymbol{\epsilon}_1$，使得 $f(\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\epsilon}_1)\neq 0$；用反证法证明．假设 $\forall\alpha\in V$ 都有 $f(\alpha,\alpha)=0$；那么 $\forall\alpha,\beta\in V$ 有

$$f(\alpha,\beta)=\frac{1}{2}\big(f(\alpha+\beta,\alpha+\beta)-f(\alpha,\alpha)-f(\beta,\beta)\big)=0. \tag{3.4-11}$$

上式说明 f 是零函数，存在矛盾；所以必然有这样的 $\boldsymbol{\epsilon}_1$ 存在．现在对空间 V 的维数 n 作归纳法．假设维数小于 n 的矢量空间定理成立，我们来证明对 n 维矢量空间定理也正确．将空间 V 的矢量 $\boldsymbol{\epsilon}_1$ 扩充成一组基矢 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$，且令

$$\boldsymbol{\epsilon}'_i=\boldsymbol{\eta}_i-\boldsymbol{\epsilon}_1\frac{f(\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\eta}_i)}{f(\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\epsilon}_1)},\qquad \text{其中 } i=2,3,\cdots,n.$$

那么容易得到

$$f(\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\epsilon}'_i)=f\left(\boldsymbol{\epsilon}_1,\ \boldsymbol{\eta}_i-\boldsymbol{\epsilon}_1\frac{f(\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\eta}_i)}{f(\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\epsilon}_1)}\right)=f(\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\eta}_i)-f(\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\epsilon}_1)\frac{f(\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\eta}_i)}{f(\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\epsilon}_1)}=0.$$

容易看出 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\epsilon}'_2,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}'_n$ 是线性无关的（证明过程留给读者），可以看成空间 V 的一组基矢．我们考察由 $\boldsymbol{\epsilon}_1$ 生成的空间 $L(\boldsymbol{\epsilon}_1)$ 和由 $\boldsymbol{\epsilon}'_2,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}'_n$ 生成的空间 $L(\boldsymbol{\epsilon}'_2,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}'_n)$，显然线性空间 V 可分解为 $L(\boldsymbol{\epsilon}_1)$ 和 $L(\boldsymbol{\epsilon}'_2,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}'_n)$ 的直和．显然 $\forall\alpha\in L(\boldsymbol{\epsilon}'_2,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}'_n)$ 都有 $f(\boldsymbol{\epsilon}_1,\alpha)=0$．我们已经假设在 $n-1$ 维空间 $L(\boldsymbol{\epsilon}'_2,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}'_n)$ 中存在一组基矢 $\boldsymbol{\epsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_n$ 使得

$$\text{当 } i\neq j \text{ 时},\quad f(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\epsilon}_j)=0,\quad i,j=2,3,\cdots,n.$$

因为 $V=L(\boldsymbol{\epsilon}_1)\oplus L(\boldsymbol{\epsilon}'_2,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}'_n)$，所以 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\epsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_n$ 便满足定理要求． ■

设线性空间 V 基矢 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\epsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_n$ 满足上面定理要求，令 $d_i=f(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\epsilon}_i)$，那么对于 V 中任意矢量 $\alpha=x^i\boldsymbol{\epsilon}_i$ 和 $\beta=y^j\boldsymbol{\epsilon}_j$ 有（矩阵 $f(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\epsilon}_j)$ 非对角元为零）

$$f(\alpha,\beta)=f(x^i\boldsymbol{\epsilon}_i,y^j\boldsymbol{\epsilon}_j)=x^iy^jf(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\epsilon}_j)=\sum\nolimits_{i=1}^{n}d_ix^iy^i. \tag{3.4-12}$$

推论 3.45 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间，那么存在基矢 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_n$，使得对于 V 中任意矢量 $\alpha=x^i\boldsymbol{\epsilon}_i$ 和 $\beta=y^j\boldsymbol{\epsilon}_j$ 在对称双线性函数 f 作用下有

$$f(\alpha,\beta)=x^1y^1+\cdots+x^py^p;\qquad 0\leqslant p\leqslant n. \tag{3.4-13}$$

也就是使双线性函数 f 的度量矩阵 $f(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\epsilon}_j)$ 的对角元要么是 $+1$ 要么是 0．

推论 3.46 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间，那么存在基矢 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_n$，使得对于 V 中任意矢量 $\alpha=x^i\boldsymbol{\epsilon}_i$ 和 $\beta=y^j\boldsymbol{\epsilon}_j$ 在对称双线性函数 f 作用下有

$$f(\alpha,\beta)=x^1y^1+\cdots+x^py^p-x^{p+1}y^{p+1}-\cdots-x^ry^r,\ 0\leqslant p\leqslant r\leqslant n. \tag{3.4-14}$$

也就是使双线性函数 f 的度量矩阵 $f(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\epsilon}_j)$ 的对角元要么是 $+1$ 要么是 -1 要么是 0．对角元上的 ±1 和 0 称为对称双线性函数的惯性指数．

定理 3.47 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间，对于一个确定的对称双线性函数 f 来说，式(3.4-14)中 $+1$、-1 和 0 的个数是确定的，合同变换下不变．

证明 . 此定理一般称为“惯性定理”；证明可参阅[85]p.432定理 6. ■

定理 3.48 设数域 $\mathbb{F}$ 上有 n 维对称矩阵 A_1, A_2，以及 m 维对称矩阵 B_1, B_2.

$$\text{如果 } A_1 \overset{c}{\sim} A_2 \quad \text{并且} \quad \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & B_1 \end{pmatrix} \overset{c}{\sim} \begin{pmatrix} A_2 & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}, \tag{3.4-15}$$

那么必有 $B_1 \overset{c}{\sim} B_2$.

证明 . 此定理称为 **Witt 消去定理**；文献[85]$^{\text{p.433}}$叙述了华罗庚的证明. ■

3.4.3 不定对称双线性函数

本小节在实数域上讨论. 非退化、对称、**正定**双线性函数是指式(3.4-14)中惯性指数没有 -1 和 0，全部是 $+1$；它有许多良好性质. 若要求它是**不定的**，即式(3.4-14)中惯性指数包含 $+1$ 和 -1，则情形有些变化.

例 3.49 定义 g 为 $g(v,w) = v_1w_1 - v_2w_2$，其中 $v = (v_1, v_2), w = (w_1, w_2)$.

不难验证 g 是 $\mathbb{R}^2$ 上对称、双线性的；然而 g 是不定的. 令 $v = (1,0)$ 和 $u = (0,1)$ 代入定义式后可验证 g 是非退化的.

在度量矩阵是正定情形下，也就是我们之前接触的平面几何学；在二维平面上，两个矢量正交是指它们相互垂直，交角是 $90°$. 然而，这些熟知的知识在本例中不再成立. 例如，我们取 $v = (1,b)$，$w = (b,1)$，把它们代入定义式有 $g(v,w) = 1\cdot b - b\cdot 1 = 0$. 只要 $b \neq 0$，v、w 便不是正定度量意义上的正交. 甚至当 $b = 1$ 时，$v = w$；非零矢量 $v = (1,1)$ 和自己正交. ■

定义 3.50 设实数域 $\mathbb{R}$ 上线性空间 V 是 m 维的，其上有不定、非退化、对称双线性函数 $g(\cdot,\cdot)$；再设 W 是 V 的子空间. 令 $W^\perp \equiv \{v \in V \mid g(v,w) = 0,\ \forall w \in W\}$，则称 $W^\perp$ 是 V 中 W 的**垂直子空间**（perpendicularity subspace）.

在例3.49中，如果取 W 为 $\{(1,1)\}$ 张成的空间，那么依照定义3.50可知 $W^\perp = W$；很明显此时 $W + W^\perp \neq V$；故在不定双线性函数情形下，不宜称 $W^\perp$ 是 W 的正交补空间. 在这个例子中 $W \cap W^\perp \neq \{0\}$，我们再给另外一例. 在 $\mathbb{R}^4$ 中，其上有双线性函数 $g(x,y) = -x^0y^0 + x^1y^1 + x^2y^2 + x^3y^3$，令 $W = \{(x,y,x,y) \in \mathbb{R}^4 \,|\, \forall x, y \in \mathbb{R}\}$；那么很明显非零矢量 $(x,0,x,0)$ 既是 W 中元素，又是 $W^\perp$ 中元素.

在垂直子空间中，仍有下面熟悉的命题成立.

命题 3.51 设实数域 $\mathbb{R}$ 上线性空间 V 是 m 维的，其上有不定的、非退化、对称双线性函数 $g(\cdot,\cdot)$. 如果 W 是 V 的子空间，则 W 和其**垂直子空间**$W^\perp$ 有如下关系成立：**(1)** $\dim W+\dim W^\perp=m=\dim V$；**(2)** $(W^\perp)^\perp=W$.

证明 . (1) 设子空间 W 的基矢组为 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_k\}$；补充一些基矢，可将其扩充为 V 上的基矢组 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_k,\boldsymbol{e}_{k+1},\cdots,\boldsymbol{e}_m\}$. 设 $v\in W^\perp$，这等价于 $g(v,\boldsymbol{e}_i)=0$，$i=1,\cdots,k$；把它表示成线性代数方程组形式

$$\sum\nolimits_{j=1}^{m} g_{ij}v_j=0,\quad g_{ij}\equiv g(\boldsymbol{e}_i,\boldsymbol{e}_j),\quad i=1,\cdots,k. \tag{3.4-16}$$

由于度量 g 是非退化的，故上述线性代数方程组解空间的维数是 $m-k$. 通过组合这个解空间的矢量可以得到全部的 $W^\perp$ 中矢量；故 (1) 成立.

(2) 由于 $u\in(W^\perp)^\perp$ 意味着 u 正交于 $W^\perp$ 中所有矢量；因此有 $W\subset(W^\perp)^\perp$. 由 (1) 的证明，我们知道 W 和 $(W^\perp)^\perp$ 有相同的维数，故两者相等. ■

定义 3.52 设有实数域上的线性空间 V 及其上的对称、非退化双线性函数 g. W 是 V 的子空间，如果 g 在 W 上的限制 $g|_W$ 是退化的，则称 W 是**退化**的.

命题 3.53 设有实数域上的 m 维线性空间 V 及其上的对称、非退化双线性函数 g；W 是 V 的子空间. V 的子空间 W 是非退化的充要条件是：V 能表示成 W 与 $W^\perp$ 的直和.

证明 . 线性空间上有如下恒等式（可参考[85]p.184定理 4）：

$$\dim(W+U)+\dim(W\cap U)=\dim W+\dim U. \tag{3.4-17}$$

上面这个公式是在不涉及空间度量情形下证明的，换句话说空间有无度量，有何种度量，上式都正确. 令 $U=W^\perp$，由命题3.51，式(3.4-17)右端等于 m；故 $V=W+W^\perp$ 等价于 $W\cap W^\perp=\{0\}$；这两个条件中的任何一条都等价于 $V=W\oplus W^\perp$. 我们已知 $W\cap W^\perp=\{w\in W\mid g(w,w')=0,\ \forall w'\in W\}$，很明显 $W\cap W^\perp=\{0\}$ 相当于子空间 W 非退化.

由于 $(W^\perp)^\perp=W$，故 W 非退化还等价于 $W^\perp$ 非退化. ■

命题 3.54 设有实数域上的线性空间 V 及其上的对称、非退化双线性函数 g；W 是 V 的非退化子空间. 那么 V 上度量 g 的正（负）惯性指数个数等于 W 上度量 $g|_W$ 正（负）惯性指数个数加上 $W^\perp$ 上度量 $g|_{W^\perp}$ 正（负）惯性指数个数.

证明 . 由命题可知：g、$g|_W$ 和 $g|_{W^\perp}$ 非退化；且 $V = W \oplus W^\perp$，$W \cap W^\perp = \{0\}$.

设子空间 W 的基矢为 $\{\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_k\}$，并且在 $g|_W$ 下，它们是正交归一的. 设 $W^\perp$ 的基矢为 $\{\boldsymbol{e}_{k+1}, \cdots, \boldsymbol{e}_m\}$，并且在 $g|_{W^\perp}$ 下，它们是正交归一的. 不难得到 $g(\boldsymbol{e}_i, \boldsymbol{e}_j) = 0$，$1 \leqslant i \leqslant k$、$k+1 \leqslant j \leqslant m$. 由于 $V = W \oplus W^\perp$，故 $V = \mathrm{Span}\{\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_k, \boldsymbol{e}_{k+1}, \cdots, \boldsymbol{e}_m\}$. 因此，$g$ 作用在 $\mathrm{Span}\{\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_k, \boldsymbol{e}_{k+1}, \cdots, \boldsymbol{e}_m\}$ 上的正（负）惯性指数个数必然是 $g|_W$ 正（负）惯性指数个数加上$g|_{W^\perp}$ 正（负）惯性指数个数. ■

3.4.4 多重线性映射

从单元微积分到两元微积分是质变；从两元微积分到 $n(>2)$ 元微积分只是量变. 与此类似，从单重线性映射到双重线性映射是质变（或许算不上），从双重线性映射到 $r(>2)$ 重线性映射只是量变，叙述起来麻烦一些而已. 双线性映射的相关内容可以几乎不作任何修改地推广到 $r(>2)$ 重线性映射.

定义 3.55 设 W 和 $V_1, \cdots, V_r$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，如果 r 元映射 $f: V_1 \times \cdots \times V_r \to W$ 对每一个变元都具有如下线性性质（其中 $\forall k \in \mathbb{F}$）：

$$f(\cdots, k\alpha + \beta, \cdots) = kf(\cdots, \alpha, \cdots) + f(\cdots, \beta, \cdots);\ \forall \alpha, \beta \in V_p,\ 1 \leqslant p \leqslant r.$$

则称映射 f 是从 $V_1 \times \cdots \times V_r$ 到 W 的 r **重线性映射**. 如果 $W \equiv \mathbb{F}$，那么映射 f 称为 $\mathbb{F}$ 值 r **重线性函数**.

例 3.56 n 阶行列式函数 det 是从直积 $\overbrace{\mathbb{F}^n \times \cdots \times \mathbb{F}^n}^{n}$ 空间到数域 $\mathbb{F}$ 的一个多重线性函数. 从行列式定义容易验证，设有 n 阶矩阵 $A = \{a_{ij}\}$，则

$$\det(A) \equiv |A| = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}, \quad j_1 \neq \cdots \neq j_n. \tag{3.4-18}$$

其中 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 是这个 n 个数的排列，偶排列返回偶数，奇排列返回奇数.

将每一行看成 n 维空间中的矢量，则

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ k_1 b_1 + k_2 c_1 & \cdots & k_1 b_n + k_2 c_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots (k_1 b_{j_i} + k_2 c_{j_i}) \cdots a_{nj_n}$$

$$= k_1 \sum_{j_1\cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1\cdots j_n)} a_{1j_1}\cdots b_{j_i}\cdots a_{nj_n} + k_2 \sum_{j_1\cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1\cdots j_n)} a_{1j_1}\cdots c_{j_i}\cdots a_{nj_n}$$

$$= k_1 \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_1 & \cdots & b_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + k_2 \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_1 & \cdots & c_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

上式说明将行列式看成映射具有定义3.55中的线性性质，故是 n 重线性函数.

3.5 物理学中的多重线性代数

在 §3.2中，我们已指出位矢空间、力空间、动量空间等等是同构的，但可区分；出现此种情况的原因是绝大多数物理量都是有量纲的，而数学中的抽象概念是不考虑量纲的. 下面我们进一步讨论多重线性函数在物理中的使用情况.

例 3.57 牛顿力学中位矢与力之间的运算 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{F}$ 是 $U\times V\to\mathbb{R}$ 的不同线性空间（分别来自位矢空间和力空间）的双线性函数. 内积的两个元素必须属于同一线性空间 V，故上述运算不是内积. 配合中的两个元素一个来自 V，另一个来自 V^*. 这两个双线性函数分别赋予了专有名字（内积、配合）；除此以外的双线性函数没有专有名称，比如 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{F}$ 就没有. ■

例 3.58 牛顿力学中速度与力之间的运算 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{F}$ 是 $U\times V\to\mathbb{R}$ 的不同线性空间（分别来自速度空间和力空间）的双线性函数. ■

例3.57中的 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{F}$ 是功，例3.58中的 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{F}$ 是功率. 若把它们改写成 $\boldsymbol{r}(\boldsymbol{F})$、$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{F})$，并依据定义3.15，它们貌似也符合线性函数的定义. 我们知道力空间（$\boldsymbol{F}$）上的全体线性函数构成力的对偶空间，那么就有 $\boldsymbol{r}$、$\boldsymbol{v}$ 都是 $\boldsymbol{F}$ 对偶空间中的元素. 然而对偶空间中的元素是能够相加的，但 $\boldsymbol{r}+\boldsymbol{v}$ 没有物理意义，故它们不是力对偶空间中的元素. 所以只能把它们看成双线性函数. 本章中所有数学概念都是抽象的，具有一定的普适性；这两个例子也说明，当我们把这些抽象数学概念用到物理中时，这些概念可能需要些许修改. 比如我们可以把对偶空间略作限制，以便更符合物理中的情形；我们附加如下约定：**线性空间 V 和其对偶空间 V^* 的量纲必须互为倒数**. 例如位矢空间（$\boldsymbol{r}$）的量纲是长度，那么其对偶空间

（$\boldsymbol{r}^*$）的量纲必须是长度的倒数．有了这种约定，便排除了把例3.57、3.58中的位矢空间、速度空间看成力空间的对偶空间的观点．

再举几个与物理相关的例子．

例 3.59 量子物理中全体态矢量构成的集合是 Hilbert 空间，它是一种特殊的复线性空间（见596页定义16.15）；它可以是有限维的、也可以是无穷维的． ■

例 3.60 有限维 Dirac 右矢空间 $\{|\psi\rangle\}$ 是一线性空间（Hilbert 空间），它的对偶空间是左矢空间 $\{\langle\psi|\}$（有限维），两者相互对偶．无穷维的 Dirac 左、右矢空间要复杂许多，不是几句话能说清楚的，请参考 §16.3.1． ■

例 3.61 Dirac 场 ψ 与电磁规范势 A_μ 的相互作用项 $qA_\mu\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 是三重线性函数 $U\times V^*\times V\to\mathbb{R}$；其中 γ^μ 是常数矩阵，q 是常数． ■

例 3.62 固体物理中晶格的正格矢是线性空间 V，它的倒易格矢空间便是 V 的对偶空间 V^*．由于此时采用的是正定欧几里得度量（即单位矩阵），故可以把 V 等同于 V^*；从而不引入对偶空间 V^*，只有 V，同时无需区分上下标． ■

例 3.63 例3.60说有限维和无穷维有差别，此处举一个具体例子来强化此观点．设 A、B、C 是有限维方阵，则它们的迹有如下关系：$Tr(ABC)=Tr(BCA)$．

在量子力学中，有基本对易关系 $\hat{q}\hat{p}-\hat{p}\hat{q}=\mathrm{i}\hbar\mathbb{1}$，此式右端的 $\mathbb{1}$ 是单位算符（或矩阵）．对此式取迹，如果依照上面的关系式必有 $Tr(\hat{q}\hat{p})-Tr(\hat{p}\hat{q})=Tr(\hat{p}\hat{q})-Tr(\hat{p}\hat{q})=0$；而右端的迹（$Tr(\mathbb{1})$）一定不是零．矛盾！这说明在有限维空间中，量子力学基本对易关系不可能成立！只有在无穷维空间中才可能成立；此时无穷维矩阵的迹没有良定义，关系 $Tr(ABC)=Tr(BCA)$ 也不再成立． ■

练习 3-2 请再举一个物理学中的多重线性映射（或函数）的例子．

3.6 张量积

本节讲述张量积的概念．其实没有张量积，也可以通过多重线性函数给张量一个明确的定义，见定义3.82．不过，多重线性映射是由 r 个线性空间笛卡尔积到相应值域的映射，使用过程中有些时候略显麻烦；我们可以先把这 r 个线性空间的笛卡尔积化为一个大的线性空间，即本节要讲述的张量积．先叙述两个线性空间的张量积概念，然后可以很自然地推广到任意有限个情形．

3.6.1 线性空间张量积

式(3.4-4)给出了双线性映射所对应的度量矩阵，从中可以看出全体双线性映射形成的线性空间是 $m\cdot n$ 维的（实际上还需乘上 W 的维数，但张量积维数与 W 无关）；所以由双线性映射构造的张量积也应是 $m\cdot n$ 维的.

定理 3.64 设 U,V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，维数分别是 m,n. 则存在 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 Y 与 $\tau\in\mathscr{L}(U,V;Y)$ 满足条件：**(1)** Y 由 τ 的像 $\tau(U\times V)$ 生成；**(2)** 对 $\mathbb{F}$ 上任意线性空间 Z 以及任意 $f\in\mathscr{L}(U,V;Z)$，存在唯一的 $g\in\mathrm{Hom}(Y,Z)$ 使得 $f=g\circ\tau$，见交换图3.1.

证明 . 设 U 和 V 的基矢分别是 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_m$ 和 $\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$. 任意取数域 $\mathbb{F}$ 上 mn 维线性空间，记为 Y，取其基矢为 $\boldsymbol{\omega}_{11},\cdots,\boldsymbol{\omega}_{1n};\ \boldsymbol{\omega}_{21},\cdots,\boldsymbol{\omega}_{2n};\ \cdots;\ \boldsymbol{\omega}_{m1},\cdots,\boldsymbol{\omega}_{mn}$. 先证明映射 τ 的存在性. 定义 $\tau:U\times V\to Y$ 为（下式构造方式与式(3.2-6)几乎相同，这是此类映射的通用定义方法）：

$$\tau\left(x^i\boldsymbol{\epsilon}_i,y^j\boldsymbol{\eta}_j\right)\overset{def}{=}\sum\nolimits_{i=1}^{m}\sum\nolimits_{j=1}^{n}x^iy^j\boldsymbol{\omega}_{ij}. \tag{3.6-1}$$

容易验证这个映射是双线性的，并且有 $\tau(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\eta}_j)=\boldsymbol{\omega}_{ij}$，空间 Y 由 $\tau(U\times V)$ 生成. 解决了空间 Y 和映射 τ 的存在性问题，也就说明了条件 (1) 成立.

设 Z 是 $\mathbb{F}$ 上任意线性空间，$\forall f\in\mathscr{L}(U,V;Z)$，定义线性映射 $g:Y\to Z$：

$$g\left(\sum\nolimits_{i,j}^{m,n}z^{ij}\boldsymbol{\omega}_{ij}\right)\overset{def}{=}\sum\nolimits_{i,j}^{m,n}z^{ij}f(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\eta}_j). \tag{3.6-2}$$

定义左端可作变化 $g(\sum_{i,j}z^{ij}\boldsymbol{\omega}_{ij})=\sum_{i,j}z^{ij}g(\tau(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\eta}_j))$. 所以这样定义的 $g\in\mathrm{Hom}(Y,Z)$，并且满足 $f=g\circ\tau$. 从而也就证明了条件 (2) 的存在性.

再证 g 的唯一性. 假设还存在另一个线性映射 $g_1:Y\to Z$ 也满足 $f=g_1\circ\tau$，那么对于 $U\times V$ 的基矢 $(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\eta}_j)$ 有

$$g\circ\tau(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\eta}_j)=f(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\eta}_j)=g_1\circ\tau(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\eta}_j)\quad\Rightarrow\quad g(\boldsymbol{\omega}_{ij})=g_1(\boldsymbol{\omega}_{ij}),$$

也就是说 g 和 g_1 作用在 Y 的基矢上结果相同，从而 $g=g_1$. ■

在上面定理证明过程中，任意取 mn 维线性空间 Y，这说明此空间是不唯一的. 设存在另一 mn 维线性空间 Y_1 和双线性映射 τ_1 也满足定理3.64中的条件 (1) 和 (2). 两者是什么关系呢？




图 3.1: 交换图一




图 3.2: 交换图二

由于定理3.64中空间 Z 是任意取的，我们可以将其取为空间 Y_1（见图3.3），依照定理中论述，对于 τ_1 存在线性映射 ψ_1 使得 $\tau_1 = \psi_1 \circ \tau$.

再将交换图换成图3.4形式，同样由定理3.64可知对于双线性映射 τ 和 τ_1，存在线性映射 ψ_2 使得 $\tau = \psi_2 \circ \tau_1$. 由交换图三和四反映的映射间关系可得：

$$\tau_1 = \psi_1 \circ \tau = \psi_1 \circ \psi_2 \circ \tau_1; \qquad \tau = \psi_2 \circ \tau_1 = \psi_2 \circ \psi_1 \circ \tau. \tag{3.6-3}$$

由于这些映射是作用在整个空间上，所以有

$$\psi_1 \circ \psi_2 = \mathrm{id} = \psi_2 \circ \psi_1. \tag{3.6-4}$$

即它们之积是恒等映射，从而说明 ψ_1、ψ_2 互为逆映射，故它们是双射. 由定义3.20可知 ψ_1 和 ψ_2 是线性同构，故 Y 和 Y_1 是线性同构的. 可得如下命题：

命题 3.65 定理3.64中所用的线性空间 Y 并不唯一，但它们线性同构. 或者说：在相差一个线性同构映射的前提下，张量积是唯一确定的.




图 3.3: 交换图三




图 3.4: 交换图四

现在可以把 $U \times V$ 上的双重线性映射转化为单重线性映射了. 确切地说：对于给定的线性空间 U 和 V，要构造只依赖于 U 和 V 的线性空间 $U \otimes V$ 及双线性映射 $\tau : U \times V \to U \otimes V$，使得对于任意双线性映射 $f : U \times V \to Z$，存在唯

一的单重线性映射 $g:U\otimes V\to Z$ 适合于 $f=g\circ\otimes:U\times V\to Z$. 见图3.2中的交换关系. 这便是张量积的定义（参见图3.2）:

定义 3.66 设 U,V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，维数分别是 m,n. 存在满足定理3.64中条件 (1) 和 (2) 的 (Y,τ) 称为线性空间 U 与 V 的**张量积**，记 $Y\equiv U\otimes V$. τ 称为 $Y\equiv U\otimes V$ 的**标准映射**，并记 $\tau(\alpha,\beta)=\alpha\otimes\beta,\ \forall\alpha\in U,\beta\in V$.

定义3.66中的线性空间可以拓展成无穷维，证明可参见[85]§11.2.2例 2.

3.6.2 张量积性质

命题 3.67 设 U 和 V 的基分别是 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_m$ 和 $\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$. 则: **(1)** $\dim(U\otimes V)=\dim U\cdot\dim V$. **(2)** 张量积 $U\otimes V$ 的基为 $\{\boldsymbol{\epsilon}_i\otimes\boldsymbol{\eta}_j\mid 1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant j\leqslant n\}$.

证明 . 由定理3.64中存在性部分论述和该定理前的讨论可知结论 (1) 是正确的.

用反证法证明 $\boldsymbol{\epsilon}_i\otimes\boldsymbol{\eta}_j$ 线性无关. 假设存在不全为零的系数 $z^{ij}\in\mathbb{F}$ 使得 $z^{ij}\boldsymbol{\epsilon}_i\otimes\boldsymbol{\eta}_j=0$，只需将对偶基 $\boldsymbol{\epsilon}^{*k},\boldsymbol{\eta}^{*l}$ 作用在这个等式上便有 $z^{kl}=0$；产生矛盾.

线性无关的矢量组 $\boldsymbol{\epsilon}_i\otimes\boldsymbol{\eta}_j$ 个数恰好等于张量积空间 $U\otimes V$ 维数，所以它们可以当成张量积空间的基矢. ■

例 3.68 取命题3.67中的 $m=2$、$n=3$，说明线性空间直和与张量积的区别.

对有限维空间的有限次直积与直和而言，它们是同义语，不必区分. 线性空间的直和 $U\oplus V$ 是 $\mathrm{Span}\{(\boldsymbol{\epsilon}_1,0),\ (\boldsymbol{\epsilon}_2,0),\ (0,\boldsymbol{\eta}_1),\ (0,\boldsymbol{\eta}_2),\ (0,\boldsymbol{\eta}_3)\}$. 张量积 $U\otimes V$ 是 $\mathrm{Span}\{\boldsymbol{\epsilon}_1\otimes\boldsymbol{\eta}_1,\ \boldsymbol{\epsilon}_1\otimes\boldsymbol{\eta}_2,\ \boldsymbol{\epsilon}_1\otimes\boldsymbol{\eta}_3,\ \boldsymbol{\epsilon}_2\otimes\boldsymbol{\eta}_1,\ \boldsymbol{\epsilon}_2\otimes\boldsymbol{\eta}_2,\ \boldsymbol{\epsilon}_2\otimes\boldsymbol{\eta}_3\}$. ■

张量积 $U\otimes V$ 中任意矢量 ω 皆可由基矢展开，即

$$\omega=\sum\nolimits_{i,j}z_{ij}\boldsymbol{\epsilon}_i\otimes\boldsymbol{\eta}_j=\sum\nolimits_i\boldsymbol{\epsilon}_i\otimes\left(\sum\nolimits_j z_{ij}\boldsymbol{\eta}_j\right),\tag{3.6-5}$$

上式中的展开系数 z_{ij} 是唯一确定的. 令 $\beta_i=\sum_j z_{ij}\boldsymbol{\eta}_j$，则上式变为

$$\omega=\sum\nolimits_i\boldsymbol{\epsilon}_i\otimes\beta_i,\tag{3.6-6}$$

需注意，$\beta_i(1\leqslant i\leqslant m)$ 几乎不可能是 n 维空间 V 的基矢，并且 $\{\beta_i\}$ 可能是线性相关的. 张量积中任意矢量都可以表示成这种单重求和的形式；但这种表示形式不具有唯一性，见下例；需小心使用.

例 3.69 定义3.66中的映射 τ 是双线性的，所以有

$$\tau(0,\beta)=\tau(0\cdot 0,\beta)=0\cdot\tau(0,\beta)=0,\quad \text{同理可得}\quad \tau(\alpha,0)=0,$$

因此 $0\otimes\beta=0=\alpha\otimes 0,\ \forall\alpha\in U,\beta\in V$，这说明张量积的零元表示不唯一.

一般情形下，$U\otimes V$ 中的元素 ω 是多个不同的 $f_i\otimes g_j$ 线性组合的形式（如式(3.6-5)），其中 $f_i\in U$、$g_j\in V$. 如果 ω 可以表示成 $\omega=f\otimes g$ 单项式的形式，其中 $f\in U$、$g\in V$；则称为**非纠缠态**. 否则，称 ω 是**纠缠态**（entangled）.

命题 3.70 设 U,V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 $m(\geqslant 2)$ 维和 $n(\geqslant 2)$ 维线性空间，设 U 基矢是 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_m$，$V$ 的基矢是 $\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$. 那么，两个或两个以上的形如 $\boldsymbol{\epsilon}_i\otimes\boldsymbol{\eta}_i$ 的基矢量之和一般不能表示成单项式张量积形式 $\alpha\otimes\beta$，其中 $\alpha\in U,\beta\in V$.

证明 . 用反证法. 设 α、β 可分别展开为 $\alpha=a^i\boldsymbol{\epsilon}_i$ 和 $\beta=b^j\boldsymbol{\eta}_j$，并且有 $\alpha\otimes\beta=\sum_i\boldsymbol{\epsilon}_i\otimes\boldsymbol{\eta}_i$. 而此式左端的张量积可表示为 $\alpha\otimes\beta=\sum_{ij}a^ib^j(\boldsymbol{\epsilon}_i\otimes\boldsymbol{\eta}_j)$. 由此可得

$$a_ib_i=1,\quad a_ib_j=0,\qquad \text{重复指标不求和，且}i\neq j.$$

以二维（$m=2=n$）为例来说明情况. 此时由上式中的第一式可解出 $a_1\neq 0,\ a_2\neq 0,\ b_1\neq 0,\ b_2\neq 0$，这显然与第二式 $a_1b_2=0,\ a_2b_1=0$ 相矛盾. 对于高维情况也能得到类似矛盾. 这便证明了命题，即张量积 $\boldsymbol{\epsilon}_i\otimes\boldsymbol{\eta}_i\pm\boldsymbol{\epsilon}_j\otimes\boldsymbol{\eta}_j$（重复指标不求和）不能写成单项张量积 $\alpha\otimes\beta$ 的形式.

除此之外，当 $i\neq j$ 时 $\boldsymbol{\epsilon}_i\otimes\boldsymbol{\eta}_j\pm\boldsymbol{\epsilon}_j\otimes\boldsymbol{\eta}_i$ 也不能表示成 $\alpha\otimes\beta$ 单项张量积的形式；也就是说 $\boldsymbol{\epsilon}_i\otimes\boldsymbol{\eta}_j\pm\boldsymbol{\epsilon}_j\otimes\boldsymbol{\eta}_i$ 等式为纠缠态. ■

命题 3.71 设 U,V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，U^*,V^* 分别是它们的对偶空间，则 **(1)** $U\otimes V$ 自然同构于 $\mathscr{L}(U^*,V^*;\mathbb{F})$. **(2)** $U^*\otimes V^*$ 自然同构于 $\mathscr{L}(U,V;\mathbb{F})$.

证明 . 由于 V 的对偶空间 V^* 的对偶空间 V^{**} 是 V 自身（见式(3.3-8)），所以可定义（下式中 $\forall\alpha\in U,\ \beta\in V;\ f\in U^*,\ g\in V^*$）：

$$(\alpha^{**}\otimes\beta^{**})(f,g)\equiv(\alpha\otimes\beta)(f,g)\overset{def}{=}f(\alpha)g(\beta).\tag{3.6-7}$$

可见映射 $\alpha^{**}\otimes\beta^{**}\equiv\alpha\otimes\beta\in\mathscr{L}(U^*,V^*;\mathbb{F})$，并且这个映射是双线性的；此外还可证明此映射是单一的（证明过程与定理3.29中的类似）. 由命题3.23可知映射(3.6-7)是自然同构映射. 所以空间 $U\otimes V$ 自然同构于 $\mathscr{L}(U^*,V^*;\mathbb{F})$.

与上述论证类似，可证空间 $U^*\otimes V^*$ 的自然同构于 $\mathscr{L}(U,V;\mathbb{F})$. ■

注 3.72 式(3.6-7)作用是有先后顺序的，也就是说：如果写成 $(\alpha\otimes\beta)(g,f)=g(\alpha)f(\beta)$，则是错误的表示！因为 $g(\alpha)$ 和 $f(\beta)$ 均无意义，这说明张量积一般不满足交换律，即通常 $\alpha\otimes\beta(f,g)\neq\beta\otimes\alpha(f,g)$.

命题 3.73 设 U,V 是 $\mathbb{F}$ 上线性空间，则 $\mathscr{L}(U,V;\mathbb{F})$ 自然同构于 $\mathscr{L}(U\otimes V;\mathbb{F})$.

证明 . 由定理3.64及定义3.66可知，$\forall g\in\mathscr{L}(U\otimes V;\mathbb{F})$ 都有（见图3.2）$f_g=g\circ\otimes\in\mathscr{L}(U,V;\mathbb{F})$. 由定理3.64知 g 是唯一；那么对于给定 f，映射 $g\to f_g$ 便是双射. 再者有 $f_{kg_1+g_2}=(kg_1+g_2)\circ\otimes=kg_1\circ\otimes+g_2\circ\otimes=kf_{g_1}+f_{g_2}$；这说明了映射 $g\to f_g$ 还是线性的；证明过程与特定基矢无关，故此映射是自然同构映射. ■

命题 3.74 设 U,V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，U^*,V^* 分别是它们的对偶空间，如果将 $U\otimes V$ 的对偶空间记为 $(U\otimes V)^*$，则 $(U\otimes V)^*$ 同构于 $U^*\otimes V^*$.

证明 . $(U\otimes V)^*$ 本来就是 $\mathscr{L}(U\otimes V;\mathbb{F})$（见定义3.25），而由上面命题3.73和3.71可知 $\mathscr{L}(U\otimes V;\mathbb{F})\cong\mathscr{L}(U,V;\mathbb{F})\cong U^*\otimes V^*$. 且这些同构皆是自然同构. ■

命题 3.75 设 U,V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，则存在 $U\otimes V$ 到 $V\otimes U$ 的同构映射 ϕ 满足 $\phi(\alpha\otimes\beta)=\beta\otimes\alpha,\quad\forall\alpha\in U,\quad\forall\beta\in V$.

命题 3.76 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间，则 $\mathbb{F}\otimes V$、$V\otimes\mathbb{F}$ 和 V 两两之间存在同构映射.

定理 3.77 设 V_1,V_2,V_3 是数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间，则存在 $(V_1\otimes V_2)\otimes V_3$ 到 $V_1\otimes(V_2\otimes V_3)$ 的同构映射 ϕ 满足 $\phi\big((\alpha_1\otimes\alpha_2)\otimes\alpha_3\big)=\alpha_1\otimes(\alpha_2\otimes\alpha_3)$，其中 $\forall\alpha_i\in V_i$.

证明 . 从定理3.67可知 $(V_1\otimes V_2)\otimes V_3$ 和 $V_1\otimes(V_2\otimes V_3)$ 的维数相等，再由基本定理3.21可知本定理中的同构映射是存在的，下面我们给出这个映射. 设 V_1、V_2 和 V_3 的基矢分别是 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_m$、$\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$ 和 $\boldsymbol{\omega}_1,\cdots,\boldsymbol{\omega}_l$. 参考式(3.2-6)，定义映射如下，

$$\phi\big(z^{ijk}(\boldsymbol{\epsilon}_i\otimes\boldsymbol{\eta}_j)\otimes\boldsymbol{\omega}_k\big)\overset{def}{=}z^{ijk}\boldsymbol{\epsilon}_i\otimes(\boldsymbol{\eta}_j\otimes\boldsymbol{\omega}_k).\tag{3.6-8}$$

参考定理3.21“充分性”证明过程中可知映射 ϕ 是 $(V_1\otimes V_2)\otimes V_3$ 到 $V_1\otimes(V_2\otimes V_3)$ 的一个同构映射. 将 α_i 在各自基矢展开，再由定义式(3.6-8)出发可直接得到 $\phi\big((\alpha_1\otimes\alpha_2)\otimes\alpha_3\big)=\alpha_1\otimes(\alpha_2\otimes\alpha_3)$.

参阅本定理证明过程，可证明命题3.75和3.76. ■

定理3.77说明张量积满足结合律，先算哪两个张量积都可以，可直接记成 $V_1\otimes V_2\otimes V_3$，无需再加括号．由定理3.77易将张量积定义拓展到有限多个；上面所有定理、命题也都可以拓展到有限多个张量积形式，而内容几乎无需改变．例如，本节自然同构关系可总结为：

$$(U\otimes V\otimes W)^{**}\cong U\otimes V\otimes W\cong \mathscr{L}(U^*,V^*,W^*;\mathbb{F})\cong \mathscr{L}(U^*\otimes V^*\otimes W^*;\mathbb{F}), \tag{3.6-9a}$$

$$(U\otimes V\otimes W)^{*}\cong U^*\otimes V^*\otimes W^*\cong \mathscr{L}(U,V,W;\mathbb{F})\cong \mathscr{L}(U\otimes V\otimes W;\mathbb{F}). \tag{3.6-9b}$$

3.6.3 线性变换张量积

本节介绍作用在线性空间上的线性映射张量积概念．

命题 3.78 设 U,V,U',V' 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间．$\mathcal{A}$ 是空间 U 到 U' 的一个线性映射，$\mathcal{B}$ 是空间 V 到 V' 的一个线性映射．那么，存在 $U\otimes V$ 到 $U'\otimes V'$ 的唯一线性映射，记作 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$，使得下式成立，

$$(\mathcal{A}\otimes\mathcal{B})(\alpha\otimes\beta)=\mathcal{A}\alpha\otimes\mathcal{B}\beta,\qquad \forall\alpha\in U,\quad \beta\in V. \tag{3.6-10}$$

线性映射 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 称为 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 的**张量积**.

证明 . 对比图3.2，参见图3.5．考虑 $U\times V$ 到 $U'\otimes V'$ 映射 $\mathcal{C}:(\alpha,\beta)\to\mathcal{A}\alpha\otimes\mathcal{B}\beta$（这个映射不是任意指定的，是确定的），其中 $\forall\alpha\in U$, $\forall\beta\in V$．容易验证 $\mathcal{C}$ 对每一变元都是线性的，所以它是双线性映射．根据张量积定义（参见定理3.64和定义3.66）可知存在 $U\otimes V$ 到 $U'\otimes V'$ 的唯一线性映射，记作 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$，使得 $\mathcal{C}=(\mathcal{A}\otimes\mathcal{B})\circ\tau$ 成立；将矢量 (α,β) 作用在这个式子上，有

$$\mathcal{C}(\alpha,\beta)=(\mathcal{A}\otimes\mathcal{B})\circ\tau(\alpha,\beta)\quad\Rightarrow\quad \mathcal{A}\alpha\otimes\mathcal{B}\beta=(\mathcal{A}\otimes\mathcal{B})\circ(\alpha\otimes\beta).$$

这便是命题中要证明的公式. ■

当 $U'\equiv U$, $V'\equiv V$ 时，线性映射便是线性变换，由命题3.78有如下定义：

定义 3.79 $\mathcal{A}$ 是线性空间 U 的一个线性变换，$\mathcal{B}$ 是线性空间 V 的一个线性变换，则存在 $U\otimes V$ 到 $U\otimes V$ 的唯一线性变换，记作 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$，使得下式成立，

$$(\mathcal{A}\otimes\mathcal{B})(\alpha\otimes\beta)=\mathcal{A}\alpha\otimes\mathcal{B}\beta,\qquad \forall\alpha\in U,\quad \forall\beta\in V. \tag{3.6-11}$$

线性变换 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 称为线性变换 $\mathcal{A}$ 与线性变换 $\mathcal{B}$ 的**张量积**.




图 3.5: 交换图五

命题 3.80 设 U, V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，$\mathcal{A}, \mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ 是 U 的线性变换，$\mathcal{B}, \mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ 是 V 的线性变换；$\mathcal{I}_U, \mathcal{I}_V, \mathcal{I}_{U\otimes V}$ 分别表示 U、V 和 $U \otimes V$ 上的恒等变换. 则

(1) $(\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2) \otimes \mathcal{B} = \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{B} + \mathcal{A}_2 \otimes \mathcal{B}$ ；

(2) $\mathcal{A} \otimes (\mathcal{B}_1 + \mathcal{B}_2) = \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}_1 + \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}_2$ ；

(3) $(k\mathcal{A}) \otimes \mathcal{B} = \mathcal{A} \otimes (k\mathcal{B}) = k(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}), \quad k \in \mathbb{F}$ ；

(4) $(\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{B}_1)(\mathcal{A}_2 \otimes \mathcal{B}_2) = \mathcal{A}_1\mathcal{A}_2 \otimes \mathcal{B}_1\mathcal{B}_2$ ；

(5) $\mathcal{I}_U \otimes \mathcal{I}_V = \mathcal{I}_{U\otimes V}$ ；

(6) 如果 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都可逆，则 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 也可逆，并且 $(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B})^{-1} = \mathcal{A}^{-1} \otimes \mathcal{B}^{-1}$.

证明 . 由于 $U \otimes V$ 中任一矢量都可以表示成形如 $\alpha \otimes \beta$ 的有限个矢量的线性组合，所以只要证明 $U \otimes V$ 上两个线性变换在 $\alpha \otimes \beta$ 上的作用相同，就可以得出我们要的结论.

(1) 与 (2) 的证法类似，故只给出 (1) 的证明；(3) 的证明也放在此处.

$$\begin{aligned}\big((k_1\mathcal{A}_1 + k_2\mathcal{A}_2) \otimes \mathcal{B}\big)(\alpha \otimes \beta) &= (k_1\mathcal{A}_1 + k_2\mathcal{A}_2)\alpha \otimes \mathcal{B}\beta = k_1\mathcal{A}_1\alpha \otimes \mathcal{B}\beta + k_2\mathcal{A}_2\alpha \otimes \mathcal{B}\beta \\ &= k_1(\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{B})(\alpha \otimes \beta) + k_2(\mathcal{A}_2 \otimes \mathcal{B})(\alpha \otimes \beta) \\ &= \big(k_1(\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{B}) + k_2(\mathcal{A}_2 \otimes \mathcal{B})\big)(\alpha \otimes \beta)\end{aligned}$$

其中 $k_1, k_2 \in \mathbb{F}$. 由此式最后一步可以得到 (1) 及 (3) 中的结果.

(4) 是指两个线性变换连续作用的计算公式，直接计算得，

$$\begin{aligned}\big((\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{B}_1)(\mathcal{A}_2 \otimes \mathcal{B}_2)\big)(\alpha \otimes \beta) &= (\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{B}_1)\big((\mathcal{A}_2 \otimes \mathcal{B}_2)(\alpha \otimes \beta)\big) \\ &= (\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{B}_1)(\mathcal{A}_2\alpha \otimes \mathcal{B}_2\beta) = \mathcal{A}_1(\mathcal{A}_2\alpha) \otimes \mathcal{B}_1(\mathcal{B}_2\beta) \\ &= (\mathcal{A}_1\mathcal{A}_2\alpha) \otimes (\mathcal{B}_1\mathcal{B}_2\beta) = (\mathcal{A}_1\mathcal{A}_2 \otimes \mathcal{B}_1\mathcal{B}_2)(\alpha \otimes \beta).\end{aligned}$$

(5) $(\mathcal{I}_U \otimes \mathcal{I}_V)(\alpha \otimes \beta) = \mathcal{I}_U\alpha \otimes \mathcal{I}_V\beta = \alpha \otimes \beta = \mathcal{I}_{U\otimes V}(\alpha \otimes \beta)$.

(6) 因 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 可逆，所以 $\mathcal{A}^{-1}, \mathcal{B}^{-1}$ 存在，于是由性质 (4) 和 (5) 有

$$(\mathcal{A}^{-1} \otimes \mathcal{B}^{-1})(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}) = \mathcal{A}^{-1}\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}^{-1}\mathcal{B} = \mathcal{I}_U \otimes \mathcal{I}_V = \mathcal{I}_{U\otimes V}.$$

与此类似可证 $(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B})(\mathcal{A}^{-1} \otimes \mathcal{B}^{-1}) = \mathcal{I}_{U\otimes V}$. 因此 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 可逆. ■

3.6.4 矩阵张量积

在选定基矢后，线性变换与矩阵一一对应，现在来讨论线性变换张量积的矩阵表示. 设数域 $\mathbb{F}$ 上有 m 维线性空间 U，和 n 维线性空间 V，它们的基矢分别是 $\boldsymbol{\epsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\epsilon}_m$ 和 $\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n$. 再设 U 和 V 上分别有线性变换 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$，那么有

$$\mathcal{A}(\boldsymbol{\epsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\epsilon}_m) = (\boldsymbol{\epsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\epsilon}_m)A; \quad \mathcal{B}(\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n) = (\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n)B. \tag{3.6-12}$$

其中矩阵 $A = \{a_{ij}\}, B = \{b_{ij}\}$ 与线性变换 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 相对应. 将 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 作用在 $U \otimes V$ 的基矢 $\boldsymbol{\epsilon}_i \otimes \boldsymbol{\eta}_j$（见命题3.67）上，并且设在此基矢上对应的矩阵是 C，

$$(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B})(\boldsymbol{\epsilon}_i \otimes \boldsymbol{\eta}_j) = \mathcal{A}\boldsymbol{\epsilon}_i \otimes \mathcal{B}\boldsymbol{\eta}_j = \left(\sum_{l=1}^{m} \boldsymbol{\epsilon}_l a_{li}\right) \otimes \left(\sum_{k=1}^{n} \boldsymbol{\eta}_k b_{kj}\right) = \sum_{l,k} a_{li}b_{kj}\boldsymbol{\epsilon}_l \otimes \boldsymbol{\eta}_k.$$

把矩阵 C 分块：C 的行分成 m 组，每组有 n 行；C 列分成 m 组，每组有 n 列. 我们让关于基矢 $\{\boldsymbol{\epsilon}\}$ 的指标（i 和 l）不变，让基矢 $\{\boldsymbol{\eta}\}$ 的指标（k 和 j）变化，从上式可知 C 的 (p, q) 块为下述 n 级矩阵，

$$\begin{pmatrix} a_{pq}b_{11} & \cdots & a_{pq}b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{pq}b_{n1} & \cdots & a_{pq}b_{nn} \end{pmatrix} = a_{pq}B, \tag{3.6-13}$$

所以，线性变换张量积 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 在上述基矢下的矩阵 C 为下面的分块矩阵，

$$C = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1m}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mm}B \end{pmatrix} \equiv A \otimes B. \tag{3.6-14}$$

这与线性代数教材上定义的矩阵 Kronecker 积一致.

练习 3-3 证明命题3.75和3.76.

3.7 张量定义

量子力学中位形空间波函数与自旋空间波函数的积便可由 §3.6中的张量积给出，符号 $|\psi\rangle\langle\phi|$ 也是张量积；所以线性空间张量积概念对物理学是必要的. 更一般化的概念是模的张量积，对物理学来说貌似不必要；如读者有兴趣可查阅抽象代数书籍. 不过在微分几何上，一般使用来自 V 与 V^* 的张量积.

设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 m 维线性空间，V^* 是其对偶空间，记张量积为

$$\mathcal{T}_q^p(V)\equiv\underbrace{V\otimes\cdots\otimes V}_{p个}\otimes\underbrace{V^*\otimes\cdots\otimes V^*}_{q个},\quad p,q\geqslant 0,\ 且\ p,q\in\mathbb{Z}. \tag{3.7-1}$$

特别约定

$$\mathcal{T}_0^0(V)\equiv\mathcal{T}^0(V)\equiv\mathcal{T}_0(V)\equiv\mathbb{F},\quad \mathcal{T}_0^p(V)\equiv\mathcal{T}^p(V),\quad \mathcal{T}_q^0(V)\equiv\mathcal{T}_q(V). \tag{3.7-2}$$

式(3.7-1)的 V 与 V^* 可以交错排列，由命题3.75可知，在相差一个线性同构映射前提下，式(3.7-1)是唯一的.

定义 3.81 张量积 $\mathcal{T}_q^p(V)$ 中的元素称为 $\binom{p}{q}$ **型张量**，p 称为**逆变次数**或反变次数，q 称为**协变次数**或共变次数.

定义 3.82 $\binom{p}{q}$ **型张量**是指 $\underbrace{V^*\times\cdots\times V^*}_{p个}\times\underbrace{V\times\cdots\times V}_{q个}$ 上的一个 $p+q$ 重线性函数；即 V 上 $\binom{p}{q}$ 型张量可定义为 $\mathscr{L}(\underbrace{V^*\times\cdots\times V^*}_{p个}\times\underbrace{V\times\cdots\times V}_{q个};\mathbb{F})$.

由式(3.6-9)可知，上述两个定义是等价的. 需注意：定义3.81中是 p 个 V 和 q 个 V^* 的张量积，而定义3.82中是 p 个 V^* 和 q 个 V 的笛卡尔积.

特别地，$\binom{1}{0}$ 型张量（线性空间 V 中元素）称为**逆变矢量**；$\binom{0}{1}$ 型张量（对偶空间 V^* 中元素）称为**协变矢量**；$\binom{0}{0}$ 型张量（数域 $\mathbb{F}$ 中元素）称为**标量**.

设 V 的基矢为 $\{\boldsymbol{\epsilon}\}$，则对偶空间 V^* 的基矢为 $\{\boldsymbol{\epsilon}^*\}$. 于是由命题3.67可知

$$\boldsymbol{\epsilon}_{i_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{\epsilon}_{i_p}\otimes\boldsymbol{\epsilon}^{*j_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{\epsilon}^{*j_q},\quad i_1,\cdots,i_p,j_1,\cdots,j_q=1,\cdots,m \tag{3.7-3}$$

是 $\mathcal{T}_q^p(V)$ 的一组基矢. $\forall\Phi\in\mathcal{T}_q^p(V)$ 可唯一表示为

$$\Phi=\Phi^{i_1\cdots i_p}_{j_1\cdots j_q}\boldsymbol{\epsilon}_{i_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{\epsilon}_{i_p}\otimes\boldsymbol{\epsilon}^{*j_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{\epsilon}^{*j_q}, \tag{3.7-4}$$

其中，

$$\Phi^{i_1\cdots i_p}_{j_1\cdots j_q}=\Phi(\boldsymbol{\epsilon}^{*i_1},\cdots,\boldsymbol{\epsilon}^{*i_p};\boldsymbol{\epsilon}_{j_1},\cdots\boldsymbol{\epsilon}_{j_q}). \tag{3.7-5}$$

$\Phi_{j_1\cdots j_q}^{i_1\cdots i_p}$ 称为张量 Φ 在基矢 $\{\boldsymbol{\epsilon}\otimes\boldsymbol{\epsilon}^*\}$ 上的**分量**.

选空间 V 的另一组基底 $\{\boldsymbol{\eta}\otimes\boldsymbol{\eta}^*\}$，两组基底关系为 $\boldsymbol{\eta}_k=\boldsymbol{\epsilon}_i A^i{}_k$，$B$ 是矩阵 A 的转置逆（见定理3.28）. $\widetilde{\Phi}_{k_1\cdots k_q}^{l_1\cdots l_p}$ 是在基矢 $\{\boldsymbol{\eta}\otimes\boldsymbol{\eta}^*\}$ 上的分量：

$$\begin{aligned}\Phi&=\widetilde{\Phi}_{k_1\cdots k_q}^{l_1\cdots l_p}\boldsymbol{\eta}_{l_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{\eta}_{l_p}\otimes\boldsymbol{\eta}^{*k_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{\eta}^{*k_q}\\&=\widetilde{\Phi}_{k_1\cdots k_q}^{l_1\cdots l_p}A^{i_1}{}_{l_1}\cdots A^{i_p}{}_{l_p}B_{j_1}{}^{k_1}\cdots B_{j_q}{}^{k_q}\boldsymbol{\epsilon}_{i_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{\epsilon}_{i_p}\otimes\boldsymbol{\epsilon}^{*j_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{\epsilon}^{*j_q}.\end{aligned}$$

结合式(3.7-4)，利用式(3.7-5)消掉上式中的基矢，有

$$\Phi_{j_1\cdots j_q}^{i_1\cdots i_p}=\widetilde{\Phi}_{k_1\cdots k_q}^{l_1\cdots l_p}A^{i_1}{}_{l_1}\cdots A^{i_p}{}_{l_p}B_{j_1}{}^{k_1}\cdots B_{j_q}{}^{k_q}\quad\Longleftrightarrow\tag{3.7-6a}$$

$$\widetilde{\Phi}_{k_1\cdots k_q}^{l_1\cdots l_p}=\Phi_{j_1\cdots j_q}^{i_1\cdots i_p}A^{j_1}{}_{k_1}\cdots A^{j_q}{}_{k_q}B_{i_1}{}^{l_1}\cdots B_{i_p}{}^{l_p}.\tag{3.7-6b}$$

上式是在基矢变换下，张量对应分量之间的变换式. 最早，Ricci 就是用此式定义张量，也就是张量的分量定义方式. 虽然式(3.7-6)中只有分量，但依照本书习惯，需分量结合基矢才是张量，即(3.7-4)式中的 Φ.

反之，如果对空间 V 的每一个基底 $\{\boldsymbol{\epsilon}\otimes\boldsymbol{\epsilon}^*\}$ 都指定一个由 m^{p+q} 个 $\mathbb{F}$ 值数构成的数组 $\Phi_{j_1\cdots j_q}^{i_1\cdots i_p}$；当基底变换时（$\boldsymbol{\eta}_k=\boldsymbol{\epsilon}_i A^i{}_k$），相应数按式(3.7-6)进行变换，那么可以定义一个 $\binom{p}{q}$ 型张量 Φ_{new}，它以 $\Phi_{j_1\cdots j_q}^{i_1\cdots i_p}$ 为它在基底 $\{\boldsymbol{\epsilon}\otimes\boldsymbol{\epsilon}^*\}$ 下的分量. 仿照式(3.2-5)或式(3.4-6)中的手法，定义如下 $\mathbb{F}$ 值映射，

$$\Phi_{new}\left(\alpha_{i_1}\boldsymbol{\epsilon}^{*i_1},\cdots,\alpha_{i_p}\boldsymbol{\epsilon}^{*i_p},\ v^{j_1}\boldsymbol{\epsilon}_{j_1},\cdots,v^{j_q}\boldsymbol{\epsilon}_{j_q}\right)\overset{def}{=}\Phi_{j_1\cdots j_q}^{i_1\cdots i_p}\alpha_{i_1}\cdots\alpha_{i_p}\ v^{j_1}\cdots v^{j_q}.$$

这样定义的映射对每个宗量都是线性的，在基矢变化时定义右端项具有形式不变性. 不难看出 $\Phi_{new}\in\mathscr{L}(V^*\times\cdots\times V^*\times V\times\cdots\times V;\mathbb{F})$，这个定义便说明了可由分量定义得到张量的代数定义3.82.

现代代数、几何中定义、定理的描述方式是尽量不涉及分量；用分量语言描述后，还需验证这种描述必须在基矢变换下具有形式不变性，即描述不能依赖于某一套特定基矢，必须对每套基矢都适用（并且形式相同）. 定义3.81和定义3.82中没有涉及任何分量信息，天生具有这种不变性.

虽然上面用分量语言定义张量的方式（见式(3.7-6)）已过时，但是在物理学中仍旧大有市场，主要原因是这种方式简单、直接、明了. 式(3.7-6)中的系数 A、B 是非退化矩阵，故有 $A,B\in GL(m,\mathbb{F})$；系数 A、B 取任意可逆矩阵是对张量定义最宽泛的要求，一般情形下会比这个要求要严格. 设有子群 $G\subset GL(m,\mathbb{F})$，若式(3.7-6)中系数 A、B 是 G 中元素，则称之为**G 型张量**. 例一：将 A、B 限

定在 $SO(3)$ 中，是牛顿力学中常用张量，比如第一章中的张量. 例二：将 A、B 限定在 $SO^+(1,3)$ 中，称为 **Lorentz 张量**. 例三：将 A、B 限定在 $SU(2)$ 中，称为 **Pauli 旋量**. 例四：将 A、B 限定在 $SL(2,\mathbb{C})$ 中，称为 $SL(2,\mathbb{C})$ **旋量**（或 Lorentz 旋量）；见第十五章.

例 3.83 设有数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 与其对偶空间 V^*. 对 $(w,\phi)\in V\times V^*$ 定义线性变换 $F_{w,\phi}\in \mathrm{End}(V)$ 为 $F_{w,\phi}(v)\overset{def}{=}\phi(v)w,\forall v\in V$；于是得到双线性映射 $F:V\times V^*\to \mathrm{End}(V)$. 这便诱导出从 $V\otimes V^*=\mathcal{T}^1_1(V)$ 到 $\mathrm{End}(V)$ 的线性映射 Ψ，它满足：$\Psi(w\otimes\phi)\overset{def}{=}F_{w,\phi}$，$\forall w\otimes\phi\in\mathcal{T}^1_1(V)$. 若 $\Psi(w\otimes\phi)(v)=\phi(v)w=0$，则 $\forall v\in V$ 有：或者 $\phi(v)=0$，即 $\phi=0$；或者 $w=0$；总之 $w\otimes\phi=0$. 又因为 $\dim\mathcal{T}^1_1(V)=(\dim V)^2=\dim\mathrm{End}(V)$；结合命题3.22、3.23可知 Ψ 是线性同构映射. 因此：V 上线性变换等同于 $\binom{1}{1}$ 张量. ■

加法、张量积、缩并

张量积 $\mathcal{T}^p_q(V)$ 本身就是一个线性空间，属于它的元素（也就是 $\binom{p}{q}$ 型张量）自然存在加法和数量乘法，见定义3.1中的描述. 其实就是在选定基底后，对应分量相加减；或者对应分量进行数量乘法. 这便是同型张量的**加减法**.

除了此以外，不同型（或同型）张量间还可以定义**张量积**. 设有两个张量积空间 $\mathcal{T}^p_q(V)$ 和 $\mathcal{T}^r_s(V)$；这两个空间都是线性空间，自然可以用上节的张量积定义3.66把这两个线性空间乘起来，得到一个新的张量积空间 $\mathcal{T}^{p+r}_{q+s}(V)=\mathcal{T}^p_q(V)\otimes\mathcal{T}^r_s(V)$. 具体来说便是，在取定基底后，对于任意 $x\in\mathcal{T}^p_q(V)$ 和 $y\in\mathcal{T}^r_s(V)$，它们的乘积是对应分量的乘积（即 $\mathbb{F}$ 值的数量乘法，比如实数乘法或复数乘法）：

$$(x\otimes y)^{i_1\cdots i_{p+r}}_{j_1\cdots j_{q+s}}=x^{i_1\cdots i_p}_{j_1\cdots j_q}\cdot y^{i_{p+1}\cdots i_{p+r}}_{j_{q+1}\cdots j_{q+s}}. \tag{3.7-7}$$

两组基底进行张量积运算. 用这种方法定义的乘法符合分配律、结合律.

张量另外一个重要的运算是**缩并**，它是一个线性映射 $C^\lambda_\mu:\mathcal{T}^p_q(V)\to\mathcal{T}^{p-1}_{q-1}(V)$. 我们以 $\binom{2}{2}$ 型张量为例来说明，用张量 Φ 的分量形式来表示：

$$\begin{aligned}C^2_1\Phi&=C^2_1\left(\Phi^{i_1i_2}_{j_1j_2}\boldsymbol{\epsilon}_{i_1}\otimes\boldsymbol{\epsilon}_{i_2}\otimes\boldsymbol{\epsilon}^{*j_1}\otimes\boldsymbol{\epsilon}^{*j_2}\right)=\Phi^{i_1i_2}_{j_1j_2}C^2_1\left(\boldsymbol{\epsilon}_{i_1}\otimes\boldsymbol{\epsilon}_{i_2}\otimes\boldsymbol{\epsilon}^{*j_1}\otimes\boldsymbol{\epsilon}^{*j_2}\right)\\&=\Phi^{i_1i_2}_{j_1j_2}\left\langle\boldsymbol{\epsilon}_{i_2},\boldsymbol{\epsilon}^{*j_1}\right\rangle\left(\boldsymbol{\epsilon}_{i_1}\otimes\boldsymbol{\epsilon}^{*j_2}\right)=\Phi^{i_1i_2}_{j_1j_2}\delta^{j_1}_{i_2}\left(\boldsymbol{\epsilon}_{i_1}\otimes\boldsymbol{\epsilon}^{*j_2}\right)=\Phi^{i_1k}_{kj_2}\boldsymbol{\epsilon}_{i_1}\otimes\boldsymbol{\epsilon}^{*j_2}.\end{aligned}$$

即让指定基矢作配合，得到 δ 函数，运算后便是分量指定指标求和；这种操作把协变和逆变各降一阶.

非对易性

虽然由命题3.75可知，存在同构映射 ϕ 使得 $\phi(\alpha\otimes\beta)=\beta\otimes\alpha$；但是一般说来两者间不能直接划等号，即一般说来 $\alpha\otimes\beta=\beta\otimes\alpha$ 是不正确的．其根源是张量积定义3.66中的标准映射 $\tau(\cdot,\cdot)$ 一般说来不是对称的双线性函数；双线性函数的作用是有顺序的，见注解3.72中叙述．

这种非对易性只体现在协变内部或者逆变内部，用分量语言来表示便是：一般情况下，$\Phi^{ij}\neq\Phi^{ji}$、$\Phi_{ij}\neq\Phi_{ji}$．更多讨论见第92页的脚注2．

练习 3-4 给线性空间选定基矢，用矩阵语言从新叙述例题3.83．

练习 3-5 证明恒等变换（也就是单位矩阵）是 $\binom{1}{1}$ 型张量．

3.8 外代数

在本节，叙述对称张量和反对称张量的概念，着重讨论反对称张量．为叙述方便，只讨论纯协变张量，同样的讨论也适用于纯逆变张量；但本节内容一般不能应用于混合张量 $T^{\cdots}_{\cdots}$．

定义 3.84 设 $\xi\in\mathcal{T}_q(V)$，如果交换任意两个自变宗量位置（见定义3.82），ξ 值不变，则称 ξ 是**对称**的 q 阶协变张量．如果交换任意两个自变宗量位置，ξ 值只改变符号，则称 ξ 是**反对称**的 q 阶协变张量．

我们用二阶协变张量来说明上面的定义，对称是指对于任意非零的逆变矢量 u,v，都有 $\xi(u,v)=\xi(v,u)$；反对称是指对于任意非零的逆变矢量 u,v，都有 $\xi(u,v)=-\xi(v,u)$．

用 $\mathscr{S}(q)$ 表示 q 个不同元素的置换群（见23页例2.23）．设 $\sigma\in\mathscr{S}(q)$，可定义符号函数 $\operatorname{sign}(\sigma)$ 为：

$$\operatorname{sign}(\sigma)\overset{def}{=}\begin{cases}+1, & \text{如果 } \sigma \text{ 是偶置换;}\\ -1, & \text{如果 } \sigma \text{ 是奇置换.}\end{cases}\tag{3.8-1}$$

很明显，有 $\operatorname{sign}(\sigma\circ\tau)=\operatorname{sign}(\sigma)\cdot\operatorname{sign}(\tau),\ \forall\sigma,\tau\in\mathscr{S}(q)$．

命题 3.85 设 $\xi\in\mathcal{T}_q(V)$，那么，ξ 是对称张量的充要条件是 ξ 的分量关于各个指标是对称的，即 $\xi_{i_1\cdots i_q}=\xi_{i_{\sigma(1)}\cdots i_{\sigma(q)}}$．$\xi$ 是反对称张量的充要条件是 ξ 的分量关

于各个指标是反对称的，即 $\mathrm{sign}(\sigma)\cdot\xi_{i_1\cdots i_q}=\xi_{i_{\sigma(1)}\cdots i_{\sigma(q)}}$. 其中 σ 是置换群 $\mathscr{S}(q)$ 中任意群元.

证明 . 设 ξ 的展开式（参见式(3.7-4)）为 $\xi=\xi_{i_1\cdots i_q}\boldsymbol{\epsilon}^{*i_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{\epsilon}^{*i_q}$，任取 q 个非零逆变矢量 v_j（指标 j 只是标记不同的矢量，不是分量标记；$(v_j)^{i_j}$ 中的上标 i_j 才是分量），则

$$\xi(v_1,\cdots,v_q)=\xi_{i_1\cdots i_q}(v_1)^{i_1}\cdots(v_q)^{i_q}, \tag{3.8-2}$$

显然上式与基矢选择无关. $\forall\sigma\in\mathscr{S}(q)$，定义3.84中交换任意自变宗量是指：

$$\big(\sigma(\xi)\big)(v_1,\cdots,v_q)\equiv\xi(v_{\sigma(1)},\cdots,v_{\sigma(q)}). \tag{3.8-3}$$

依据上式，将 σ 作用在式(3.8-2)两边，有（记 $\tau=\sigma^{-1}$）

$$\begin{aligned}&\big(\sigma(\xi)\big)(v_1,\cdots,v_q)=\xi(v_{\sigma(1)},\cdots,v_{\sigma(q)})=\xi_{i_1\cdots i_q}(v_{\sigma(1)})^{i_1}\cdots(v_{\sigma(q)})^{i_q}\\&=\xi_{i_1\cdots i_q}(v_1)^{i_{\tau(1)}}\cdots(v_q)^{i_{\tau(q)}}=\xi_{i_{\sigma(1)}\cdots i_{\sigma(q)}}(v_1)^{i_1}\cdots(v_q)^{i_q}.\end{aligned} \tag{3.8-4}$$

有了上述准备，可以开始证明命题了.

若 ξ 是对称的（等价于 $\xi(v_1,\cdots,v_q)=\xi(v_{\sigma(1)},\cdots,v_{\sigma(q)})$），则从式(3.8-2)和式(3.8-4) 可知 $\xi_{i_1\cdots i_q}=\xi_{i_{\sigma(1)}\cdots i_{\sigma(q)}}$. 反之，如果有 $\xi_{i_1\cdots i_q}=\xi_{i_{\sigma(1)}\cdots i_{\sigma(q)}}$，那么从从式(3.8-2)和(3.8-4)也可得到 $\xi(v_1,\cdots,v_q)=\xi(v_{\sigma(1)},\cdots,v_{\sigma(q)})$.

如果 ξ 是反对称的（等价于 $\xi(v_1,\cdots,v_q)=\mathrm{sign}(\sigma)\cdot\xi(v_{\sigma(1)},\cdots,v_{\sigma(q)})$），则从式 (3.8-2) 和 (3.8-4) 可知 $\xi_{i_1\cdots i_q}=\mathrm{sign}(\sigma)\cdot\xi_{i_{\sigma(1)}\cdots i_{\sigma(q)}}$. 反之，如果有 $\xi_{i_1\cdots i_q}=\mathrm{sign}(\sigma)\cdot\xi_{i_{\sigma(1)}\cdots i_{\sigma(q)}}$，那么从从式 (3.8-2) 和 (3.8-4)也可得到 $\xi(v_1,\cdots,v_q)=\mathrm{sign}(\sigma)\cdot\xi(v_{\sigma(1)},\cdots,v_{\sigma(q)})$. 此处的表达式与命题中略有差别，读者能识别出两者本质上相同吗？ ■

命题3.85指出：用分量表达对称、反对称张量与定义3.84中的描述方式是等价的. 很多时候用分量语言来描述对称或反对称更为方便，比如下述定义：

定义 3.86 用圆括号表示对称，方括号表示反对称，定义如下：

$$\xi_{(i_1i_2\cdots i_q)}\overset{def}{=}\frac{1}{q!}\sum_{\sigma\in\mathscr{S}(q)}\xi_{i_{\sigma(1)}i_{\sigma(2)}\cdots i_{\sigma(q)}}, \tag{3.8-5}$$

$$\xi_{[i_1i_2\cdots i_q]}\overset{def}{=}\frac{1}{q!}\sum_{\sigma\in\mathscr{S}(q)}\mathrm{sign}(\sigma)\xi_{i_{\sigma(1)}i_{\sigma(2)}\cdots i_{\sigma(q)}}. \tag{3.8-6}$$

给出几个常用的例子.

$$\xi_{(ab)}=\frac{1}{2}\big(\xi_{ab}+\xi_{ba}\big),\qquad \xi_{[ab]}=\frac{1}{2}\big(\xi_{ab}-\xi_{ba}\big). \tag{3.8-7}$$

$$\xi_{(abc)}=\frac{1}{6}\big(\xi_{abc}+\xi_{bca}+\xi_{cab}+\xi_{acb}+\xi_{bac}+\xi_{cba}\big), \tag{3.8-8}$$

$$\xi_{[abc]}=\frac{1}{6}\big(\xi_{abc}+\xi_{bca}+\xi_{cab}-\xi_{acb}-\xi_{bac}-\xi_{cba}\big). \tag{3.8-9}$$

如果想让方括号（或圆括号）中某些参数不参与反对称（或对称）循环，可用下式表示

$$\xi_{[ij|kl|n]}. \tag{3.8-10}$$

上式表示 i,j,n 参与全反对称操作，而参数 k,l 不参与反对称操作.

与 m 级矩阵 $A=\{a_{ij}\}$ 的行列式（Determinant）定义很类似的另一个概念是（见式(3.4-18)并与之对比，只是所有乘积前的系数全部是 $+1$）：

例 3.87 积和式（Permanent），定义为：

$$\mathrm{perm}(A)=\sum_{j_1j_2\cdots j_m}(+1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_m)}a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{mj_m},\qquad \{j_1,\cdots,j_m\}\text{ 两两不同}.$$

例如两个低阶积和式为

$$\mathrm{perm}\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=ad+bc,\ \mathrm{perm}\begin{pmatrix}a&b&c\\d&e&f\\g&h&i\end{pmatrix}=aei+bfg+cdh+ceg+bdi+afh.$$

与行列式（见例3.56）相同，积和式也可看作多重线性函数. 量子物理中的费米子表示用行列式，玻色子表示则要用积和式. 上面的对称化（即圆括号）也可用积和式. 有关积和式内容就不再叙述了. ■

3.8.1 广义 Kronecker 记号

本小节约定：所有角标（如 $\{i\}$）跑动范围是 $1\leqslant\{i\}\leqslant m$；且 $q\leqslant m$.

通常的 **Kronecker 记号**是（一般情况下不区分这个记号的上下指标）：

$$\delta_{ij}\equiv\delta^{ij}\equiv\delta^i_j\overset{def}{=}\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j.\end{cases} \tag{3.8-11}$$

现引入**广义 Kronecker 记号**（广义记号需要区分上下指标）：

$$\delta^{i_1\cdots i_q}_{j_1\cdots j_q} \overset{def}{=} \begin{cases} +1, & i_1,\cdots,i_q \text{ 互不相同，且 } \{j\} \text{ 是 } \{i\} \text{ 偶置换;} \\ -1, & i_1,\cdots,i_q \text{ 互不相同，且 } \{j\} \text{ 是 } \{i\} \text{ 奇置换;} \\ 0, & \text{其它情形.} \end{cases} \tag{3.8-12}$$

根据定义，$\delta^{i_1\cdots i_q}_{j_1\cdots j_q}$ 关于上指标是反对称的，关于下指标也是反对称的．当广义 Kronecker 记号上下标是相同的内容，只是排列不同（即，恒不为零时），那么有

$$\delta^{i_1\cdots i_q}_{j_1\cdots j_q} = \operatorname{sign}\begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_q \\ j_1 & \cdots & j_q \end{pmatrix}. \tag{3.8-13}$$

如果广义 Kronecker 记号为零，那么置换记号 $\left(\begin{smallmatrix} i_1 & \cdots & i_q \\ j_1 & \cdots & j_q \end{smallmatrix}\right)$ 是没有定义的．当广义 Kronecker 记号恒不为零时，置换记号自然有定义，利用置换群元的乘法，那么必然有

$$\begin{aligned} \operatorname{sign}\begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_q \\ k_1 & \cdots & k_q \end{pmatrix} &= \operatorname{sign}\left[\begin{pmatrix} j_1 & \cdots & j_q \\ k_1 & \cdots & k_q \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_q \\ j_1 & \cdots & j_q \end{pmatrix}\right] \\ &= \operatorname{sign}\begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_q \\ j_1 & \cdots & j_q \end{pmatrix}\cdot\operatorname{sign}\begin{pmatrix} j_1 & \cdots & j_q \\ k_1 & \cdots & k_q \end{pmatrix} \\ \Longleftrightarrow\quad \delta^{i_1\cdots i_q}_{k_1\cdots k_q} &= \delta^{i_1\cdots i_q}_{j_1\cdots j_q}\cdot\delta^{j_1\cdots j_q}_{k_1\cdots k_q}. \qquad \text{重复指标 } \{j\} \text{ 不求和} \end{aligned} \tag{3.8-14}$$

再次强调，上式要求 $(i_1\cdots i_q)$、$(j_1\cdots j_q)$ 和 $(k_1\cdots k_q)$ 必须是满足定义(3.8-12)前两行，并且不满足第三行的整数．

命题 3.88 广义 Kronecker 记号有行列式表示：

$$\delta^{i_1\cdots i_q}_{j_1\cdots j_q} = \begin{vmatrix} \delta^{i_1}_{j_1} & \cdots & \delta^{i_1}_{j_q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \delta^{i_q}_{j_1} & \cdots & \delta^{i_q}_{j_q} \end{vmatrix}. \tag{3.8-15}$$

证明 . 根据行列式定义(3.4-18)直接计算上式右端得：

$$\delta^{i_1\cdots i_q}_{j_1\cdots j_q} = \sum_{\sigma\in\mathscr{S}(q)}(-1)^{\sigma(j_1\cdots j_q)}\delta^{i_1}_{\sigma(j_1)}\cdots\delta^{i_q}_{\sigma(j_q)}. \tag{3.8-16}$$

命题等价于证明上式．当指标 $(i_1,\cdots,i_q)$（或 $(j_1,\cdots,j_q)$）中有两个（或多个）相同时，由行列式的反对称性质可知，上式为零．与广义 Kronecker 记号第三行定义相符合．

下面只讨论 $(i_1,\cdots,i_q)$ 两两不等情形．若 $(j_1,\cdots,j_q)$ 有不同于 $(i_1,\cdots,i_q)$ 的元素时，比如 (i_1,i_2) 指标集是 $(1,2)$，而 (j_1,j_2) 指标集是 $(2,3)$，则(3.8-16)式中的积肯定包含有恒为零的 δ^i_j 项（如 $\delta^1_2\delta^2_3-\delta^1_3\delta^2_2$），所以上面行列式恒为零．与广义 Kronecker 记号第三行定义相符合．

所以，只需讨论指标集 $(j_1,\cdots,j_q)$ 全同于 $(i_1,\cdots,i_q)$ 的情形，两者差别只是排列不同．行列式的求和式共有 $q!$ 项，其中只有一项非零，即 $\delta^{i_1}_{i_1}\delta^{i_2}_{i_2}\cdots\delta^{i_q}_{i_q}$（重复指标不求和），其它项因 δ^i_j 记号的上下指标内容不同而为零．此非零项前的 $(-1)^{\sigma(j_1\cdots j_q)}$ 系数返回值与式(3.8-12)中的奇偶排列返回值相同．证毕． ■

参考上面的命题中的式(3.8-16)，式(3.8-17)几乎一望而知：

$$\delta^{i_1\cdots i_q}_{j_1\cdots j_q}=\sum_{\sigma\in\mathscr{S}(q)}\operatorname{sign}(\sigma)\,\delta^{i_1}_{\sigma(j_1)}\cdots\delta^{i_q}_{\sigma(j_q)}=\sum_{\sigma\in\mathscr{S}(q)}\operatorname{sign}(\sigma)\,\delta^{\sigma(i_1)}_{j_1}\cdots\delta^{\sigma(i_q)}_{j_q}, \tag{3.8-17}$$

$$=q!\delta^{i_1}_{[j_1}\cdots\delta^{i_q}_{j_q]}=q!\delta^{[i_1}_{j_1}\cdots\delta^{i_q]}_{j_q}. \tag{3.8-18}$$

参考定义3.86，式(3.8-17)可直接变为式(3.8-18)．利用(3.8-18)可证明下两式：

$$\frac{1}{q!}\delta^{i_1\cdots i_q}_{j_1\cdots j_q}T^{j_1\cdots j_q}=\delta^{[i_1}_{j_1}\cdots\delta^{i_q]}_{j_q}T^{j_1\cdots j_q}=T^{[i_1\cdots i_q]}, \tag{3.8-19}$$

$$\frac{1}{q!}\delta^{j_1\cdots j_q}_{i_1\cdots i_q}S_{j_1\cdots j_q}=\delta^{j_1}_{[i_1}\cdots\delta^{j_q}_{i_q]}S_{j_1\cdots j_q}=S_{[i_1\cdots i_q]}. \tag{3.8-20}$$

缩并运算中的方括号具有“传染性”（圆括号亦然，证明留给读者）．

$$S_{i_1\cdots i_q}T^{[i_1\cdots i_q]}=S_{i_1\cdots i_q}\,\frac{1}{q!}\delta^{i_1\cdots i_q}_{j_1\cdots j_q}\,T^{j_1\cdots j_q}=S_{[j_1\cdots j_q]}T^{j_1\cdots j_q}. \tag{3.8-21}$$

括号内增加异种括号恒为零，以及异种括号缩并恒为零（证明留给读者），例如

$$T_{(a[bc]d)}=0,\qquad T_{[a(bc)d]}=0;\qquad T_{(abc)}S^{[abc]}=0. \tag{3.8-22}$$

3.8.1.1 缩并

单重 Kronecker 记号的缩并是：

$$\delta^i_i\equiv\sum_{i=1}^m\delta^i_i=\sum_{i=1}^m 1=m. \tag{3.8-23}$$

上式中求和号下的重复指标 i 不再求和（即不是双重求和）；这是一个熟知的式子，广义 Kronecker 记号自然有与之对应的公式．我们先将广义 Kronecker 记号展开，把行列式(3.8-15)按最后一行将其展开，有

$$\begin{aligned}\delta^{i_1\cdots i_q}_{j_1\cdots j_q} &= (-)^{q+1}\delta^{i_q}_{j_1}\cdot\delta^{i_1\cdots i_{q-1}}_{j_2\cdots j_q}+(-)^{q+2}\delta^{i_q}_{j_2}\cdot\delta^{i_1\cdots i_{q-1}}_{j_1\hat{j}_2j_3\cdots j_q}+\cdots+(-)^{q+q}\delta^{i_q}_{j_q}\cdot\delta^{i_1\cdots i_{q-1}}_{j_1\cdots j_{q-1}}\\ &=\sum_{s=1}^{q}(-)^{q+s}\delta^{i_q}_{j_s}\cdot\delta^{i_1\cdots i_{q-1}}_{j_1\cdots\hat{j}_s\cdots j_q}.\end{aligned}\tag{3.8-24}$$

其中脱字符 $\hat{j}$ 表示没有这一项；第二行只是将第一行写成求和形式而已．令式(3.8-24)中左端项的 $i_q=j_q=k$，即令最后一项求和，得

$$\begin{aligned}\delta^{i_1\cdots i_{q-1}k}_{j_1\cdots j_{q-1}k} &= (-)^{q+1}\delta^{k}_{j_1}\cdot\delta^{i_1\cdots i_{q-1}}_{j_2\cdots j_{q-1}k}+(-)^{q+2}\delta^{k}_{j_2}\cdot\delta^{i_1\cdots i_{q-1}}_{j_1\hat{j}_2j_3\cdots j_{q-1}k}+\cdots+(-)^{q+q}\delta^{k}_{k}\cdot\delta^{i_1\cdots i_{q-1}}_{j_1\cdots j_{q-1}}\\ &=(-)^{q+1}\delta^{i_1\cdots i_{q-1}}_{j_2\cdots j_{q-1}j_1}+(-)^{q+2}\delta^{i_1\cdots i_{q-1}}_{j_1\hat{j}_2j_3\cdots j_{q-1}j_2}+\cdots+(-)^{q+q}m\cdot\delta^{i_1\cdots i_{q-1}}_{j_1\cdots j_{q-1}}\\ &=-\delta^{i_1\cdots i_{q-1}}_{j_1j_2\cdots j_{q-1}}-\delta^{i_1\cdots i_{q-1}}_{j_1j_2j_3\cdots j_{q-1}}-\cdots-\delta^{i_1\cdots i_{q-1}}_{j_1\cdots j_{q-1}}+m\cdot\delta^{i_1\cdots i_{q-1}}_{j_1\cdots j_{q-1}}\\ &=\big(m-(q-1)\big)\delta^{i_1\cdots i_{q-1}}_{j_1\cdots j_{q-1}}.\end{aligned}$$

我们将上式中的 $q-1$ 换成 q 便有

$$\delta^{i_1\cdots i_qk}_{j_1\cdots j_qk}=(m-q)\delta^{i_1\cdots i_q}_{j_1\cdots j_q}.\tag{3.8-25}$$

如果令上式中的 $i_q=j_q=l$，即求和，便有

$$\delta^{i_1\cdots i_{q-1}lk}_{j_1\cdots j_{q-1}lk}=(m-q)\delta^{i_1\cdots i_{q-1}l}_{j_1\cdots j_{q-1}l}=(m-q)\big(m-(q-1)\big)\delta^{i_1\cdots i_{q-1}}_{j_1\cdots j_{q-1}}.\tag{3.8-26}$$

由此式作递归易得

$$\begin{aligned}\delta^{i_1\cdots i_qi_{q+1}\cdots i_r}_{j_1\cdots j_qi_{q+1}\cdots i_r} &= \big(m-(r-1)\big)\cdots\big(m-(q+1)\big)(m-q)\delta^{i_1\cdots i_q}_{j_1\cdots j_q}\\ &=\frac{(m-q)!}{(m-r)!}\delta^{i_1\cdots i_q}_{j_1\cdots j_q},\qquad 0\leqslant q\leqslant r\leqslant m.\end{aligned}\tag{3.8-27}$$

此式是缩并运算的核心式，由它可得诸多公式；比如令式(3.8-27)中的 $q=0$，有

$$\delta^{i_1\cdots i_r}_{i_1\cdots i_r}=\frac{m!}{(m-r)!}.\tag{3.8-28}$$

当上式中的 $r=1$ 时，自然得到式(3.8-23)．当上式中的 $r=m$ 时，得到

$$\delta^{i_1\cdots i_m}_{i_1\cdots i_m}=m!.\tag{3.8-29}$$

令式(3.8-27)中的 $r=m$，则得

$$\delta^{i_1\cdots i_q i_{q+1}\cdots i_m}_{j_1\cdots j_q i_{q+1}\cdots i_m}=(m-q)!\delta^{i_1\cdots i_q}_{j_1\cdots j_q}. \tag{3.8-30}$$

令上式中的 $q=0$ 也能得到式(3.8-29).

3.8.1.2 乘积

这小节给出两个广义 Kronecker 记号乘积（及缩并）的计算公式.在式(3.8-14)中强调了：重复指标 $\{j\}$ 不求和；下式是对重复指标求和的公式：

$$\delta^{i_1\cdots i_q}_{k_1\cdots k_q}=\frac{1}{q!}\delta^{i_1\cdots i_q}_{j_1\cdots j_q}\cdot\delta^{j_1\cdots j_q}_{k_1\cdots k_q}. \qquad \text{重复指标 } \{j\} \text{ 求和} \tag{3.8-31}$$

证明：当上式中 $(i_1\cdots i_q)$ 不是 $(k_1\cdots k_q)$ 的置换时，那么等号两端必然都是零.当 $\{i\}$（或 $\{k\}$）内部满足定义(3.8-12)第三行时，那么上式等号两端必然也都是零. 由于指标集 $\{j\}$ 从 1 跑到 m，自然有些组合会令式(3.8-31)右端的两项之一（或者两项）为零，但这并不影响最终的求和结果（加上零，等于什么都没加!）.

所以我们只需考虑 $\{i\}$、$\{j\}$ 和 $\{k\}$ 满足定义(3.8-12)前两行的情形即可. 在这种情形下，求和哑标 $\{j\}$ 的各种排列中有 $q!$ 项使得右端非零，所以除以了系数 $q!$；因为哑标 $\{j\}$ 有上下两组，所以它们内部因交换产生的负号正好相消，因此每个非零项都是相等的. ■

令式(3.8-31)中的 $k_1=i_1,\cdots,k_q=i_q$，同时利用式(3.8-28)，有

$$\delta^{i_1\cdots i_q}_{j_1\cdots j_q}\cdot\delta^{j_1\cdots j_q}_{i_1\cdots i_q}=q!\frac{m!}{(m-q)!}. \tag{3.8-32}$$

式(3.8-31)是对全部指标缩并，下式给出只对部分指标缩并的公式：

$$\delta^{i_1\cdots i_q i_{q+1}\cdots i_r}_{j_1\cdots j_q j_{q+1}\cdots j_r}\cdot\delta^{j_{q+1}\cdots j_r}_{k_{q+1}\cdots k_r}=(r-q)!\ \delta^{i_1\cdots i_q i_{q+1}\cdots i_r}_{j_1\cdots j_q k_{q+1}\cdots k_r}, \qquad 0\leqslant q\leqslant r\leqslant m. \tag{3.8-33}$$

证明过程与式(3.8-31)的证明过程类似，请读者补齐. 令上式中的 $k_{q+1}=i_{q+1}$，……，$k_r=i_r$，并利用式(3.8-27)，有

$$\delta^{i_1\cdots i_q i_{q+1}\cdots i_r}_{j_1\cdots j_q j_{q+1}\cdots j_r}\cdot\delta^{j_{q+1}\cdots j_r}_{i_{q+1}\cdots i_r}=(r-q)!\ \delta^{i_1\cdots i_q i_{q+1}\cdots i_r}_{j_1\cdots j_q i_{q+1}\cdots i_r}=(r-q)!\frac{(m-q)!}{(m-r)!}\ \delta^{i_1\cdots i_q}_{j_1\cdots j_q}. \tag{3.8-34}$$

再给出一个重要公式：

$$\delta^{i_1\cdots i_q i_{q+1}\cdots i_r}_{j_1\cdots j_r}\cdot\delta^{j_1\cdots j_r}_{k_1\cdots k_q i_{q+1}\cdots i_r}=r!\frac{(m-q)!}{(m-r)!}\ \delta^{i_1\cdots i_q}_{k_1\cdots k_q}, \qquad 0\leqslant q\leqslant r\leqslant m. \tag{3.8-35}$$

证明过程与式(3.8-31)的证明过程类似，先缩并指标 $\{j\}$，得出因子 $r!$；再缩并指标 i_{q+1} 至 i_r，并用式(3.8-27)可得到最终的公式.

作为应用，下面证明：方括号内可以随意增减方括号（圆括号亦然）.

$$\begin{aligned}T_{[[i_1\cdots i_q]k_{q+1}\cdots k_r]} &\overset{3.8-20}{=\!=\!=} \frac{1}{r!}\delta^{l_1\cdots l_q l_{q+1}\cdots l_r}_{i_1\cdots i_q k_{q+1}\cdots k_r}\left(\frac{1}{q!}\delta^{j_1\cdots j_q}_{l_1\cdots l_q}T_{j_1\cdots j_q l_{q+1}\cdots l_r}\right)\\ &=\frac{1}{r!q!}\delta^{l_1\cdots l_q l_{q+1}\cdots l_r}_{i_1\cdots i_q k_{q+1}\cdots k_r}\delta^{j_1\cdots j_q}_{l_1\cdots l_q}\cdot T_{j_1\cdots j_q l_{q+1}\cdots l_r}\\ &\overset{3.8-33}{=\!=\!=} \frac{1}{r!}\delta^{j_1\cdots j_q l_{q+1}\cdots l_r}_{i_1\cdots i_q k_{q+1}\cdots k_r}T_{j_1\cdots j_q l_{q+1}\cdots l_r}\overset{3.8-20}{=\!=\!=} T_{[i_1\cdots i_q k_{q+1}\cdots k_r]}.\end{aligned}$$

由式(3.8-33)和(3.8-35)是缩并乘积的核心式，再结合上小节的缩并公式，可得到一些常用公式，不再列出.

行列式 设 $a=\{a^j_i\}$ 是 q 级矩阵，那么有行列式的多种表达方式

$$\begin{aligned}\det(a) &= \sum_{j_1\cdots j_q}(-1)^{\sigma(j_1\cdots j_q)}a^{j_1}_1\cdots a^{j_q}_q=\delta^{1\cdots q}_{j_1\cdots j_q}a^{j_1}_1\cdots a^{j_q}_q\\ &=\delta^{i_1\cdots i_q}_{j_1\cdots j_q}a^{j_1}_{i_1}\cdots a^{j_q}_{i_q} \qquad \text{指标 } \{i\} \text{ 取固定整数，不求和；} \{j\} \text{ 求和}\\ &=\frac{1}{q!}\delta^{i_1\cdots i_q}_{j_1\cdots j_q}a^{j_1}_{i_1}\cdots a^{j_q}_{i_q} \qquad \text{指标 } \{i\},\{j\} \text{ 求和}\end{aligned} \tag{3.8-36}$$

上式第一个等号“=”是行列式定义(3.4-18)；第二个“=”无非是将置换群元 σ 换个记号而已；第三个“=”中的 $(i_1,\cdots,i_q)$ 取固定整数并且不求和，它只是 $(1,\cdots,q)$ 的某种排列，比如 $(2,3,1,\cdots,q)$；第四个“=”令指标 $\{i\}$ 也求和，此时必然会产生 $q!$ 个相同项（见式(3.8-31)证明过程的讨论），故引入了该系数.

3.8.2 外积

外代数一般是把式(3.8-48d)当作定义，然后展开讨论，得到全部理论；这种讲法请参阅文献[70]§2.3；此种讲法虽然逻辑清晰、结构缜密，但对初学者而言显得有些晦涩、神秘. 下面我们采用另外一种讲法，虽然数学严格性、简洁性不如前者，但较易理解.

3.8.2.1 定义

为使公式简洁，以逆变矢量来讨论外积（可省掉角标上的星号），结论同样适用于协变矢量. 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 m 维矢量空间，取 V 的一组基 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_m$，

用这组基和实数“1”形式地作下列元素

$$\begin{array}{lll}
1, & \text{单位元素}, & \bigwedge^0(V)\equiv\mathbb{R};\\
\boldsymbol{\epsilon}_i, & i=1,2,\cdots,m, & \bigwedge^1(V)\equiv V;\\
\cdots\cdots, & \cdots\cdots, & \cdots\cdots;\\
\boldsymbol{\epsilon}_{i_1}\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{i_2}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{i_p}, & 1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_p\leqslant m, & \bigwedge^p(V);\\
\cdots\cdots, & \cdots\cdots, & \cdots\cdots;\\
\boldsymbol{\epsilon}_1\wedge\boldsymbol{\epsilon}_2\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_m, & \text{只有一个元素}, & \bigwedge^m(V)\cong\mathbb{R}.
\end{array}\tag{3.8-37}$$

上面一共有

$$\binom{m}{0}+\binom{m}{1}+\binom{m}{2}+\cdots+\binom{m}{m}=2^m \tag{3.8-38}$$

个元素，用这 2^m 个元素作为基底，数量乘法选为实数乘法，矢量加法为同种基矢前实系数相加，则可另构建一个实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个 2^m 维矢量空间 $G(V)$.

式(3.8-37)中引入一种新的符号“$\wedge$”，这个符号还没有确切定义；我们规定，对于基矢而言它还需满足如下条件：

$$\boldsymbol{\epsilon}_i\wedge\boldsymbol{\epsilon}_j=-\boldsymbol{\epsilon}_j\wedge\boldsymbol{\epsilon}_i, \tag{3.8-39a}$$

$$(\boldsymbol{\epsilon}_{i_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{i_r})\wedge(\boldsymbol{\epsilon}_{j_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{j_s})=\boldsymbol{\epsilon}_{i_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{i_r}\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{j_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{j_s}, \tag{3.8-39b}$$

$$(\boldsymbol{\epsilon}_i\wedge\boldsymbol{\epsilon}_j)\wedge\boldsymbol{\epsilon}_k=\boldsymbol{\epsilon}_i\wedge\boldsymbol{\epsilon}_j\wedge\boldsymbol{\epsilon}_k=\boldsymbol{\epsilon}_i\wedge(\boldsymbol{\epsilon}_j\wedge\boldsymbol{\epsilon}_k). \tag{3.8-39c}$$

上式中各角标满足 $1\leqslant\{i\},\{j\},\{k\}\leqslant m$，且没有大小关系约束. 因外积具有反对称性（见式(3.8-39a)），所以有（下式中的重复指标不求和）

$$\boldsymbol{\epsilon}_i\wedge\boldsymbol{\epsilon}_i=-\boldsymbol{\epsilon}_i\wedge\boldsymbol{\epsilon}_i=0,\qquad 1\leqslant i\leqslant m. \tag{3.8-40}$$

已在矢量空间 $G(V)$ 的基矢中引入一种**乘法**，下面继续规定其分配律和齐次性.

$$(a\alpha+b\beta)\wedge\gamma=a\alpha\wedge\gamma+b\beta\wedge\gamma,\quad \forall a,b\in\mathbb{R},\ \forall\alpha,\beta,\gamma\in G(V), \tag{3.8-41a}$$

$$\gamma\wedge(a\alpha+b\beta)=a\gamma\wedge\alpha+b\gamma\wedge\beta,\quad \forall a,b\in\mathbb{R},\ \forall\alpha,\beta,\gamma\in G(V). \tag{3.8-41b}$$

作了各种规定（式(3.8-39)和(3.8-41)）后，这种乘法称为**楔积**或**外积**. 定义了外积的 $G(V)$ 称为 Grassmann 代数或**外代数**.

我们把以 $\binom{m}{p}$ 个元素

$$\boldsymbol{\epsilon}_{i_1}\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{i_2}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{i_p},\qquad 1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_p\leqslant m \tag{3.8-42}$$

为基底的 $G(V)$ 的子空间记作 $\bigwedge^p(V)$，此空间中的任意元素可以表示为

$$\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_p\leqslant m} a^{i_1\cdots i_p}\boldsymbol{\epsilon}_{i_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{i_p},\qquad a^{i_1\cdots i_p}\in\mathbb{R}. \tag{3.8-43}$$

特别地记 $\bigwedge^0(V)\equiv\mathbb{R}$ 和 $\bigwedge^1(V)\equiv V$. 需注意 $\bigwedge^m(V)\cong\mathbb{R}$ 以及 $\bigwedge^{m-1}(V)\cong V$，即它们是同构关系（因为这些空间的维数相等）. 容易看出 $G(V)$ 可以表示成子空间的直和：

$$G(V)=\wedge^0(V)\oplus\wedge^1(V)\oplus\cdots\oplus\wedge^m(V). \tag{3.8-44}$$

命题 3.89 对于 V 中任意元素 x，有 $x\wedge x=0$.

证明 . 将 x 在基底上展开为 $x=a^i\boldsymbol{\epsilon}_i$，则有

$$x\wedge x=(a^i\boldsymbol{\epsilon}_i)\wedge(a^j\boldsymbol{\epsilon}_j)=\sum_{1\leqslant i<j\leqslant m}a^ia^j(\boldsymbol{\epsilon}_i\wedge\boldsymbol{\epsilon}_j+\boldsymbol{\epsilon}_j\wedge\boldsymbol{\epsilon}_i)\xlongequal{3.8-39a}0.$$

求和过程中注意指标的大小次序，以及应用乘法反对称. ■

注 3.90 由外积的反对称性，可知任意选择 $n(>m)$ 个基矢的外积恒为零（因为 n 个基矢必有重复），即 $\boldsymbol{\epsilon}_1\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_n=0$. 这说明式(3.8-39b)中作外积的基矢个数最多是 m 个.

3.8.2.2 反对称化表示

从上面可以看到，外代数表示中总要求 $\sum$ 的求和指标满足一定大小顺序，多有不便. 交换基矢中任意两个下标都会产生一个负号，这个属性说明此基底可以用广义 Kronecker 记号来表示. 我们先从两个基矢开始讨论.

$$\boldsymbol{\epsilon}_i\wedge\boldsymbol{\epsilon}_j\cong\boldsymbol{\epsilon}_i\otimes\boldsymbol{\epsilon}_j-\boldsymbol{\epsilon}_j\otimes\boldsymbol{\epsilon}_i\equiv\delta_{ij}^{kl}\boldsymbol{\epsilon}_k\otimes\boldsymbol{\epsilon}_l,\qquad 1\leqslant i,j\leqslant m. \tag{3.8-45}$$

上式中对 i 和 j 的大小关系不作要求. 符号“$\cong$”左右两端对下指标的交换产生相同的正负号；如果 $i=j$，那么“$\cong$”两端都是零. 因此“$\cong$”可理解为同构；既然同构，干脆将两者认同，或当成定义；推广到任意个下标，便是

$$\boldsymbol{\epsilon}_{i_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{i_p}\overset{def}{=}\delta_{i_1\cdots i_p}^{j_1\cdots j_p}\boldsymbol{\epsilon}_{j_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{\epsilon}_{j_p},\qquad 1\leqslant\{i\},\{j\}\leqslant m. \tag{3.8-46}$$

上式中对指标组 $\{i\}$ 间的大小关系不作要求. 如果指标组 $\{i\}$ 中有两个或多个指标相同，根据基矢外积的反对称性可知左端为零；由广义 Kronecker 记号的定义可得右端也为零.

外代数 $G(V)$ 子空间 $\bigwedge^p(V)$ 中任意矢量 α 可以表示为

$$\alpha = \sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_p\leqslant m} a^{i_1\cdots i_p}\boldsymbol{\epsilon}_{i_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{i_p}, \quad \text{规定 } \{i\} \text{ 序关系} \tag{3.8-47a}$$

$$= \frac{1}{p!}a^{j_1\cdots j_p}\boldsymbol{\epsilon}_{j_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{j_p}. \quad \text{不规定 } \{j\} \text{ 序关系} \tag{3.8-47b}$$

式(3.8-47b)中的因子 $\frac{1}{p!}$ 自然是因无序指标组 $\{j\}$ 重复求和而产生的；上两式要求分量 $a^{j_1\cdots j_p}$ 对上标全反对称．这是外代数中两个常用的展开表达式．

下面来介绍 $G(V)$ 两个子空间 $\bigwedge^p(V)$ 和 $\bigwedge^q(V)$ 中矢量的外积，设 $\alpha\in\bigwedge^p(V)$, $\beta\in\bigwedge^q(V)$，则

$$\alpha\wedge\beta = \left(\frac{1}{p!}a^{j_1\cdots j_p}\boldsymbol{\epsilon}_{j_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{j_p}\right)\wedge\left(\frac{1}{q!}b^{k_1\cdots k_q}\boldsymbol{\epsilon}_{k_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{k_q}\right) \tag{3.8-48a}$$

$$= \frac{1}{p!q!}a^{j_1\cdots j_p}b^{k_1\cdots k_q}(\boldsymbol{\epsilon}_{j_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{j_p})\wedge(\boldsymbol{\epsilon}_{k_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{k_q}) \tag{3.8-48b}$$

$$= \frac{1}{p!q!}a^{j_1\cdots j_p}b^{k_1\cdots k_q}\delta^{i_1\cdots i_p l_1\cdots l_q}_{j_1\cdots j_p k_1\cdots k_q}(\boldsymbol{\epsilon}_{i_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{\epsilon}_{i_p}\otimes\boldsymbol{\epsilon}_{l_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{\epsilon}_{l_q}) \tag{3.8-48c}$$

$$= \frac{(p+q)!}{p!q!}a^{j_1\cdots j_p}b^{k_1\cdots k_q}\boldsymbol{\epsilon}_{[j_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{\epsilon}_{j_p}\otimes\boldsymbol{\epsilon}_{k_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{\epsilon}_{k_q]}. \tag{3.8-48d}$$

上式给出了 $\alpha\wedge\beta\in\bigwedge^{p+q}(V)$ 的几种常用表达式，尤其式(3.8-48d)常被当作外积定义．从式(3.8-48b)我们还可以得到：

$$\begin{aligned}\alpha\wedge\beta &= \frac{1}{p!q!}a^{j_1\cdots j_p}b^{k_1\cdots k_q}(\boldsymbol{\epsilon}_{j_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{j_p})\wedge(\boldsymbol{\epsilon}_{k_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{k_q})\\ &= \frac{1}{p!q!}a^{j_1\cdots j_p}b^{k_1\cdots k_q}(-)^{pq}(\boldsymbol{\epsilon}_{k_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{k_q})\wedge(\boldsymbol{\epsilon}_{j_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{j_p})\\ &= (-)^{pq}\beta\wedge\alpha.\end{aligned} \tag{3.8-49}$$

这是两个矢量外积对易公式，非常重要．

3.8.2.3 矢量变换

设 $\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_p$ 是空间 V 的一组矢量，那么它们可以用基矢组 $\{\boldsymbol{\epsilon}\}$ 展开：

$$\boldsymbol{\eta}_i = \boldsymbol{\epsilon}_j a^j_{\cdot i}, \qquad i=1,\cdots,p, \quad p\leqslant m; \quad 1\leqslant j\leqslant m. \tag{3.8-50}$$

其中，$a^j_{\cdot i}$ 是 $m\times p$ 级矩阵．作矢量组 $\{\boldsymbol{\eta}\}$ 的外积，有

$$\boldsymbol{\eta}_1\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\eta}_p = a^{j_1}_{\cdot 1}\cdots a^{j_p}_{\cdot p}\boldsymbol{\epsilon}_{j_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{j_p}, \qquad \text{指标组 } \{j\} \text{ 是无序的，且求和}$$

$$= a^{j_1}_{\cdot 1}\cdots a^{j_p}_{\cdot p}\cdot \delta^{i_1\cdots i_p}_{j_1\cdots j_p}\cdot \boldsymbol{\epsilon}_{i_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{i_p}, \qquad 1\leqslant i_1<\cdots<i_p\leqslant m$$

$$= \sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_p\leqslant m}\begin{vmatrix} a^{i_1}_{\cdot 1} & \cdots & a^{i_p}_{\cdot 1}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ a^{i_1}_{\cdot p} & \cdots & a^{i_p}_{\cdot p}\end{vmatrix}\boldsymbol{\epsilon}_{i_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_{i_p}. \tag{3.8-51}$$

上式第二个等号将无序排列的 $\{j\}$ 换成有序排列组 $\{i\}$，交换下标产生的负号体现在广义 Kronecker 符号中；第三个等号无非是行列式定义. 有了这个公式可以证明如下命题：

命题 3.91 V 中矢量组 $\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_p$ 是线性无关的充要条件是 $\boldsymbol{\eta}_1\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\eta}_p\neq 0$.

证明 . 若 $\boldsymbol{\eta}_1\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\eta}_p\neq 0$，则可知式(3.8-51)的诸多行列式中至少有一个不为零，这说明矩阵 $\{a^i_{\cdot j}\}$ 的秩等于 p；从式(3.8-50)可知矢量组 $\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_p$ 线性无关.

反之，如果矢量组 $\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_p$ 线性无关，那么矩阵 $\{a^i_{\cdot j}\}$ 的秩等于 p，因此它至少有一个 p 级子行列式不为零，所以 $\boldsymbol{\eta}_1\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\eta}_p\neq 0$. ■

注 3.92 令上面命题中的 $p=m$，当行列式 $\det(a^i_{\cdot j})\neq 0$ 时，矢量组 $\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_m$ 可当作线性空间 V 的一组基矢，并且有 $\boldsymbol{\eta}_1\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\eta}_m=\det(a^i_{\cdot j})\boldsymbol{\epsilon}_1\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}_m$；选择 $\det(a^i_{\cdot j})>0$ 可保证两组基矢 $\{\epsilon\}$ 和 $\{\eta\}$ 定向相同（定向定义见 §5.5）.

例子 这小节用 $\mathbb{R}$ 上三维矢量空间 V 来把上面一些理论具体化，将有助于理解问题；既然是三维空间，我们用更常见的字母 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\}$ 来表示基矢. 依照前面讨论，外代数可表示成

$$G(V)=V^0\oplus V^1\oplus V^2\oplus V^3. \tag{3.8-52}$$

其中有同构关系（见定理3.21）：

$$V^3\cong V^0\equiv\mathbb{R};\qquad V^2\cong V^1\equiv V. \tag{3.8-53}$$

$V^0\equiv\mathbb{R}$ 中的元素是纯数，可看作标量；我们生活的空间可看成 V 中的矢量，基矢是 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\}$；$V^2$ 同构于 V，其基矢是 $\{\boldsymbol{e}_1\wedge\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_2\wedge\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_1\wedge\boldsymbol{e}_3\}$；$V^3$ 同构于 $\mathbb{R}$，其基矢是 $\{\boldsymbol{e}_1\wedge\boldsymbol{e}_2\wedge\boldsymbol{e}_3\}$. 有鉴于此，在三维空间中，我们只需要研究标量与矢量就足够了；无需研究 V^2 和 V^3.

留几个问题给读者以加深理解：取 $m=3,p=2$，读者可将式(3.8-51)详细写出来；将式(3.8-47)展开.

3.8.2.4 外型式

本小节在此之前，我们一直使用矢量空间 V，其实上面所有内容都可以换成其对偶空间 V^*（也是一种矢量空间）；也就是用协变矢量来作外积，这在微分几何中有重要应用.

定义 3.93 数域 $\mathbb{R}$ 上 m 维矢量空间 V 上 $\binom{0}{q}$ 型反对称张量称为 V 上的 q 次**外型式**，简称 q **型**[4]. 空间 V 上全体 q 次外型式记为 $\bigwedge^q(V^*)$.

依照前面讨论 $G(V^*)=\mathbb{R}\oplus V^*\oplus\bigwedge^2(V^*)\oplus\cdots\oplus\bigwedge^q(V^*)\oplus\cdots\oplus\bigwedge^m(V^*)$ 是空间 V^* 上的外代数.

设 V 的基矢为 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_m$，其对偶空间 V^* 的基矢为 $\boldsymbol{\epsilon}^{*1},\cdots,\boldsymbol{\epsilon}^{*m}$；$\alpha\in\bigwedge^q(V^*)$，那么对于任意 $v_1,\cdots,v_q\in V$ 有（注意用式(3.8-47)）

$$\begin{aligned}\alpha(v_1,\cdots,v_q)&=\frac{1}{q!}\alpha_{j_1\cdots j_q}\boldsymbol{\epsilon}^{*j_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}^{*j_q}(v_1^{i_1}\boldsymbol{\epsilon}_{i_1},\cdots,v_q^{i_q}\boldsymbol{\epsilon}_{i_q})\\&\xlongequal{3.8-46}\frac{1}{q!}\alpha_{j_1\cdots j_q}v_1^{i_1}\cdots v_q^{i_q}\cdot\delta^{j_1\cdots j_q}_{k_1\cdots k_q}\boldsymbol{\epsilon}^{*k_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{\epsilon}^{*k_q}(\boldsymbol{\epsilon}_{i_1},\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_{i_q})\\&=\frac{1}{q!}\alpha_{j_1\cdots j_q}v_1^{i_1}\cdots v_q^{i_q}\cdot\delta^{j_1\cdots j_q}_{i_1\cdots i_q}.\quad\{i,j\}\text{ 无大小次序}\end{aligned}\tag{3.8-54}$$

参考(3.8-51)中的计算过程，上式最后一步可以化成一个行列式（$\{j\}$ 有大小次序后，因子 $q!$ 消失），即

$$\alpha(v_1,\cdots,v_q)=\sum_{1\leqslant j_1<\cdots<j_q\leqslant m}\alpha_{j_1\cdots j_q}\begin{vmatrix}v_1^{j_1}&\cdots&v_1^{j_q}\\\vdots&\ddots&\vdots\\v_q^{j_1}&\cdots&v_q^{j_q}\end{vmatrix}.\tag{3.8-55}$$

式(3.8-54)或(3.8-55)称为 q 次外型式 α 的求值公式，需注意外型式 α 关于分量指标是全反对称的. 这个公式表明，外型式无非是一些行列式的线性组合；同时也表明了外代数和行列式的密切关系. 式(3.8-55)一个典型的特例是：

$$\boldsymbol{\epsilon}^{*j_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{\epsilon}^{*j_q}(\boldsymbol{\epsilon}_{i_1},\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_{i_q})=\delta^{j_1\cdots j_q}_{i_1\cdots i_q}.\tag{3.8-56}$$

几个定理 首先给出 Cartan 引理.

[4]英文“form”在这里被翻译成“型式”，而不是“形式”；主要是后者意义太多了，容易误解.

定理 3.94 设 n 维线性空间 V 中有两组矢量 $v_1,\cdots,v_r$ 和 $w_1,\cdots,w_r$，其中 $1\leqslant r\leqslant n$；这两组矢量满足

$$\sum_{\alpha=1}^{r} v_\alpha\wedge w_\alpha=0. \tag{3.8-57}$$

如果矢量组 $v_1,\cdots,v_r$ 线性无关，那么 w_α 可以表示成它们的线性组合

$$w_\alpha=\sum_{\beta=1}^{r} c_{\alpha\beta}v_\beta,\quad 1\leqslant\alpha\leqslant r,\qquad \text{并且}\quad c_{\alpha\beta}=c_{\beta\alpha}. \tag{3.8-58}$$

证明 . 因矢量组 $v_1,\cdots,v_r$ 线性无关，可将其扩充成 V 的一组基矢量

$$v_1,\cdots,v_r,v_{r+1},\cdots,v_n.$$

矢量 w_α 自然可以用其展开：

$$w_\alpha=\sum_{\beta=1}^{r} c_{\alpha\beta}v_\beta+\sum_{i=r+1}^{n} c_{\alpha i}v_i. \tag{3.8-59}$$

将上式代入式(3.8-57)得

$$\begin{aligned}0&=\sum_{\alpha=1}^{r} v_\alpha\wedge\left(\sum_{\beta=1}^{r} c_{\alpha\beta}v_\beta+\sum_{i=r+1}^{n} c_{\alpha i}v_i\right)=\sum_{\alpha,\beta=1}^{r} c_{\alpha\beta}v_\alpha\wedge v_\beta+\sum_{\alpha=1}^{r}\sum_{i=r+1}^{n} c_{\alpha i}v_\alpha\wedge v_i\\&=\sum_{1\leqslant\alpha<\beta\leqslant r}(c_{\alpha\beta}-c_{\beta\alpha})v_\alpha\wedge v_\beta+\sum_{\alpha=1}^{r}\sum_{i=r+1}^{n} c_{\alpha i}v_\alpha\wedge v_i\end{aligned}$$

由于 $\{v_i\wedge v_j,\ 1\leqslant i<j\leqslant n\}$ 是 $\wedge^2(V)$ 的一个基底，因此由上式可以得到

$$c_{\alpha\beta}-c_{\beta\alpha}=0,\qquad c_{\alpha i}=0. \tag{3.8-60}$$

将此式带回式(3.8-59)，便证明了 Cartan 引理，即式(3.8-58). ■

定理 3.95 设 n 维线性空间 V 中有线性无关矢量组 $v_1,\cdots,v_r$；w 是 V 上 p 次外矢量，即 $w\in\bigwedge^p(V)$. 那么，存在 $\psi_1,\cdots,\psi_r\in\bigwedge^{p-1}(V)$，使得

$$w=v_1\wedge\psi_1+v_2\wedge\psi_2+\cdots+v_r\wedge\psi_r \tag{3.8-61}$$

成立的充分必要条件是

$$v_1\wedge v_2\wedge\cdots\wedge v_r\wedge w=0. \tag{3.8-62}$$

证明 . 式(3.8-61)通常被记为 $w \equiv 0\big(\mathrm{mod}(v_1,\cdots,v_r)\big)$.

先证“⇒”. 如果式(3.8-61)成立，那么

$$v_1\wedge\cdots\wedge v_r\wedge w = v_1\wedge\cdots\wedge v_r\wedge\big(v_1\wedge\psi_1+\cdots+v_r\wedge\psi_r\big)=0. \tag{3.8-63}$$

再证“⇐”. 因矢量组 $v_1,\cdots,v_r$ 线性无关，可将其扩充成 V 的一组基矢

$$v_1,\cdots,v_r,v_{r+1},\cdots,v_n.$$

p 次外矢量 w 自然可以用其展开：

$$w=\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_p\leqslant n} w^{i_1\cdots i_p}v_{i_1}\wedge\cdots\wedge v_{i_p}. \tag{3.8-64}$$

当 $r+p>n$ 时，式(3.8-62)自动成立. 如果式(3.8-64)中基矢 $v_{i_1}\wedge\cdots\wedge v_{i_p}$ 在 $v_{r+1},\cdots,v_n$ 中有重复选择，那么该项必为零；我们只考虑在 $v_{r+1},\cdots,v_n$ 中选择不重复. 因为 $p>n-r$，所以基矢 $v_{i_1}\wedge\cdots\wedge v_{i_p}$ 至少含有 $v_1,\cdots,v_r$ 中的一项，也就是式(3.8-61)成立.

下面只考虑 $r+p\leqslant n$ 情形. 借用式(3.8-64)展开式(3.8-62)，有

$$0=v_1\wedge\cdots\wedge v_r\wedge w=\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_p\leqslant n} w^{i_1\cdots i_p}v_1\wedge\cdots\wedge v_r\wedge v_{i_1}\wedge\cdots\wedge v_{i_p}. \tag{3.8-65}$$

上式中的基矢量

$$\{v_1\wedge\cdots\wedge v_r\wedge v_{i_1}\wedge\cdots\wedge v_{i_p}\},\qquad r+1\leqslant i_1<\cdots<i_p\leqslant n \tag{3.8-66}$$

是外矢量空间 $\bigwedge^{r+p}(V)$ 基底的一部分；（由于式(3.8-62)）故式(3.8-65)意味着

$$w^{i_1\cdots i_p}=0,\qquad r+1\leqslant i_1<\cdots<i_p\leqslant n. \tag{3.8-67}$$

这说明，只有当 i_1 只在 $\{1,\cdots,r\}$ 取值时，$w^{i_1\cdots i_p}$ 才可能不为零. 于是

$$w=\sum_{j=1}^{r}v_j\wedge\left(\sum_{j<i_2<\cdots<i_p\leqslant n} w^{ji_2\cdots i_p}v_{i_2}\wedge\cdots\wedge v_{i_p}\right). \tag{3.8-68}$$

上式满足定理要求. ■

以上几个定理中的矢量换成对偶矢量，结论仍旧成立.

练习 3-6 证明式(3.8-21)对圆括号也正确.

练习 3-7 证明式(3.8-22).

练习 3-8 参考式(3.8-24)，用第一行或第一列展开行列式.

练习 3-9 请阅读陈省身和陈维桓 [70, §2.3]中外积的讲法.

3.9 抽象指标记号

从前面章节可以看到，如果有线性空间两个矢量 β 和 ξ，数学家习惯用符号 $\beta\cdot\xi$ 或 (β,ξ) 或 $\langle\beta,\xi\rangle$ 来表示两个矢量的内积；数学家的表示有一个好处是不涉及分量，也就是不必事先选择一套基矢；这是几何或代数语言，是现代数学习惯表示方法（如 §3.7，或见文献[70]）. 而物理学家更习惯用分量求和 $\beta^r\xi_r$ 来表示内积，这需要事先选好一套基矢（或者坐标系）；当从一套基矢变换到另一套基矢时，这些分量会发生变化. 然而，具体计算必然要先选择基矢，再使用分量，这是无法避免的；如果坚持使用 §3.7表示法，有些复杂的计算往往无法处理. 这被视为在数学家和物理学家间的符号表示冲突.

Penrose[49]Ch. 2发明了抽象指标记号（abstract index notation）用来表示张量与旋量，大体可以减少上述冲突. 与 §3.7表示法相比，抽象指标法能够显示张量的类型，同时可清楚地表明缩并等运算. 而与分量表示法不同，抽象指标法与特定的基底无关，可以表示出张量等式. 下面介绍这种张量表示方法. [5]

甲 求和约定（见46页脚注3）继续有效，且求和哑标必须一上一下，否则错误. 明确写出求和号时，求和约定失效. 小写字母 m 只用来表示流形 M 的维数或物质质量，不作求和哑标使用. 求和哑标一般是 i,j,k,l,n,p,q,r,s,t 等以及所有希腊字母. 在微分几何书籍中，哑标（i,μ 等）求和范围一般从“1”开始计数. 在相对论书籍中，一般约定希腊字母 $\alpha,\beta,\cdots$ 等从“0”计数到“3”，第“0”维表示时间；拉丁字母 $i,j,\cdots$ 等从“1”计数到“3”，表示纯空间.

乙 $\binom{p}{q}$ 型张量用带有 p 个上标和 q 个下标的字母表示，上下标均用小写拉丁字母[6]（即 $abcdef\cdots$，一般不会超过“f”），它们用来指明张量类型，称为抽象指标. 比如用 v^a（上标）表示矢量空间中的矢量，ω_a（下标）表示对偶空间的矢量，T^{ab}_c 表示 $\binom{2}{1}$ 型张量，等等. 这种表示方式与分量表示方法很像，但是这里的上下标不代表分量，不能谈及 $a=1$ 或 $a=2$ 的问题，它只是抽象地表示是何种张量. [7] 写等式时需要注意“指标平衡”，例如可写成 $u^a+v^a=w^a$ 或 $u^b+v^b=w^b$，但不能写作 $u^a+v^b=w^a$.

---

[5]这里采用 Wald [62, §2.4, §3.4b]书中的表示方法；中文介绍可参见文献[77]§2.6.

[6]Penrose, Rindler [49, Ch. 2]书籍采用的是希腊字母. 他们书中求和例子 $V^\alpha=V^{\boldsymbol{\alpha}}\delta^\alpha_{\boldsymbol{\alpha}}$（见 Eq. (2.3.5)），粗罗马字体的 $\boldsymbol{\alpha}$ 表示求和哑标，普通字体的 α 表示抽象指标. 可见，这种差别很细微，容易引起误解.

[7]在分量表示法中可以谈及分量指标具体的数值，比如可以说矢量 ξ 在基矢组展开后的分量是 ξ^i，在此处可以谈及 i 是等于 1 还是等于 2，这表示 ξ 的第 1 分量及第 2 分量.

丙 通常会省略张量积记号“⊗”. 例如在 §3.7表示法中有 $T\in\mathcal{T}^2_1(V)$ 和 $S\in\mathcal{T}^1_1(V)$，则 $T\otimes S$ 在抽象指标法中记作 $T^{ab}_cS^d_e$；当然记成 $T^{ab}_c\otimes S^d_e$ 也没有任何问题. 显然，§3.7记号**不能**表明张量类型，需另外声明；而抽象指标记号**能**清晰表明张量类型，这是抽象指标记号最重要的优点.

丁 基矢也是通常的矢量（或对偶矢量），本可以与乙中相同，但是基矢一般是一组矢量，不是单个的，所以给基矢量增加一个内指标. 举例说明，先叙述 §3.7表示方法，张量在基矢组的展开式为 $T=T^{\mu\nu}_\rho\boldsymbol{e}_\mu\otimes\boldsymbol{e}_\nu\otimes\boldsymbol{e}^{*\rho}$，其中 $\boldsymbol{e}_\mu$ 是基矢，$\boldsymbol{e}^{*\rho}$ 是对偶基矢. 在抽象指标中，将基矢 $\boldsymbol{e}_\mu$ 记为 $(e_\mu)^a$，将对偶基矢 $\boldsymbol{e}^{*\rho}$ 记为 $(e^\rho)_a$；即增加一个圆括号，内部指标表示是第几个基矢，外部是抽象指标；因对偶矢量 $(e^\rho)_a$ 的外指标已表明它是对偶矢量，所以无需写成 $(e^{*\rho})_a$ [8]. 现在，§3.7表示法中的张量用抽象指标表示为：$T^{ab}_c=T^{\mu\nu}_\rho(e_\mu)^a(e_\nu)^b(e^\rho)_c$. 基矢量 $(e_\mu)^a$ 的内指标表示第 μ 个基矢，可以问及 $\mu=1$ 还是 $\mu=2$ 的问题；张量 T^{ab}_c 的分量 $T^{\mu\nu}_\rho$ 指标 μ,ν,ρ 自然也可以被问此问题.

戊 缩并运算. 以 $\binom{1}{1}$ 型张量 T 缩并为例，在 §3.7记号中写作 $C^1_1T=T(\boldsymbol{e}^{*\mu};\boldsymbol{e}_\mu)=T^\mu_\mu$，在抽象指标法中可简单地记作 T^a_a. 再比如 $\binom{2}{1}$ 型张量的缩并，$C^1_1T=T(\boldsymbol{e}^{*\mu};\cdot;\boldsymbol{e}_\mu)\cong T^{ab}_a$，$C^2_1T=T(\cdot;\boldsymbol{e}^{*\mu};\boldsymbol{e}_\mu)\cong T^{ab}_b$，等. 可见对于缩并运算抽象指标法更清晰. 用分量语言和抽象指标表示纯缩并运算在形式上是相同的，我们不严格区分它们.

己 分量表示. 用小写希腊字母（μ,ν 等）来表示张量分量[9]，既然是分量，自然可问及 $\mu=1$ 还是 $\mu=3$ 等问题. 由抽象指标形式通过缩并运算可以得到分量表达式：$T^{\mu\nu}_\rho=T^{ab}_c(e^\mu)_a(e^\nu)_b(e_\rho)^c$. 在戊中介绍了抽象指标的缩并，引入分量表示后，需要明确如果分量的上下指标相同也代表求和（即缩并），一般说来 $T^\mu_\mu\equiv T^a_a$. 有时候只缩并部分张量指标，比如 $T_{a\mu}=T_{ab}(e_\mu)^b$；但这种记号表示有可能会引起误解，尽量不用.

庚 第71页的“非对易性”中（以及注解3.72）讲述了一般情况下 $\alpha\otimes\beta(f,g)\neq\alpha\otimes\beta(g,f)$；在这种记号中，括号内 (f,g) 因子顺序表示作用顺序，当然不能随便交换. 在抽象指标记号中，将线性映射作用记为 $\alpha_a\beta_b(f^a,g^b)$，很多时候会将圆括号省略，简记为 $\alpha_a\beta_bf^ag^b$. 此时 $\alpha_a\beta_bf^ag^b=\beta_b\alpha_af^ag^b$ 是正确的，即带着抽象指标交换是允许的；因为上下标间的缩并表明了作用对象，不用 f,g 的顺序表

[8]除了基矢量使用圆括号之外，其它矢量组或对偶矢量组也要使用圆括号以区分内外指标，比如197页的联络型式(6.3-7). 圆括号的使用固然使指标区分得更加明显，但也让公式表述更加繁琐.

[9]也可约定小写拉丁字母来表示分量，比如 i,j,k,l 等，但一定要和抽象指标区分开来.

示作用对象．不对易性体现在 $\alpha_a\beta_b \neq \alpha_b\beta_a$．除此以外，一般说来 $T_{ab} \neq T_{ba}$，这种交换是不正确的；见第92页的脚注2．

辛 由于描述中采用了抽象指标记号，切矢量 v^a 和对偶矢量 ω_a 间的线性映射 $\omega_a(v^a)$ 可能会被简单地理解成缩并．这多少有些误解；比如后面我们会给出联络（∇_a，一种求导算符），虽然 $\nabla_a(v^a)$ 中包含缩并运算，但不是简单的缩并，还需要求导．也就是说线性映射 $\omega_a(v^a)$ 除了缩并还可能包含其它运算，比如求导、积分等；此时最好不要省略圆括号了．

壬 有些情形不宜使用抽象指标记号；比如见 §4.1.3；见112页注4.27；见143页注4.88；见179页注6.5；等等．同一章中，只采用同一记号，几乎不会混用．

癸 读者慢慢会体会到抽象指标记号的角标比用分量表示法还要繁杂，这对公式的具体表示带来诸多不便．如果读者你能深刻、准确理解抽象数学，抽象指标多少有些累赘，用 §3.7记号（与陈省身和陈维桓 [70]同）可能更好．当读者你对抽象数学认知有限时，抽象指标是有益的；这是笔者选用抽象指标的原因．

最后，我们对 §3.7记号、抽象指标记号、分量记号法作些评价．§3.7记号和抽象指标记号本身包括张量分量和张量的基矢，两者在这点是相同的；抽象指标记号的角标比 §3.7记号繁杂．而分量记号法不包含基矢，这使得此种记号中，比如 v^i、$T^\alpha{}_\beta$，既是分量又是张量，容易造成误解；一旦造成定义层面的误解，将会在微分几何（或张量分析）的认知中产生无法消除的错误．笔者大胆揣测：当初 Rodger Penrose 就是发现相关从业者对张量定义理解有偏差，遂发明抽象指标记号；此种记号完全消除了张量定义层面的误解．

表 3.1: 抽象指标对比 §3.7记号

导数名称	抽象指标	§3.7记号
自然基矢	$\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a$, $(\mathrm{d}x^j)_a$	$\frac{\partial}{\partial x^i}$, $\mathrm{d}x^j$
一般基矢	$(e_i)^a$, $(e^i)^a$; $(e^j)_a$, $(e_j)_a$	$\boldsymbol{e}_i$, $\boldsymbol{e}^i$; $\boldsymbol{e}^{*j}$, $\boldsymbol{e}^*_j$
张量积	$\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a \cdots (\mathrm{d}x^j)_b \cdots$	$\frac{\partial}{\partial x^i} \otimes \cdots \otimes \mathrm{d}x^j \otimes \cdots$
曲线 $\gamma(t)$ 切矢	$\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a\big\vert_{\gamma(0)}$	$\gamma'(0)$
度规（度量）	g_{ab}	g，$\langle\cdot,\cdot\rangle_g$

注 3.96 不同记号的更多表述可参见300页．

小结

本章主要目的是从代数学角度叙述张量定义；为此先描述线性空间、对偶空间的概念，进而讲解了双线性映射、多重线性映射；有了这些准备之后张量的代数定义水到渠成；然后讲述了外代数．最后引入了抽象指标记号，这种方式比较适合于物理学者．

需要强调：张量定义不需要度规（度量、内积等附加结构）．度规是 $\binom{0}{2}$ 型张量（场）；若在定义张量时用到度规，则多少有些循环定义的感觉．

本章内容主要取自文献[85]相应章节，如读者需要更多知识，可参考之．

第四章　微分流形

本章将介绍微分流形概念，这是微分几何的基础．接着介绍流形上的切矢量场、余切矢量场、张量场，然后叙述单参数变换群以及李导数．

如无特殊声明，本章及以后各章节只在实数域 $\mathbb{R}$ 上讨论问题．

4.1　平直的广义欧几里得空间

在正式描述弯曲的（指黎曼曲率非零）微分流形前，再对平直的（指黎曼曲率为零）广义欧几里得空间做些说明是大有裨益的．本节的概念可直接用到流形上的切空间，进而可用到流形论中．本节是连接上一章与微分流形的桥梁．

4.1.1　定义

定义 4.1 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 m 维线性空间，给定 V 上非退化的、对称的双线性函数 $g(\cdot,\cdot)\equiv\langle\cdot,\cdot\rangle$，那么 V 称为**广义欧几里得空间**，记为 (V,g)．

若式(3.4-14)中全是正号，则此空间称为**欧几里得空间**，记为 (V,δ)．

若式(3.4-14)中的正负号都不止一个，则是一般的不定度规空间．

若式(3.4-14)中只有一个负号，其余皆为正号（即存在基矢使得度量矩阵 η 非对角元为零，对角元有 1 个 -1、$m-1$ 个 1），则此空间称为**广义 Minkowski 空间**，记为 (V,η)．特别地，当度规 $\eta=\mathrm{diag}(-1,1,1,1)$ 时，空间 $\mathbb{R}^4_1$ 便是物理上的 **Minkowski 时空**，记为 $(\mathbb{R}^4_1,\eta)$；η 称为 **Lorentz 度规**或闵氏度规．[1]

[1] 时空是较物理的称呼，空间是偏数学的叫法；两者等价，不必严格区分．$\mathbb{R}^4_1$ 的上指标表示空间的总维数，下标表示负惯性指数（见式(3.4-14)）个数．

如果广义欧氏空间 (V,g) 的基矢 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\epsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_n$ 满足

$$g(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\epsilon}_j)=\begin{cases}+1\text{ 或 }-1, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}\tag{4.1-1}$$

则称基矢组 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\boldsymbol{\epsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_n$ 是广义欧氏空间 (V,g) 的**正交归一**基矢量. 上式仍旧使用了 §3.7记号，下面详细介绍如何用抽象指标表示度规张量.

4.1.2 平直空间度规张量的表示

给定数域 $\mathbb{R}$ 上线性空间 V，基矢组是 $(e_\mu)^a$；它的对偶空间是 V^*，基矢组是 $(e^\mu)_a$. 度规是一个 $\binom{0}{2}$ 型对称、非退化张量，它的抽象指标表示可写为

$$g_{ab}=g_{\mu\nu}(e^\mu)_a(e^\nu)_b,\quad g_{ab}=g_{ba};\quad g_{\mu\nu}=g_{ab}(e_\mu)^a(e_\nu)^b,\quad g_{\mu\nu}=g_{\nu\mu}.\tag{4.1-2}$$

因度规是非退化的，上式中矩阵 $g_{\mu\nu}$ 的逆一定存在，记为 $g^{\mu\nu}\equiv(g_{\mu\nu})^{-1}$，而且这个逆矩阵一定是对称的，它们有如下关系

$$g_{\mu\nu}g^{\nu\rho}=\delta^\rho_\mu=g^{\rho\nu}g_{\nu\mu}.\tag{4.1-3}$$

给此逆矩阵配上基矢，即

$$g^{ab}=g^{\mu\nu}(e_\mu)^a(e_\nu)^b,\quad g^{ab}=g^{ba};\quad g^{\mu\nu}=g^{ab}(e^\mu)_a(e^\nu)_b,\quad g^{\mu\nu}=g^{\nu\mu}.\tag{4.1-4}$$

则 g^{ab} 是一个 $\binom{2}{0}$ 型非退化、对称张量，它称为 g_{ab} 的**共轭张量**.

基矢和对偶基矢间的关系见46页式(3.3-5)，用抽象指标可表示为

$$(e_\mu)^a(e^\nu)_a=\delta^\nu_\mu,\qquad \delta^\nu_\mu\text{ 是 Kronecker 记号.}\tag{4.1-5}$$

需要注意：上式与度规是否正定无关，Lorentz 度规下的公式也如上所示.

度规张量有了协变与逆变两种形式，经计算可得

$$\begin{aligned}&g^{ab}g_{bc}=g^{\mu\nu}(e_\mu)^a(e_\nu)^b\ g_{\rho\sigma}(e^\rho)_b(e^\sigma)_c=g^{\mu\nu}g_{\rho\sigma}(e_\mu)^a(e^\sigma)_c\left[(e^\rho)_b(e_\nu)^b\right]\\&=g^{\mu\nu}g_{\rho\sigma}(e_\mu)^a(e^\sigma)_c\cdot\delta^\rho_{\cdot\nu}=g^{\mu\nu}g_{\nu\sigma}(e_\mu)^a(e^\sigma)_c=\delta^\mu_{\cdot\sigma}(e_\mu)^a(e^\sigma)_c=\delta^a_{\cdot c}.\end{aligned}\tag{4.1-6}$$

上式最后一行便是 $\delta^a_{\cdot c}$ 的抽象指标表达式.

线性空间 V 中指定了度规张量 g_{ab} 后，由52页定理3.40可知，度规 g_{ab} 可将矢量空间 V 自然同构于其对偶空间 V^*；即 $\forall u^b \in V$，那么必然存在唯一对偶矢量 $g_{ab}u^b \in V^*$ 与之相对应；既然是自然同构，那我们就直接将其记为 $u_a \equiv g_{ab}u^b$. 这样 u^a 可以看成矢量 $\mathbf{u}$ 的逆变形式，而 u_a 可以看成矢量 $\mathbf{u}$ 的协变形式；也就是，将它们看作同一矢量的不同表现形式.

还可以将度规作用理解成：升降指标. 比如

$$u_a = g_{ab}u^b, \quad w^a = g^{ab}w_b, \quad T^{ae}{}_{bf} = g^{ac}T_c{}^{ed}{}_f g_{db}.$$

除了对抽象形式的张量升降指标外，度规分量还可升降张量分量指标：

$$g^{\mu\nu}u_\nu = g^{ab}(e^\mu)_a(e^\nu)_b\ u_c(e_\nu)^c = g^{ab}(e^\mu)_a u_c \delta^c_b = g^{ab}u_b(e^\mu)_a = u^a(e^\mu)_a = u^\mu.$$

对于张量需要注意的是：当可以用度规升降指标时，协变指标和逆变指标是**不可以**混排的，需要区分前后. 两个混合型张量 $T^a_{\cdot b}$ 和 $T_b^{\cdot a}$ 是同一张量的不同形式；而 T^a_b 意义含混不明[2]. 二阶对称张量可以不严格区分上下指标的顺序，比如 $\delta^b_a \equiv \delta^b_{\cdot a} \equiv \delta^{\cdot b}_a$.

我们来看看二阶张量指标的排列方式代表什么. 因 $T^{ac} = T^a_{\cdot b}g^{bc}$，所以 T^{ac} 表示 Tg^{-1}，即矩阵 T 和度规逆变形式的乘积. 因 $T_{cb} = g_{ac}T^a_{\cdot b}$，所以它代表 gT，即度规协变形式与矩阵 T 的乘积. 最后，$T_b^{\cdot a} = g_{bc}T^c_{\cdot d}g^{da}$ 代表 gTg^{-1}，注意 $T_b^{\cdot a}$ 的行指标是在前面的 b，列指标是在后面的 a. 对于二阶张量来说，指标的先后顺序决定了度规矩阵是左乘还是右乘，矩阵左右乘法的结果一般是不同的. 可见在指定度规之后，协变、逆变指标不能混排；在之后的叙述中，我们将协变、逆变指标错开排列，给出预留空位.

在正定、正交归一基矢(4.1-1)下，有 $g^{\mu\nu} = g_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu}$，以及 $u^\mu = u_\mu$，此时不必区分逆变、协变. 但仅限于度规正定情形；比如上面的 Lorentz 度规（$\eta = \mathrm{diag}(-+++)$）情形下便没有 $u^\mu = u_\mu$.

我们记 $x_i \equiv g_{ij}x^j$，故一般情形下

$$\mathrm{d}x_i = \mathrm{d}(g_{ij}x^j) = \big(\mathrm{d}g_{ij}\big)x^j + g_{ij}\mathrm{d}x^j \ \neq\ g_{ij}\mathrm{d}x^j. \tag{4.1-7}$$

只有 g_{ij} 全部是常数的情形下才有 $\mathrm{d}x_i = g_{ij}\mathrm{d}x^j$.

[2]当没有定义度规时，指标不能升降. 协变（或逆变）内部不能混排；但协变、逆变是可以混排的，因为此时协变、逆变没有任何关系. 也就是说在没有指定度规的线性空间中，$T^a_{\cdot b} = T_b^{\cdot a} = T^a_b$ 表示同一意思.

本小节最后，我们引入两个记号（更详尽的讨论见 §8.3、§8.7）：

$$(e_\rho)_a \overset{def}{=} g_{ab}(e_\rho)^b = g_{\mu\rho}(e^\mu)_a \quad \text{对应} \quad \boldsymbol{e}^*_\rho \overset{def}{=} g_{\mu\rho}\boldsymbol{e}^{*\mu}, \tag{4.1-8a}$$

$$(e^\rho)^a \overset{def}{=} g^{ab}(e^\rho)_b = g^{\mu\rho}(e_\mu)^a \quad \text{对应} \quad \boldsymbol{e}^\rho \overset{def}{=} g^{\mu\rho}\boldsymbol{e}_\mu. \tag{4.1-8b}$$

4.1.3 矢量抽象化

前几章中已介绍如何抽象成代数的了，下面简要回顾一下．在 m 维欧氏空间 E^m 中建立一个正交归一标架 $\{O;\boldsymbol{e}_i\}$ [3]，O 是坐标原点．任意矢量都可以将其起点平移到原点 O，所以我们只需研究起点在原点的有向线段即可．对于点 $P\in E^m$ 对应着 m 元数组 $\{\lambda^i\}$ 使得 $\overrightarrow{OP}=\lambda^i\boldsymbol{e}_i$．这个 m 元数组 $(\lambda^1,\cdots,\lambda^m)$ 对应着 $\mathbb{R}^m$ 中的矢量；这样便把箭头抽象成了线性空间 $\mathbb{R}^m$ 中的矢量了，这个映射是双射．（注：E^m 是点的空间，$\mathbb{R}^m$ 是矢量空间．）

下面描述矢量如何由“箭头”过渡到微分几何中．在 E^m 取定正交归一标架 $\{O;\boldsymbol{e}_i\}$，设有 C^r 映射 $f:\mathbb{R}\to E^m$，则映射 f 可以表示成 m 个实函数 $x^1(t),\cdots,x^m(t)$，即

$$\overrightarrow{Of(t)} = x^i(t)\boldsymbol{e}_i, \qquad t\in\mathbb{R}. \tag{4.1-9}$$

通常把映射 f 称为 E^m 中一条 C^r 曲线．

而曲线的切矢量与曲线的导数又是一一对应的（双射），即

$$f'(t_0) = \frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}t}(t_0)\boldsymbol{e}_i, \tag{4.1-10}$$

上式中描述的导数（即切矢量）称为方向导数；见图1.1及该图处的描述．

曲线切矢量自然是一条有向线段，这自然可以与 $\mathbb{R}^m$ 中的矢量建立同构关系．因此我们建立了“同构”[4]关系图如下

$$\boxed{\mathbb{R}^m \text{ 中矢量}} \simeq \boxed{\text{有向线段（箭头）}} \simeq \boxed{E^m \text{ 中曲线方向导数}} \simeq \boxed{E^m \text{ 中定义4.2}}$$

上述内容（除定义4.2）在微积分教材中都有叙述．

我们以二维曲面（比如球面）为例再复述一下上面几个方框以加深理解．过曲面上一点 P 有无数条曲线，每条曲线都有切线（也就是切矢量，即有方向的

[3] 本节经常用箭头表示矢量；若使用抽象指标，会导致等号两端抽象指标不匹配，故恢复 §3.7记号．

[4] 这里加引号的同构并非定义3.20中的同构，而且特意换了一个符号来表示．这里的同构只是表示这几个方框都有相同的东西，这些东西是“矢量”的本质；也有不同的东西，比如“箭头”这种非常形象的图像无法向微分几何学中移植．

线段——箭头），所有这些切线都在点 P 的切平面上（切平面也是二维的），切平面便是线性空间 $\mathbb{R}^2$；而切矢量（即切线）又与方向导数同构．上面诸多概念很难平移到微分流形上，而（经过改造的）方向导数却可以移到流形论中．下小节来叙述最后一个方框内的内容．

4.1.3.1 方向导数抽象化

取定欧氏空间 E^m 的基矢量 $\{O;(e_i)^a\}$（恢复抽象指标记号），其对偶矢量是 $\{(e^i)_a\}$；其实在正定、正交归一基矢下，协变、逆变基矢是相同的，但我们仍用上下标来区分它们．

在多元微积分中，$\mathbb{R}^m$ 上全体 r 次连续可微 m 元函数记为 $C^r(\mathbb{R}^m)$，有了上面代数学抽象的双射，自然也可以把它记成 $C^r(E^m)$；$C^r(E^m)$ 中的函数是 $g:E^m\to\mathbb{R}$．我们用 $C^r_P(E^m)$ 代表点 $P\in E^m$ 上全体 m 元函数集合．

设 $f:\mathbb{R}\to E^m$ 是一条欧氏空间的 C^r 曲线，点 $P=f(t_0),t_0\in\mathbb{R}$；$\forall g\in C^r_P(E^m)$，则 $g\circ f$ 是定义在 t_0 点附近的 C^r 函数．简单来说，映射 f 将实数轴上某区间 (a,b) 变成了 E^m 中的一堆连续可微的坐标 $(x^1(t),\cdots,x^m(t))\equiv f(t)$，映射 g 又将这些坐标变回到实数轴上．根据复合函数求导法则，有

$$\left.\frac{\mathrm{d}\ g\circ f(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}g\big(x^1(t),\cdots,x^m(t)\big)=\left.\frac{\partial g}{\partial x^i}\right|_{f(t_0)}\frac{\mathrm{d}x^i(t_0)}{\mathrm{d}t},\tag{4.1-11}$$

f 的自变宗量只有一个，因变量是 m 个实数；g 的自变宗量有 m 个，因变量只是一个实数；$g\big(x^1,\cdots,x^m\big)$ 是 g 在给定标架 $\{O;(e_i)^a\}$ 上的 m 元实函数，令

$$\nabla_a g\big(f(t_0)\big)\equiv\left.\frac{\partial g}{\partial x^i}\right|_{f(t_0)}(e^i)_a,\tag{4.1-12}$$

上式中 ∇_a 的下标 a 只是为了平衡等号右端的抽象指标而加上的[5]，并且对哑标 i 求和．从这个式子，我们可以把 $\nabla_a g\big(f(t_0)\big)$ 理解成点 $f(t_0)\in E^m$ 处的一个矢量，这个矢量与标架 $\{O;(e_i)^a\}$ 的选择无关．证明过程并不复杂，我们另选一个标架 $\{O';(\epsilon_i)^a\}$，则 g 在标架 $\{O';(\epsilon_i)^a\}$（$(\epsilon_i)^a=(e_j)^aA^j_{\cdot i}$）下对应的 m 元实函数是 $g'(y^1,\cdots,y^m)$，有如下表达式

$$g'(y^1,\cdots,y^m)=g(c^1+B^{\cdot 1}_j x^j,\cdots,c^m+B^{\cdot m}_j x^j),\tag{4.1-13}$$

[5]在有了联络定义后，∇_a 就表示联络，现在我们只把这个下标当成人为附加上的．因正定欧氏空间基矢正交归一，所以 $(e^i)_a\equiv(e_i)^a$．

其中 c^i 是矢量 $\overrightarrow{OO'}$ 在标架 $\{O;(e_i)^a\}$ 中的坐标；y^i 是标架 $\{O';(\epsilon_i)^a\}$ 中的坐标变量（区别于标架 $\{O;(e_i)^a\}$ 中的坐标 x^i）；$\{y\}$ 与 $\{x\}$ 关系见式(3.7-6)，以及47页定理3.28，$B^{\cdot i}_k$ 是矩阵 $A^j_{\cdot i}$ 的转置逆．于是，运用复合函数求导法则，有

$$\frac{\partial g'}{\partial y^i}(\epsilon^i)_a=\frac{\partial g}{\partial x^j}\frac{\partial x^j}{\partial y^i}(\epsilon^i)_a=\frac{\partial g}{\partial x^j}A^j_{\cdot i}(\epsilon^i)_a=\frac{\partial g}{\partial x^j}A^j_{\cdot i}B^{\cdot i}_k(e^k)_a=\frac{\partial g}{\partial x^j}(e^j)_a \tag{4.1-14}$$

不同标架下，形式相同，这表明矢量 $\nabla_a g\big(f(t_0)\big)$ 与标架选取无关．如果读者了解二维空间的曲面论，那应能看出 $\nabla_a g\big(f(t_0)\big)$ 是函数 g 在二维曲面上点 $f(t_0)$ 处的梯度矢量．令

$$v^a\equiv\frac{\mathrm{d}x^i(t_0)}{\mathrm{d}t}(e_i)^a, \tag{4.1-15}$$

则 v^a 是曲线 $f(t)$ 在 $t=t_0$ 处的切矢量（对比式(4.1-10)不难得出此结论）．与上面论证类似，也可证明 v^a 与标架选取无关，请读者补齐证明．有了这些记号，可以将式(4.1-11)改写为

$$\frac{\mathrm{d}\ g\circ f(t)}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=t_0}=\frac{\partial g}{\partial x^j}\bigg|_{f(t_0)}(e^j)_a\ (e_i)^a\frac{\mathrm{d}x^i(t_0)}{\mathrm{d}t}=v^a\nabla_a g\big(f(t_0)\big). \tag{4.1-16}$$

需要注意的是，式(4.1-16)最后一项与具体坐标无关，只线性地依赖于曲线 f 的切矢量 v^a；而且我们已经论证整个推导过程均不依赖于某一套特定基矢．这样表达式 $v^a\nabla_a g\big(f(t_0)\big)$ 称为函数 $g\in C^r_P(E^m)$ 在点 $P=f(t_0)$ 处沿矢量 v^a 的**方向导数**，记作[6]

$$\mathrm{D}_v g\equiv v^a\nabla_a g\big(f(t_0)\big),\qquad \forall g\in C^r_P(E^m). \tag{4.1-17}$$

上面的讨论说明，在点 P 处任意一个切矢量 v^a 决定了一个算子 $\mathrm{D}_v: C^r_P\to\mathbb{R}$，它满足如下规则：

定义 4.2 **(1)** 线性：$\forall g,h\in C^r_P(E^m)$，$\forall\lambda\in\mathbb{R}$，有 $\mathrm{D}_v(g+\lambda h)=\mathrm{D}_v g+\lambda\mathrm{D}_v h$;

(2) Leibniz 律：$\forall g,h\in C^r_P(E^m)$，有 $\mathrm{D}_v(g\cdot h)=h(P)\cdot\mathrm{D}_v g+g(P)\cdot\mathrm{D}_v h$.

由式(4.1-17)可以直接得到上面两条性质．反之有如下定理：

定理 4.3 如果有映射 $\sigma: C^r_P(E^m)\to\mathbb{R}$ 满足上述条件 (1) 和 (2)，那么在点 P 处必然存在唯一的切矢量 v^a 使得 $\sigma=\mathrm{D}_v$.

由定理4.3可知：证明了上小节末尾那个等价关系的最后一个方框，也就是满足定义4.2中条件的映射 D_v 便是欧氏空间中的**切矢量**；这种算符化的切矢量表述方式可以很容易地推广到微分流形中．

[6]当 v^a 作为角标时，为了平衡抽象指标（等号右端的抽象指标已经缩并掉），略去指标 a.

4.1.3.2 定理4.3的证明

上述定理的证明还需要另外两个定理，首先我们重述一下多元函数微分中值定理（可参考任一本数学分析书籍）. 设 $P \in E^m$，其坐标为 $(x_0^1, \cdots, x_0^m)$，$\forall g \in C_P^r(E^m)$，有（其中 $0 < \theta < 1$）

$$g(x^1, \cdots, x^m) = g(x_0^1, \cdots, x_0^m) + (x^i - x_0^i)\frac{\partial g\big(x_0 + \theta(x - x_0)\big)}{\partial x^i}. \tag{4.1-18}$$

其次，还需证明如下命题：

命题 4.4 如果映射 σ 满足定义4.2中条件，那么 σ 作用在常实数上为零.

证明 . 首先将 σ 作用在实数“1”上，由条件 (2) 可知

$$\sigma(1) = \sigma(1 \cdot 1) = 1 \cdot \sigma(1) + 1 \cdot \sigma(1) = 2 \cdot \sigma(1) \quad \Rightarrow \quad \sigma(1) = 0.$$

对于任意实常数 c，由上式及性质 (1) 可知 $\sigma(c) = \sigma(1 \cdot c) = c \cdot \sigma(1) = 0$. ■

下面开始证明定理4.3. 我们注意到坐标函数 x^i 是点 P 邻域内的 C_P^∞ 函数，设映射 σ 作用在 x^i 上的值为 $v^i \equiv \sigma(x^i)$，结合基矢，我们构造 P 点的切矢量

$$v^a = v^i(e_i)^a = \sigma(x^i)(e_i)^a. \tag{4.1-19}$$

接着，我们将映射 σ 作用到式(4.1-18)上，有

$$\begin{aligned}
\sigma(g) &= \sigma\left(g(x_0^1, \cdots, x_0^m)\right) + \sigma\left((x^i - x_0^i)\frac{\partial g\big(x_0 + \theta(x - x_0)\big)}{\partial x^i}\right) \\
&= \sigma\left((x^i - x_0^i)\right) \cdot \frac{\partial g\big(x_0 + \theta(x - x_0)\big)}{\partial x^i}\bigg|_P + (x^i - x_0^i)|_P \cdot \sigma\left(\frac{\partial g\big(x_0 + \theta(x - x_0)\big)}{\partial x^i}\right) \\
&= \sigma(x^i)\frac{\partial g(x_0)}{\partial x^i} = v^a(e^i)_a\frac{\partial g(x_0)}{\partial x^i} = v^a\nabla_a g(x_0) = \mathrm{D}_v g.
\end{aligned}$$

计算过程并不困难，注意到 x_0 和 $g(x_0^1, \cdots, x_0^m)$ 是实常数，并利用命题4.4；参阅定义4.2中条件 (1) 和 (2)，同时应用式(4.1-12)、式(4.1-17)和式(4.1-19)可得最终答案. 这便证明了定理中 v^a 的存在性.

下面用反证法证明 v^a 的唯一性. 假设有不同于 v^a 的矢量 $\tilde{v}^a = \tilde{v}^i(e_i)^a$ 满足条件 $\sigma = \mathrm{D}_{\tilde{v}}$，将它作用在坐标函数 x^i 上，易得

$$\sigma(x^i) = \mathrm{D}_{\tilde{v}}(x^i) = \tilde{v}^a\nabla_a(x^i) = \tilde{v}^a(e^j)_a\frac{\partial x^i}{\partial x^j} = \tilde{v}^a(e^i)_a = \tilde{v}^i. \tag{4.1-20}$$

即，$\tilde{v}^i = \sigma(x^i) = v^i$；参见式(4.1-19)可知 $\tilde{v}^a = v^a$；定理4.3证毕.

4.1.4 欧氏空间切映射

切映射是微分流形里重要概念之一，为此我们先叙述欧氏空间的切映射，这可为后面切映射概念的引入做些铺垫. 设 E^m 中的坐标是 x^i，标架是 $\{O;(e_i)^a\}$；E^n 中的坐标是 y^α，标架是 $\{P;(\epsilon_i)^a\}$. 多元微积分中已经讲授过从 E^m 到 E^n 的 C^r 映射 ϕ 的知识，映射 ϕ 有 m 个自变宗量，有 n 个因变量，可以表示为

$$y^\alpha = \phi^\alpha(x^1,\cdots,x^m), \qquad 1\leqslant\alpha\leqslant n. \tag{4.1-21}$$

此映射的 Jacobi 矩阵是

$$J=\begin{pmatrix} \frac{\partial\phi^1}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial\phi^1}{\partial x^m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial\phi^n}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial\phi^n}{\partial x^m} \end{pmatrix}. \tag{4.1-22}$$

仿照上节，设有过点 $A\in E^m$ 的曲线 $\gamma:\mathbb{R}\to E^m$，且 $A=\gamma(0)$，曲线在此点的切矢量是 $v^a=\frac{\mathrm{d}x^i\circ\gamma(0)}{\mathrm{d}t}(e_i)^a$. 映射 ϕ 将 E^m 中的曲线 $\gamma(t)$ 变成 E^n 中的曲线 $\tilde\gamma(t)$，即有 $\tilde\gamma(t)=\phi\circ\gamma(t)$，且 $B=\tilde\gamma(0)\in E^n$；我们记 E^n 中曲线 $\tilde\gamma(t)$ 在 B 点切矢量为 $\tilde v^a$，那么 $\tilde v^a$ 与 v^a 有什么关系？

依照前面给出的参数方程，我们知道 $\tilde\gamma(t)$ 的参数方程为：

$$y^\alpha=\phi^\alpha\big(x^1(t),\cdots,x^m(t)\big), \tag{4.1-23}$$

切矢量 $\tilde v^a$ 自然是对曲线 $\tilde\gamma(t)$ 的方向导数：

$$\tilde v^a=\frac{\mathrm{d}y^\alpha\circ\tilde\gamma(0)}{\mathrm{d}t}(\epsilon_\alpha)^a=\frac{\mathrm{d}y^\alpha\circ\phi\circ\gamma(0)}{\mathrm{d}t}(\epsilon_\alpha)^a=\left.\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\right|_A\frac{\mathrm{d}x^i\circ\gamma(0)}{\mathrm{d}t}(\epsilon_\alpha)^a. \tag{4.1-24}$$

上式便是 $\tilde v^a$ 的展开式；从上式和 v^a 的展开式可得两个切矢量分量间的关系式

$$\tilde v^\alpha=v^i\left.\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\right|_{\left(x^1(0),\cdots,x^m(0)\right)}. \tag{4.1-25}$$

由此式可见，映射 ϕ 诱导出从 E^m 中 A 点切空间到 E^n 中点 B 切空间之间的线性变换，Jacobi 矩阵(4.1-22)恰好是这个线性变换在相应基底下的变换矩阵.

高维空间较难想象，我们设想 $\phi:E^2\to E^2$，即它只把某曲面（甚至是平面）变换到另外一个曲面，那么 v^a 便是变换前曲面 A 点切平面上一矢量，$\tilde v^a$ 便是

变换后曲面 B 点切平面上的切矢量，这两个切矢量之间的变换关系由 Jacobi 矩阵描述．这在二维曲面论中是熟知的结论．

ϕ 所诱导的两个切空间间的线性映射称为**切映射**，记为 ϕ_*，即 $\phi_* v^a = \tilde{v}^a$．

考虑 E^m 中第 i 条坐标线的切矢量，即让 $v^i = 1$（i 是固定值，比如 $i = 1$），其它 $v^j = 0,\ \forall j \neq i$．依照公式(4.1-24)的最后一步哑标 α 继续求和，哑标 i 只有一项非零且 $v^i = 1$，从而有

$$\tilde{v}^a = \phi_* v^a \Rightarrow \phi_*(e_i)^a = \sum_{\alpha=1}^{n} (\epsilon_\alpha)^a \left.\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\right|_{\left(x^1(0),\cdots,x^m(0)\right)} . \tag{4.1-26}$$

此公式即基矢间的切映射关系．

虽然本节定义了广义欧氏空间（平直空间）的度规，但不是微分流形（平直、弯曲空间）上的度规．从 §4.2开始，一直到 §8.1都不会用到度规这个基本几何量．读者可以看到：即使没有度规，微分几何内容仍旧十分丰富．

4.1.5 经典张量分析

这里的*经典张量分析*是指三维牛顿矢量力学中的张量分析，一般用于弹性力学、流体力学等．在经典张量分析中，不引入对偶空间概念，只引入对偶基概念．具体来说，在三维欧几里得空间 $\mathbb{R}^3$ 中先定义一组线性无关的基矢 $\{\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \mathbf{g}_3\}$；我们已知欧几里得空间的度量（度规）合同于正定的三维单位矩阵，故借用欧氏内积（即点乘）定义一组对偶基矢 $\{\mathbf{g}^1, \mathbf{g}^2, \mathbf{g}^3\}$，它们满足 $\mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}^j = \delta_i^j$；这组基矢量是唯一确定的．需要强调的是：$\{\mathbf{g}^i\}$ *与* $\{\mathbf{g}_j\}$ *属于同一空间* $\mathbb{R}^3$．

在我们的语言中，设线性空间 V（比如 $\mathbb{R}^3$）中有基矢量 $(e_i)^a$，其对偶空间 V^* 中有对偶基矢 $(e^j)_a$，它们满足 $(e^j)_a (e_i)^a = \delta_i^j$．需要强调，此时还未引入度量；在我们的语言中对偶空间的引入是不需要度量的（用的是*配合*）．现在引入度量张量 g_{ab}，它就是式(4.1-2)．在我们的语言中基矢与对偶基矢的关系为：

$$\delta_i^j = (e^j)_a (e_i)^a = g_{ab} (e_i)^a (e^j)^b . \tag{4.1-27}$$

即便引入了度量，V 和 V^* 只是同构，仍是可区分的．比如有 $x^i \in V$、$f_i \in V^*$；如果认为 V 和 V^* 是同一个线性空间，把线性空间中的*加法*用在它们上，有 $x^i + f_i$，这是无意义的量（因为一个指标在上，一个指标在下，根本无法相加）；所以 V 和 V^* 不是同一个线性空间，仅仅同构而已．

经典张量分析中基矢 $\mathbf{g}_i$ 用抽象指标表示便是：$\mathbf{g}_i \cong (\mathbf{g}_i)^a$. 经典张量分析中基矢 $\mathbf{g}_i$ 和对偶基矢 $\mathbf{g}^j$ 的点乘用抽象指标表示为：

$$\delta_i^j = \mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}^j \quad \text{此点乘等价于} \quad \delta_i^j = g_{ab}(\mathbf{g}_i)^a(\mathbf{g}^j)^b. \tag{4.1-28}$$

对比式(4.1-27)和式(4.1-28)可以看到对偶基矢 $\mathbf{g}^j$ 用抽象指标表示为：

$$\mathbf{g}^j \quad \text{等价于} \quad (\mathbf{g}^j)^a. \tag{4.1-29}$$

经典张量分析中的 $\mathbf{g}^j$ 的抽象指标是在上面的；这与我们语言中的对偶基矢 $(e^j)_a$ 不同，此处的抽象指标是在下面的. 用我们的观点来说：经典张量分析中根本不存在协变矢量（对偶矢量），全是逆变矢量. 需要注意的是：外微分只对协变矢量有定义，对逆变矢量无定义；故经典张量分析中是不能定义外微分的.

经典张量分析有一个常用公式

$$\mathbf{v} = v^i\mathbf{g}_i = v_i\mathbf{g}^i \quad \text{等价于} \quad v^a = v^i(\mathbf{g}_i)^a = v_i(\mathbf{g}^i)^a. \tag{4.1-30}$$

$$\text{或者} \quad \mathbf{v} = v^i\mathbf{g}_i = v_i\mathbf{g}^{\sharp i}. \quad \text{音乐同构记号，见300页} \tag{4.1-31}$$

在我们的观点中，不能记 $v^i(\mathbf{g}_i)^a = v_i(\mathbf{g}^i)_a$（错！），因为抽象指标不匹配.

在我们的观点中，所有导数算符（除外微分定义5.6中的第 (2) 条外）都要遵循 Leibniz 律. 而经典张量分析中并不遵守这条普适原则（Leibniz 律）.

力学中的张量分析本质上是欧氏空间的活动标架法，§8.8有初步介绍.

应该说是：张量定义上的差别导致了上述所有差异.

综上，经典张量分析不等同于现代微分几何中的欧几里得张量分析. 不要拿着经典张量分析中的理论、公式用到微分几何；这相当于拿着欧几里得理论研究非欧几何，属于基本逻辑性错误！

练习 4-1 请阅读某本力学张量分析教材中张量的定义.

练习 4-2 请详尽写出式(4.1-13)、(4.1-14)的计算过程.

4.2 微分流形基本概念

微分流形是现代数学中的一个基本概念，在数学的众多分支中都有应用. 我们在 §2.2引入了拓扑流形的概念（见定义2.53），在拓扑流形中，有拓扑结构，可

以谈及连续性、同胚性等等，但无法涉及映射是否可微．为了使某些拓扑流形可以谈及映射可微性，需要对这类流形提出某些合适的、特别的要求，以使此流形具备支持微分运算的结构．

4.2.1 微分流形定义

上节介绍的广义欧氏空间 $\mathbb{R}^m$ 上的函数可以涉及可微性，这种可微性在数学分析中早已研究过；若我们让拓扑流形每一点的邻域都具有空间 $\mathbb{R}^m$ 上的某些属性，那么就可以谈及拓扑流形上的可微性了，这便需要引入微分流形的概念．

定义 4.5 设有 m 维拓扑流形 M，并且存在集族 $\mathscr{A}=\{(U_\alpha,\varphi_\alpha)\mid\alpha\in\mathscr{I}\}$（其中 $\mathscr{I}$ 为某种指标集）满足：

(1) $\{U_\alpha\mid\alpha\in\mathscr{I}\}$ 是 M 的一个开覆盖，映射 $\varphi_\alpha:U_\alpha\to\varphi_\alpha(U_\alpha)\subset\mathbb{R}^m$ 是拓扑同胚的；

(2) 相容性：$\forall\alpha,\beta\in\mathscr{I}$，如果 $U_\alpha\cap U_\beta\neq\varnothing$，那么坐标变换 $\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1}$ 和 $\varphi_\alpha\circ\varphi_\beta^{-1}$ 是 $C^r(1\leqslant r\leqslant\infty)$ 的；

(3) 对于条件 (1) 和 (2) 来说，集族 $\mathscr{A}$ 是 C^r 极大的．

则称 M 是 m 维 C^r **微分流形**；$(U_\alpha,\varphi_\alpha)$ 称为**坐标卡**（或坐标图）；满足条件 (1) 和 (2) 的坐标卡集合称为**坐标图册**，再满足第 (3) 条，则 $\mathscr{A}$ 称为流形 M 的一个 C^r **微分结构**．

当 $r=0$ 时就是拓扑流形，没有可微性．可微阶数 C^r 一般取为 C^∞，称为**光滑流形**；如无特殊声明，之后章节皆取 $r=\infty$；而且我们也不再严格区分微分流形与光滑流形的差别（其差别无非是可微到多少阶）．

这个定义引入了许多新概念，自然需要进一步解释．先解释坐标卡．

M 是拓扑流形，它的每一个开集 U（暂时省略角标 α）都同胚于 $\mathbb{R}^m$ 中的开子集，即有 $\varphi:U\to\varphi(U)\subset\mathbb{R}^m$，并且 φ^{-1} 也是连续映射[7]．由于 $\mathbb{R}^m$ 中的开集天然存在坐标，我们利用同胚属性将此坐标移植到开集 U 上，具体这样操作：设 $p\in U$ 是 M 中的一点；同胚映射 φ 将其映射为 $\varphi(p)\in\mathbb{R}^m$，$\varphi(p)$ 的坐标是 $\big(\varphi(p)\big)^i$，令点 $p\in U$ 的坐标是 $x^i(p)\equiv\big(\varphi(p)\big)^i$；显然这个坐标是依赖于映射 φ 的，不同映射将给出不同的坐标．U 中的点原来没有坐标概念，我们借助同胚这个操作，赋给了它坐标属性；(U,φ) 称为 M 的坐标卡，(U,x^i) 称为 M 的**局部坐**

[7]有的文献定义 $\varphi^{-1}:U\to\mathbb{R}^m$；由于 φ 是同胚，用 φ 还是 φ^{-1} 来定义都是允许的，注意区分便是．

标系，坐标卡和局部坐标系是同一内容的两种不同叫法而已.

再解释相容性，描述过程可参考图4.1. 定义4.5中条件 (1) 使用了指标集，这使得符号有较多角标；为了简洁起见，我们用不同字符 $(U,\varphi;x^i)$ 和 $(V,\psi;y^i)$ 来表示流形 M 的两个不同的坐标卡（从而暂时省略了稍显繁杂的角标）.

如果 $U\cap V=\varnothing$，则称 (U,φ) 和 (V,ψ) 是**相容的**.

下面只讨论 $U\cap V\neq\varnothing$ 的情形. 令

$$x^i(p)=\big(\varphi(p)\big)^i,\qquad y^i(p)=\big(\psi(p)\big)^i,\qquad \forall p\in U\cap V, \tag{4.2-1}$$

那么点 p 的两组坐标 $x^i(p)$ 和 $y^i(p)$ 是相互连续依赖的. 因为 φ 和 ψ 是同胚映射，则它们在非空开集 $U\cap V$ 上的限制

$$\begin{aligned}&\varphi|_{U\cap V}:U\cap V\to\varphi(U\cap V)\subset\mathbb{R}^m,\\&\psi|_{U\cap V}:U\cap V\to\psi(U\cap V)\subset\mathbb{R}^m.\end{aligned}$$

也是同胚；它们的逆自然也是同胚；同胚又具有传递性，所以

$$\begin{aligned}&\psi|_{U\cap V}\circ(\varphi|_{U\cap V})^{-1}:\varphi(U\cap V)\to U\cap V\to\psi(U\cap V),\\&\varphi|_{U\cap V}\circ(\psi|_{U\cap V})^{-1}:\psi(U\cap V)\to U\cap V\to\varphi(U\cap V).\end{aligned}$$

也是同胚的，同时上面两个映射互为逆映射. 这些同胚关系可以用坐标表示成：

$$x^i(p)=\big(\varphi(p)\big)^i=\Big(\varphi\circ\psi^{-1}\big(\psi(p)\big)\Big)^i\equiv g^i\big(y^1(p),\cdots,y^m(p)\big), \tag{4.2-2}$$

$$y^i(p)=\big(\psi(p)\big)^i=\Big(\psi\circ\varphi^{-1}\big(\varphi(p)\big)\Big)^i\equiv f^i\big(x^1(p),\cdots,x^m(p)\big). \tag{4.2-3}$$

很明显，上式是 $\mathbb{R}^m$ 开子集中的坐标变换. 因同胚映射本身是连续映射，所以 f^i（即 y^i）和 g^i（即 x^i）都是连续函数；并且由上面定义可知它们互逆，即

$$x^i=g^i\big(f^1(x^1,\cdots,x^m),\cdots,f^m(x^1,\cdots,x^m)\big), \tag{4.2-4}$$

$$y^i=f^i\big(g^1(y^1,\cdots,y^m),\cdots,g^m(y^1,\cdots,y^m)\big). \tag{4.2-5}$$

因 f^i 和 g^i 都是定义在 $\mathbb{R}^m$ 开集上的函数，所以可以定义它们的可微性；而 $\psi\circ\varphi^{-1}$ 和 $\varphi\circ\psi^{-1}$ 可微与否可分别由 f 和 g 可微与否来定义. 我们只需假设 f^i 和 g^i 是 $C^r(1\leqslant r\leqslant\infty)$ 的即可（其中 r 可选为解析的，即 $r=\omega$）. 当 $\psi\circ\varphi^{-1}\equiv f$ 和 $\varphi\circ\psi^{-1}\equiv g$ 有了可微性时，我们便称坐标卡 (U,φ) 和 (V,ψ) 是 C^r **相容的**.

可见，流形 M 上映射（$\psi\circ\varphi^{-1},\varphi\circ\psi^{-1}$）的可微性是借助于 $\mathbb{R}^m$ 中映射（f,g）可微性来定义的.

接着解释条件 (3) 中的极大性：如果 (U,φ) 是流形 M 的一个坐标卡，并且 (U,φ) 与 $\mathscr{A}$ 中的每一个成员都是 C^r 相容的，那么 (U,φ) 必然属于 $\mathscr{A}$；此时称 $\mathscr{A}$ 是极大的.

设微分流形 M 有坐标卡集合 $\mathscr{A}$ 和 $\mathscr{B}$，这两个集合都分别满足定义中条件 (1) 和 (2). 这时有两种可能，第一，两个图册互不相容，即 $\mathscr{A}$ 和 $\mathscr{B}$ 之间的两个坐标卡的坐标变换不满足条件 (2)；见例4.9；这时流形有两个不同的微分结构.

第二，两个图册相容，见例4.12；那么可以证明如下命题：




图 4.1: 坐标卡与相容性

命题 4.6 *设微分流形 M 上有坐标卡集合 $\mathscr{B}$ 满足定义4.5中的条件 (1) 和 (2)，那么在 M 上必然存在唯一的一个微分结构 $\mathscr{A}\supset\mathscr{B}$.*

证明 . 已知存在坐标卡集合 $\mathscr{B}$ 满足条件 (1) 和 (2)，索性把所有与 $\mathscr{B}$ 相容的坐标卡都放在一起构造出一个最大的图册，称之为 $\mathscr{A}$. 用这种方式构造的集合 $\mathscr{A}$ 显然满足条件 (1) 和 (2)，这便是条件 (3) 中所说的极大图册. 这种方式构造出的 $\mathscr{A}$ 显然是唯一的. ■

这个命题说明：定义4.5中的条件 (1) 和 (2) 是基本的.

下面给出几个具体例子.

例 4.7 可数离散点集构成的拓扑空间是零维流形. ■

例 4.8 m 维欧几里得空间 $\mathbb{R}^m$. 只需取一个开集 $U=\mathbb{R}^m$ 即可，令映射 $\varphi: U\to\mathbb{R}^m$ 是恒等映射，则 (U,φ) 是空间 $\mathbb{R}^m$ 的坐标卡.

能够与标准欧几里得坐标进行坐标变换的坐标卡有很多，有的变换只连续，并不可微；如果我们将所有变换关系是 C^∞ 可微的坐标卡集合记为 $\mathscr{B}$，那么 $\mathscr{B}$ 便是 $\mathbb{R}^m$ 的最大图册，也就是它的**微分结构**；称为 $\mathbb{R}^m$ 的**标准微分结构**. ■

例 4.9 实数轴 $\mathbb{R}$ 上可以构造不同的微分结构. 第一种微分结构取为如例4.8所示的标准微分结构，记为 $\mathscr{A}_1$，局部坐标用 x 表示.

第二种微分结构可以这样构造，取 $V=\mathbb{R}$，映射 $\psi: V\to\mathbb{R}$ 取为 $\psi(y)=y^5,\ \forall y\in V$，记这种结构为 $\mathscr{A}_2=(V,\psi)$.

坐标变换 $\varphi\circ\psi^{-1}$ 的表达式为 $x=\sqrt[5]{y}$，很明显这个函数在 $y=0$ 处不可微，所以两个微分结构并不相容. ■

例 4.10 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中 m 维标准球面 $S^m(a)$ 的微分流形.

$S^m(a)$ 的具体表示为：

$$S^m(a)=\left\{(x^1,\cdots,x^{m+1})\in\mathbb{R}^{m+1}\mid\sum\nolimits_{i=1}^{m+1}(x^i)^2=a^2\right\}. \tag{4.2-6}$$

对每一个确定的 $\alpha(1\leqslant\alpha\leqslant m+1)$，令

$$U_\alpha^+=\{(x^1,\cdots,x^{m+1})\in S^m: x^\alpha>0\},$$
$$U_\alpha^-=\{(x^1,\cdots,x^{m+1})\in S^m: x^\alpha<0\}.$$

这两个类型的集合是 $S^m(a)$ 的开集，这些集合之并是 $S^m(a)$ 的开覆盖，即

$$S^m(a)=\bigcup_{\alpha=1}^{m+1}\left(U_\alpha^+\cup U_\alpha^-\right). \tag{4.2-7}$$

有了开覆盖，下面定义映射 $\varphi_\alpha^+: U_\alpha^+\to\mathbb{R}^m$ 和 $\varphi_\alpha^-: U_\alpha^-\to\mathbb{R}^m$：

$$\varphi_\alpha^+(x^1,\cdots,x^{m+1})=(x^1,\cdots,\hat{x}^\alpha,\cdots,x^{m+1}), \tag{4.2-8}$$
$$\varphi_\alpha^-(x^1,\cdots,x^{m+1})=(x^1,\cdots,\hat{x}^\alpha,\cdots,x^{m+1}). \tag{4.2-9}$$

其中 $\hat{x}^\alpha$ 表示把第 α 个分量 x^α 去掉. 实际上，这两个映射从不同的开集得到了相同的坐标. 在多元微积分角度上看，上面两个映射是 C^∞ 的，它们的逆也是 C^∞ 的；所以 $(U_\alpha^+,\varphi_\alpha^+)$ 和 $(U_\alpha^-,\varphi_\alpha^-)$ 是球面 $S^m(a)$ 的坐标卡. 映射 $\varphi_\alpha^\pm$（取 α 为固定数值）的几何意义是将 $S^m(a)$ 的半球面 $U_\alpha^\pm$ 沿第 α 坐标轴投影到 $x^\alpha=0$ 坐标平面上.

下面我们来看坐标变换是否相容. 取 α 和 β 为两个互不相等的固定数值，那么必然有 $U_\alpha^+\cap U_\beta^+\neq\varnothing$、$U_\alpha^+\cap U_\beta^-\neq\varnothing$ 和 $U_\alpha^-\cap U_\beta^-\neq\varnothing$，我们以 $U_\alpha^+\cap U_\beta^-$ 为例，写出如下坐标变换的具体公式（见式(4.2-10)）：

$$\begin{aligned}\varphi_\beta^-\circ(\varphi_\alpha^+)^{-1}:&\quad \varphi_\alpha^+\big(U_\alpha^+\cap U_\beta^-\big)\to\varphi_\beta^-\big(U_\alpha^+\cap U_\beta^-\big),\\ \varphi_\alpha^+\circ(\varphi_\beta^-)^{-1}:&\quad \varphi_\beta^-\big(U_\alpha^+\cap U_\beta^-\big)\to\varphi_\alpha^+\big(U_\alpha^+\cap U_\beta^-\big).\end{aligned}$$

其余坐标变换公式留给读者当作练习. 假设 $\alpha<\beta$，对于 S^m 球面上的点 $(x^1,\cdots,x^{m+1})\in U_\alpha^+\cap U_\beta^-$ 有 $x^\alpha>0$，$x^\beta<0$，应用条件 $|x|=a$ 可得坐标变换公式：

$$\begin{aligned}&\varphi_\beta^-\circ(\varphi_\alpha^+)^{-1}(x^1,\cdots,\hat{x}^\alpha,\cdots,x^{m+1})\\ =&\left(x^1,\cdots,x^{\alpha-1},\sqrt{a^2-\sum\nolimits_{\gamma\neq\alpha}(x^\gamma)^2},x^{\alpha+1},\cdots,\hat{x}^\beta,\cdots,\hat{x}^{m+1}\right),\qquad\text{(4.2-10a)}\\ &\varphi_\alpha^+\circ(\varphi_\beta^-)^{-1}(x^1,\cdots,\hat{x}^\beta,\cdots,x^{m+1})\\ =&\left(x^1,\cdots,\hat{x}^\alpha,\cdots,x^{\beta-1},-\sqrt{a^2-\sum\nolimits_{\gamma\neq\beta}(x^\gamma)^2},x^{\beta+1},\cdots,\hat{x}^{m+1}\right).\qquad\text{(4.2-10b)}\end{aligned}$$

因为式子 $\sqrt{a^2-\sum_{\gamma\neq\alpha}(x^\gamma)^2}$ 和 $\sqrt{a^2-\sum_{\gamma\neq\beta}(x^\gamma)^2}$ 根号下是恒大于零的，求导之后放在分母上不会导致无穷大，所以两个坐标变换 $\varphi_\beta^-\circ(\varphi_\alpha^+)^{-1}$ 和 $\varphi_\alpha^+\circ(\varphi_\beta^-)^{-1}$ 都是 C^∞ 的，因此坐标卡 $(U_\alpha^+,\varphi_\alpha^+)$ 和 $(U_\alpha^-,\varphi_\alpha^-)$ 是 C^∞ 相容的. 与此类似同样可证其余坐标卡也是 C^∞ 相容的，所以坐标卡集合 $\{(U_\alpha^+,\varphi_\alpha^+),(U_\alpha^-,\varphi_\alpha^-):1\leqslant\alpha\leqslant m+1\}$ 决定了球面 $S^m(a)$ 上的 C^∞ 一种微分结构，进而 $S^m(a)$ 符合定义4.5中所有条件，所以它是微分流形. ■

例 4.11 继上一例题，用球极投影法再次说明 m 维球面是微分流形.

设球面的北极和南极点坐标分别为 $N=(0,\cdots,0,a)$ 和 $S=(0,\cdots,0,-a)$. 令 $V_+=S^m(a)\backslash\{S\}$，$V_-=S^m(a)\backslash\{N\}$，这样定义的集合是球面上的开集. 分别

定义映射 $\psi_\pm : V_\pm \to \mathbb{R}^m$ 如下

$$(y^1,\cdots,y^m) \equiv \psi_+(x^1,\cdots,x^{m+1}) = \left(\frac{ax^1}{a+x^{m+1}},\cdots,\frac{ax^m}{a+x^{m+1}}\right), \tag{4.2-11}$$

$$(z^1,\cdots,z^m) \equiv \psi_-(x^1,\cdots,x^{m+1}) = \left(\frac{ax^1}{a-x^{m+1}},\cdots,\frac{ax^m}{a-x^{m+1}}\right). \tag{4.2-12}$$

需要由上两式来求 $\psi_\pm$ 的逆映射，我们仅以 ψ_+ 为例来说明求解过程. 将(4.2-11)式求平方和，并利用 $\sum_{i=1}^{m+1}(x^i)^2 = a^2$，可得

$$\sum_{j=1}^{m}(y^j)^2 = \frac{a^2}{(a+x^{m+1})^2}\left(\sum\nolimits_{i=1}^{m}(x^i)^2\right) = \frac{a^2}{(a+x^{m+1})^2}\left(a^2-(x^{m+1})^2\right)$$

$$\Rightarrow \quad x^{m+1} = \frac{a\left(a^2-\sum_j(y^j)^2\right)}{a^2+\sum_j(y^j)^2}, \quad \text{或} \quad x^{m+1} = -a \text{ (舍弃)}.$$

有了最后一个坐标的表达式，其它坐标几乎一望而知，它们是（同时给出 ψ_-^{-1}）

$$\begin{aligned}(x^1,\cdots,x^m,x^{m+1}) &= \psi_+^{-1}(y^1,\cdots,y^m)\\ &= \frac{a}{a^2+\sum_j(y^j)^2}\left(2ay^1,\cdots,2ay^m,\ a^2-\sum\nolimits_{j=1}^{m}(y^j)^2\right),\end{aligned} \tag{4.2-13}$$

$$\begin{aligned}(x^1,\cdots,x^m,x^{m+1}) &= \psi_-^{-1}(z^1,\cdots,z^m)\\ &= \frac{a}{a^2+\sum_j(z^j)^2}\left(2az^1,\cdots,2az^m,\ \sum\nolimits_{j=1}^{m}(z^j)^2-a^2\right).\end{aligned} \tag{4.2-14}$$

有了逆映射，便可以求出坐标变换如下

$$(z^1,\cdots,z^m) = \psi_-\circ\psi_+^{-1}(y^1,\cdots,y^m) = \frac{a^2}{\sum_j(y^j)^2}\left(y^1,\cdots,y^m\right), \tag{4.2-15}$$

$$(y^1,\cdots,y^m) = \psi_+\circ\psi_-^{-1}(z^1,\cdots,z^m) = \frac{a^2}{\sum_j(z^j)^2}\left(z^1,\cdots,z^m\right). \tag{4.2-16}$$

不难验证这些坐标变换都是 C^∞ 的，故 $(V_+,\psi_+;y^i)$ 和 $(V_-,\psi_-;z^i)$ 构成了球面 $S^m(a)$ 的容许局部坐标开覆盖，决定了球面的一种微分结构. ■

例 4.12 以 $S^1(1)$ 为例来说明上面两个例题中的坐标卡属于同一微分结构.

只取其中一个坐标变换，其余类似. 取第一种坐标卡中的开集和映射为

$$U_1^+ = \{(x^1,x^2)\in S^1 \mid x^1>0\},\ \varphi_1^+(x^1,x^2) = x^2,\ (\varphi_1^+)^{-1}(x^2) = \left(\sqrt{1-(x^2)^2},x^2\right).$$

取第二种坐标卡中的开集和映射为

$$V_+,\quad \psi_+(x^1,x^2)=\frac{x^1}{1+x^2},\quad \psi_+^{-1}(y^1)=\frac{1}{1+(y^1)^2}\left(2y^1,1-(y^1)^2\right).$$

坐标变换为

$$\varphi_1^+\circ\psi_+^{-1}(\xi)=\frac{1-\xi^2}{1+\xi^2},\qquad \psi_+\circ(\varphi_1^+)^{-1}(\eta)=\frac{\sqrt{1-\eta^2}}{1+\eta}. \tag{4.2-17}$$

这些函数是 C^∞ 的，所以坐标变换是相容的，它们属于同一微分结构. ■

可见在构造微分流形时，只需指出它的一个相容的坐标覆盖就行了，这样已能研究全部的几何. 比如对于球面 $S^m(a)$，（对于物理中的应用而言）我们用例4.10或例4.11中的任意一个坐标覆盖即可，（除了微分拓扑等基础领域）没有必要非将其延拓至最大相容的坐标覆盖（即微分结构）；命题4.6表明任意一个坐标覆盖都能延拓至最大图册.

4.2.2 笛卡尔积流形

拓扑空间有笛卡尔积的概念（见定义2.40），微分流形也有类似概念. 设有微分流形 M 和 N，其维数分别是 m 和 n，它们的微分结构分别是

$$\mathscr{A}_1=\{(U_\alpha,\varphi_\alpha)\mid\alpha\in\mathscr{I}_1\},\qquad \mathscr{A}_2=\{(V_i,\psi_i)\mid i\in\mathscr{I}_2\}. \tag{4.2-18}$$

由命题2.72–2.74可知 $M\times N$ 是 Hausdorff 空间，并有可数拓扑基；且 $\{(U_\alpha\times V_i)\mid\alpha\in\mathscr{I}_1,i\in\mathscr{I}_2\}$ 是拓扑积 $M\times N$ 的一个开覆盖. 下面构造 $M\times N$ 的微分结构. 对每一对指标 $\{(\alpha,i)\in\mathscr{I}_1\times\mathscr{I}_2\}$，定义从 $U_\alpha\times V_i$ 到 $\mathbb{R}^{m+n}$ 的映射如下

$$(\varphi_\alpha\times\psi_i)(x,y)\overset{def}{=}\big(\varphi_\alpha(x),\ \psi_i(y)\big),\qquad \forall(x,y)\in U_\alpha\times V_i.$$
$$(\varphi_\alpha\times\psi_i)^{-1}(X,Y)\overset{def}{=}\big(\varphi_\alpha^{-1}(X),\ \psi_i^{-1}(Y)\big),\qquad \forall(X,Y)\in\varphi_\alpha(U_\alpha)\times\psi_i(V_i).$$

不难验证 $\varphi_\alpha\times\psi_i$ 是从 $U_\alpha\times V_i$ 到 $\varphi_\alpha(U_\alpha)\times\psi_i(V_i)$ 的同胚映射.

再者，当 $U_\alpha\cap U_\beta\neq\varnothing$，$V_i\cap V_j\neq\varnothing$ 时，定义

$$(\varphi_\alpha\times\psi_i)\circ(\varphi_\beta\times\psi_j)^{-1}\overset{def}{=}(\varphi_\alpha\circ\varphi_\beta^{-1})\times(\psi_i\circ\psi_j^{-1}). \tag{4.2-19}$$

在这样定义下，$(U_\alpha\times V_i,\varphi_\alpha\times\psi_i)$ 与 $(U_\beta\times V_j,\varphi_\beta\times\psi_j)$ 是 C^∞ 相容的. 当 $U_\alpha\cap U_\beta=\varnothing$ 和 $V_i\cap V_j=\varnothing$ 至少有一个成立时，我们约定它们也是 C^∞ 相容的. 这样，

$$\{(U_\alpha\times V_i,\varphi_\alpha\times\psi_i)\mid\alpha\in\mathscr{I}_1,i\in\mathscr{I}_2\}, \tag{4.2-20}$$

在拓扑积 $M\times N$ 上决定了一个 $m+n$ 维的光滑结构，这使得 $M\times N$ 成为 $m+n$ 维光滑流形，称为 M 和 N 的笛卡尔**积流形**.

很明显，上述流程可以推广到任意有限个流形（$M_1, M_2, \cdots$）之积.

4.2.3 小结

微分流形定义要求每个局部开集 U 均同胚于 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，所以流形自然存在局部坐标 $\{U; x^i\}$，这个坐标是天生存在的，不需要额外定义；微分几何所有理论都需要构建在这个坐标基础之上. 因此，那种想完全摆脱局部坐标去构建微分几何理论的想法是错误的. 但是，流形论本身不依赖于某套特别的坐标系.

然而，微分几何理论却是整体性的，流形论主要目的是研究在局部坐标变换下而保持不变的性质（如切矢量、外微分式、黎曼曲率等等）. 微分几何理论不能只对某个特别的坐标系正确，对其它坐标系不正确；也就是理论本身必须与坐标系选取无关才可以；坐标本身没有意义，所有基本理论都不能只依赖某特定局部坐标（Christoffel 符号是个例外）. 那种想用坐标分量语言来描述微分几何的方式貌似已经过时了.

引入坐标系的目的是为了把几何问题代数化、分析化，从而能用代数及微积分的方法来研究几何问题. 选择适当的坐标可以大大简化研究难度，大家在书中看到的各种坐标，是前人经过长期研究而作出的选择，基本上是最优的了.

举例说明坐标本身没有意义（以下两例中的度量是正定欧式度量）.

例 4.13 张三沿直线向东走了一段距离，我们把他走路的起点算作坐标 a，终点坐标记为 b；但是坐标本身（不论是 a 还是 b）都没有意义，有意义的是由“$b-a$”表示的这段距离；而且这段距离是不随坐标系变换而改变的，比如随便将坐标系平移和旋转，这段距离是不变的，但两点坐标的数值却改变了.

例 4.14 在 $\mathbb{R}^3$ 中的 $x-y$ 平面上，画一个椭圆（称为旧的），中心在原点，长半轴沿 x，短半轴沿 y；这是最常用的坐标表示形式. 我们将坐标轴进行任意旋转（甚至反射），那么（新）椭圆可能处于 $\mathbb{R}^3$ 中任意一个平面上，不在 $x-y$ 平面上；此时“旧”、“新”椭圆上的坐标几乎不可能一致了，但是椭圆的长、短半轴长度，偏心率等等几何量是不变的. 这个例子生动地说明了“坐标本身没有意义”，我们应该研究那些坐标变换下的不变量.

在牛顿力学中，地球绕太阳旋转，我们依据牛顿第二定律和万有引力公式列出方程，如果按照上述“旧”方式取坐标，则方程很容易求解；如果按照上述

“新”方式取坐标，则方程很难求解，可能需要用数值解法．不论哪个坐标系，求得的解必然是同一个椭圆，但地球在“旧”、“新”坐标系中的坐标是不同的．可见，即使在经典力学中，研究的仍是坐标变换下的不变量，坐标本身没有意义！

练习 4-3 以 $S^2(1)$ 为例再次论证例题4.12．

练习 4-4 证明例题1.4中的圆环面是 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑流形．

练习 4-5 证明 $x-y$ 平面可看成由 x、y 轴构成的笛卡尔积流形．

练习 4-6 设 S^1 是一维单位圆周．证明例题1.4中的圆环面可以看成两个圆周的笛卡尔积流形，即 $S^1\times S^1$．

4.3 流形的映射

读者应该学习过多元微积分中 $\mathbb{R}^m$ 与 $\mathbb{R}^n$ 间映射（或函数）的概念，那里的内容大都可以推广到流形之间．

定义 4.15 设 M 和 N 分别是 m 和 n 维微分流形，存在连续映射 $f:M\to N$．[8] $\forall p\in M$，存在包含 p 的坐标卡 $(U,\varphi;x)$ 以及 N 上包含点 $q\equiv f(p)$ 的坐标卡 $(V,\psi;y)$，那么可以构造如下映射 $\hat{f}$：

$$\hat{f}\equiv\psi\circ f\circ\varphi^{-1}:\varphi(U)\big(\subset\mathbb{R}^m\big)\ \to\ \psi(V)\big(\subset\mathbb{R}^n\big).$$

如果 $\hat{f}$ 是 C^r 的（即可微到 $r(>0)$ 阶），[9] 那么称映射 $f:M\to N$ 在 p 点是 C^r 的；如果 f 在每一点都是 C^r 的，那么称之为 C^r 映射．

注 4.16 不难验证，上述定义与坐标卡选取无关．有了这个定义后，我们不再严格区分 f 和 $\hat{f}$，认为两者等同．在多元微积分中 $\hat{f}$ 在 $p\in\mathbb{R}^m$ 点的 Jacobi 矩阵也称为 f 在 $p\in M$ 点的 Jacobi 矩阵．Jacobi 矩阵秩也可作类似认同．

定义 4.17 设定义4.15中的 M 是实数轴上的某个开区间 (a,b)，那么称映射 $f:(a,b)\to N$ 为流形 N 上的一条 C^r **（参数）曲线**．

设流形 N 中有 C^r 曲线 $f(t)$，其中 t 称为曲线的**参数**．如果有 C^r 变换函数 $u(t)$ 将参数 t 变成 u，并且 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$ 处处不为零，那么称变换后的曲线 $\tilde{f}(u)=f\big(u(t)\big)$

[8] 读者应能注意到：只到这里的 f 只是拓扑流形间的映射，只能谈及连续性，无法涉及可微性．

[9] $\hat{f}$ 肯定是连续的；$\hat{f}$ 本质上是 $\mathbb{R}^m$ 与 $\mathbb{R}^n$ 开子集间的映射，自然可以谈及其可微性．

是原曲线 $f(t)$ 的**重参数化曲线**. 既然 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$ 处处不为零，那么必然有 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}>0$ 或者 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}<0$ 处处成立，即变换 $u(t)$ 是单调的双射函数.

定义 4.18 设定义4.15中的 N 是实数轴上的某个开区间 (a,b)，那么称映射 $f: M\to(a,b)$ 为流形 M 上的 C^r **函数**. 全体 C^r 函数集合记作 $C^r(M)$.

函数的加法和乘法在 $C^r(M)$ 中是封闭的，（参照23页定义2.24）因此 $C^r(M)$ 在代数上是一个环.

例 4.19 设流形 M 的局部坐标是 $(U_\alpha,\varphi_\alpha;x^i)$，函数 x^i 在坐标卡内就是 $\mathbb{R}^m$ 的坐标投影，故它一定是 C^∞ 的.

定义 4.20 设定义4.15中的 f 是拓扑同胚（见2.52），若 f 和 f^{-1} 都是 C^r 的，则称 f 是微分流形 M 与 N 间的 C^r **微分同胚**. 若 f 只是 M 的某局部开集 U 和 N 的局部开集 V 之间的微分同胚，则称 f 为 U 到 V 上的**局部微分同胚**.

拓扑同胚可保证两流形维数相等；微分同胚自然也可得此结论.

下面叙述几个关于映射的命题，这些命题会在多处使用. 为理解方便，先介绍 $\mathbb{R}^m$ 空间中的一个命题：

命题 4.21 令 Q 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个矩形区域. 存在一个 C^∞ 函数 $\phi:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$ 使得当 x 属于 Q 内部时，有：$\phi(x)>0$；否则 $\phi(x)=0$.

证明 . 先考虑如下一维函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，

$$f(t)=\begin{cases}\exp(-\frac{1}{t}), & t>0;\\ 0, & t\leqslant 0.\end{cases}$$

此函数曲线见图4.2，当 $t\to\infty$ 时，$f(t)\to 1^-$；当 $t\to 0^+$ 时，$f(t)\to 0$；拐点在 $t=0.5$ 处. 很明显，函数 f 在实数轴上是 C^∞ 的. 利用此函数，接着定义另一函数 g（见图4.3），

$$g(t)=f(t)\cdot f(1-t)/(f(0.5))^2. \tag{4.3-1}$$

函数 g 在 $0<t<1$ 中非零且恒正，其它点恒为零；最大值已归一化到 1.

对于 $\mathbb{R}^m$ 中的矩形区域 $Q=[a_1,b_1]\times\cdots\times[a_m,b_m]$，则可定义函数 ϕ 如下

$$\phi(x)=g\left(\frac{x_1-a_1}{b_1-a_1}\right)\times g\left(\frac{x_2-a_2}{b_2-a_2}\right)\times\cdots\times g\left(\frac{x_m-a_m}{b_m-a_m}\right). \tag{4.3-2}$$

这样定义的函数满足命题要求，这便证明了存在性. 需要指出的是这类函数有很多，不止上述一个. ■




图 4.2: 指数函数 f




图 4.3: 指数函数积 g

上面命题还有变种.

命题 4.22 令 D_1 和 D_2 是 $\mathbb{R}^m$ 中两个同心球，且 $\overline{D}_1 \subset D_2$. 则存在 C^∞ 函数 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 使得 $0 \leqslant f \leqslant 1$，并且

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in D_1; \\ 0, & x \notin D_2. \end{cases} \tag{4.3-3}$$

上面命题将取值域限定为球，这个限制可以拓展至一般情形：

命题 4.23 令 U 和 V 是 $\mathbb{R}^m$ 中两个非空开集，$\overline{V}$ 是紧致的，且 $\overline{V} \subset U$. 则存在 C^∞ 函数 $g : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 使得 $0 \leqslant g \leqslant 1$，并且

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x \in V; \\ 0, & x \notin U. \end{cases} \tag{4.3-4}$$

上面命题可以推广到一般流形上：

命题 4.24 令 U 和 V 是微分流形 M 中两个非空开集，$\overline{V}$ 是紧致的，且 $\overline{V} \subset U$. 则存在 C^∞ 函数 $h : M \to \mathbb{R}$ 使得 $0 \leqslant h \leqslant 1$，并且

$$h(p) = \begin{cases} 1, & p \in V; \\ 0, & p \notin U. \end{cases} \tag{4.3-5}$$

命题4.22、4.23和4.24的证明并不复杂，可参见文献[70]§1.3中证明. 它们本质上是命题4.21的推广，但越来越抽象. 利用命题4.24，可证明下面命题：

命题 4.25 设 U 是微分流形 M 的一个开子集，给定函数 $f \in C^\infty(U)$，则 $\forall p \in U$，必有 p 点一个邻域 $V \subset U$，以及光滑函数 $\hat{f} \in C^\infty(M)$，使得 $\hat{f}|_V = f|_V$.

证明 . 利用流形的局部紧致性，可以使得 $\overline{V}$ 是 U 的真子集；如果不是，将 V 缩小一些即可. 依照命题4.24，存在流形 M 上的光滑函数 h 满足式(4.3-5)，令

$$\hat{f}(x)=\begin{cases} f(x)\cdot h(x), & \forall x\in U;\\ 0, & \forall x\notin U. \end{cases} \tag{4.3-6}$$

很明显，有 $\hat{f}|_V=f|_V$. 因 f 在 U 上式光滑的，故 $f\cdot h$ 在 V 上也是光滑的；而 h 又保证了 $\hat{f}$ 能以 C^∞ 的方式光滑从 V 过渡到 $M\backslash U$，所以 $\hat{f}$ 是整个流形 M 上的光滑函数. ■

这个命题是说：局部的光滑函数可以很容易地延拓成整个流形上的光滑函数. 反之，光滑流形 M 上的光滑函数场也可以限制在开子集 V 上.

练习 4-7 证明本节未给出证明过程的定理（命题）.

4.4 切空间

在 §4.1.3.1中，我们给出了欧氏空间切矢量的定义4.2；现在有了微分流形概念，可以把定义4.2移植到流形论中. 本节先定义切矢量，再引入余切矢量. 这个过程也可以反过来，即先定义余切矢量，再引入切矢量；可参考[70]§1.2.

4.4.1 切矢量

定义 4.26 设有一 m 维 C^∞ 微分流形 M，任选其中一点 $x\in M$. 点 x 上**切矢量**（简称**矢量**）v^a 是指满足如下条件的一个映射 $v^a:C^\infty_x(M)\to\mathbb{R}$

(1) 线性性：$\forall g,h\in C^\infty_x(M)$ ，$\forall\lambda\in\mathbb{R}$，有 $v(g+\lambda h)=v(g)+\lambda v(h)$;

(2) Leibniz 律：$\forall g,h\in C^\infty_x(M)$，有 $v(g\cdot h)=\big(v(g)\big)\cdot h(x)+g(x)\cdot v(h)$.

在 §4.1.3.1中，我们将方向导数等同于切矢量，这个认知在流形中也是成立的. 设映射 $\gamma:(-a,a)\to M$ 是微分流形 M 中一条经过固定点 x_0 的光滑曲线，其中 $x_0=\gamma(0)$，则下面的映射 $v^a:C^\infty_{x_0}\to\mathbb{R}$（其中 $f\in C^\infty_{x_0}(M)$）

$$v(f)\overset{def}{=}\left.\frac{\mathrm{d}\big(f\circ\gamma(t)\big)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}\equiv\left.\frac{\mathrm{d}\Big(f\big(\gamma(t)\big)\Big)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0};\quad -a<t<a,\quad a>0. \tag{4.4-1}$$

便确定了 x_0 点的一个切矢量 v^a；只需验证上面公式满足定义即可．线性性的验证是一望而知的．下面验证 Leibniz 律；需要先指出

$$(f\cdot g)\circ\gamma \overset{def}{=} (f\circ\gamma)\cdot(g\circ\gamma). \tag{4.4-2}$$

将上式代入式(4.4-1)，有

$$\begin{aligned} v(f\cdot g) &= \frac{\mathrm{d}\Big(f\big(\gamma(t)\big)\cdot g\big(\gamma(t)\big)\Big)}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} \\ &= \frac{\mathrm{d}\Big(f\big(\gamma(t)\big)\Big)}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0}\cdot g\big(\gamma(0)\big) + f\big(\gamma(0)\big)\cdot\frac{\mathrm{d}\Big(g\big(\gamma(t)\big)\Big)}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} \\ &= \big(v(f)\big)\cdot g(x_0) + f(x_0)\cdot v(g). \end{aligned}$$

验证完毕．公式(4.4-1)中所定义的切矢量称为曲线 $\gamma(t)$ 在 $t=0$ 的**切矢量**．这个例子非常生动地说明了切矢量和方向导数是一回事儿！

注 4.27 $v(f)$ 是一个实数，如果写成 $v^a(f)$ 可能会被误认为是一个矢量，所以略去抽象指标．后面切矢量场作用在标量函数场上时也不采用抽象指标记号．

局部坐标本身就是一个 $\mathbb{R}^m$，具有线性结构，我们选取这样的曲线 $\gamma_j : (-a_j, a_j)\to M,\ 1\leqslant j\leqslant m$ 使得其局部坐标是

$$x^i\big(\gamma_j(t)\big) = x_0^i + \delta^i_j\cdot t, \tag{4.4-3}$$

上式中指标 j 是固定不变的，上标 i 是其 m 个坐标分量的指标．当 $i\neq j$ 时，坐标就处在 x_0^i 点不动；当 $i=j$ 时，（只有这一个）坐标按线性规律（即直线）变化．将这样的坐标代入式(4.4-1)，并将这个切矢量记为 $(\frac{\partial}{\partial x^j})^a$（注意作用到标量函数上后，略去抽象指标）

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x^j}f\big(\gamma(0)\big) &= \frac{\mathrm{d}(f\circ\varphi^{-1})\circ\big(\varphi\circ\gamma(t)\big)}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} = \frac{\mathrm{d}(f\circ\varphi^{-1})(x_0^1,\cdots,x_0^j+t,\cdots,x_0^m)}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} \\ &= \frac{\partial(f\circ\varphi^{-1})}{\partial x^j}\bigg|_{\varphi(x_0)}\frac{\mathrm{d}(x_0^j+t)}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} = \frac{\partial(f\circ\varphi^{-1})}{\partial x^j}\bigg|_{\varphi(x_0)}. \end{aligned}$$

很明显切矢量(4.4-1)在坐标(4.4-3)下就表现为对标量函数 f 求坐标 x^j 的偏导数，这也是将其记为 $(\frac{\partial}{\partial x^j})^a$ 的理由；这样的偏导数（也就是切矢量）共有 m 个，即 $j=1,\cdots,m$.

4.4.2 切空间基矢

上面定义中已给出切矢量对 $C_x^\infty(M)$ 中全体（标量）函数具有线性性．若在不同切矢量间定义如下关系：

$$(u+v)f \overset{def}{=} u(f)+v(f), \qquad u,v \text{ 是 } x\in M \text{ 的任意切矢量;} \tag{4.4-4a}$$

$$(\lambda u)f \overset{def}{=} \lambda\big(u(f)\big), \qquad \forall\lambda\in\mathbb{R}. \tag{4.4-4b}$$

上两式中 $f\in C_x^\infty(M)$．有了这样定义之后，不难发现 $x\in M$ 点全体切矢量满足线性空间的定义3.1，我们称这个线性空间是微分流形 M 在点 x 的**切空间**，记为 T_xM．下面我们证明这个空间的维数恰好是 m；大体思路是：首先找到 m 个切矢量，然后证明它们线性无关，最后证明每个切矢量都可以由它们展开．

设微分流形 M 在点 x_0 的邻域的容许坐标卡是 $(U,\varphi;x)$，点 x_0 的坐标是 $(x_0^1,\cdots,x_0^m)$．前面已经指出了

$$\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a\Big|_{x_0}, \qquad 1\leqslant i\leqslant m, \tag{4.4-5}$$

是点 $x_0\in U$ 的切矢量．需注意：局部开子集 U 与 $\mathbb{R}^m$ 是拓扑同胚的，天生有坐标，天生有偏导数的概念，无需另行定义；或者直接将 U 与 $\mathbb{R}^m$ 作恒等认同．

用反证法．假设存在 m 个不全为零的实常数 c^i 使得下式成立：

$$c^i\frac{\partial f}{\partial x^i}=0, \qquad \forall f\in C^\infty(U). \tag{4.4-6}$$

将标量函数 f 选为坐标线 x^k，并将这些坐标线一一代入上式，容易得到 $c^k=0,\ k=1,\cdots,m$．与假设矛盾，所以 m 个矢量是线性无关的．

任意给定一个满足定义4.26的矢量 $v^a\in T_{x_0}M$，下面证明它可以由 $(\frac{\partial}{\partial x^j})^a$ 展开．证明过程与定理4.3证明非常相似．仿照命题4.4证明可以得到：满足定义4.26的矢量 v^a 作用到任意实常数 c 上都使之为零，即 $v(c)\equiv 0$．

同样，由多元函数微分中值定理可知，$\forall f\in C_{x_0}^\infty(M)$，有

$$(f\circ\varphi^{-1})(x^1,\cdots,x^m)=(f\circ\varphi^{-1})(x_0^1,\cdots,x_0^m)+(x^i-x_0^i)\frac{\partial(f\circ\varphi^{-1})\big(x_0+\theta(x-x_0)\big)}{\partial x^i},$$

其中 $0<\theta<1$．将矢量 v^a 作用到上式，可得（请参考定理4.3证明）

$$v\big(f\circ\varphi^{-1}(x^1,\cdots,x^m)\big)=v(x^i-x_0^i)\cdot\frac{\partial(f\circ\varphi^{-1})\big(x_0+\theta(x-x_0)\big)}{\partial x^i}\bigg|_{x=x_0}.$$

记 $v^i \equiv v(x^i)$，并将坐标省略，上式变为（将 $f\circ\varphi^{-1}$ 记为 $\hat{f}$）

$$v(\hat{f}) = v^i \cdot \frac{\partial \hat{f}(x_0)}{\partial x^i} \quad \Leftrightarrow \quad v^a = \sum_{i=1}^{m} v^i \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a_{x_0}. \tag{4.4-7}$$

上面“$\Leftrightarrow$”后的式子将 $\hat{f} \equiv f\circ\varphi^{-1}$ 略去（因 f 和 φ 都是任选的），并补上了抽象指标记号．上式充分说明 x_0 点任意矢量 v^a 都可以由 m 个 x_0 点矢量 $(\frac{\partial}{\partial x^i})^a_{x_0}$ 展开，其系数是 m 个实数 $v^i \equiv v(x^i)$．

因此，$\{(\frac{\partial}{\partial x^i})^a_{x_0},\ 1\leqslant i\leqslant m\}$ 是线性空间 $T_{x_0}M$ 的一组基矢量，称之为**自然坐标（切）基底**，简称自然基底；空间 $T_{x_0}M$ 的维数是 m．

例 4.28 式(4.4-1)给出了光滑曲线 $\gamma(t)$ 的切矢量，我们用自然基底来表示这个切矢量．设 m 维光滑流形 M 有局部坐标系 $(U;x^i)$，$\forall p\in U$（p 对应 $t=0$），曲线 $\gamma(t)$ 上点的局部坐标记为 $\{x^i\}$．将式(4.4-1)展开为

$$\left.\frac{\mathrm{d}\big(f\circ\gamma(t)\big)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \frac{\partial f}{\partial x^i}\left.\frac{\mathrm{d}x^i\circ\gamma(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)^a\Big|_{\gamma(0)} = \frac{\mathrm{d}x^i\big(\gamma(0)\big)}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a. \tag{4.4-8}$$

上式中“$\Rightarrow$”是因为 $f\in C^\infty_p(M)$ 的任意性．这便是曲线 $\gamma(t)$ 在 p 点切矢量的局部坐标展开式；其中切矢量 $\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)^a$ 必需沿曲线 $\gamma(t)$，且取 $t=0$．

注 4.29 一般称 $\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)^a$ 是曲线 $\gamma(t)$ 切线的切矢量，简称**切线切矢量**．比如二维球面 S 上任一点 p 的切平面 T 上的任意（原点在切点 p 的）矢量都是切于球面 S 的．再取过 p 点的一个大圆 $\gamma(t)$，切平面上的切矢量未必切于大圆 $\gamma(t)$．“切线切矢量”是笔者杜撰出来的名词，用来描述切于曲线 $\gamma(t)$ 的切矢量，以区别于切平面 T 上其它切矢量．

4.4.3 余切空间

切空间是一个 m 维线性空间，按照 §3.3内容，它应该有对偶空间．

定义 4.30 切空间 $T_{x_0}M$ 的对偶空间称为微分流形 M 在点 x_0 的**余切空间**，记作 $T^*_{x_0}M$．余切空间的元素称为**余切矢量**．

§3.3中所有内容都可以移植到余切空间；首先，余切空间维数与切空间相同，都是 m 维；其次，利用式(3.3-5)定义自然切基矢的**对偶自然基矢**，将其记为 $(\mathrm{d}x^j)_a$（由于点 x_0 的标记位置与对偶基矢抽象指标位置重合，暂将 x_0 略去）：

$$(\mathrm{d}x^j)_a\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a_{x_0} \equiv \left\langle (\mathrm{d}x^j)_a,\ \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a_{x_0}\right\rangle \overset{def}{=} \delta^j_i. \tag{4.4-9}$$

由上式定义的对偶基矢共有 m 个．将 $(\mathrm{d}x^j)_a$ 作用在任意矢量 v^a 上，有

$$(\mathrm{d}x^j)_a v^a = (\mathrm{d}x^j)_a \left[v^i \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)^a_{x_0} \right] = v^i \left[(\mathrm{d}x^j)_a \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)^a_{x_0} \right] = v^i \delta^j_i = v^j.$$

这说明 $(\mathrm{d}x^j)_a$ 的作用是取出 v^a 在自然坐标基底上的第 j 分量．

任意余切空间元素 $\omega_a \in T^*_{x_0} M$ 都可以在自然对偶基矢上展开，并将其作用到任一切矢量 v^a 上，有

$$\omega_a(v^a) = \left[\omega_j (\mathrm{d}x^j)_a \right] \left(v^i \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)^a_{x_0} \right) = \omega_j v^i \delta^j_i = \omega_j v^j. \tag{4.4-10}$$

上式说明对偶矢量和切矢量的线性映射是一个实数；而切矢量 v^a 作用到标量函数 f 上也得到一个实数 $v(f)$；结合这两点，可说明标量函数 f 可以诱导出一个对偶矢量，记为 $(\mathrm{d}f)_a$；具体过程如下：

$$(\mathrm{d}f)_a v^a \equiv v(f) = v^i \delta^j_i \left. \frac{\partial f}{\partial x^j} \right|_{x_0} = \left[v^i \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)^a_{x_0} \right] \left[(\mathrm{d}x^j)_a \left. \frac{\partial f}{\partial x^j} \right|_{x_0} \right]. \tag{4.4-11}$$

我们说了 $(\mathrm{d}f)_a$ 是由 f 诱导的对偶矢量，自然令 $(\mathrm{d}f)_a v^a$ 等于 $v(f)$，也可看成定义．上式计算过程用到了式(4.4-7)和式(4.4-9)．由上式可见，f 诱导的对偶矢量 $(\mathrm{d}f)_a$ 可以看成

$$(\mathrm{d}f)_a = (\mathrm{d}x^j)_a \left. \frac{\partial f}{\partial x^j} \right|_{x_0}. \tag{4.4-12}$$

将此式去掉抽象指标，很明确地显示了由 f 诱导的对偶矢量是其普通**微分**$\mathrm{d}f$．这也是我们将标量函数场 f（包括局部坐标 x^i）诱导的对偶矢量记成微分的理由（也见式(4.4-9)，$(\mathrm{d}x^i)_a$）．

对于余切矢量，也可先把式(4.4-11)当成定义，然后由此导出坐标基矢间的配合公式(4.4-9)；再导出其它公式．很明显定义(4.4-9)和式(4.4-11)是相容的．

注 4.31 读者需注意：抽象指标作用之一是标记张量类型；当不用于求和哑标时，直接去掉后就变成了 §3.7记号方式；此时，自然坐标切基矢是偏导数（$(\frac{\partial}{\partial x^i})^a \to \frac{\partial}{\partial x^i}$），自然坐标对偶基矢是普通微分式（$(\mathrm{d}x^j)_a \to \mathrm{d}x^j$）．

4.4.4 局部坐标变换

微分流形定义中要求坐标卡可以取成各种相容形式，如果 $x_0 \in M$ 有两个相互容许的坐标卡 $(U, \varphi; x)$ 和 $(V, \psi; y)$，且 $U \cap V \neq \varnothing$；对应的自然坐标基底分别

是 $(\frac{\partial}{\partial x^i})^a_{x_0}$ 和 $(\frac{\partial}{\partial y^j})^a_{x_0}$. 我们把 $(\frac{\partial}{\partial y^j})^a_{x_0}$ 看成式(4.4-7)中的 v^a，那么有

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^j}\right)^a_{x_0} = \left.\frac{\partial x^i}{\partial y^j}\right|_{x_0} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a_{x_0} \Leftrightarrow \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a_{x_0} = \left.\frac{\partial y^j}{\partial x^i}\right|_{x_0} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial y^j}\right)^a_{x_0}. \tag{4.4-13}$$

上式同时写出了逆变换；可见过渡矩阵恰好是 x_0 点的 Jacobi 矩阵.

在 $U \cap V$ 中可以把 y^j 看成自变量是 x^i 的标量函数（也可反过来），将式(4.4-12)中的 f 用 y^j 替换后，有

$$(\mathrm{d}y^j)_a = (\mathrm{d}x^i)_a \left.\frac{\partial y^j}{\partial x^i}\right|_{x_0} \quad \Leftrightarrow \quad (\mathrm{d}x^i)_a = (\mathrm{d}y^j)_a \left.\frac{\partial x^i}{\partial y^j}\right|_{x_0} \tag{4.4-14}$$

过渡矩阵恰好是 x_0 点的 Jacobi 矩阵的转置逆.

其实，在同一流形 M 中，点 $x_0 \in M$ 有两个相互容许的坐标卡 $(U, \varphi; x)$ 和 $(V, \psi; y)$，且 $U \cap V \neq \varnothing$；此时的局部坐标变换与局部微分同胚是等价的，一般分别称它们为被动模式和主动模式. 请读者仔细理解这两种操作的等价性.

4.4.5 张量

能否在一般流形（比如球面 $x^2+y^2+z^2=1$）上直接指定张量？答案否！流形可能是非线性的，我们无法在一个非线性几何客体上直接指定张量（多重线性函数）；只有在每点引入线性的切空间和余切空间后，才能在每点指定张量.

有了切空间 $T_{x_0}M$ 及其对偶空间 $T^*_{x_0}M$（两个都是线性空间），仿照 §3.7，可以定义微分流形 M 在点 x_0 处的 $\binom{p}{q}$ 型张量，可以把它看成 m^{p+q} 维线性空间

$$\mathcal{T}^p_q(x_0) \equiv \underbrace{T_{x_0}M \otimes \cdots \otimes T_{x_0}M}_{p\text{个}} \otimes \underbrace{T^*_{x_0}M \otimes \cdots \otimes T^*_{x_0}M}_{q\text{个}} \tag{4.4-15}$$

中的元素. 也可以把它看成笛卡尔积空间

$$\underbrace{T^*_{x_0}M \times \cdots \times T^*_{x_0}M}_{p\text{个}} \times \underbrace{T_{x_0}M \times \cdots \times T_{x_0}M}_{q\text{个}} \tag{4.4-16}$$

的 $p+q$ 重线性函数.

从上一小节可知线性空间 $\mathcal{T}^p_q(x_0)$ 的自然基矢量是（略去了下标 x_0）

$$\left(\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}\right)^{a_1} \otimes \cdots \otimes \left(\frac{\partial}{\partial x^{i_p}}\right)^{a_p} \otimes (\mathrm{d}x^{j_1})_{b_1} \otimes \cdots \otimes (\mathrm{d}x^{j_q})_{b_q}. \tag{4.4-17}$$

上式中 $1 \leqslant \{i,j\} \leqslant m$. 由式(4.4-13)和(4.4-14)不难得到上式在坐标变化下的变换关系. 通常省略张量积符号 $\otimes$.

$\mathcal{T}_q^p(x_0)$ 中的任一张量可以在基矢组(4.4-17)上展开,

$$\alpha^{a_1\cdots a_p}{}_{b_1\cdots b_q} = \alpha^{i_1\cdots i_p}{}_{j_1\cdots j_q}\left(\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}\right)^{a_1}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial x^{i_p}}\right)^{a_p}(\mathrm{d}x^{j_1})_{b_1}\cdots(\mathrm{d}x^{j_q})_{b_q}. \tag{4.4-18}$$

当坐标变换时, 由式(4.4-13)和(4.4-14)易得分量的变换关系是

$$\tilde{\alpha}^{k_1\cdots k_p}{}_{l_1\cdots l_q}(y) = \alpha^{i_1\cdots i_p}{}_{j_1\cdots j_q}(x)\times\frac{\partial y^{k_1}}{\partial x^{i_1}}\cdots\frac{\partial y^{k_p}}{\partial x^{i_p}}\times\frac{\partial x^{j_1}}{\partial y^{l_1}}\cdots\frac{\partial x^{j_q}}{\partial y^{l_q}}. \tag{4.4-19}$$

需要强调的是: 上式所有量都需在点 $x_0 \in M$ 取值, $\{x\}$、$\{y\}$ 是 x_0 点某个小邻域的两套坐标系. 由此式直接可得一阶切矢量或余切矢量的分量变换关系.

小结

本小节引入了诸多概念: 切矢量、切空间、余切空间、自然坐标切基底、自然坐标对偶基底, 等等; 这些概念会贯穿整个微分几何.

在微积分中, 如果函数很复杂, 不好研究; 我们会将其进行泰勒展开, 首项是一阶导数项(即线性项), 那么问题就简单多了. 多元微积分中同样有类似的线性化近似方法. 在二维曲面论中, 我们会取某点的切平面, 在这个切平面上来研究此曲面的局部性质. 微分流形 M 的切空间便是上述方法的推广, 切空间 $T_{x_0}M$ 是微分流形 M 的局部线性化; 切空间具有 $\mathbb{R}^m$ 空间的线性结构, 这样我们便可以用线性代数工具来研究了; 总之, 切空间是为了简化流形研究而引入的一个重要概念.

由于本书是写给物理学工作者的, 故在数学严谨性上有所欠缺; 严格说来, 切矢量应该定义在函数芽(germ)的概念上, 有兴趣读者可参考[70]§1.2.

最后, 单列一个自然段来再次强调: 流形 M 的切空间 T_pM 同构于 $\mathbb{R}^m$.

4.5 诱导映射

设有两个微分流形 M 和 N, 维数分别为 m 和 n(两者未必相等), 存在光滑映射 $\phi: M \to N$; M 和 N 的局部坐标分别为 $(U;x^i)$ 和 $(V;y^\alpha)$, 则

$$y^\alpha = \phi(x^i) = y^\alpha(x^1,\cdots,x^m), \qquad 1 \leqslant \alpha \leqslant n. \tag{4.5-1}$$

取微分流形 M 中任一点 x_0 及微分流形 N 中点 $\phi(x_0)$，则有 $y_0^\alpha = \phi(x_0^i)$. 那么它自然诱导出一系列映射.

定义 4.32 从 $C^\infty_{\phi(x_0)}(N)$ 到 $C^\infty_{x_0}(M)$ 的**拉回映射** ϕ^* 定义为

$$\phi^*(g) \overset{def}{=} g\circ\phi, \qquad \forall g\in C^\infty_{\phi(x_0)}(N). \tag{4.5-2}$$

一般来说，我们不能把 M 中的标量函数推前到 N 上；比如映射 ϕ 不是单射，假设有 $\phi(x_1)=\phi(x_2)=y\in N$，那么 y 处的被推前函数值就不知道该选为 $g(x_1)$ 还是 $g(x_2)$ 的值了，出现多值选择困难.

定义 4.33 定义**推前映射**，或称为**切映射**：

$$(\phi_* v)(g) \overset{def}{=} v(\phi^*(g)) = v(g\circ\phi), \qquad \forall g\in C^\infty_{\phi(x_0)}(N), \quad \forall v^a\in T_{x_0}M. \tag{4.5-3}$$

同样注意，对于一般的光滑映射，我们不能定义切矢量的拉回；请读者仿照上面讨论，用非单一性给出（类似）解释.

定义 4.34 **拉回映射**可拓展到余切矢量，也称为**余切映射**：

$$(\phi^*\omega)_a v^a \overset{def}{=} \omega_a(\phi_* v)^a, \qquad \forall\omega_a\in T^*_{\phi(x_0)}N, \quad \forall v^a\in T_{x_0}M. \tag{4.5-4}$$

需要强调的是：上面几个定义都是点对点的.

命题 4.35 切映射和余切映射都是线性的.

证明 . 先证切映射是线性的. 设 $\forall u^a, v^a\in T_{x_0}M$, $\forall g\in C^\infty_{\phi(x_0)}(N)$, $\forall\lambda\in\mathbb{R}$，

$$\big(\phi_*(u+\lambda v)\big)(g) = (u+\lambda v)(g\circ\phi) = u(g\circ\phi)+\lambda\cdot v(g\circ\phi) = (\phi_* u)(g)+\lambda\cdot(\phi_* v)(g).$$

与前面约定相同，当切矢量作用在标量函数上时省略抽象指标.

再证余切映射的线性性. $\forall\omega_a,\mu_a\in T^*_{\phi(x_0)}N$, $\forall v^a\in T_{x_0}M$, $\forall\lambda\in\mathbb{R}$，有

$$\phi^*(\omega+\lambda\mu)_a v^a = (\omega+\lambda\mu)_a(\phi_* v)^a = (\phi^*\omega)_a v^a + \lambda(\phi^*\mu)_a v^a.$$

证明过程与上面证明完全类似，所以省略了一步. 标量函数的拉回映射4.32也是线性的，证明过程完全相同，略. ■

命题 4.36 证明切映射确实是“切矢量”，即验证 $\phi_* v$ 满足定义4.26.

证明 . 留给读者当作习题. ■

命题 4.37 导出自然基矢在切映射和余切映射下的变换关系.

证明 . 符号同本节开头叙述. 命题要求解的是切映射 $\phi_*(\frac{\partial}{\partial x^i})^a$ 在局部坐标 $(V;y)$ 的基矢 $(\frac{\partial}{\partial y^\alpha})^a$ 下的展开系数，只需将它作用在局部坐标 $y^\alpha(x^i)$ 上即可.

$$\left[\phi_*\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)\right](y^\alpha)=\frac{\partial}{\partial x^i}(y^\alpha\circ\phi)=\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\ \Leftrightarrow\ \phi_*\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a=\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\left(\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right)^a \tag{4.5-5}$$

切映射在局部坐标基矢间的关系是 Jacobi 矩阵，注意这个矩阵未必是方阵.

命题要求解的是余切映射 $\phi^*(\mathrm{d}y^\alpha)_a$ 在局部坐标 $(U;x)$ 的自然基矢 $(\mathrm{d}x^i)_a$ 下的展开系数，作法同上，有

$$\begin{aligned}&\phi^*\left(\mathrm{d}y^\alpha\right)_a\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a=\left(\mathrm{d}y^\alpha\right)_a\ \phi_*\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a=\left(\mathrm{d}y^\alpha\right)_a\frac{\partial y^\beta}{\partial x^i}\left(\frac{\partial}{\partial y^\beta}\right)^a=\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\\ \Rightarrow\ &\phi^*\left(\mathrm{d}y^\alpha\right)_a=\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\left(\mathrm{d}x^i\right)_a.\end{aligned} \tag{4.5-6}$$

余切映射局部坐标基矢间的关系也是 Jacobi 矩阵.

最后强调一点：所有公式只在 x_0 点取值，为使下标简洁才略去了此点. ■

命题4.37中映射是 $\phi:M\to N$，如果我们令 $N\equiv M$，并且令 ϕ 是恒等映射 id；但 M 和 N 的局部坐标未必相同. 这时上面命题中的变换可以理解成同一局部邻域内的坐标变换；公式与 §4.4.4中的相同.

利用式(4.5-6)可证明如下一个重要公式，即普通微分和拉回映射可对易.

$$\begin{aligned}\phi^*(\mathrm{d}f)_a=&\phi^*\left[\frac{\partial f}{\partial y^\alpha}(\mathrm{d}y^\alpha)_a\right]=\left.\frac{\partial f}{\partial y^\alpha}\right|_{\phi(x_0)}\left.\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\right|_{x_0}\left(\mathrm{d}x^i\right)_a=\left.\frac{\partial(f\circ\phi)}{\partial x^i}\right|_{x_0}\left(\mathrm{d}x^i\right)_a\\ =&\mathrm{d}_a(f\circ\phi)=\mathrm{d}_a(\phi^*f).\end{aligned} \tag{4.5-7}$$

仿照上式，其实式(4.5-6)也可以写为 $\phi^*(\mathrm{d}y^\alpha)_a=\mathrm{d}_a(y^\alpha\circ\phi)$.

给出复合映射的关系式.

定理 4.38 设有光滑流形 M,N 和 Q，存在流形间的光滑映射 $\phi:M\to N$ 和 $\psi:N\to Q$，则复合映射 $\psi\circ\phi:M\to Q$ 的三种诱导映射服从如下链式法则（其中 $\forall p\in M$），

(1) $(\psi\circ\phi)^*=\phi^*\circ\psi^*:C^\infty_{\psi\circ\phi(p)}(Q)\to C^\infty_p(M)$；对应定义4.32；

(2) $(\psi\circ\phi)_*=\psi_*\circ\phi_*:T_pM\to T_{\psi\circ\phi(p)}Q$；对应定义4.33；

(3) $(\psi\circ\phi)^*=\phi^*\circ\psi^*:T^*_{\psi\circ\phi(p)}Q\to T^*_pM$；对应定义4.34.

证明 . 设有任意 $v^a \in T_pM$ 和任意 $f \in C^\infty_{\psi\circ\phi(p)}(Q)$，以及任意的 $\omega_a \in T^*_{\psi\circ\phi(p)}(Q)$. 先证第 (1) 式，由定义直接计算，得

$(\psi\circ\phi)^*(f) = f\circ\psi\circ\phi(p) = (f\circ\psi)\circ\phi(p) = \big(\psi^*(f)\big)\circ\phi(p) = \phi^*\big(\psi^*(f)\big)\big|_p$; 或者

$(\psi\circ\phi)^*(f) = f\circ\psi\circ\phi(p) = (f\circ\psi)\circ(\phi)|_p = \phi^*(f\circ\psi)|_p = \phi^*\big(\psi^*(f)\big)\big|_p$.

上式最后一式便是第 (1) 条中的结论. 再证第 (2) 式：

$$(\psi\circ\phi)_*v(f) = v\big((\psi\circ\phi)^*(f)\big) = v\Big(\phi^*\circ\big(\psi^*(f)\big)\Big) = \phi_*v\big(\psi^*(f)\big) = \psi_*\circ\phi_*v(f).$$

证明过程中用到了第 (1) 式. 最后证明第 (3) 式：

$$\big((\psi\circ\phi)^*\omega_a\big)(v^a) = \omega_a\big((\psi\circ\phi)_*v^a\big) = \omega_a(\psi_*\circ\phi_*v^a) = \psi^*\omega_a(\phi_*v^a) = (\phi^*\circ\psi^*\omega_a)(v^a).$$

需要注意，第 (1)、(3) 式的链式法则次序与原复合映射次序相反. ■

例 4.39 曲线 $\gamma(t)$ 切矢的推前等于“曲线像 $\phi\circ\gamma(t)$”的切矢.

设有光滑流形 M 和 N，存在流形间的光滑映射 $\phi : M \to N$. M 中有光滑参数曲线 $\gamma(t)$，此线切矢量如式(4.4-8)所述. 很明显 $\phi\circ\gamma : (-\delta,\delta) \to N$ 是流形 N 中一条光滑曲线，下面来给出此条曲线的切矢量，$\forall f \in C^\infty_{\phi(0)}(N)$，

$$\phi_*\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\gamma(0)}\right)(f) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\gamma(0)}(f\circ\phi) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}\big(f\circ\phi\circ\gamma(t)\big) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\phi\circ\gamma(0)}(f).$$

从上式可以得到

$$\phi_*\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\gamma(0)}\right)^a = \left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\phi\circ\gamma(0)}\right)^a. \tag{4.5-8}$$

在涉及曲线切矢量的计算时，此式非常有用. ■

练习 4-8 有映射 $f(t) = (t, t^2)$，$g(x,y) = x\cos y$. 求切映射：f_*、g_*、$(f\circ g)_*$.

练习 4-9 算出例题4-8中曲线 f 的切矢量，然后推前到像集中；先将曲线 f 推前到像集中，再求它的切矢量；进而验证式(4.5-8)是否正确.

4.6 子流形

定理 4.40 设光滑流形 M 和 N 的维数都是 m，$f : M \to N$ 是光滑映射. 如果在一点 $p \in M$，切映射 $f_* : T_pM \to T_{f(p)}N$ 是同构的，则存在点p 在 M 中的邻

域 U 使得 $V = f(U)$ 是点 $f(p)$ 在 N 中的一个邻域，并且 $f|_U : U \to V$ 是微分同胚映射.

定理4.40的证明请参考[70]§1.3定理 3.2. 利用上面定理可证明如下定理.

定理 4.41 设光滑流形 M 和 N 的维数分别是 m 和 n，且 $m < n$. $f : M \to N$ 是光滑映射，并且切映射 $f_* : T_pM \to T_{f(p)}N$ 是非退化的. 则存在点 p 的局部坐标系 $(U; x^i)$ 以及点 $q = f(p)$ 的局部坐标系 $(V; y^\alpha)$，使得 $f(U) \subset V$，并且映射 $f|_U$ 可用局部坐标表示为

$$\begin{cases} y^i \circ f = x^i, & 1 \leqslant i \leqslant m; \\ y^\nu \circ f = 0, & 1 + m \leqslant \nu \leqslant n. \end{cases} \tag{4.6-1}$$

证明 . 设光滑映射 f 在 p 点局部坐标系 $(U; x^i)$ 下的像点 q 的坐标关系是

$$y^\alpha = f^\alpha(x^1, \cdots, x^m), \qquad 1 \leqslant \alpha \leqslant n.$$

因切映射 f_* 在点 p 是非退化的，那么可知 Jacobi 矩阵至少存在一个 $m \times m$ 的子矩阵的行列式非零，不妨假设

$$\left.\frac{\partial(f^1, \cdots, f^m)}{\partial(x^1, \cdots, x^m)}\right|_{x^i=0} \neq 0.$$

因 f 是光滑函数，此行列式至少是连续的，所以存在 p 点附近一个充分小邻域，在此小邻域范围内上式恒不为零.

可将 $(U; x^i)$ 的 m 维坐标卡延拓至 n 维，即假设有 $\mathbb{R}^{n-m}$ 中的一个方体

$$I \equiv \{(x^{m+1}, \cdots, x^n) \mid \max(|x^{m+1}|, \cdots, |x^n|) < \delta\},$$

其中 δ 是一个充分小正实数. 构造映射 $\tilde{f} : U \times I \to V$，其坐标表达式如下

$$\begin{cases} (y \circ \tilde{f})^i = f^i(x^1, \cdots, x^m), & 1 \leqslant i \leqslant m; \\ (y \circ \tilde{f})^\alpha = x^\alpha + f^\alpha(x^1, \cdots, x^m), & 1 + m \leqslant \alpha \leqslant n. \end{cases} \tag{4.6-2}$$

不失一般性，以设 p 点坐标是原点 0；如果不是，平移一下原点即可. 我们将方体 I 的原点和 p 结合在一起，构成 $U \times I$ 的新原点 $\tilde{p} \equiv \{0\}$. 很明显映射 $\tilde{f}$ 在新原点 $\tilde{p}$ 的 Jacobi 行列式不为零，也就是切映射 $\tilde{f}_*$ 是非退化的；根据定理4.40可知映射 $\tilde{f}$ 在 $\tilde{p}$ 点充分小邻域内是微分同胚.

现在我们舍弃 V 中原有坐标系 $\{y^\alpha\}$（如果 $\{y^\alpha\}$ 与式(4.6-3)相同，就不用舍弃了，直接用！）；利用微分同胚 $\tilde{f}$ 带来的坐标当成开集 V 的新局部坐标系 $(V;z)$，可表示为

$$\begin{cases} (z\circ\tilde{f})^i = x^i, & 1\leqslant i\leqslant m; \\ (z\circ\tilde{f})^\alpha = x^\alpha, & 1+m\leqslant\alpha\leqslant n. \end{cases} \tag{4.6-3}$$

在此局部坐标系内，$\tilde{f}$ 是 $(U\times I;x)$ 到 $(V;z)$ 的恒等映射. 由映射 $\tilde{f}$ 定义(4.6-2)可知 $\tilde{f}|_{U\times\{0\}}$ 满足定理中要求的映射 $f|_U$；也就是，坐标系(4.6-3)具体表达为

$$\tilde{f}(x^1,\cdots,x^m,0,\cdots,0) = (x^1,\cdots,x^m,0,\cdots,0). \tag{4.6-4}$$

此定理说明：通过坐标变换，局部满秩映射 f 可以将开集 U 单一地映入 N 的一个局部坐标面内. 注：仅是局部，非整体. ■

4.6.1 浸入、嵌入与淹没

现在引入几个定义. 设光滑流形 M 和 N 的维数分别是 m 和 n；$\phi:M\to N$ 是光滑映射. 将 $p\in M$ 点的 Jacobi 矩阵（见注解4.16）秩记为 $\mathrm{rank}_p\phi$，可以考察关于秩的几种重要情形. 需要指出的是流形上的秩未必逐点相同，但考虑到映射是连续的，肯定存在 $p\in M$ 点附近的开邻域 U，在 U 内任意点的秩都相同.

(1) 若 $m=n=\mathrm{rank}_p\phi$，则 ϕ 是局部微分同胚的.

(2) 若 $m\leqslant n, \mathrm{rank}_p\phi=m$，也就是映射 ϕ 在 p 点某个邻域内是局部单一的，则称 ϕ 点 p 是**局部浸入**的. 若映射 ϕ 在 M 上每一点都浸入，则称为**浸入映射**（immerse）.

(3) 设 $\phi:M\to N$ 是浸入的，若 ϕ 是整体单一的，则称为**嵌入映射**（embed）.

(4) 设 $\phi:M\to N$ 是嵌入的，若 ϕ 从 M 带到 $\phi(M)$ 的拓扑结构与 $\phi(M)$ 从 N 上得到的诱导拓扑结构（见定义2.48）相同，“相同”是指由 ϕ 带来的拓扑和从 N 诱导得到的拓扑相互同胚；则称之为**正则嵌入映射**（regular embedding）.

(5) 若 $m>n, \mathrm{rank}_p\phi=n$，则称 ϕ 点 p 是**局部淹没**的（submersion）.

浸入映射只要求局部单一，并不要求大范围单一；因此浸入映射的像可能有自交点. 嵌入映射则要求在整个流形范围内是单一的，没有自交点.

有了浸入和嵌入便可有了子流形定义：

定义 4.42 有 m 维光滑流形 M 和光滑流形 N 间的光滑映射 $\phi: M \to N$；若 ϕ 是浸入（嵌入、正则嵌入）的，则称 (ϕ, M) 是 N 的一个 m 维**浸入（嵌入、正则嵌入）子流形**.

定义 4.43 设有集合 A 和 B，并且有 $A \subset B$，映射 $\imath: A \to B$; $\imath(x) = x$, $\forall x \in A$. 那么，称映射 $\imath$ 为**包含映射**（inclusion map）.

包含映射一定是嵌入映射；反之未必，因嵌入映射值域未必与定义域有交集.

4.6.2 浸入与嵌入区别

我们先叙述几个例题.

例 4.44 开子流形. 设 U 是光滑流形 N 的一个开子集，将流形 N 的光滑结构限制在 U 上，变得到 U 的一个光滑结构，使之成为与 N 同维数的光滑流形. 包含映射 $(\imath, U)$ 是 N 的一个正则嵌入子流形. 则称 $(\imath, U)$ 是 N 的开子流形. ■

例 4.45 闭子流形. 设 (ϕ, M) 是 N 的一个光滑嵌入子流形，如果 (1)$\phi(M)$ 是 N 的一个闭子集. (2)$\forall p \in \phi(M)$，N 中存在局部坐标系 $(U; x^i)$ 使得 $\phi(M) \cap U$ 是由方程 $x^{m+1} = x^{m+2} = \cdots = x^n = 0$ 定义的，那么，称 (ϕ, M) 是 N 的闭子流形. 比如，二维球面连同包含映射就是三维空间的一个闭子集. ■

下面给出两个十分相近的函数，它们都是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的映射.

例 4.46 浸入，非嵌入例子.

$$F(t) = \left(2\cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right),\ \sin 2\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\right). \tag{4.6-5}$$

当 t 取值从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 时，式(4.6-5)在原点（$(0,0)$）处无穷多次自相交. 所以 $(F, \mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的浸入子流形，不是嵌入子流形. ■

例 4.47 浸入，且嵌入，但非正则嵌入例子.

$$G(t) = \left(2\cos\left(2\arctan t + \frac{\pi}{2}\right),\ \sin 2\left(2\arctan t + \frac{\pi}{2}\right)\right). \tag{4.6-6}$$

当 $t = 0$ 时，$G(0) = (0,0)$. 当 $t \to \pm\infty$ 时，曲线无限接近原点，但没有到达原点，即 $G(t \to \pm\infty) \to (0,0)$；没有自交点. 所以 $(G, \mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}^2$ 是嵌入子流形，当然它也是浸入子流形.

由 G 代入 $G(\mathbb{R})$ 的是一条不自相交的曲线，这个拓扑是一维的，同胚于实数轴. 我们再来看诱导拓扑（参见定义2.48）. 取二维平面 $\mathbb{R}^2$ 中的通常拓扑：开

圆盘. 圆心在原点的开圆盘 C，无论半径取多小（必须是个有限小的确定数值，不能是零，也不能取无限趋近于零的极限），首先会包含 $-\epsilon < t < \epsilon$ 的 $G(t)$ 曲线；其次当 $t \to \pm\infty$ 时，$G(t \to \pm\infty) \to (0,0)$，曲线都会进入开圆盘 C. 很明显利用开圆盘得到的诱导拓扑不是一维的实线段，与映射 G 带来的拓扑不同胚，因此 G 不是正则嵌入. ■

例 4.48 浸入，且嵌入，但非正则嵌入又一例. 定义映射 $H:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$ 如下

$$H(t)=\begin{cases}\left(\frac{3}{t^2},\sin\pi t\right), & 1\leqslant t<+\infty,\\ (0,\ t+2), & -\infty<t\leqslant -1.\end{cases} \tag{4.6-7}$$

假定 $H(t)$ 在定义区间 $[-1,+1]$ 内是连接 $(3,0)$ 和 $(0,1)$ 两点的光滑曲线，且与上式给出的两个部分无交点. 映射 $(H,\mathbb{R})$ 是整体单一浸入到 $\mathbb{R}^2$ 的曲线，没有自交点；所以它是浸入的，且是嵌入的.

代入拓扑是由 $H(t)$ 描述的一维曲线，同胚于实数轴. 下面分析诱导拓扑，不难发现 y 轴的 $[-1,+1]$ 部分是曲线 $H(t)$ 的一部分，记为 I_y；显然 I_y 是诱导拓扑中的一部分，且是一维直线段. 当 $t\to+\infty$ 时，曲线会围绕着 x 轴上下摆动，从右侧无限接近 I_y 部分. 与上一例相似，取 $\mathbb{R}^2$ 中的通常拓扑——开圆盘 C，且令开圆盘的圆心在 I_y 上. 但是无论开圆盘半径取得多么小（必须是有限小的确定值），当 $t\to+\infty$ 时，曲线 $H(t\to+\infty)$ 都会进入开圆盘 C；所以 $H(t\to+\infty)$ 也是诱导拓扑的一部分，故代入拓扑与诱导拓扑不是同胚的. 因此，映射 H 不是正则嵌入的. ■

我们再叙述几个定理，省略证明过程，可请参考文献[70]§1.3.

定理 4.49 设 (ϕ,M) 是 N 的单浸入子流形，若 M 紧致，则 (ϕ,M) 是正则嵌入.

定理 4.50 设 (ϕ,M) 是 n 光滑流形 N 的 m 维浸入子流形. (ϕ,M) 是正则嵌入的充分必要条件是：它是 N 的一个开子流形的闭子流形.

定理 4.51 设 (ϕ,M) 是 n 维流形 N 的 m 维浸入子流形. (ϕ,M) 是正则嵌入的充要条件是：对任意点$p\in M$，在 N 中存在 $q=\phi(p)$ 的局部坐标系 $(V;y^i)$，其中 $y^i(q)=0$；且 $\phi(M)\cap V$ 是由 $y^{m+1}=y^{m+2}=\cdots=y^n=0$ 定义的.

对比定理4.41与定理4.51，可以十分清晰地看到浸入与正则嵌入的区别. 浸入只是局部上的要求，即 $\forall p\in U\subset M$，N 中都存在 $\phi(p)$ 点附近的开邻域 $\phi(U)\subset V\subset N$，在邻域 V 内坐标分量 $y^i=0(i>m)$；对邻域 U 外的 M 中的点如何在 N 中表示不作任何要求. 正则嵌入则是整体上的要求，即 $\forall p\in U\subset M$，

N 中都存在 $\phi(p)$ 点附近的开邻域 $\phi(U) \subset V \subset N$，在邻域 V 内坐标分量 $y^i = 0 (i > m)$；对邻域 U 外的 M 中的点如何在 N 中表示也作要求，即 $M - U$ 中的点不能映入 V 中. 若只在 p 点局部邻域 U 内看问题的话，则浸入和正则嵌入没有差别，换句话说：浸入在局部上必定是正则嵌入的. 例4.46、4.47、4.48具体地表明了浸入、嵌入、正则嵌入的差别，尤其请参阅后两道例题中代入拓扑和诱导拓扑的分析.

4.7 切矢量丛

两个流形（笛卡尔）积是一个很基本的概念，见 §4.2.2. 例如，定义在微分流形 M 上实函数 $f(x)$ 的像 $(x, f(x))$ 便是从 M 到（笛卡尔）积流形 $M \times \mathbb{R}$ 的一个映射；这个概念可以进一步推广成纤维丛；本节只叙述相对简单的纤维丛——切矢量丛.

切矢量丛是一个非常基本的概念，这里只给出结果；详尽完整论述可参见 Spivak [55, pp. 63-106]或类似文献.

设 M 是 m 维光滑流形，$p \in M$ 点的切空间记为 T_pM，记

$$TM \equiv \bigcup_{p \in M} T_pM = \{v^a \in T_pM \mid \forall p \in M\}. \tag{4.7-1}$$

TM 是流形 M 上全体切矢量的集合. 我们要给它赋予一个拓扑结构和微分结构，使它成为一个 $2m$ 维的光滑流形. 我们将略去如下证明（可见[71]§3.1、[59]§12.1）：TM 是 Hausdorff 空间；TM 存在开覆盖 $\bigcup_{\alpha \in I} \pi^{-1}(U_\alpha)$，并且这族开覆盖构成 TM 的可数拓扑基.

虽然省略了一些证明，但我们还是要建立 TM 拓扑的. 首先定义如下映射 $\pi : TM \to M$：

$$\pi(v^a) = p; \qquad \forall v^a \in T_pM, \quad p \in M. \tag{4.7-2}$$

这样，对每一个点 $p \in M$，都有 $\pi^{-1}(p) = T_pM$；注意这里的 π^{-1} 不是指逆映射，是指逆像的集合；映射 π 不是单射，无逆；容易看出映射 π 是满射.

设微分流形 M 有微分结构 $\mathscr{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha; x^i) | \alpha \in I\}$，令

$$\pi^{-1}(U_\alpha) \equiv \bigcup_{p \in U_\alpha} T_pM. \tag{4.7-3}$$

当 α 遍历整个指标集 I 后，便有 $\bigcup_{\alpha\in I}\pi^{-1}(U_\alpha)=TM$．很明显 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 是 TM 的子集；因 T_pM 是 m 维的，而点 $p\in U_\alpha$（U_α 是 m 维）又是可变动的，所以可知 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 是 $2m$ 维；进而 TM 也是 $2m$ 维的．这个子集中的元素自然是切矢量；前面我们说过建立微分流形以及坐标卡的过程无法摆脱局部坐标系（见§4.2.3），我们当然选择自然坐标基矢来描述 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 中的切矢量．

设 $(x_p^1,\cdots,x_p^m)$ 是 p 点在映射 φ_α 作用下的坐标；矢量 $v^a\in\pi^{-1}(U_\alpha)$ 可以在 p 点自然切基矢 $\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a\Big|_p$ 下展开，其分量是 $(v^1,\cdots,v^m)$．$\forall\alpha\in I$，定义映射 $\psi_\alpha:\pi^{-1}(U_\alpha)\to U_\alpha\times\mathbb{R}^m\xrightarrow{\varphi_\alpha}\varphi_\alpha(U_\alpha)\times\mathbb{R}^m$（其中 $\varphi_\alpha(U_\alpha)\subset\mathbb{R}^m$ 维数是 m）．

$$\psi_\alpha\left(v^i\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a\Big|_p\right)\overset{def}{=}\left(x_p^1,\cdots,x_p^m,v^1,\cdots,v^m\right),\quad\forall p\in U_\alpha,\ v^a\in\pi^{-1}(p).\tag{4.7-4}$$

因 $(x_p^1,\cdots,x_p^m)$ 与 $(v^1,\cdots,v^m)$ 都是可变动的，所以上述定义更好地说明了 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 是 $2m$ 维的．不难看出映射 ψ_α 是双射，其逆存在；我们可以规定 ψ_α 和 ψ_α^{-1} 是连续映射，相当于规定了 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 中的开集；这样，式(4.7-4)中的映射便是拓扑同胚的，它将 $\varphi_\alpha(U_\alpha)\times\mathbb{R}^m$ 中的（通常）拓扑携带到 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 中．很明显 $(\pi^{-1}(U_\alpha),\psi_\alpha)$ 是 TM 一个坐标卡，这样我们建立了 TM 的拓扑结构．[10]

我们开始建立 TM 上的微分结构；只需验证坐标卡 $(\pi^{-1}(U_\alpha),\psi_\alpha)$ 是 C^∞ 相容的．实际上，$\pi^{-1}(U_\alpha)\cap\pi^{-1}(U_\beta)\neq\varnothing\Leftrightarrow U_\alpha\cap U_\beta\neq\varnothing$．当 $U_\alpha\cap U_\beta\neq\varnothing$ 时，设分别存在坐标卡 $(U_\alpha;x^i)$ 和 $(U_\beta;\tilde{x}^i)$；则它们间的坐标变换是 C^∞ 的，即 Jacobi 矩阵 $\frac{\partial\tilde{x}^j}{\partial x^i}$ 是 $\{x^j\}$ 的 C^∞ 函数，同样，其逆矩阵 $\frac{\partial x^i}{\partial\tilde{x}^j}$ 也是 $\{\tilde{x}^i\}$ 的 C^∞ 函数．设 $p\in U_\alpha\cap U_\beta$，则式(4.7-4)中的 v^a 在 p 点的坐标表达式有两个等价描述如下：

$$v^a=v^i\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a\Big|_p=\tilde{v}^j\left(\frac{\partial}{\partial\tilde{x}^j}\right)^a\Big|_p\tag{4.7-5}$$

不难得到两者分量的变换关系：

$$v^i=\tilde{v}^j\left.\frac{\partial x^i}{\partial\tilde{x}^j}\right|_p\quad\Leftrightarrow\quad\tilde{v}^j=v^i\left.\frac{\partial\tilde{x}^j}{\partial x^i}\right|_p.\tag{4.7-6}$$

上述坐标变换关系中的 Jacobi 矩阵是 C^∞ 的，坐标 $(v^1,\cdots,v^m)$ 本身也是 C^∞ 的，那么坐标变换 $v^i\leftrightarrow\tilde{v}^i$ 是 C^∞ 的；而 $U_\alpha\cap U_\beta$ 自身的坐标变换 $x^i\leftrightarrow\tilde{x}^i$ 本来

[10] 建立 M 的拓扑过程大体如下：(1) 找到 M 的一个覆盖集合 $\mathcal{C}$；(2) 将集合 $\mathcal{C}$ 与 $\mathbb{R}^m$ 中的开子集建立双射关系 σ，要求 σ 和 σ^{-1} 都连续；(3) 双射 σ 可将 $\mathbb{R}^m$ 中拓扑（即开集概念）携带到 M；σ 便是拓扑同胚映射．这样，M 成为拓扑流形．

需注意：如果 M 中原来有拓扑结构 $\mathcal{T}$，这个拓扑未必与 $\mathbb{R}^m$ 中开集存在条件 (2) 中的 σ；如果存在，那么 $(M,\mathcal{T})$ 本身便是拓扑流形．

就是 C^∞ 的；TM 坐标是由两者结合得到的 $(x^1,\cdots,x^m,v^1,\cdots,v^m)$，它的坐标变换自然也是 C^∞ 的. 由100页定义4.5中第二条和命题4.6可知，这个坐标卡集合是相容的，那么便建立了 TM 的 C^∞ 微分结构，从而它是微分流形了. TM 便是切矢量丛，简称切丛.

更多内容请参见第七章.

4.8 切矢量场

在 §4.4中，我们已经介绍了微分流形 M 上某确定点 x 切矢量定义4.26，这个定义可以推广到整个流形，那便是切矢量场.

定义 4.52 在微分流形 M 的每一点 x 都指定一个切矢量 $v^a(x)\in T_xM$，称 v^a 是 M 上的一个**切矢量场**.

设 m 维微分流形 M 有局部坐标系 $(U,\varphi;x)$，很明显，$\{(\frac{\partial}{\partial x^i})^a\}$（其中 $1\leqslant i\leqslant m$）是开集 U 上的切矢量场，但一般说来它们不是整个流形 M 上的切矢量场. 在 §4.4中，已经说明在确定的点 p，$\{(\frac{\partial}{\partial x^i})^a_p\}$ 是该点切空间自然坐标基矢；在 U 上每一点都有定义的 $\{(\frac{\partial}{\partial x^i})^a\}$（$1\leqslant i\leqslant m$）是 U 上**自然标架场**，任一 U 上切矢量场 $v^a(x)$ 都可以用此标架展开

$$v^a(x)|_U=v^i\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a. \tag{4.8-1}$$

定义 4.53 若式(4.8-1)中系数 $v^i(1\leqslant i\leqslant m)$ 是 $C^\infty(U)$ 的，则称 v^a 是 U 上**光滑切矢量场**. 若 v^i 对流形 M 每个坐标卡中开覆盖是 C^∞ 的，则称 v^a 是 M 上**光滑切矢量场**；M 上全体光滑切矢量场记为 $\mathfrak{X}(M)$.

我们用自然方式定义 $\mathfrak{X}(M)$ 中矢量场的加法与数乘（$\forall u^a,v^a\in\mathfrak{X}(M)$，和 $\forall x\in M$，以及 $\forall\lambda\in\mathbb{R}$），有

$$(u^a+v^a)(x)\overset{def}{=}u^a(x)+v^a(x),\qquad(\lambda\cdot v^a)(x)\overset{def}{=}\lambda\cdot v^a(x). \tag{4.8-2}$$

这样定义后，$\mathfrak{X}(M)$ 构成了实数域 $\mathbb{R}$ 上的矢量空间；由于点 $x\in M$ 是连续的、变动的，所以这个矢量空间是无穷维的（因 x 有无穷多个值）. 除了实数域上的数量乘法，还可以定义 $C^\infty(M)$ 上函数乘法（也称为$C^r(M)$-线性，也见定理4.69；注意与数域 $\mathbb{F}$-线性的区别）：

$$(f\cdot v^a)(x)\overset{def}{=}f(x)\cdot v^a(x);\ \forall x\in M,\ \forall f(x)\in C^\infty(M),\ \forall v^a\in\mathfrak{X}(M). \tag{4.8-3}$$

流形 M（或其开子集 U）上的 $C^\infty(M)$ 构成一个含有幺元的交换环（请读者依照定义2.24验证）；在式(4.8-3)定义下（加法仍由式(4.8-2)中第一式来定义），$\mathfrak{X}(M)$ 构成了环 $C^\infty(M)$ 上的矢量空间，也称为 $C^\infty(M)$-模；模的定义见25页2.30.

4.8.1 切矢量场几何定义

设有微分流形 M 及其局部坐标系 $(U,\varphi;x)$，再设 $v^a\in\mathfrak{X}(M)$，及 $f(x)\in C^\infty(M)$；我们先给出切矢量场作用标量函数上的定义（省略抽象指标记号）：

$$\big(v(f)\big)(x)\overset{def}{=}v(x)\big(f(x)\big). \tag{4.8-4}$$

利用式(4.8-1)，得

$$v(x)f=v^i\frac{\partial f}{\partial x^i}=v^i\frac{\partial f\circ\varphi^{-1}}{\partial x^i}. \tag{4.8-5}$$

因 $v^i,f\in C^\infty(M)$，所以由上式可知光滑切矢量场作用在光滑标量场上得到一个光滑标量场，也就是可以把光滑切矢量场看成这样一个映射 $v^a:C^\infty(M)\to C^\infty(M)$；上面局部坐标系是任选的，所以这种看法与局部坐标系无关．此映射自然满足一些性质，见下面定理．

定理 4.54 依式(4.8-4)定义的 $v^a\in\mathfrak{X}(M)$ 是这样一个映射 $v^a:C^\infty(M)\to C^\infty(M)$，并且它满足如下条件：

(1) 线性性：$\forall g,h\in C^\infty(M)$，$\forall\lambda\in\mathbb{R}$，有 $v(g+\lambda h)=v(g)+\lambda v(h)$；

(2) Leibniz 律：$\forall g,h\in C^\infty(M)$，有 $v(g\cdot h)=\big(v(g)\big)\cdot h(x)+g(x)\cdot v(h)$.

反之，如果有映射 $\alpha:C^\infty(M)\to C^\infty(M)$ 满足上面两个条件，那么存在唯一 $v^a\in\mathfrak{X}(M)$ 使得 $v(f)=\alpha(f)$, $\forall f\in C^\infty(M)$.

此定理说明：若映射满足上述两个条件，则它便是一个切矢量场．从而这两个条件可以看作是切矢量场的几何定义（或第二定义）；与切矢量定义4.26相对应；切矢量场的第二定义不要事先给定局部坐标系，显得更几何化．

定理的前一半证明很容易，直接逐点验证即可（留给读者当练习）．后半部分证明略显复杂，为此我们先证明一个命题，也被称为**局部性定理**.

命题 4.55 设 $f,c\in C^\infty(M)$，在开集 $U\subset M$ 上有 $f|_U=c|_U$．如果映射 $v:C^\infty(M)\to C^\infty(M)$ 满足定理4.54中的两个条件，那么必然有 $v(f)|_U=v(c)|_U$.

证明 . 利用定理4.54中第 (2) 个条件，令 $g=1$, $h=1$，则有 $v(1\cdot1)=1\cdot v(1)+$

$1\cdot v(1) \Rightarrow v(1)=2\cdot v(1) \Rightarrow v(1)=0$，进而可以得到 $v(const)=0$；这说明 v 将常数标量场映射为零标量场.

$\forall p\in U$，选择点 p 的一个足够小邻域 V，使得 $V\subset\overline{V}\subset U$；令 $h\in C^\infty(M)$ 是满足命题4.24中条件的标量场，那么在整个流形 M 中有 $(f-c)\cdot h\equiv 0$；将映射 v 作用在这个等式两端，并利用 Leibniz 律，有

$$0=v\big((f-c)\cdot h\big)=\big(v(f-c)\big)\cdot h+(f-c)\cdot v(h)\xrightarrow[\text{在 } V \text{ 上}]{\text{限制}}\big(v(f-c)\big)|_V\cdot h|_V=0.$$

因 h 限制在 V 上是恒为 1 的，（并利用线性性）所以有 $v(f)|_V=v(c)|_V$. 又因点 p 是任意的，所以必然有 $v(f)|_U=v(c)|_U$. ■

注 4.56 定理4.54中的映射 α 是定义在整个流形 M 上的；一般说来，流形是不存在全局（即大范围、整体）坐标系的. 只有限制在局部开子集 $U\subset M$ 上，才可能存在一个坐标系就能覆盖住 U 的情形，进而使用局部坐标来描述切矢量. 定理4.54中的两个条件是针对整个流形 M 的，我们不能随便将其应用到开子集 U 中，或者说切矢量在 U 上还没有定义；我们通过命题4.55诱导出开子集 U 上的一个“切矢量”定义，并证明它满足“局部性”（即命题4.55中描述的属性）. 没有局部性定理，也就没有局部坐标系相应映射的定义，比如式(4.8-6). 在后面的内容中还会有类似的局部性定理，如外微分、联络局部性定理等等.

如此啰嗦地叙述，是因为有些属性在整体与局部并不相同. 比如紧致性，实直线是非紧的，而其子集 $[0,1]$ 是紧致的.“局部性定理”都指出切矢量定义（以及后面将会讲到的外微分、联络等，它们都可以算“导数”的推广）在整体（流形 M）与局部（开子集 U）的性质是相同的.

$\forall p\in U$，选择点 p 的一个足够小邻域 V，使得 $V\subset\overline{V}\subset U$；取 $f\in C^\infty(U)$，根据命题4.25可以将 f 延拓至整个流形 M 上的 $\hat{f}\in C^\infty(M)$，并且有 $f|_V=\hat{f}|_V$. 根据局部性定理，我们可以将 $\alpha(f)$ 在 $p\in U$ 点的局部值定义为

$$\big(\alpha(f)\big)(p)\overset{def}{=}\big(\alpha(\hat{f})\big)(p). \tag{4.8-6}$$

定义号“$\overset{def}{=}$”右端是 $C^\infty(M)$ 中的标量场，本来就有意义. 需要注意的是，这个定义与开集 V 选取无关；可以将 V 换成任意其它开集 V'，只要满足 $V'\subset\overline{V'}\subset U$ 即可；证明过程与上面完全相同. 也和函数 $\hat{f}$ 的选取无关，可以将 $\hat{f}$ 换成任意 $\tilde{f}$，只需满足 $f|_V=\hat{f}|_V=\tilde{f}|_V$ 即可（有无穷多种 $\tilde{f}$ 满足这个关系）. 在通常的微积分中，我们谈及函数 $f(x)$ 在 p 点可导属性时，只需涉及 p 点一个小邻域即可，

无需知道整个实数轴上 $f(x)$ 的性状；上面局部性定理告诉我们这一性质在微分流形中也成立（此性质同样适用于后面的外微分、联络等）.

容易验证由式(4.8-6)诱导出的局部映射 $\alpha : C^\infty(U) \to C^\infty(U)$ 同样满足定理4.54中的两个条件. 下面开始证明定理4.54.

设流形 M 有相容性坐标覆盖 $(U_i, \varphi_i; x^j)$，对于任意点 $p \in M$，它必然属于某个开覆盖 U_i；在此点，我们定义一个映射 $v : C^\infty_p \to \mathbb{R}$ 如下

$$\big(v(f)\big)(p) \equiv \big(v(p)\big)(f) \overset{def}{=} \big(\alpha(f)\big)(p) = \big(\alpha(\hat{f})\big)(p), \qquad \forall f \in C^\infty_p. \tag{4.8-7}$$

由于局部映射 $\alpha : C^\infty(U) \to C^\infty(U)$ 同样满足定理4.54中的两个条件；不难证明在定义(4.8-7)的意义下，这两个条件全部限制在点 p 处取值，即（证明留给读者，极易. 其中 $\forall g, h \in C^\infty_p$, $\lambda \in \mathbb{R}$）

$$\big(v(p)\big)(g + \lambda h) = \big(v(p)\big)(g) + \lambda \cdot \big(v(p)\big)(h), \tag{4.8-8a}$$

$$\big(v(p)\big)(g \cdot h) = \big(v(p)(g)\big) \cdot h + g \cdot \big(v(p)\big)(h). \tag{4.8-8b}$$

上两式说明，由式(4.8-7)定义的 $v(p)$ 符合切矢量定义4.26，因此 $v(p)$ 是流形 M 在点 p 处的一个切矢量. 由于点 p 是任意选取的，于是 M 中每一点都可以定义类似切矢量，这样构造的 v 是 M 上的**切矢量场**.

仍需证明 v^a 的光滑性. 取局部坐标系 $(U_i, \varphi_i; x^j)$，将 v 展开

$$v^a(p) = v^j(p) \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a\Big|_p = \big(v(p)\big)(x^j) \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a\Big|_p = \big(\alpha(p)\big)(x^j) \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a\Big|_p \tag{4.8-9}$$

坐标函数 x^j 是光滑标量场，故而 $\alpha(x^j)$ 也是光滑标量场，由定义(4.8-6)可知其限制在 p 点取值后，$v^j(p)$ 也是 C^∞_p 的；又因 p 是任取的，所以 v^j 是 $C^\infty(M)$ 的. 这便说明了 v^a 在 M 上的光滑性. 切矢量场光滑性的证明不依赖于某特定局部坐标系. 定理4.54证毕.

注 4.57 定理4.54的主要目的是提供一个（表面上）不用局部坐标系的方式定义切矢量场，也就是由此定理能导出定义4.52；从而说明两个定义是等价的.

定理4.54中两个条件是针对整个流形而言的，不能随便用到局部坐标系. 选取局部坐标系后，通过局部性定理以及定义式(4.8-7)，把原来只对整体流形 M 成立的定义诱导出了局部坐标系相应定义；而且容易证明此定义满足(4.8-8)式，即诱导出的定义符合切矢量4.52的要求. 这样，便从第二定义导出了第一定义.

4.8.2 Poisson 括号

设 $u^a, v^a \in \mathfrak{X}(M)$，$\forall f \in C^\infty(M)$，有

$$[u,v]\,(f) \overset{def}{=} u\big(v(f)\big) - v\big(u(f)\big). \tag{4.8-10}$$

由上式定义的 Poisson 括号（也称为对易子）是流形 M 上一个光滑矢量场，即 $[u,v]^a \in \mathfrak{X}(M)$. 证明并不困难，首先从定义式易看出：$[u,v] : C^\infty(M) \to C^\infty(M)$；剩下只需验证它满足定理4.54中的两个条件，我们先验证线性性（其中 $\forall f, g \in C^\infty(M),\ \lambda \in \mathbb{R}$）：

$$\begin{aligned}&[u,v]\,(f+\lambda g) = u\big(v(f+\lambda g)\big) - v\big(u(f+\lambda g)\big) = u\big(v(f)+\lambda v(g)\big) - v\big(u(f)+\lambda u(g)\big)\\ &= u\big(v(f)\big) + \lambda u\big(v(g)\big) - v\big(u(f)\big) - \lambda v\big(u(g)\big) = [u,v]\,(f) + \lambda\,[u,v]\,(g).\end{aligned}$$

Leibniz 律的验证略显麻烦，我们先计算下式：

$$\begin{aligned}u\big(v(f\cdot g)\big) &= u\big(v(f)\cdot g + f\cdot v(g)\big) = u\big(v(f)\cdot g\big) + u\big(f\cdot v(g)\big)\\ &= u\big(v(f)\big)\cdot g + v(f)\cdot u\big(g\big) + u\big(f\big)\cdot v(g) + f\cdot u\big(v(g)\big).\end{aligned}$$

将上式中 u 和 v 互换，并作差，得

$$\begin{aligned}[u,v]\,(f\cdot g) &= u\big(v(f)\big)\cdot g + f\cdot u\big(v(g)\big) - v\big(u(f)\big)\cdot g - f\cdot v\big(u(g)\big)\\ &= \{[u,v]\,(f)\}\cdot g + f\cdot [u,v]\,(g).\end{aligned}$$

这便验证了 Leibniz 律. 因此证明了 Poisson 括号是一个光滑切矢量场.

设 M 有局部坐标系 $(U;x^i)$，可在局部坐标系将 Poisson 括号展开，有

$$\begin{aligned}[u,v]\,(f) &= u^i\frac{\partial}{\partial x^i}\big(v^j\frac{\partial}{\partial x^j}(f)\big) - v^j\frac{\partial}{\partial x^j}\big(u^i\frac{\partial}{\partial x^i}(f)\big)\\ &= \left(u^i\frac{\partial v^j}{\partial x^i} - v^i\frac{\partial u^j}{\partial x^i}\right)\frac{\partial}{\partial x^j}(f).\end{aligned} \tag{4.8-11}$$

用抽象指标可表示为

$$[u,v]^a = \left(u^i\frac{\partial v^j}{\partial x^i} - v^i\frac{\partial u^j}{\partial x^i}\right)\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a. \tag{4.8-12}$$

定理 4.58 光滑流形 M 上的切矢量场 $\mathfrak{X}(M)$ 中的 Poisson 括号满足如下规则：

(1) 反交换律：$[u,v]^a=-[v,u]^a$；
(2) $\mathbb{R}$-线性：$[ku+v,w]^a=k[u,w]^a+[v,w]^a$；
(3) Jacobi 恒等式：$\big[u,[v,w]\big]^a+\big[w,[u,v]\big]^a+\big[v,[w,u]\big]^a=0$.
其中 $\forall u^a,v^a,w^a\in\mathfrak{X}(M)$，$\forall k\in\mathbb{R}$.

证明 . 前两条性质证明极易；下面给出第三条性质的证明，$\forall f\in C^\infty(M)$，有

$$\begin{aligned}\big[u,[v,w]\big](f)&=[u,vw-wv](f)=(uvw-uwv-vwu+wvu)(f)\\ \big[w,[u,v]\big](f)&=(wuv-wvu-uvw+vuw)(f)\\ \big[v,[w,u]\big](f)&=(vwu-vuw-wuv+uwv)(f)\end{aligned}$$

上面三式相加便是定理中的第三条. ■

满足定理4.58中三个条件的运算，可以看成某种乘法，光滑切矢量场 $\mathfrak{X}(M)$ 便是实数域上关于 Poisson 括号乘积的**李代数**；更详细内容请见例13.18.

定理4.58中性质 (2) 说明 Poisson 括号具有 $\mathbb{R}$-线性，然而这一性质并不能推广成 $C^\infty(M)$-线性；$\forall f,g\in C^\infty(M)$，$\forall u^a,v^a\in\mathfrak{X}(M)$，一般有

$$[fu,gv]^a=fg[u,v]^a+f\cdot u(g)\cdot v^a-g\cdot v(f)\cdot u^a. \tag{4.8-13}$$

计算过程并不复杂，留给读者当作练习.

4.8.3 场上的诱导映射

在 §4.5中，引入确定点 x_0 的切映射、余切映射等概念；其中有一些可以直接推广到“场”上，有一些则不可以.

设有两个微分流形 M 和 N，维数分别为 m 和 n（两者未必相等），存在光滑映射 $\phi:M\to N$；M 和 N 的局部坐标分别为 $(U;x^i)$ 和 $(V;y^\alpha)$.

其中标量函数的拉回映射4.32可以直接推广到“场”与“场”间的拉回：

定义 4.59 从 $C^\infty(N)$ 到 $C^\infty(M)$ 的**拉回映射** ϕ^* 定义为

$$\phi^*(g)\overset{def}{=}g\circ\phi,\qquad\forall g\in C^\infty(N). \tag{4.8-14}$$

由于标量函数的拉回映射本质上就是复合函数，对 ϕ 没有太多要求. 例如，举一个极端的例子，假设两个流形分别都是实直线 $\mathbb{R}$，ϕ 是个常数映射 $\phi(x)=$

0, $\forall x \in \mathbb{R}$；这个映射显然不是单射，也不是满射．那么 ϕ 定义的拉回是良定义吗？检查拉回的定义就能看出一点问题都没有，ϕ 把（目标流形 N）$\mathbb{R}$ 的任何光滑函数 g 拉回为（源流形 M）$\mathbb{R}$ 的常数函数，其值为 $g(0)$；$\phi^*(g)$ 对任意 $x \in M$ 都有定义，且满足场的要求．

仿照切矢量场定义，给出余切矢量场定义：

定义 4.60 在微分流形 M 的每一点 x 都指定一个余切矢量 $\omega_a(x) \in T_x^*M$，称 ω_a 是 M 上的一个**余切矢量场**．一般记为 $\mathfrak{X}^*(M)$ 或者 $A^1(M)$．

余切矢量的拉回同样可以拓展到“场”：

定义 4.61 余切矢量场间的**拉回映射**定义为：

$$(\phi^*\omega)_a v^a \overset{def}{=} \omega_a(\phi_* v)^a, \qquad \forall \omega_a \in \mathfrak{X}^*(N), \quad \forall v^a \in T_xM. \tag{4.8-15}$$

可以看出这个定义中的点 x 是可以遍历到流形 M 中任意一点的；$(\phi_* v)^a$ 只需逐点定义即可．映射 ϕ 是否单一（是否满射）并不影响 $(\phi^*\omega)_a$ 是 M 上的“场”这一结论．不难看出定义4.61很容易拓展到任意 $\binom{0}{q}$ 型张量场．

切矢量的推前映射与以上两个定义不同，一般说来，它不能推前成“场”．比如 ϕ 不是单一的，可能有 $x_1, x_2 \in M$ 使得 $\phi(x_1) = \phi(x_2) = y \in N$，但多数情况下 $\phi_*(v_{x_1})^a \neq \phi_*(v_{x_2})^a$；这样在 $y \in N$ 便有两个不同的切矢量，出现多值性．再比如 ϕ 不是满射，那么 $\phi_*(v_x)^a$ 不能遍历到 N 上每个点，因此不能称为“场”．

如果规定 ϕ 是微分同胚，那么可以把推前切矢量变成“场”．

定义 4.62 定义切矢量场的**推前映射**，或称为**切映射**（其中 ϕ 是微分同胚）

$$(\phi_* v)(g) \overset{def}{=} v(\phi^*(g)) = v(g \circ \phi), \qquad \forall g \in C^\infty_{\phi(x)}(N), \quad \forall v^a \in T_xM. \tag{4.8-16}$$

很明显，切映射 ϕ_* 是光滑流形 M 的切空间 T_xM 和光滑流形 N 的切空间 $T_{\phi(x)}N$ 之间的线性映射．

命题 4.63 设 $\phi : M \to N$ 是微分同胚，那么 $\forall v^a \in \mathfrak{X}(M)$、$\forall \omega_a \in \mathfrak{X}^*(M)$ 和 $f \in C^\infty(M)$，它们在微分同胚 ϕ 下的变换关系是：$\phi_*(f v^a) = \big(f \circ \phi^{-1}\big)\big(\phi_* v^a\big)$，$\phi^{-1*}\big(v(f)\big) = \big(\phi_* v\big)\big(f \circ \phi^{-1}\big)$，$\phi^{-1*}(f\omega_a) = \big(f \circ \phi^{-1}\big)\big(\phi^{-1*}\omega_a\big)$．

证明 . 由定义4.62可知，$\forall g \in C^\infty(N)$，有

$$\phi_*(fv)g = (fv)(g \circ \phi) = f \cdot \big(v(g \circ \phi)\big) = (f \circ \phi^{-1}) \cdot \big(\phi_* v(g)\big). \tag{4.8-17}$$

需注意 f 的定义域是 M，故需要 ϕ^{-1} 操作．与之类似，可证明第二式

$$\phi^{-1*}\big(v(f)\big)=\big(v(f)\big)\circ\phi^{-1}=\big(\phi_*v\big)\big(f\circ\phi^{-1}\big). \tag{4.8-18}$$

第三式证明留给读者．总的来说，切矢量场要用 ϕ_* 推前；标量函数场、余切矢量场要用 ϕ^{-1} 拉回． ■

4.8.4 ϕ-相关矢量场

定义4.62将映射限定为微分同胚，其实这还能弱化．设有两个光滑流形 M、N，它们的维数分别是 m、n（$m\leqslant n$）；再设 $\phi:M\to N$ 是光滑映射．

定义 4.64 $X^a\in\mathfrak{X}(M)$，$Y^a\in\mathfrak{X}(N)$；若 $\forall p\in M$ 有 $\phi_*X^a=Y^a_{\phi(p)}$ 成立（或有等价式 $(\phi_*X)(f)=(Yf)\circ\phi$，$\forall f\in C^\infty(N)$），则称 X^a 与 Y^a 是 ϕ-**相关矢量场**．

举个简单的例子，比如流形 M 是一条直线，N 是二维平面；ϕ 是恒等映射，它将 M 映射为 N 中的一条直线（比如 x 坐标轴）．M 上（直线）自然可以定义一个矢量场 X^a，映射 ϕ 只是将 M 映射为 N 中的 x 轴；在 N 中 x 轴之外的地方无法与 M 建立联系，故 ϕ 不能把 X^a 推前成 N 中的“场”．如果把 N 中矢量场 Y^a 的取值范围限定在 x 轴上（即 $\phi(M)$ 上），那么 X^a 和 $Y^a_{\phi(p)}$ 间是有双射关系的，这便是定义4.64中描述的 ϕ-相关．

定理 4.65 设 X^a_i 和 Y^a_i 是 ϕ-相关的（$i=1,2$），则 $[X_1,X_2]^a$ 与 $[Y_1,Y_2]^a$ 是 ϕ-相关的，即 $\phi_*[X_1,X_2]^a=[Y_1,Y_2]^a\circ\phi=[\phi_*X_1,\phi_*X_2]^a$．

证明 . 由定义4.64可知：

$$Y_1\big(Y_2(f)\big)\circ\phi=(\phi_*X_1)\big(Y_2(f)\big)=X_1\big(Y_2(f\circ\phi)\big)=X_1\big(\phi_*X_2(f)\big)=X_1\big(X_2(f\circ\phi)\big).$$

由此式自然可证 $\phi_*[X_1,X_2]^a=[Y_1,Y_2]^a\circ\phi=[\phi_*X_1,\phi_*X_2]^a$． ■

由上述定理立刻可得如下定理：

定理 4.66 设 $\phi:M\to N$ 是微分同胚，则 ϕ_* 保持 Poisson 括号不变：

$$\phi_*[X,Y]^a=[\phi_*X,\phi_*Y]^a,\qquad \forall X^a,Y^a\in\mathfrak{X}(M). \tag{4.8-19}$$

练习 4-10 证明式(4.8-13)．

4.9 张量场

切矢量场的概念自然可以推广到张量上来，见下：

定义 4.67 在微分流形 M 每一点 x 指定一个 $\binom{p}{q}$ 型张量 $T^{a_1\cdots a_p}{}_{b_1\cdots b_q}(x)\in\mathcal{T}^p_qM(x)$，则称 $T^{a_1\cdots a_p}{}_{b_1\cdots b_q}(x)$ 是 M 上的一个**张量场**.

设点 $x\in M$ 有局部坐标系 $(U;x^i)$，张量 T 表达式为：

$$T^{a_1\cdots a_p}{}_{b_1\cdots b_q}=T^{i_1\cdots i_p}{}_{j_1\cdots j_q}\left(\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}\right)^{a_1}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial x^{i_p}}\right)^{a_p}(\mathrm{d}x^{j_1})_{b_1}\cdots(\mathrm{d}x^{j_q})_{b_q}. \tag{4.9-1}$$

定义 4.68 若式(4.9-1)中系数 $T^{i_1\cdots i_p}{}_{j_1\cdots j_q}$ 是 $C^\infty(U)$ 的，则称 $T^{a_1\cdots a_p}{}_{b_1\cdots b_q}$ 是 U 上**光滑张量场**. U、M 上全体光滑切张量场分别记为 $\mathfrak{T}^p_q(U)$、$\mathfrak{T}^p_q(M)$.

可以仿照切矢量场定义加法和数量乘法（见式(4.8-2)）使 $\mathfrak{T}^p_q(M)$ 成为线性空间；仿照式(4.8-3)定义 $C^\infty(M)$-乘法（注意，此乘法不同于数量乘法）. 除此之外，还可逐点定义张量积运算和缩并运算（见 §3.7）. 如果记

$$\mathfrak{T}(M)=\bigoplus_{p,q\geqslant0}\mathfrak{T}^p_q(M), \tag{4.9-2}$$

则 $\mathfrak{T}(M)$ 成为 $C^\infty(M)$ 模. 其中，$\mathfrak{T}^0_0(M)$ 便是标量函数场；$\mathfrak{T}^1_0(M)$ 便是 $\mathfrak{X}(M)$；$\mathfrak{T}^0_1(M)$ 是全体余切矢量场，也称为**一次微分式**，常用记号是 $A^1(M)$ 或 $\mathfrak{X}^*(M)$；$\mathfrak{T}^0_2(M)$ 中有一类特别子集称作**度量**或**度规**（metric）.

张量场也存在与定理4.54类似的定理，因此张量场也可有与切矢量场类似的第二定义；两者的第二定义不需要局部坐标系，显得更几何化.

定理 4.69 （**张量场特征引理**）：光滑流形 M 上一个多重线性映射 $\mathscr{T}$ 如下

$$\mathscr{T}:\underbrace{\mathfrak{X}^*(M)\times\cdots\times\mathfrak{X}^*(M)}_{p\text{个}}\times\underbrace{\mathfrak{X}(M)\times\cdots\times\mathfrak{X}(M)}_{q\text{个}}\to C^\infty(M)$$

是一个 $\binom{p}{q}$ 型光滑张量场，等价于，映射 $\mathscr{T}$ 对每个位置都是 $C^\infty(M)$-线性的（蕴含 $\mathbb{R}$-线性），即

$$\begin{aligned}&\mathscr{T}^{a_1\cdots a_p}{}_{b_1\cdots b_q}\alpha^1_{a_1}\cdots\alpha^p_{a_p}v^{b_1}_1\cdots(f\cdot v^{b_r}_r)\cdots v^{b_q}_q\\=&f\cdot\mathscr{T}^{a_1\cdots a_p}{}_{b_1\cdots b_q}\alpha^1_{a_1}\cdots\alpha^p_{a_p}v^{b_1}_1\cdots v^{b_q}_q\\=&\mathscr{T}^{a_1\cdots a_p}{}_{b_1\cdots b_q}\alpha^1_{a_1}\cdots(f\cdot\alpha^s_{a_s})\cdots\alpha^p_{a_p}v^{b_1}_1\cdots v^{b_q}_q.\end{aligned} \tag{4.9-3}$$

其中，$\forall f\in C^\infty(M)$，$\forall\alpha^j_{a_i}\in\mathfrak{X}^*(M)$，$\forall v^{b_i}_j\in\mathfrak{X}(M)$；$1\leqslant r\leqslant q$ 和 $1\leqslant s\leqslant p$.

证明 . 可参考文献[71]§3.5定理 5.1，或[33]§12.3引理 12.24；或类似文献. ■

很明显，这个定理有许多变种，比如（利用上面定理很容易证明如下推论）

推论 4.70 光滑流形 M 上一个多重线性映射 $\mathscr{T}$ 如下

$$\mathscr{T}:\underbrace{\mathfrak{X}^*(M)\times\cdots\times\mathfrak{X}^*(M)}_{p个}\times\underbrace{\mathfrak{X}(M)\times\cdots\times\mathfrak{X}(M)}_{q个}\to\mathfrak{X}(M)$$

是一个 $\binom{p+1}{q}$ 型光滑张量场，充分必要条件是，映射 $\mathscr{T}$ 对每个位置都是 $C^\infty(M)$ 线性的，即满足式(4.9-3).

推前和拉回映射可拓展到 $\binom{p}{q}$ 型张量场上.

定义 4.71 流形 M 上张量场$T^{a_1\cdots a_p}_{b_1\cdots b_q}$ 的诱导映射定义为

$$(\Phi^*T)^{a_1\cdots a_p}_{b_1\cdots b_q}\omega_{a_1}\cdots\omega_{a_p}\ u^{b_1}\cdots u^{b_q}\overset{def}{=}T^{a_1\cdots a_p}_{b_1\cdots b_q}(\phi^*\omega_{a_1})\cdots(\phi^*\omega_{a_p})(\phi_*^{-1}u^{b_1})\cdots(\phi_*^{-1}u^{b_q}).$$

其中 $\forall\omega_{a_i}\in T^*_{\phi(p)}N$, $\forall u^{b_j}\in T_{\phi(p)}N$；$\phi:M\to N$ 是微分同胚；Φ^* 是推前和拉回映射的混合；矢量场 u^{b_j} 的“推前”需要用 $\phi_*^{-1}:T_{\phi(p)}N\to T_pM$.

命题 4.72 设有 M 上张量场 T、S，由定义4.71可知 $\Phi^*(T\otimes S)=\Phi^*(T)\otimes\Phi^*(S)$.

4.10 单参数变换群

单参数变换群理论是微分流形中一个重要课题，在 Arnold [3]的著作中有着详尽、完整论述[11]. 本节同时参考了文献[70]§6.2.

我们需要用常微分方程理论来描述流形上的矢量场. 为此，在本节假设常微分方程解存在且唯一，也就是满足 Lipschitz 条件[3]§31.

定义 4.73 给定 m 维光滑流形 M 上的光滑切矢量场 v^a 且处处非零. 如果流形 M 上的光滑曲线 $\gamma(t)$ 的切线切矢量 $(\frac{\partial}{\partial t})^a=v^a$（见式(4.4-8)），则称曲线 $\gamma(t)$ 是切矢量场 v^a 的**积分曲线**（或**轨道**）.

因此，在曲线上每一点，曲线 $\gamma(t)$ 的切矢量都由 v^a 规定.

设流形 M 有局部坐标系 $(U;x^i)$，借用式(4.4-7)，将切矢量场 v^a 在局部坐标系展开，其中 v^i 是其分量. 再参考例题4.28，上述定义可表述为：

$$\frac{\mathrm{d}x^i\circ\gamma(t)}{\mathrm{d}t}=v^i(x^1\circ\gamma,\cdots,x^m\circ\gamma),\qquad x^i(t)\big|_{t=t_0}=x^i_p. \tag{4.10-1}$$

[11]其自序：贯穿本书的是两个中心思想及其衍生结果，即矢量场直化定理和单参数线性变换群理论.

我们在上式中同时指定了初始条件：当 $t=t_0$ 时，坐标 $x^i(t_0)$ 取 $p\in M$ 点坐标 x^i_p. 上式是积分曲线的分量表达式，需要注意矢量场 v^a 是不显含参量 t 的. 根据常微分方程解存在唯一性定理[3]§31可知给定初始条件的微分系统(4.10-1)解是唯一确定的；也就是说给定矢量场 v^a 后，过 p 点的积分曲线是（局部）唯一的. 因积分曲线未必在整个实数轴上有定义，故积分曲线未必整体存在、唯一.

例 4.74 设有一维光滑流形：实直线 $\mathbb{R}$，局部坐标取为 $\{x\}$. 其上有光滑矢量场 kx（只有一个分量），其中 k 是实常数；求其过 x_0 点的积分曲线. 将上述条件代入式(4.10-1)，有

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}=kx \quad\Rightarrow\quad x(t)=x_0e^{k(t-t_0)}. \tag{4.10-2}$$

上面例题应该是最简单的情形之一，读者可在平面上画出积分曲线（令 x_0 变动）. 下面给出一个略微复杂一点的例子.

例 4.75 设有二维光滑流形：二维实平面 $\mathbb{R}^2$，局部坐标取为 $\{x,y\}$. 其上有光滑矢量场 (x,ky)（有两个分量），其中 k 是实常数；求其过 (x_0,y_0) 点的积分曲线. 将上述条件代入式(4.10-1)，有

$$\begin{cases}\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} &= x\\ \frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} &= ky\end{cases}\quad\Rightarrow\quad\begin{cases}x(t) &= x_0e^{t-t_0}\\ y(t) &= y_0e^{k(t-t_0)}\end{cases} \tag{4.10-3}$$

积分曲线比上一例题复杂多了，需要对 k 取值范围进行分类，然后再画；有兴趣的读者请仔细画出.

积分曲线不仅与出发点（即初始条件那个点）有关，还与曲线参数化有关.

例 4.76 设 v^a 是光滑流形 M 上处处非零的光滑切矢量场. 假设 $\gamma(t)$ 是矢量场 v^a 的积分曲线，那么 $\gamma(u)$（其中 $u=t+c$，c 是实常数）也是矢量场 v^a 的积分曲线. 直接计算即可证明，

$$\frac{\mathrm{d}x^i\circ\gamma(t+c)}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}x^i\circ\gamma(t+c)}{\mathrm{d}(t+c)}=\frac{\mathrm{d}x^i\circ\gamma(u)}{\mathrm{d}u}=v^i(u)=v^i(t+c). \tag{4.10-4}$$

处处非零矢量场 v^a 过 $p\in M$ 点积分曲线 $\gamma(t)$, $b<t<c$ 在 p 点小邻域内是唯一的，其中 $\gamma(0)=p$. 我们将 $\gamma(t)$ 的定义域 (b,c) 向整个实数轴延拓，使得所有符合方程(4.10-1)的解都包含在内，则称延拓后的积分曲线 $\gamma(t)$ 为矢量场 v^a 的、通过点 p 的**最大积分曲线**. 需要指出的是最大积分曲线的定义域未必是整个实数轴，可能存在某些无法包含在内的点或区间（比如奇点）.

定义 4.77 设 $v^a \in \mathfrak{X}(M)$，若在 $p \in M$ 有 $v^a(p) = 0$，则称 p 是 v^a 的**奇点**.

我们不研究奇点. 在非奇点附近，切矢量场性状是简单的.

定义 4.78 设 $v^a \in \mathfrak{X}(M)$ 且处处非零，如果 v^a 的最大积分曲线$\gamma(t)$ 中的参数 t 可以取遍整个实数轴 $\mathbb{R}$，那么称 v^a 是**完备**切矢量场.

设矢量场 v^a 是完备的，则它的最大积分曲线定义域是整个实数轴. 如果我们人为地挖掉某点（比如 $t = 1$），那么积分曲线定义域不再是整个实数轴，矢量场也不再完备. 这种点可以通过延拓来补齐，从而使得矢量场再次完备. 不能通过延拓而补上的点具有奇异性.

命题 4.79 设有光滑流形 M，处处非零的光滑矢量场 $v^a \in \mathfrak{X}(M)$ 的最大积分曲线 $\gamma_p(t)$ 过点 $p \in M$，并且当 $t = 0$ 时，$\gamma_p(0) = p$；令 $q = \gamma_p(s)$. 那么有 $\gamma_p(s + t) = \gamma_q(t)$.

证明 . 假设命题中所有参数取值在积分曲线 γ_p 定义域内.

由命题可知点 $q \in M$ 在积分曲线 γ_p 上，且其参数取 s，即 $q = \gamma_p(s)$.

曲线 γ_q 是指通过 q 点的矢量场 v^a 的积分曲线（且 $\gamma_q(0) = q$）. 由于 q 在曲线 γ_p 上，并且矢量场 v^a 的最大积分曲线是唯一的（可从常微分方程解的唯一性得到）；所以 γ_q 与 γ_p 是同一条曲线的两种不同表述方式，差别仅在于初始点的不同. 依命题中叙述不难得到结论：$\gamma_p(s + t) = \gamma_q(t)$. ■

设有 m 维光滑流形 M，对于任意点 $p \in M$，由处处非零的完备切矢量场$v^a \in \mathfrak{X}(M)$ 的最大积分曲线$\gamma_p(t)$ 可以定义一个变换[12]

$$\phi(t, p) \equiv \gamma_p(t), \qquad \forall t \in \mathbb{R}, \quad \forall p \in M. \tag{4.10-5}$$

当 p 固定时，$\phi(t, p)$ 就是过 p 点积分曲线. 当参数 t 固定时，$\phi(t, p)$ 给出一个从 M 到 M 的映射（变换）；$\forall (t, p) \in \mathbb{R} \times M$，记 $\phi_t(p) \equiv \phi(t, p)$. 可证明此变换满足如下定理.

定理 4.80 变换 ϕ 满足如下条件：**(1)** $\phi_0 \equiv \mathrm{id} : M \to M$；**(2)** 对于任意实数 s, t 都有 $\phi_t \circ \phi_s = \phi_{t+s}$.

证明 . (1)：$\phi_0(p) = \phi(0, p)$ 自然将 p 点映射成 p 点，所以它是恒等映射.

(2)：由命题4.79可得：$\phi_t \circ \phi_s(p) = \phi_t\big(\phi_s(p)\big) = \phi(t, q) = \phi_{t+s}(p)$. ■

[12]映射一般定义成两个不同集合之间的关系，比如 $\phi : M \to N$；如果是同一集合内部的映射（$\phi : M \to M$），则赋予它一个特别的名字：**变换**.

满足定理4.80中两个条件的 ϕ（由式(4.10-5)定义）被称为**（左）单参数可微变换群**. 完备切矢量场 v^a 一般也称为由单参数可微变换群 $\phi(t,p)$诱导的切矢量场；两者一一对应.

还需要说明 ϕ_t 是一个群. 把第 (2) 条的复合映射看成群乘法，很明显此乘法是封闭的. 由第 (2) 条易证群乘法满足结合律. ϕ_0 是恒等映射，可看成单位元. 再从第 (2) 条可知 $\phi_{-t}\circ\phi_t=\phi_0=\mathrm{id}$，因此 $\phi_{-t}=\phi_t^{-1}$；这说明 ϕ_t 的逆存在且是 C^∞ 的. 综上，ϕ_t 是群.

因 ϕ_t^{-1} 存在，所以 ϕ_t 必然是双射，进而 ϕ_t, ϕ_t^{-1} 都是 C^∞ 的双射；故可知它是**微分同胚**的. 由第 (2) 条可得：$\phi_s\circ\phi_t=\phi_{s+t}=\phi_{t+s}=\phi_t\circ\phi_s$，这说明此群是可对易的.

v_p^a 是积分曲线 $\gamma_p(t)$ 在 p 的切矢量，由式(4.4-1)有公式，有

$$v_p(f)=\left.\frac{\mathrm{d}\big(f\circ\gamma_p(t)\big)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\lim_{t\to0}\frac{f\big(\phi(t,p)\big)-f\big(\phi(0,p)\big)}{t},\tag{4.10-6}$$

其中 $\forall f\in C_p^\infty(M)$. 利用上式，用推前映射语言来描述一下由 $\phi(t,p)$ 诱导的切矢量场 v^a 的变换关系. 很明显 $p\equiv\phi(0,p)$，令 $q\equiv\phi(s,p)$. 由式(4.10-6)易得

$$\begin{aligned}v_q(f)=&\lim_{t\to0}\frac{f\big(\phi(t+s,p)\big)-f\big(\phi(s,p)\big)}{t}=\lim_{t\to0}\frac{f\big(\phi_s(t,p)\big)-f\big(\phi_s(0,p)\big)}{t}\\=&\lim_{t\to0}\frac{f\circ\phi_s(t,p)-f\circ\phi_s(0,p)}{t}=v_p\big(f\circ\phi_s(p)\big)=\phi_{s*}(v_p)(f).\end{aligned}$$

因 f 及 p 的任意性，由上式可得

$$v_q^a=v_{\phi_s(p)}^a=\phi_{s*}(v_p^a).\tag{4.10-7}$$

这便是两点间切矢量推前映射关系式.

上面定义是针对整个流形 M 而言，它还可以弱化，只针对局部子集 U.

定义 4.81 设 U 是光滑流形 M 的一个开子集，取 $\epsilon>0$. 如果光滑映射 $\phi:(-\epsilon,\epsilon)\times U\to M$ 满足如下条件：

(1) $\forall p\in U$, $|t|<\epsilon$ 都有 $\phi_0:U\to U$ 恒等映射；

(2) 若 $|s|<\epsilon$, $|t|<\epsilon$, $|s+t|<\epsilon$，则 $\phi_s\circ\phi_t=\phi_{s+t}$.

那么，称 ϕ_t 为作用在开子集 U 上的**局部（左）单参数可微变换群**.

局部单参数可微变换群自然也有与之对应的局部光滑诱导切矢量场 $v^a\in\mathfrak{X}(U)$. 所诱导的切矢量场 v^a 一般说来不再是完备的，但 ϕ_t 仍是局部微分同胚

的. 需要强调的是：本节定义的单参数可微变换群是*左作用*在流形 M 上的；与之对偶，可以定义*右作用*在流形 M 上的单参数可微变换群；具体参见 §13.14.

定理 4.82 设 ϕ_t 是作用在光滑流形 M 上的单参数可微变换群，v^a 是其所诱导的光滑切矢量场. 若 $\psi : M \to M$ 是一个 C^∞ 微分同胚，则 $\tilde{\phi}_t \equiv \psi \circ \phi_t \circ \psi^{-1}$ 也是作用在 M 上的单参数可微变换群，并且其诱导的光滑切矢量场是 $\psi_* v^a$.

证明 . 显然 $\tilde{\phi}_t$ 是从 M 到 M 的变换；$\tilde{\phi}_0 = \psi \circ \phi_0 \circ \psi^{-1} = \mathrm{id}$ 是恒等映射，满足定理4.80中的第 (1) 条；$\tilde{\phi}_t \circ \tilde{\phi}_s = (\psi \circ \phi_t \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ \phi_s \circ \psi^{-1}) = \psi \circ \phi_{t+s} \circ \psi^{-1} = \tilde{\phi}_{t+s}$，也满足第 (2) 条；综上，$\tilde{\phi}_t$ 是作用在 M 上的单参数可微变换群.

对其求导便可得诱导切矢量场，令 $q = \psi(p)$，$\forall f \in C^\infty(M)$，有

$$\tilde{v}(f) = \left.\frac{\mathrm{d}\big(f \circ \tilde{\phi}(t,q)\big)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \left.\frac{\mathrm{d}\big(f \circ \psi \circ \phi_t \circ \psi^{-1}(q)\big)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \left.\frac{\mathrm{d}\big(f \circ \psi \circ \phi(t,p)\big)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}$$
$$\xlongequal{4.10-6} v(f \circ \psi) \xlongequal{4.8-16} \psi_* v(f).$$

因此 $\tilde{\phi}_t$ 诱导的光滑切矢量场是 $\tilde{v}^a = \psi_* v^a$. ■

定义 4.83 设 v^a 是光滑流形 M 上的光滑切矢量场，$\psi : M \to M$ 是光滑微分同胚. 如果 $\psi_* v^a = v^a$，那么称 v^a 在 ψ 作用下是不变的.

命题 4.84 设 ϕ_t 是作用在光滑流形 M 上的单参数可微变换群，v^a 是其所诱导的光滑切矢量场；$\psi : M \to M$ 是一个 C^∞ 微分同胚. v^a 在 ψ 作用下是不变的充分必要条件是：ϕ_t 与 ψ 可交换，即 $\phi_t \circ \psi = \psi \circ \phi_t$.

证明 . 先证 “$\Leftarrow$”. 如果 ϕ_t 与 ψ 可交换，即 $\phi_t = \psi \circ \phi_t \circ \psi^{-1}$，由定理4.82可知 $v^a = \psi_* v^a$，即 v^a 在 ψ 作用下是不变的.

再证 “$\Rightarrow$”. 由 v^a 和 $\psi_* v^a$ 决定的单参数可微变换群分别是 ϕ_t 和 $\psi \circ \phi_t \circ \psi^{-1}$. 如果 v^a 在 ψ 作用下是不变的，即 $v^a = \psi_* v^a$，那么说明两个单参数可微变换群满足同一常微分方程和相同的初始条件，也就是两条积分曲线是重合的，即 $\phi_t = \psi \circ \phi_t \circ \psi^{-1}$. ■

定理 4.85 设 ϕ_t 是作用在光滑流形 M 上的单参数可微变换群，X^a 是其所诱导的光滑切矢量场；Y^a 是 M 上另一切矢量场. 那么两个切矢量场的 Poisson 括号（对易子）表达式为

$$[X,Y]^a = \lim_{t\to 0} \frac{Y^a_{\phi_0} - (\phi_t)_* Y^a_{\phi_{-t}}}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{(\phi_{-t})_* Y^a_{\phi_t} - Y^a_{\phi_0}}{t}. \tag{4.10-8}$$

证明 . 只需令 $t \to -t$ 即可看到两个表达式等价，所以只需证明其中之一便可.

对于任意的 $f \in C^\infty(M)$，有 $(\phi_{-t})_* Y_{\phi_t}(f) = Y_{\phi_t}\big(f \circ \phi(-t,p)\big)$，其中点 p（对应 $t=0$ 点）是 M 中任一点. 从中可以看出，需要仔细计算其中的表达式 $F(t) \equiv f \circ \phi(-t,p)$；在 $p \in M$ 点小邻域内，我们利用如下积分技巧

$$F(t) - F(0) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}F(st)}{\mathrm{d}s}\mathrm{d}s = t \cdot \int_0^1 \frac{\mathrm{d}F(st)}{\mathrm{d}(st)}\mathrm{d}s \equiv t \cdot g(t,p).$$

上式最后的恒等号相当于定义了 $g(t,p)$，很明显 $g(t,p)$ 是光滑函数. 由此得

$$f \circ \phi(-t,p) = f(p) + t \cdot g(t,p). \tag{4.10-9}$$

先计算一下 $g(0,p)$

$$\begin{aligned} g(0,p) =& \lim_{t\to 0} \int_0^1 \frac{\mathrm{d}F(st)}{\mathrm{d}(st)}\mathrm{d}s = \int_0^1 \lim_{t\to 0} \frac{\mathrm{d}f\circ\phi(-st,p)}{\mathrm{d}(st)}\mathrm{d}s \\ \xlongequal{4.10-6}& - X_p(f)\int_0^1 \mathrm{d}s = -X_p(f). \end{aligned}$$

再计算极限（注意应用上式）

$$\begin{aligned} &\lim_{t\to 0} \frac{(\phi_{-t})_* Y_{\phi_t} - Y_{\phi_0}}{t}(f) = \lim_{t\to 0} \frac{Y_{\phi_t}\big(f(p) + t\cdot g(t,p)\big) - Y_{\phi_0}(f)}{t} \\ &= \lim_{t\to 0} \frac{Y_{\phi_t}\big(f(p)\big) - Y_{\phi_0}(f)}{t} + \lim_{t\to 0} Y_{\phi_t}\big(g(t,p)\big) \\ &= \lim_{t\to 0} \frac{(Y_p f)\circ\phi(t,p) - (Y_p f)\circ\phi(0,p)}{t} - Y_p \circ X_p(f) \\ &\xlongequal{4.10-6} X_p\Big(Y_p\big(f(p)\big)\Big) - Y_p \circ X_p(f) = [X,Y]_p(f). \end{aligned}$$

因 p 是任选的，所以上式对整个流形均正确. ■

定理 4.86 设 X^a 是光滑流形 M 上的光滑切矢量场，如果在点 $p \in M$ 矢量场 $X^a_p \neq 0$，那么，存在 p 点的一个局部坐标系 $(V; y^i)$ 使得 $X^a|_V = (\frac{\partial}{\partial y^1})^a$.

证明 . 设 p 点附近存在局部坐标系 $(U; x^i)$，并将 p 取为坐标原点，即 $x^i(p) = 0$. 在此局部坐标系内光滑流形 X^a 可展开为：$X^a|_U = \xi^j (\frac{\partial}{\partial x^j})^a$，其中 $\xi^j \in C^\infty(U)$. 因 $X^a_p \neq 0$，不妨设 $\xi^1(p) \neq 0$. 利用 ξ^j 的连续性，可假设 ξ^1 在开集 U 上不为

零；若有零点，将 U 缩小便可．考虑切矢量场 X^a 的积分轨道，要求此轨道经过坐标面 $x^1=0$ 上的点 $(0,y^2,\cdots,y^m)$，此轨道满足如下常微分方程和初始条件：

$$\frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}t}=\xi^i(x^1,\cdots,x^m);\quad x^1(0;y^2,\cdots,y^m)=0;\quad x^\alpha(0;y^2,\cdots,y^m)=y^\alpha.$$

其中 $2\leqslant\alpha\leqslant m$．根据常微分方程理论（可参阅文献[3]§31），上述方程的解 $x^i(t;y^2,\cdots,y^m)$ 光滑依赖于自变量 t 和初始值 $y^2,\cdots,y^m$．为了行文方便，令 $y^1=t$，解的 Jacobi 行列式为

$$\left.\frac{\partial(x^1,\cdots,x^m)}{\partial(y^1,\cdots,y^m)}\right|_{y=0}=\begin{vmatrix}\xi^1(p) & 0 & \cdots & 0\\ \xi^2(p) & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \xi^m(p) & 0 & \cdots & 1\end{vmatrix}=\xi^1(p)\neq 0.$$

Jacobi 行列式不为零说明可把坐标 $(x^1,\cdots,x^m)$ 变换成另一套坐标 $(y^1,\cdots,y^m)$，即存在 p 点邻域 $V\subset U$ 的局部坐标系 $\{y\}$．求复合函数偏导数，

$$\frac{\partial}{\partial y^1}=\frac{\partial x^i}{\partial y^1}\frac{\partial}{\partial x^i}=\xi^i\frac{\partial}{\partial x^i}$$

配上抽象指标后便是定理所求．光滑矢量场 X^a 存在与之对应的单参数可微变换群 $\phi(t,p)$；由上易见，单参数 t 便是所选坐标系的第一个坐标．一般称坐标系 $(V;y^i)$ 是矢量场 X^a 的**适配坐标系**． ■

4.11 李导数

设 X^a 是 m 维光滑流形 M 上的完备光滑切矢量场，它诱导的（局部）单参数可微变换群是 ϕ_t，经过点 $x\in M$ 的轨道记为 $\gamma_x(t)$（当 $t=0$ 时 $\gamma_x(0)=x$）；由于 ϕ_t 是（局部）微分同胚，可将轨道 $\gamma_x(t)$ 上不同点的切空间建立联系．

定义 4.87 由 ϕ_t 可定义李导数（Lie Derivative [13]）：

$$\pounds_X f(p)\overset{def}{=}\lim_{t\to0}\frac{\phi_t^*(p)f-\phi_0^*(p)f}{t}=\big(X(f)\big)(p),\tag{4.11-1}$$

$$\pounds_X Y^a\overset{def}{=}\lim_{t\to0}\frac{(\phi_{-t})_*Y^a-(\phi_0)_*Y^a}{t}=\lim_{t\to0}\frac{\phi_{t*}^{-1}Y^a-\phi_{0*}^{-1}Y^a}{t},\tag{4.11-2}$$

[13] Sophus Lie(1842-1899)，挪威数学家．其另一更重大贡献是李群，可见第十三章．

$$\pounds_X T^{a_1\cdots a_p}_{b_1\cdots b_q} \overset{def}{=} \lim_{t\to 0}\frac{\Phi_t^* T^{a_1\cdots a_p}_{b_1\cdots b_q} - \Phi_0^* T^{a_1\cdots a_p}_{b_1\cdots b_q}}{t}. \tag{4.11-3}$$

其中 $\forall f\in C^\infty_p(M)$，$\forall X^a, Y^a\in\mathfrak{X}(M)$ 和 $\forall T^{a_1\cdots a_p}_{b_1\cdots b_q}\in\mathfrak{T}^p_q(M)$. 上面分别给出了标量场、切矢场、一般张量场的李导数定义；其实都可以归结为一般张量场定义. Φ_t^* 见定义4.71.

注 4.88 为避免抽象指标不匹配，$\pounds_X$ 中的 X 不附抽象指标，即不写成 $\pounds_{X^a}$.

由于李导数定义并不十分明朗，下面略微详细描述一下. 由于 ϕ_t（至少局部上）是微分同胚，它的诱导映射都是线性同构的.

$$\phi_{-t*}\equiv\phi_{t*}^{-1}: T_{\gamma_x(t)}M\to T_xM, \tag{4.11-4}$$

$$\phi_t^*: T^*_{\gamma_x(t)}M\to T^*_xM, \tag{4.11-5}$$

$$\Phi_t^*: T^p_q\big(\gamma_x(t)\big)\to T^p_q(x). \tag{4.11-6}$$

上式最后一行的 Φ_t^* 是点 x 张量空间和点 $\gamma_x(t)$ 张量空间的线性同构映射. 设有局部坐标系 $(U;x^i)$，并令 t 是个充分小的正实数，则有 $\gamma_x(t)\in U$；我们用 $\{x^i\}$ 表示 x 点处的坐标分量，为了在形式上有所区分，我们用 $\{y^i\}$ 表示 $\gamma_x(t)$ 点处的坐标分量；需要注意的是，当 $t\to 0$ 时，坐标 $\{y^i\}$ 就变成了坐标 $\{x^i\}$，即有 $\lim_{t\to 0}y^i=x^i$.

张量 $T^{a_1\cdots a_p}_{b_1\cdots b_q}$ 在两点处的局部坐标表示如下：

$$T^{a_1\cdots a_p}_{b_1\cdots b_q}(x)=T^{i_1\cdots i_p}_{j_1\cdots j_q}(x)\left(\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}\right)^{a_1}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial x^{i_p}}\right)^{a_p}(\mathrm{d}x^{j_1})_{b_1}\cdots(\mathrm{d}x^{j_q})_{b_q},$$

$$T^{a_1\cdots a_p}_{b_1\cdots b_q}\big(\gamma_x(t)\big)=T^{i_1\cdots i_p}_{j_1\cdots j_q}\big(\gamma_x(t)\big)\left(\frac{\partial}{\partial y^{i_1}}\right)^{a_1}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial y^{i_p}}\right)^{a_p}(\mathrm{d}y^{j_1})_{b_1}\cdots(\mathrm{d}y^{j_q})_{b_q}.$$

将 Φ_t^* 作用在 $T^{a_1\cdots a_p}_{b_1\cdots b_q}\big(\gamma_x(t)\big)$ 上，有

$$\begin{aligned}(\Phi_t^*T^{a_1\cdots a_p}_{b_1\cdots b_q})\big(\gamma_x(t)\big)=T^{i_1\cdots i_p}_{j_1\cdots j_q}\big(\gamma_x(t)\big)\ \phi_{t*}^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial y^{i_1}}\right)^{a_1}\cdots\phi_{t*}^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial y^{i_p}}\right)^{a_p}\\ \times\phi_t^*(\mathrm{d}y^{j_1})_{b_1}\cdots\phi_t^*(\mathrm{d}y^{j_q})_{b_q}.\end{aligned} \tag{4.11-7}$$

由上式容易得到

$$\lim_{t\to 0}(\Phi_t^*T^{a_1\cdots a_p}_{b_1\cdots b_q})\big(\gamma_x(t)\big)=T^{a_1\cdots a_p}_{b_1\cdots b_q}(x). \tag{4.11-8}$$

很容易证明上几式表述与局部坐标系的选取无关（只需换个坐标系，基矢会产生一组 Jacobi 矩阵；张量分量也会产生一组 Jacobi 矩阵；两组矩阵刚好互逆，所以形式不变）.

命题 4.89 证明 Φ_t^* 与缩并运算 C 可交换.

证明 . 我们只以 i_1 和 j_1 的缩并来说明问题，其它基矢缩并与之类似. 首先，

$$\begin{aligned} C_{i_1}^{j_1}\left(T_{b_1\cdots b_q}^{a_1\cdots a_p}(\gamma_x(t))\right) &= T_{j_1\cdots j_q}^{i_1\cdots i_p}(\gamma_x(t))\left(\frac{\partial}{\partial y^{i_1}}\right)^{a_1}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial y^{i_p}}\right)^{a_p}(\mathrm{d}y^{j_1})_{a_1}\cdots(\mathrm{d}y^{j_q})_{b_q} \\ &= T_{kj_2\cdots j_q}^{ki_2\cdots i_p}(\gamma_x(t))\left(\frac{\partial}{\partial y^{i_2}}\right)^{a_2}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial y^{i_p}}\right)^{a_p}(\mathrm{d}y^{j_2})_{b_2}\cdots(\mathrm{d}y^{j_q})_{b_q}. \end{aligned}$$

再将 Φ_t^* 作用在上式两端，有

$$\begin{aligned} \Phi_t^*\left(C_{i_1}^{j_1}\left(T_{b_1\cdots b_q}^{a_1\cdots a_p}(\gamma_x(t))\right)\right) = T_{kj_2\cdots j_q}^{ki_2\cdots i_p}(\gamma_x(t))\ \phi_{t*}^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial y^{i_2}}\right)^{a_2}\cdots\phi_{t*}^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial y^{i_p}}\right)^{a_p} \\ \times\,\phi_t^*(\mathrm{d}y^{j_2})_{b_2}\cdots\phi_t^*(\mathrm{d}y^{j_q})_{b_q}. \end{aligned} \tag{4.11-9}$$

利用命题4.37可以导出 x 点和 $\gamma_x(t)$ 点基矢之间的变换关系：

$$\phi_{t*}^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right)^a = \frac{\partial x^i}{\partial y^\alpha}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a, \qquad \phi_t^*\left(\mathrm{d}y^\alpha\right)_a = \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\left(\mathrm{d}x^i\right)_a. \tag{4.11-10}$$

利用上两式，把式(4.11-7)缩并，可得

$$\begin{aligned} & C_{i_1}^{j_1}\left(\Phi_t^* T_{b_1\cdots b_q}^{a_1\cdots a_p}\right)(\gamma_x(t)) \\ &= T_{j_1\cdots j_q}^{i_1\cdots i_p}(\gamma_x(t))\ \phi_{t*}^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial y^{i_1}}\right)^{a_1}\cdots\phi_{t*}^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial y^{i_p}}\right)^{a_p}\times\phi_t^*(\mathrm{d}y^{j_1})_{a_1}\cdots\phi_t^*(\mathrm{d}y^{j_q})_{b_q} \\ &= T_{j_1\cdots j_q}^{i_1\cdots i_p}(\gamma_x(t))\ \phi_{t*}^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial y^{i_2}}\right)^{a_2}\cdots\phi_{t*}^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial y^{i_p}}\right)^{a_p}\times\phi_t^*(\mathrm{d}y^{j_2})_{b_2}\cdots\phi_t^*(\mathrm{d}y^{j_q})_{b_q}\times\frac{\partial x^i}{\partial y^{i_1}}\frac{\partial y^{j_1}}{\partial x^i} \\ &= T_{kj_2\cdots j_q}^{ki_2\cdots i_p}(\gamma_x(t))\ \phi_{t*}^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial y^{i_2}}\right)^{a_2}\cdots\phi_{t*}^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial y^{i_p}}\right)^{a_p}\times\phi_t^*(\mathrm{d}y^{j_2})_{b_2}\cdots\phi_t^*(\mathrm{d}y^{j_q})_{b_q}. \end{aligned}$$

综合公式(4.11-9)和上式，命题得证. ■

定理 4.90 李导数 $\pounds_X$ 有如下运算规则（其中，$\forall T\in\mathfrak{T}_q^p(M)$, $S\in\mathfrak{T}_s^r(M)$, $\forall\lambda\in\mathbb{R}$, $\forall\omega_a\in\mathfrak{X}^*(M)$，$\forall X^a, Y^a\in\mathfrak{X}(M)$；为了公式简洁，省略了 T, S 的上下标）：

(1) 线性：$\pounds_X(T+\lambda\cdot S)=\pounds_X T+\lambda\cdot\pounds_X S$；

(2) Leibniz 律：$\pounds_X(T\otimes S)=T\otimes\pounds_X S+(\pounds_X T)\otimes S$；

(3) 与缩并运算可交换，即 $C_\times^\times(\pounds_X T)=\pounds_X(C_\times^\times T)$；

(4) 若 $\psi: M\to M$ 是微分同胚，则 $\psi_*(\pounds_X T)=\pounds_{\psi_* X}\psi_* T$.

证明 . (1) 根据定义式(4.11-3)很容易证明线性性.

(2) 根据定义式(4.11-3)和命题4.72，有

$$\begin{aligned}\pounds_X(T\otimes S)&=\lim_{t\to 0}\frac{\Phi_t^*(T\otimes S)-T\otimes S}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{\Phi_t^*(T)\otimes\Phi_t^*(S)-T\otimes S}{t}\\&=\lim_{t\to 0}\frac{\Phi_t^*(T)\otimes\Phi_t^*(S)-T\otimes\Phi_t^*(S)+T\otimes\Phi_t^*(S)-T\otimes S}{t}\\&=T\otimes\pounds_X S+(\pounds_X T)\otimes S.\end{aligned}$$

(3) 根据定义式(4.11-3)和命题4.89非常容易证明此命题；留给读者当练习.

(4) 依据定理4.82可令 $\tilde{\phi}_t\equiv\psi\circ\phi_t\circ\psi^{-1}$；先验证切矢量场公式

$$\psi_*(\pounds_X Y^a)=\lim_{t\to 0}\frac{\psi_*\phi_{-t*}Y^a-\psi_*Y^a}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{\tilde{\phi}_{-t*}\psi_*Y^a-\psi_*Y^a}{t}=\pounds_{\psi_*X}\psi_*Y^a.$$

再验证余切矢量场公式

$$\psi^{-1*}(\pounds_X\omega_a)=\lim_{t\to 0}\frac{\psi^{-1*}\phi_t^*\omega_a-\psi^{-1*}\omega_a}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{\tilde{\phi}_t^*\psi^{-1*}\omega_a-\psi^{-1*}\omega_a}{t}=\pounds_{\psi_*X}\psi^{-1*}\omega_a.$$

利用 Leibniz 律，可推广至高阶张量场. ■

例 4.91 切矢量场、余切矢量场的李导数.

由定理4.85可知切矢量场的李导数可以表示为：

$$\pounds_X Y^a=[X,Y]^a,\qquad\forall X^a,Y^a\in\mathfrak{X}(M).\tag{4.11-11}$$

利用式(4.11-1)以及李导数的 Leibniz 律（见定理4.90），有 $Y^a\pounds_X(\omega_a)+(\pounds_X Y^a)\omega_a=\pounds_X(Y^a\omega_a)=X(Y^a\omega_a)$；整理之，可得余切矢量场 $\omega_a\in\mathfrak{X}^*(M)$ 李导数公式：

$$(\pounds_X\omega_a)Y^a=X\big(\omega_aY^a\big)-\omega_a[X,Y]^a,\qquad\forall X^a,Y^a\in\mathfrak{X}(M).\tag{4.11-12}$$

余切矢量场的李导数需要辅助矢量场 Y^a 来描述，一般张量场的李导数需引入更多辅助场来描述；在引入无挠联络后，有物理学习惯的表达式（§6.1.5.1）. ■

例 4.92 试证明：$\pounds_{X+Y}T=\pounds_X T+\pounds_Y T$；其中 T 是任意张量场.

由式(4.11-11)、(4.11-12)出发，不难验证本例题对切矢量场、余切矢量场是正确的. 再利用 Leibniz 律可将本例推广到高阶张量场. 需要注意，一般说来 $\pounds_{f\cdot X}T\neq f\cdot\pounds_X T$，其中 $f\in C^\infty(M)$；此时需用式(6.1-31)来计算. ■

例 4.93 适配坐标系中的李导数.

由定理4.86可知，对于任意在点 $p\in M$ 非零光滑矢量场 X^a 都存在适配坐标系$(U;x^i)$ 使得 $X^a|_U=(\frac{\partial}{\partial x^1})^a_p$；在适配坐标系上李导数的表达式较为简单，我们以 $\binom{1}{1}$ 型张量 T^a_b 为例来求出具体表达式. 由定义式(4.11-3)可得张量的分量T^i_j的李导数（其中 $t\equiv x^1$）

$$\left(\pounds_X T^a_b\right)\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^b\left(\mathrm{d}x^i\right)_a=\left.\frac{\partial T^i_j}{\partial x^1}\right|_p=\pounds_X\left(\left.T^i_j\right|_p\right). \tag{4.11-13}$$

具体证明过程如下：

$$\begin{aligned}
\left(\pounds_X T^a_b\right)\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^b\left(\mathrm{d}x^i\right)_a&=\lim_{t\to0}\frac{\Phi_t^*T^a_b-T^a_b}{t}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^b\left(\mathrm{d}x^i\right)_a\\
&\overset{4.11-7}{=\!=}\lim_{t\to0}\frac{1}{t}\left(T^\alpha_\beta\big(\gamma_p(t)\big)\phi^{-1}_{t*}\left(\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right)^a\phi_t^*(\mathrm{d}y^\beta)_b\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^b\left(\mathrm{d}x^i\right)_a-T^i_j(p)\right)\\
&\overset{4.11-7}{\underset{4.11-10}{=\!=}}\lim_{t\to0}\frac{1}{t}\left(T^\alpha_\beta\big(\gamma_p(t)\big)\frac{\partial x^i}{\partial y^\alpha}\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}-T^i_j(p)\right)\\
&\overset{*}{=}\lim_{t\to0}\frac{1}{t}\left(T^i_j\big(\gamma_p(t)\big)-T^i_j(p)\right)=\left.\frac{\partial T^i_j}{\partial x^1}\right|_p=\pounds_X\left(\left.T^i_j\right|_p\right).
\end{aligned}$$

“$\overset{*}{=}$”步：因 $X^a|_U=(\frac{\partial}{\partial x^1})^a_p$，在点 $p\in M$ 处有 $y^1=x^1_p+t$，$y^k=x^k_p(1<k\leqslant m)$，即 $\frac{\partial x^i}{\partial y^\alpha}=\delta^i_\alpha$ 和 $\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}=\delta^\beta_j$. 倒数第二步是因为 $t\equiv x^1$. 最后一步是因为式(4.11-1). 在一般的坐标系中，$(\pounds_X T^a_b)(\frac{\partial}{\partial x^j})^b(\mathrm{d}x^i)_a=(\pounds_X T)^i_j\neq\pounds_X(T^i_j)$；但在适配坐标系（适配坐标系定义见定理4.86）下，两者相等. ■

练习 4-11 补全证明式(4.11-13)中所省略的步骤.

练习 4-12 在二维流形 $\mathbb{R}^2$ 上有局部坐标系 x,y，令 $X^a=x^2(\frac{\partial}{\partial x})^a$、$Y^a=(\frac{\partial}{\partial x})^a+y^2(\frac{\partial}{\partial y})^a$. 计算 $\pounds_X Y^a$ 关于 $(\frac{\partial}{\partial x})^a$、$(\frac{\partial}{\partial y})^a$ 的表达式. 作变换 $u=x+y$、$v=x-y$，求 $\pounds_X Y^a$ 关于 $(\frac{\partial}{\partial u})^a$、$(\frac{\partial}{\partial v})^a$ 的表达式.

小结

本章主要参考了[70]、[71]相应章节.

第五章　外微分型式

外微分的现代形式是由法国数学家 Élie Cartan（1869-1951）提出并发展的一种微分几何中常用方法．本章主要介绍微分型式场的概念，以及外微分运算；继而，介绍 Frobenius 定理及其外微分表示；然后介绍流形定向与单位分解，最后引入流形上的积分概念．

5.1　外微分型式场

在 §3.8中，我们已经引入了线性空间 V 中外代数的概念；那里只是针对一个特定空间 V（或其对偶空间 V^*），而本节我们将这些概念推广到场中．在 §4.9中引入了张量场的概念，微分型式场是全反对称的协变张量场．

定义 5.1 设有 m 维光滑流形 M，其上一个 C^∞全反对称r 阶协变张量场称为流形 M 上的一个 r 次**外微分型式场**，简称为**外型式场**；也称为**外微分式**．

上面已将 §3.8.2.4中“型式”定义3.93推广到了场．在不引起误解时，可以省略前缀“外”字．此场自然是构建在余切丛 T^*M 上的，对于点 $x\in M$，有局部坐标系 $(U;x^i)$；仿照式(3.8-47)，r 型式场有如下表达式

$$\omega_{a_1\cdots a_r}|_U=\sum_{\mu_1<\cdots<\mu_r}\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}(\mathrm{d}x^{\mu_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_r},\quad \{\mu\}\text{有序} \tag{5.1-1a}$$

$$=\frac{1}{r!}\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}(\mathrm{d}x^{\mu_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_r}.\quad \{\mu\}\text{无序} \tag{5.1-1b}$$

上面公式中，$\omega_{a_1\cdots a_r}$ 和 $\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}$ 的下标是全反对称的，即交换其中任意两个指标都会产生一个负号．很明显，当 $r>m$ 时，外微分式恒为零（为什么？）．

我们将 M 上 r 次全体光滑外微分型式场的集合记为 $A^r(M)$．为方便起见，规定 M 上全体光滑函数场是 0 次微分型式场，即 $A^0(M)=C^\infty(M)$；通常的 1 次微分式便是 1 次外微分型式场 $A^1(M)$ 或 $\mathfrak{X}^*(M)$．

可将 §4.9中定义的张量间的加法和数量乘法，以及 $C^\infty(M)$-乘法直接运用到微分型式场（微分型式场只是张量场的特例，自然可直接运用这些运算）. 除此之外，还可仿照 §3.8.2逐点定义外积，使

$$A(M)=\bigoplus_{r=0}^{m}A^r(M) \tag{5.1-2}$$

成为**外代数**；一般说来它是无穷维的.

很容易把定义4.61（不需要映射是微分同胚的）用到微分型式场上，所拉回的映射是同阶的外型式场.

定理 5.2 设有光滑流形 M 和 N，维数分别是 m 和 n；流形间存在光滑映射 $\phi:M\to N$，拉回映射 $\phi^*:A^r(N)\to A^r(M)$（$0\leqslant r\leqslant\min(m,n)$）是线性的，且与外积可交换，即

$$\phi^*(\alpha\wedge\beta)=(\phi^*\alpha)\wedge\phi^*\beta,\quad \forall\alpha\in A^p(N),\ \beta\in A^q(N),\quad 0\leqslant p+q\leqslant\min(m,n).$$

证明 . 设点 $x\in M$ 有局部坐标 $(U;x^i)$；点 $y=\phi(x)\in N$ 有局部坐标 $(V;y^i)$.

$$\begin{aligned}
&\phi^*(\alpha_{a_1\cdots a_p}\wedge\beta_{b_1\cdots b_q})=\frac{(p+q)!}{p!q!}\phi^*(\alpha_{[a_1\cdots a_p}\beta_{b_1\cdots b_q]})\\
=&\frac{(p+q)!}{p!q!}\phi^*\left(a_{j_1\cdots j_p}b_{k_1\cdots k_q}(\mathrm{d}y^{j_1})_{[a_1}\cdots(\mathrm{d}y^{j_p})_{a_p}(\mathrm{d}y^{k_1})_{b_1}\cdots(\mathrm{d}y^{k_q})_{b_q]}\right)\\
=&\frac{1}{p!q!}a_{j_1\cdots j_p}b_{k_1\cdots k_q}\delta^{j_1\cdots j_pk_1\cdots k_q}_{i_1\cdots i_pl_1\cdots l_q}\phi^*\left((\mathrm{d}y^{i_1})_{a_1}\otimes\cdots\otimes(\mathrm{d}y^{i_p})_{a_p}\otimes(\mathrm{d}y^{l_1})_{b_1}\otimes\cdots\otimes(\mathrm{d}y^{l_q})_{b_q}\right)\\
=&\frac{1}{p!q!}a_{j_1\cdots j_p}b_{k_1\cdots k_q}\delta^{j_1\cdots j_pk_1\cdots k_q}_{i_1\cdots i_pl_1\cdots l_q}\frac{\partial y^{i_1}}{\partial x^{\pi_1}}\cdots\frac{\partial y^{i_p}}{\partial x^{\pi_p}}\times\frac{\partial y^{l_1}}{\partial x^{\sigma_1}}\cdots\frac{\partial y^{l_q}}{\partial x^{\sigma_q}}\\
&\qquad\times(\mathrm{d}x^{\pi_1})_{a_1}\otimes\cdots\otimes(\mathrm{d}x^{\pi_p})_{a_p}\otimes(\mathrm{d}x^{\sigma_1})_{b_1}\otimes\cdots\otimes(\mathrm{d}x^{\sigma_q})_{b_q}\\
=&\left(\frac{1}{p!}a_{j_1\cdots j_p}\frac{\partial y^{j_1}}{\partial x^{\pi_1}}\cdots\frac{\partial y^{j_p}}{\partial x^{\pi_p}}(\mathrm{d}x^{\pi_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{\pi_p})_{a_p}\right)\\
&\qquad\wedge\left(\frac{1}{q!}b_{k_1\cdots k_q}\frac{\partial y^{k_1}}{\partial x^{\sigma_1}}\cdots\frac{\partial y^{k_q}}{\partial x^{\sigma_q}}(\mathrm{d}x^{\sigma_1})_{b_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{\sigma_q})_{b_q}\right)\\
=&(\phi^*\alpha_{a_1\cdots a_p})\wedge\phi^*\beta_{b_1\cdots b_q}.
\end{aligned}$$

证明过程需参阅式(3.8-46)、式(3.8-48)、式(4.5-6)和式(5.1-1). ■

证明过程中，我们还得到了一个常用公式：

$$\phi^*\alpha_{a_1\cdots a_p}\big|_U=\left(\frac{1}{p!}\alpha_{j_1\cdots j_p}\circ\phi\right)\frac{\partial y^{j_1}}{\partial x^{\pi_1}}\cdots\frac{\partial y^{j_p}}{\partial x^{\pi_p}}(\mathrm{d}x^{\pi_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{\pi_p})_{a_p}. \tag{5.1-3}$$

例 5.3 计算 $(e^{i_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(e^{i_p})_{a_p}(e_\kappa)^{a_p}$ 和 $(e_\kappa)^{a_1}(e^{i_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(e^{i_p})_{a_p}$.

参考式(3.8-46)，有

$$(e^{i_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(e^{i_p})_{a_p}=\delta^{i_1\cdots i_p}_{j_1\cdots j_p}(e^{j_1})_{a_1}\otimes\cdots\otimes(e^{j_p})_{a_p};\quad 1\leqslant\{i\},\{j\}\leqslant m.$$

利用式(3.8-24)，有

$$\begin{aligned}&(e^{i_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(e^{i_p})_{a_p}(e_\kappa)^{a_p}=\sum_{s=1}^{p}(-)^{p+s}\delta^{i_s}_{j_p}\cdot\delta^{i_1\cdots\hat{i}_s\cdots i_p}_{j_1\cdots j_{p-1}}(e^{j_1})_{a_1}\otimes\cdots\otimes(e^{j_p})_{a_p}(e_\kappa)^{a_p}\\=&\sum_{s=1}^{p}(-)^{p+s}\delta^{i_s}_{\kappa}\cdot(e^{i_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge\widehat{e^{i_s}}\wedge\cdots\wedge(e^{i_p})_{a_{p-1}}.\end{aligned}$$

上式对 s 求和过程中至多有一项非零．给出两个具体示例：

$$(e^0)_a\wedge\cdots\wedge(e^3)_d(e_\kappa)^d=\frac{1}{3!}\delta^{0123}_{\beta\mu\nu\kappa}(e^\beta)_a\wedge(e^\mu)_b\wedge(e^\nu)_c.\tag{5.1-4}$$

$$(e_\kappa)^a(e^0)_a\wedge\cdots\wedge(e^3)_d=\frac{1}{3!}\delta^{0123}_{\kappa\beta\mu\nu}(e^\beta)_b\wedge(e^\mu)_c\wedge(e^\nu)_d.\tag{5.1-5}$$

其中 $0\leqslant\kappa\leqslant3$．在广义相对论中会经常用到上两式中的缩并． ■

例 5.4 与例5.3相仿，计算缩并式 $(e^0)_a\wedge\cdots\wedge(e^3)_d\left[(e_\tau)^c\wedge(e_\kappa)^d\right]$.

直接展开，有

$$\begin{aligned}&(e^0)_a\wedge(e^1)_b\wedge(e^2)_c\wedge(e^3)_d\left[(e_\tau)^c\wedge(e_\kappa)^d\right]\\=&\delta^{0123}_{\alpha\beta\mu\nu}(e^\alpha)_a\otimes(e^\beta)_b\otimes(e^\mu)_c\otimes(e^\nu)_d\left[(e_\tau)^c\otimes(e_\kappa)^d-(e_\kappa)^c\otimes(e_\tau)^d\right]\\=&\delta^{0123}_{\alpha\beta\mu\nu}(e^\alpha)_a\otimes(e^\beta)_b\left[\delta^\mu_\tau\delta^\nu_\kappa-\delta^\mu_\kappa\delta^\nu_\tau\right]=\delta^{0123}_{\alpha\beta\tau\kappa}(e^\alpha)_a\otimes(e^\beta)_b-\delta^{0123}_{\alpha\beta\kappa\tau}(e^\alpha)_a\otimes(e^\beta)_b\\=&\delta^{0123}_{\alpha\beta\tau\kappa}(e^\alpha)_a\otimes(e^\beta)_b-\delta^{0123}_{\alpha\beta\tau\kappa}(e^\beta)_a\otimes(e^\alpha)_b.\end{aligned}$$

故，有

$$(e^0)_a\wedge(e^1)_b\wedge(e^2)_c\wedge(e^3)_d\left[(e_\tau)^c\wedge(e_\kappa)^d\right]=\delta^{0123}_{\alpha\beta\tau\kappa}(e^\alpha)_a\wedge(e^\beta)_b.\tag{5.1-6}$$

$$\left[(e_\tau)^a\wedge(e_\kappa)^b\right](e^0)_a\wedge(e^1)_b\wedge(e^2)_c\wedge(e^3)_d=\delta^{0123}_{\alpha\beta\tau\kappa}(e^\alpha)_c\wedge(e^\beta)_d.\tag{5.1-7}$$

其中 $0\leqslant\tau,\kappa\leqslant3$．在广义相对论中会经常用到上两式中的缩并． ■

例 5.5 计算缩并式 $(e^0)_a\wedge\cdots\wedge(e^3)_d\left[(e_\tau)^b\wedge(e_\kappa)^c\wedge(e_\sigma)^d\right]$.

直接展开，有

$$\begin{aligned}&(e^0)_a\wedge(e^1)_b\wedge(e^2)_c\wedge(e^3)_d\left[(e_\tau)^b\wedge(e_\kappa)^c\wedge(e_\sigma)^d\right]\\=&\delta^{0123}_{\alpha\beta\mu\nu}(e^\alpha)_a\otimes(e^\beta)_b\otimes(e^\mu)_c\otimes(e^\nu)_d\left[\delta^{\zeta\xi\eta}_{\tau\kappa\sigma}(e_\zeta)^b\otimes(e_\xi)^c\otimes(e_\eta)^d\right]\\=&\delta^{0123}_{\alpha\beta\mu\nu}\delta^{\zeta\xi\eta}_{\tau\kappa\sigma}(e^\alpha)_a\delta^\beta_\zeta\delta^\mu_\xi\delta^\nu_\eta=\delta^{0123}_{\alpha\beta\mu\nu}\delta^{\beta\mu\nu}_{\tau\kappa\sigma}(e^\alpha)_a.\end{aligned}$$

利用式(3.8-33)（$\delta^{i_1\cdots i_q i_{q+1}\cdots i_m}_{j_1\cdots j_q j_{q+1}\cdots j_m}\cdot\delta^{j_{q+1}\cdots j_m}_{k_{q+1}\cdots k_m}=(m-q)!\,\delta^{i_1\cdots i_q i_{q+1}\cdots i_m}_{j_1\cdots j_q k_{q+1}\cdots k_m}$），有

$$(e^0)_a\wedge(e^1)_b\wedge(e^2)_c\wedge(e^3)_d\left[(e_\tau)^b\wedge(e_\kappa)^c\wedge(e_\sigma)^d\right]=6\,\delta^{0123}_{\alpha\tau\kappa\sigma}(e^\alpha)_a. \tag{5.1-8}$$

其中 $0\leqslant\tau,\kappa,\sigma\leqslant3$. 在广义相对论中会经常用到上式中的缩并. ■

5.2 外微分

本节介绍微分型式场上的重要运算——外微分.

定理 5.6 设 M 是 m 维光滑流形，则存在唯一的映射 $\mathrm{d}:A(M)\to A(M)$，使得 $\mathrm{d}\big(A^r(M)\big)\subset A^{r+1}(M)$，并且满足如下条件：

(1) $\mathbb{R}$-线性：$\forall\alpha,\beta\in A^r(M)$, $\forall\lambda\in\mathbb{R}$，有 $\mathrm{d}(\alpha+\lambda\cdot\beta)=\mathrm{d}\alpha+\lambda\cdot\mathrm{d}\beta$；

(2) 准 Leibniz 律：$\forall\alpha\in A^r(M)$，有 $\mathrm{d}(\alpha\wedge\beta)=\mathrm{d}\alpha\wedge\beta+(-)^r\alpha\wedge\mathrm{d}\beta$；

(3) $\forall f\in A^0(M)\equiv C^\infty(M)$，$\mathrm{d}f$ 是 f 的普通微分；

(4) $\forall\omega\in A^r(M)$，$\mathrm{d}(\mathrm{d}\omega)=0$.

满足上面条件的映射“d”称为**外微分**.

我们稍后证明此定理，先叙述一些必要信息. 为令公式表述简洁，叙述此定理时未使用抽象指标记号. 这个定理是流形 M 的整体描述，我们需要一个局部性定理，才能得到局部坐标系中的外微分表达式.

引理 5.7 假设满足定理5.6中四个条件的外微分 d 存在；如果 $\alpha,\beta\in A(M)$，并且在开子集 $U\subset M$ 上有 $\alpha|_U=\beta|_U$，则必然有 $\mathrm{d}\alpha|_U=\mathrm{d}\beta|_U$.

证明 . 因并未指定 α,β 的阶，故仍旧不使用抽象指标记号.

由条件 (1) 可知，引理等价于证明 $\mathrm{d}(\alpha-\beta)|_U=0$；因此只需证明：若 $\omega\in A(M)$ 且 $\omega|_U=0$，则 $\mathrm{d}\omega|_U=0$.

任取一点 $p\in U$，因流形是局部紧致的，所以存在 p 点开邻域 V 使得 $\overline{V}$ 紧致，并且有 $p\in V\subset\overline{V}\subset U$；令 $h\in C^\infty(M)$ 是满足命题4.24中条件的标量场；

则有 $h\cdot\omega\in A(M)$ 且 $h\cdot\omega=0$（这两式是针对整个流形 M 而言）. 将外微分作用在此式上，并利用准 Leibniz 律（条件 (2)）和条件 (3)，有（需注意：截止到此处，外微分 d 只能作用在流形 M 上的型式场，不能作用在局部邻域 U 上的型式场，即 $\mathrm{d}_U(\omega|_U)$ 意义不明）

$$0=\mathrm{d}\big(h\cdot\omega\big)=(\mathrm{d}h)\cdot\omega+h\cdot\mathrm{d}\omega.$$

因 h 限制在 V 上是恒为 1 的，而 $\omega|_V=0$；所以将上式限制在 V 上取值时，可以得到 $(\mathrm{d}\omega)|_V=0$. 又因 p 点取值的任意性，故必然可得 $(\mathrm{d}\omega)|_U=0$. ■

关于局部性定理，请先参考切矢量场的评注4.56. $\forall p\in U$，选择点 p 的一个足够小邻域 V，使得 $V\subset\overline{V}\subset U$；取 $\omega\in A(U)$，根据命题4.25可以将 ω 延拓至整个流形 M 上的 $\hat{\omega}\in A(M)$，并且有 $\omega|_V=\hat{\omega}|_V$. 根据局部性定理，可将 $\mathrm{d}\omega$ 在 $p\in U$ 点的局部值定义为

$$(\mathrm{d}\omega)(p)\overset{def}{=}(\mathrm{d}\hat{\omega})(p). \tag{5.2-1}$$

定义号 “$\overset{def}{=}$” 右端是 $A(M)$ 中的型式场，本来就有意义. 需要注意的是，这个定义与开集 V 选取无关；可以将 V 换成任意其它开集 V'，只要满足 $V'\subset\overline{V'}\subset U$ 即可；证明过程与上面完全相同. 也和 $\hat{\omega}$ 的选取无关，可以将 $\hat{\omega}$ 换成任意 $\tilde{\omega}$，只需满足 $\omega|_V=\hat{\omega}|_V=\tilde{\omega}|_V$ 即可. 因此，如果 $\mathrm{d}|_M$ 是流形 M 上的外微分算子，那么通过式(5.2-1)可以定义出局部开集 U 中的外微分算子 $\mathrm{d}|_U$，而且 $\mathrm{d}|_U$ 同样具有定理5.6中所陈述的四条性质.

下面开始证明定理5.6. 先解决外微分的存在性问题，自然是寻找符合定理中四个条件的外微分定义. 为此，先回顾一下数学分析中的（一元）二次普通微分 $\mathrm{d}(\mathrm{d}x)=0$；因 x 是自变量，所以 $\mathrm{d}x$ 是不依赖于 x 的任意数，那么对其再次求普通微分时自然为零. 多元微分学中，不同自变量 x^μ 是相互独立的（例如 x^1 独立于 x^2）；那么，$\mathrm{d}x^\mu$ 是不依赖于 x^μ 以及其它 x^ν（$\mu\neq\nu$）的任意数，自然也有 $\mathrm{d}(\mathrm{d}x^\mu)=0$.

虽然 $\mathrm{d}(\mathrm{d}x)=0$，但标量函数 $f(x)$ 的两次普通微分一般是不为零的，有 $\mathrm{d}^2f=f''(x)\mathrm{d}x^2$；可见普通微分算符不满足条件 (4)（但满足条件 (3)）不能当成外微分算符定义. 其实略加修改，便可满足条件 (4)；考虑多元标量函数场 f，把外积 “$\wedge$” 引入到 $\mathrm{d}x$ $\mathrm{d}x$ 之间：

$$\mathrm{d}_c(\mathrm{d}_af)\equiv\mathrm{d}_c\left(\frac{\partial f}{\partial x^\mu}(\mathrm{d}x^\mu)_a\right)\overset{def}{=}\frac{\partial^2f}{\partial x^\mu\partial x^\sigma}(\mathrm{d}x^\sigma)_c\wedge(\mathrm{d}x^\mu)_a+\frac{\partial f}{\partial x^\mu}\mathrm{d}_c(\mathrm{d}x^\mu)_a$$

$$\xlongequal{\mathrm{d}\circ\mathrm{d}x=0} \frac{\partial^2 f}{\partial x^\mu \partial x^\sigma}(\mathrm{d}x^\sigma)_c \wedge (\mathrm{d}x^\mu)_a = 0. \tag{5.2-2}$$

上式倒数第二步用的是自变量二次普通微分恒为零（$\mathrm{d}(\mathrm{d}x)=0$）[1]；最后一步用到了标量函数对偏导数具有对称性，而外积有反对称性，求和为零（展开即可验证）；对于标量函数场，这样定义的算符满足条件 (4). 我们将上述定义推广到一般情形；设流形 M 有局部坐标系 $(U;x^i)$，微分型式场 ω 有局部表达式(5.1-1)，则可定义它的外微分局部表达式为：

$$(\mathrm{d}\omega_{ba_1\cdots a_r})|_U \overset{def}{=} \frac{1}{r!}\mathrm{d}_b(\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}) \wedge (\mathrm{d}x^{\mu_1})_{a_1} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_r} \tag{5.2-3}$$

易见，这个局部定义满足第 (1)、(3) 条.

首先，验证式(5.2-3)满足条件 (4)；为验证此条件，我们计算一般外型式场的两次外微分（使公式简洁，下面诸式皆省略下标 “$|_U$”）.

$$\begin{aligned}\mathrm{d}_c\mathrm{d}_b(\alpha_{a_1\cdots a_r}) &= \frac{1}{r!}\mathrm{d}_c\left(\frac{\partial\alpha_{\mu_1\cdots\mu_r}}{\partial x^\rho}(\mathrm{d}x^\rho)_b \wedge (\mathrm{d}x^{\mu_1})_{a_1} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_r}\right)\\ &= \frac{1}{r!(r+1)!}\frac{\partial^2\alpha_{\mu_1\cdots\mu_r}}{\partial x^\rho\partial x^\sigma}(\mathrm{d}x^\sigma)_c \wedge (\mathrm{d}x^\rho)_b \wedge (\mathrm{d}x^{\mu_1})_{a_1} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_r} = 0.\end{aligned}$$

与(5.2-2)同样的理由，上式最后一步为零；这便验证了定义(5.2-3)符合条件 (4).

其次，验证式(5.2-3)满足第 (2) 条

$$\begin{aligned}&\mathrm{d}_c(\alpha_{a_1\cdots a_r} \wedge \beta_{b_1\cdots b_s})\\ =&\frac{1}{r!s!}\mathrm{d}_c\left(\alpha_{\mu_1\cdots\mu_r}\beta_{\sigma_1\cdots\sigma_q}(\mathrm{d}x^{\mu_1})_{a_1} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_r} \wedge (\mathrm{d}x^{\sigma_1})_{b_1} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}x^{\sigma_s})_{b_s}\right)\\ =&\frac{1}{r!s!}\left(\mathrm{d}_c(\alpha_{\mu_1\cdots\mu_r})\beta_{\sigma_1\cdots\sigma_q} + \alpha_{\mu_1\cdots\mu_r}\mathrm{d}_c(\beta_{\sigma_1\cdots\sigma_q})\right)\\ &\wedge\left((\mathrm{d}x^{\mu_1})_{a_1} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_r} \wedge (\mathrm{d}x^{\sigma_1})_{b_1} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}x^{\sigma_s})_{b_s}\right)\\ =&\frac{1}{r!s!}\mathrm{d}_c(\alpha_{\mu_1\cdots\mu_r})\beta_{\sigma_1\cdots\sigma_q} \wedge \left((\mathrm{d}x^{\mu_1})_{a_1} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_r} \wedge (\mathrm{d}x^{\sigma_1})_{b_1} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}x^{\sigma_s})_{b_s}\right)\\ &+\frac{1}{r!s!}\alpha_{\mu_1\cdots\mu_r}\mathrm{d}_c(\beta_{\sigma_1\cdots\sigma_q}) \wedge \left((\mathrm{d}x^{\mu_1})_{a_1} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_r} \wedge (\mathrm{d}x^{\sigma_1})_{b_1} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}x^{\sigma_s})_{b_s}\right)\\ =&\frac{1}{r!}\mathrm{d}_c(\alpha_{\mu_1\cdots\mu_r}) \wedge (\mathrm{d}x^{\mu_1})_{a_1} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_r} \wedge \frac{1}{s!}\beta_{\sigma_1\cdots\sigma_q}(\mathrm{d}x^{\sigma_1})_{b_1} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}x^{\sigma_s})_{b_s} +\end{aligned}$$

[1] 条件 (4) 是自变量 x 两次普通微分恒为零（$\mathrm{d}(\mathrm{d}x)=0$）的推广；推广成任何全反对称协变张量场的两次外微分皆为零. 把作为自变量的坐标的两次外微分定义成两次普通微分，即 $\mathrm{d}_c(\mathrm{d}_a x^\mu) \overset{def}{=} \mathrm{d}(\mathrm{d}x^\mu)=0$，是为了消除可能存在的循环定义.

$$(-)^r\frac{1}{r!}\alpha_{\mu_1\cdots\mu_r}(\mathrm{d}x^{\mu_1})_c\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_{r-1}}\wedge\frac{1}{s!}\mathrm{d}_{a_r}(\beta_{\sigma_1\cdots\sigma_q})\wedge(\mathrm{d}x^{\sigma_1})_{b_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{\sigma_s})_{b_s}.$$

上式最后一个等号用到了外积的反对称性，产生了 r 个负号；最终，有

$$\mathrm{d}_c(\alpha_{a_1\cdots a_r}\wedge\beta_{b_1\cdots b_s})=(\mathrm{d}_c\alpha_{a_1\cdots a_r})\wedge\beta_{b_1\cdots b_s}+(-)^r\alpha_{ca_1\cdots a_{r-1}}\wedge\mathrm{d}_{a_r}\beta_{b_1\cdots b_s}. \tag{5.2-4}$$

式(5.2-3)给出的定义满足四个条件，这便证明了外微分算符的存在性. 将 α 和 β 取为一次微分型式场，由式(5.2-4)可得到一个常用公式

$$\mathrm{d}_c(\alpha_a\wedge\beta_b)=(\mathrm{d}\alpha)_{ca}\wedge\beta_b-\alpha_c\wedge(\mathrm{d}\beta)_{ab}. \tag{5.2-5}$$

虽然解决了外微分算子的局部、整体存在性问题（并且局部、整体定义是相容的），但仍需证明式(5.2-3)中的定义是唯一的，以及与局部坐标的选取无关.

先证明唯一性. 假设另有一个算符 $\bar{\mathrm{d}}$ 同样满足定理5.6中的四个条件；需要注意，标量函数场 f 的普通微分是唯一确定的（这是数学分析中的结论），由条件 (3) 可知 $\bar{\mathrm{d}}f=\mathrm{d}f$，也就是两个算符作用在标量场上是相等的. 由于微分型式场 $\omega_{a_1\cdots a_r}$ 的分量 $\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}$ 及坐标 x^μ 都是标量函数场，即它们属于 $C^\infty(U)$；因此，从式(5.2-3)可以看到 $\bar{\mathrm{d}}\omega_{ba_1\cdots a_r}=\mathrm{d}\omega_{ba_1\cdots a_r}$，也就说明了外微分算符的唯一性！

再证，定义(5.2-3)与局部坐标选取无关. 设有开子集 $(W;y^i)$，且 $U\cap W\neq\varnothing$，那么微分型式场 ω 可有两组相等的表达式：

$$\omega_{a_1\cdots a_r}|_{U\cap W}=\frac{1}{r!}\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}(x)(\mathrm{d}x^{\mu_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_r}, \tag{5.2-6}$$

$$=\frac{1}{r!}\tilde{\omega}_{\mu_1\cdots\mu_r}(y)(\mathrm{d}y^{\mu_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}y^{\mu_r})_{a_r}. \tag{5.2-7}$$

下面推导过程中，注意利用关系式(4.4-13)和(4.4-14)，以及式(4.4-19)；不再单独提示. 对式(5.2-7)取外微分，有

$$\begin{aligned}\mathrm{d}_b(\omega_{a_1\cdots a_r})=&\frac{1}{r!}\mathrm{d}_b(\tilde{\omega}_{\mu_1\cdots\mu_r})\wedge(\mathrm{d}y^{\mu_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}y^{\mu_r})_{a_r}\\=&\frac{1}{r!}\mathrm{d}_b\left(\omega_{j_1\cdots j_r}\frac{\partial x^{j_1}}{\partial y^{\mu_1}}\cdots\frac{\partial x^{j_r}}{\partial y^{\mu_r}}\right)\wedge(\mathrm{d}y^{\mu_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}y^{\mu_r})_{a_r}\\=&\frac{1}{r!}\left(\mathrm{d}_b(\omega_{j_1\cdots j_r})\times\frac{\partial x^{j_1}}{\partial y^{\mu_1}}\cdots\frac{\partial x^{j_r}}{\partial y^{\mu_r}}+\omega_{j_1\cdots j_r}\frac{\partial^2x^{j_1}}{\partial y^{\mu_1}\partial y^\sigma}\times\right.\\&\left.(\mathrm{d}y^\sigma)_b\frac{\partial x^{j_2}}{\partial y^{\mu_2}}\cdots\frac{\partial x^{j_r}}{\partial y^{\mu_r}}+\cdots\right)\wedge(\mathrm{d}y^{\mu_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}y^{\mu_r})_{a_r}\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
=&\frac{1}{r!}\frac{\partial x^{j_1}}{\partial y^{\mu_1}}\cdots\frac{\partial x^{j_r}}{\partial y^{\mu_r}}\times \mathrm{d}_b(\omega_{j_1\cdots j_r})\wedge(\mathrm{d}y^{\mu_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}y^{\mu_r})_{a_r}\\
=&\frac{1}{r!}\mathrm{d}_b(\omega_{j_1\cdots j_r})\wedge(\mathrm{d}x^{j_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{j_r})_{a_r}.
\end{aligned}
$$

上面推导中用到了坐标 x^j（标量场）二阶偏导是对称的，且外积“$\wedge$”是反对称的，所以对坐标的二次偏导数求和之后都是零．最后一个等号显示外微分运算与坐标选取无关，具有形式不变性！至此，定理5.6证毕．

注 5.8 此定理表明，在光滑流形上，通过外微分运算能够把一个光滑**全反对称协变**张量场变成**高一阶**的光滑全反对称协变张量场．

若对一般的切矢量场，或混合张量场，或者非全反对称（只有部分指标反对称或没有任何对称性）的协变张量场进行**微分**运算，进而得到协变阶数增加一阶的光滑张量场；仅有微分结构（即相容的坐标图册）是不够的，还需附加上联络或者度规结构．但**全反对称协变**张量场不需要这些结构便能进行**微分**运算．

下面给出外微分运算的一些性质．

定理 5.9 对于一次微分型式场 ω_a 和任意切矢量场 X^a, Y^b，有如下重要公式：

$$
(\mathrm{d}_a\omega_b)X^aY^b = X(\omega_bY^b) - Y(\omega_bX^b) - \omega_b[X,Y]^b. \tag{5.2-8}
$$

证明 . 因式(5.2-8)两边对于 ω_a 是线性的，故不妨假设它是单项式，即 $\omega_a = g\mathrm{d}_af$，其中 $f, g \in C^\infty(M)$；因此，$\mathrm{d}_a\omega_b = \mathrm{d}_ag\wedge\mathrm{d}_bf$．式(5.2-8)等号左端为

$$
LHS = (\mathrm{d}_ag\wedge\mathrm{d}_bf)X^aY^b = (\mathrm{d}_ag)\mathrm{d}_bfX^aY^b - (\mathrm{d}_bg)\mathrm{d}_afX^aY^b = X(g)Y(f) - X(f)Y(g).
$$

再计算式(5.2-8)等号右端

$$
\begin{aligned}
RHS &= X(g\mathrm{d}_bfY^b) - Y(g\mathrm{d}_bfX^b) - g\mathrm{d}_bf[X,Y]^b\\
&= X\big(gY(f)\big) - Y\big(gX(f)\big) - g[X,Y](f) = X(g)\cdot Y(f) - X(f)\cdot Y(g).
\end{aligned}
$$

综合以上两式，定理得证．更高次微分型式场的相关公式表达式十分复杂，需要更多的辅助切矢量场；在引入联络后有较为简洁的表达式，见 §6.1.5.2． ■

之前，我们证明了公式(4.5-7)（即 $\phi^*(\mathrm{d}f)_a = \mathrm{d}_a(\phi^*f) = \mathrm{d}_a(f\circ\phi)$）；此公式说明外微分与拉回映射可交换，这个结论是以推广至一般情形．

定理 5.10 设光滑流形 M 和 N 的维数分别是 m 和 n，两者间存在光滑映射 $\phi: M\to N$，其诱导映射是 $\phi^*: A^r(N)\to A^r(M)$，其中 $0\leqslant r<\min(m,n)$．则 $\forall\omega_{a_1\cdots a_r}\in A^r(N)$ 有 $\phi^*(\mathrm{d}_b\omega_{a_1\cdots a_r}) = \mathrm{d}_b(\phi^*\omega_{a_1\cdots a_r})$．

证明 . 定理中对微分型式场阶数的要求保证其外微分有意义. 外微分有局部性，其局部坐标表达式为式(5.2-3)，由于这个式子具有坐标变换不变性，可以看成整体上皆有意义的定义式. 首先将其看成流形 N 上的外微分（有局部坐标系 $(V;y)$），再将此式拉回到流形 M 上（有局部坐标系 $(U;x)$，且 $\phi(U)\subset V$）.

$$\begin{aligned}\phi^*(\mathrm{d}\omega_{ba_1\cdots a_r})=&\phi^*\left(\frac{1}{r!}\frac{\partial\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}}{\partial y^\rho}(\mathrm{d}y^\rho)_b\wedge(\mathrm{d}y^{\mu_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}y^{\mu_r})_{a_r}\right)\\ \overset{5.1-3}{=\!=\!=}&\frac{1}{r!}\frac{\partial\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}\circ\phi}{\partial y^\rho}\cdot\frac{\partial y^\rho}{\partial x^{j_0}}\frac{\partial y^{\mu_1}}{\partial x^{j_1}}\cdots\frac{\partial y^{\mu_r}}{\partial x^{j_r}}\cdot(\mathrm{d}x^{j_0})_b\wedge(\mathrm{d}x^{j_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{j_r})_{a_r}\\ =&\frac{1}{r!}\frac{\partial\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}\circ\phi}{\partial x^{j_0}}\cdot\frac{\partial y^{\mu_1}}{\partial x^{j_1}}\cdots\frac{\partial y^{\mu_r}}{\partial x^{j_r}}\cdot(\mathrm{d}x^{j_0})_b\wedge(\mathrm{d}x^{j_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{j_r})_{a_r}.\end{aligned}$$

再对式(5.1-3)求外微分，有

$$\begin{aligned}\mathrm{d}_b(\phi^*\omega_{a_1\cdots a_r})=&\mathrm{d}_b\left(\frac{1}{r!}(\omega_{j_1\cdots j_r}\circ\phi)\cdot\frac{\partial y^{j_1}}{\partial x^{\pi_1}}\cdots\frac{\partial y^{j_r}}{\partial x^{\pi_r}}\cdot(\mathrm{d}x^{\pi_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{\pi_r})_{a_r}\right)\\ =&\frac{1}{r!}\frac{\partial\omega_{j_1\cdots j_r}\circ\phi}{\partial x^{\pi_0}}\cdot\frac{\partial y^{j_1}}{\partial x^{\pi_1}}\cdots\frac{\partial y^{j_r}}{\partial x^{\pi_r}}\cdot(\mathrm{d}x^{\pi_0})_b\wedge(\mathrm{d}x^{\pi_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{\pi_r})_{a_r}.\end{aligned}$$

上式最后一步省略了 $\frac{\partial^2 y^j}{\partial x^\pi\partial x^\sigma}(\mathrm{d}x^\pi)_a\wedge(\mathrm{d}x^\sigma)_b=0$（读者应该能看出此式为何为零吧?）这一步. 综合以上两式可见，外微分与拉回映射可交换. ■

定义 5.11 对于 $\omega\in A^r(M)$，若 $\mathrm{d}\omega=0$，则称 ω 是**闭的**（closed）. 若存在 $\sigma\in A^{r-1}(M)$ 使得 $\omega=\mathrm{d}\sigma$，则称 ω 是**恰当的**（exact）.

很明显，如果微分型式场 ω 是恰当的，那么它必然是闭的；（整体上来说）反之未必. 但我们有如下定理说明局部上是闭的，则它必然是局部上恰当的.

定理 5.12 （Poincaré 引理）设 $U=B_0(a)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中以原点为中心、a 为半径的球形开邻域（可弱化为星形开邻域）；设 $\omega\in A^r(U)$ 且 $\mathrm{d}\omega=0$，则存在 $\sigma\in A^{r-1}(U)$ 使得 $\omega=\mathrm{d}\sigma$.

证明 . 因 U 是 $\mathbb{R}^m$ 中开集，可假定它由一个坐标域覆盖；设 ω 的表达式为：

$$\omega_{a_1\cdots a_r}=\sum_{\mu_1<\cdots<\mu_r}\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}(\mathrm{d}x^{\mu_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_r}. \tag{5.2-9}$$

证明过程需利用一个具有技巧性的积分，定义映射 $I:A^r(U)\to A^{r-1}(U)$ 如下

$$\begin{aligned}I_r(\omega)_{a_1\cdots a_{r-1}}\overset{def}{=}&\sum_{\mu_1<\cdots<\mu_r}\left(\int_0^1 t^{r-1}\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}(tx)\mathrm{d}t\right)\times\sum_{i=1}^r(-)^{i-1}x^{\mu_i}\times\\ &\times(\mathrm{d}x^{\mu_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge\widehat{(\mathrm{d}x^{\mu_i})}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_{r-1}}.\end{aligned} \tag{5.2-10}$$

其中脱字符^表示没有这个基矢 $(\widehat{\mathrm{d}x^{\mu_i}})$；脱字符下的基矢不再占用抽象指标记号. 需要证明此映射有如下性质：

$$\mathrm{d}_b\big(I_r(\omega)_{a_1\cdots a_{r-1}}\big)+I_{r+1}(\mathrm{d}\omega)_{ba_1\cdots a_{r-1}}=\omega_{ba_1\cdots a_{r-1}}. \tag{5.2-11}$$

直接计算便可证明；先计算

$$\mathrm{d}_b\big(I_r(\omega)_{a_1\cdots a_{r-1}}\big)=\sum_{\mu_1<\cdots<\mu_r}\left(\int_0^1 t^{r-1}\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}(tx)\mathrm{d}t\right)\cdot r\cdot(\mathrm{d}x^{\mu_1})_b\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_2})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_{r-1}}+$$
$$\sum_{\mu_0<\cdots<\mu_r}\left(\int_0^1 t^r\frac{\partial\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}(tx)}{\partial x^{\mu_0}}\mathrm{d}t\right)\sum_{i=1}^{r}(-)^{i-1}x^{\mu_i}(\mathrm{d}x^{\mu_0})_b\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\widehat{\mathrm{d}x^{\mu_i}})\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_{r-1}}$$

再借用式(5.2-3)可以得到

$$I_{r+1}(\mathrm{d}\omega)_{ba_1\cdots a_{r-1}}=\sum_{\mu_0<\cdots<\mu_r}\left(\int_0^1 t^r\frac{\partial\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}(tx)}{\partial x^{\mu_0}}\mathrm{d}t\right)\times\sum_{i=0}^{r}(-)^i x^{\mu_i}\times$$
$$(\mathrm{d}x^{\mu_0})_b\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\widehat{\mathrm{d}x^{\mu_i}})\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_{r-1}}$$

上两式求和，有

$$\begin{aligned}
&\mathrm{d}_b\big(I_r(\omega)_{a_1\cdots a_{r-1}}\big)+I_{r+1}(\mathrm{d}\omega)_{ba_1\cdots a_{r-1}}\\
=&\sum_{\mu_1<\cdots<\mu_r}\left(\int_0^1 t^{r-1}\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}(tx)\mathrm{d}t\right)\cdot r\cdot(\mathrm{d}x^{\mu_1})_b\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_2})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_{r-1}}\\
&+\sum_{\mu_1<\cdots<\mu_r}\left(\int_0^1 t^r\frac{\partial\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}(tx)}{\partial x^{\mu_0}}\mathrm{d}t\right)\times x^{\mu_0}(\mathrm{d}x^{\mu_1})_b\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_2})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_{r-1}}\\
=&\sum_{\mu_1<\cdots<\mu_r}\left(\int_0^1\frac{\mathrm{d}\big(t^r\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}(tx)\big)}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t\right)(\mathrm{d}x^{\mu_1})_b\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_2})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_{r-1}}\\
=&\sum_{\mu_1<\cdots<\mu_r}\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}(x)(\mathrm{d}x^{\mu_1})_b\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_2})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{\mu_r})_{a_{r-1}}=\omega_{ba_1\cdots a_{r-1}}.
\end{aligned}$$

这便证明了式(5.2-11). 当 ω 为闭型式时，也就是 $\mathrm{d}\omega=0$ 时，由式(5.2-11)可得 $\omega_{ba_1\cdots a_{r-1}}=\mathrm{d}_b\big(I_r(\omega)_{a_1\cdots a_{r-1}}\big)$，这说明 ω 是恰当的；其中 $\sigma=I_r(\omega)$. ■

注 5.13 从 Poincaré 引理的证明过程来看（见式(5.2-10)），只有微分型式场 ω 的分量 $\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}(x)$ 不为零时才能使得积分后的式(5.2-10)不为零；如果 ω 的分量为零，那么定理中的 σ 也为零.

5.3 Frobenius 定理

在 §4.10中，已经指出流形上切矢量场与其积分曲线（单参数可微变换群）有一一对应关系，这其实是在说单个切矢量场是否可积；本节将讲述多个切矢量场是否可积的问题，由常微分方程组过渡到偏微分方程组. 省略的定理证明过程可参考文献[70]§1.4或[71]§3.4或其它类似书籍. 需要事先声明，本节所叙述的定理只在局部成立；关于 Frobenius 定理的大范围描述可参阅[55]§6.6-6.7.

设有一阶偏微分方程组

$$\frac{\partial y^\alpha(x)}{\partial x^i} = f_i^\alpha(x^1,\cdots,x^m;y^1,\cdots,y^n);\quad 1\leqslant\alpha\leqslant n,\ 1\leqslant i\leqslant m. \tag{5.3-1}$$

假定 $f_i^\alpha(x^j;y^\beta)$ 是定义在区域 $D=U\times V$ 上的 C^r 阶连续可微函数，其中 U 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开凸子集，V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开凸子集；并且这两个子集的边界（∂U 和 ∂V）是 C^{r-1} 阶连续可微的（除了有限个测度为零的不可微子区域）.

定理 5.14 对于任意给定初值 $(x_0^1,\cdots,x_0^m;y_0^1,\cdots,y_0^n)\in D$，方程组(5.3-1)在点 $(x_0^1,\cdots,x_0^m)\in U$ 的一个邻域 $\tilde U$ 内有连续可微解 $y^\alpha=y^\alpha(x^1,\cdots,x^m)$，并且满足初始条件 $y^\alpha(x_0^1,\cdots,x_0^m)=y_0^\alpha$（其中 $1\leqslant\alpha\leqslant n$）的充分条件是，在区域 D 上下述等式恒成立：

$$\frac{\partial f_i^\alpha}{\partial x^j}-\frac{\partial f_j^\alpha}{\partial x^i}=\sum_{\sigma=1}^n\left(\frac{\partial f_j^\alpha}{\partial y^\sigma}f_i^\sigma-\frac{\partial f_i^\alpha}{\partial y^\sigma}f_j^\sigma\right),\quad 1\leqslant\alpha\leqslant n,\ 1\leqslant i,j\leqslant m. \tag{5.3-2}$$

此时简称该方程组完全可积；并且该解是唯一的. 反之，若假设方程组(5.3-1)解存在，则条件(5.3-2)也是其必要条件（即推论）之一.

需要提醒读者注意，此定理在叙述中省略了区域 D 的拓扑性质（已在定理前给出），这些性质也是解存在的充分条件. 只有单独一个条件(5.3-2)无法保证方程组(5.3-1)解的存在，仍需拓扑条件、初边值条件等.

例 5.15 令定理5.14中的 $n=1$、$m=2$，即方程(5.3-1)为

$$\partial_x u=f(x,y;u),\qquad \partial_y u=g(x,y;u). \tag{5.3-3}$$

注意有两个方程，一个未知量 u；但方程组是确定的，见 §3.1.2. 解存在性条件(5.3-2)只有一个 $\partial_x g-\partial_y f=g\partial_u f-f\partial_u g$，其它全部为 $0=0$ 的恒等式；如果假设 f、g 与 u 无关，则上述解存在性条件变为 $\partial_x g-\partial_y f=0$. ■

例 5.16 将例题5.15稍微改变一下表述方式，令

$$F_{ij}=\begin{pmatrix}0 & -u\\ u & 0\end{pmatrix},\qquad J_i=\begin{pmatrix}g\\ -f\end{pmatrix}. \tag{5.3-4}$$

则例5.15中方程变为

$$\sum_j \frac{\partial}{\partial x^j}F_{ji}=J_i. \tag{5.3-5}$$

假设 f、g 与 u 无关，则解存在性条件是 $\sum_i \frac{\partial}{\partial x^i}J_i=\partial_x g-\partial_y f=0$. ■

例 5.17 令

$$F_{ij}=\begin{pmatrix}0 & -u_3 & u_2\\ u_3 & 0 & -u_1\\ -u_2 & u_1 & 0\end{pmatrix},\qquad J_i=\begin{pmatrix}J_1\\ J_2\\ J_3\end{pmatrix}. \tag{5.3-6}$$

其中 J_i 与 u_i 无关. 则有如下方程

$$\sum_j \frac{\partial}{\partial x^j}F_{ji}=J_i \quad\Leftrightarrow\quad \nabla\times\boldsymbol{u}=\boldsymbol{J}. \tag{5.3-7}$$

解存在性条件为 $\sum_i \frac{\partial}{\partial x^i}J_i=\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$. ■

定理5.14是 Frobenius 定理的古典形式；下面我们用切矢量场以及微分型式场方式再次叙述此定理，为此需要做些准备.

定义 5.18 设光滑流形 M 是 m 维的. 若对每一点 $p\in M$ 都指定切空间 T_pM 的一个 h 维子空间 $L^h(p)\subset T_pM$，则 $L^h=\bigcup_{p\in M}L^h(p)$ 构成切丛 TM 的一个子集，称为 M 上的一个 h 维**分布**. 若上述 L^h 只在流形 M 的某开子集 U 上成立，则称 L^h 是 U 上的 h 维**分布**.

流形上每点切空间都与流形同维数，分布的含义便是先在 T_pU 找到 h 个 $\mathbb{R}$-线性无关的切矢量 $X_1^a(p),\cdots,X_h^a(p)$；然后让点 p 遍历 U，这样就有 h 个线性无关的切矢量场$\underset{\sim}{X}{}_1^a,\cdots,X_h^a\in\mathfrak{X}(U)$；分布便是由这些切矢量场张成（为简单起见，要求这些切矢量场是光滑的），记为

$$L^h|_U\equiv \mathrm{Span}_\infty\{X_1^a,\cdots,X_h^a\},\quad \mathrm{Span}_\infty\text{的组合系数是}C^\infty(U)\text{函数}. \tag{5.3-8}$$

切矢量场能够进行非退化 $C^\infty(U)$ 函数变换（包括 $\mathbb{R}$-线性变换）

$$Y_\alpha^a=c_\alpha^\beta X_\beta^a,\qquad \forall c_\alpha^\beta\in C^\infty(U)\ \text{且}\ \det(c_\alpha^\beta)\neq 0. \tag{5.3-9}$$

这 h 个切矢量 Y_α^a 仍是 $\mathbb{R}$-线性无关的；此时，分布 $L^h|_U$ 也可记为

$$L^h|_U \equiv \mathrm{Span}_\infty\{Y_1^a,\cdots,Y_h^a\}. \tag{5.3-10}$$

若光滑流形 M 上存在 h 个处处 $\mathbb{R}$-线性无关的光滑切矢量场，则在 U 上就存在一个 h 维光滑分布．反过来，U 上存在一个 h 维光滑分布，那么在 M 上未必存在 h 个处处线性无关的光滑切矢量场．典型的例子便是二维球面 S^2 上的光滑切矢量场必有奇点，因此 S^2 整体上不可能存在两个处处线性无关的非零切矢量场；然而 S^2 的局部上的切矢量场显然是个 2 维分布．虽然在整个流形（或者称之为大范围情形）两者并不等价，但在局部开子集 U 上，两者是等价的，即一个 h 维光滑分布等价于存在 h 个处处线性无关的非零光滑切矢量场．

定义 5.19 设 L^h 是定义在开子集 $U\subset M$ 上的光滑分布，如果有包含映射 $\imath: N\to U$ 对每一点 $p\in N$ 有 $\imath_*(T_pN)\subset L^h\big(\imath(p)\big)$，则称 $(\imath,N)$ 是光滑分布 L^h 的一个**积分流形**．若 $\forall q\in U$，都有分布 L^h 的一个 h 维积分流形经过它，则称分布 L^h 是**完全可积**的．

由于包含映射一定是嵌入映射，那么必然是单射；同时流形 N 的维数不可能超过 h．积分流形只要求 $\forall p\in N$ 可积，完全积分流形要求 $\forall q\in U$ 可积．

当 $h=1$ 时，L^1 分布便是 U 上的切矢量场；很明显，分布是切矢量场向高维空间的推广；切矢量场的积分曲线正是它作为分布时的一维积分流形．定理4.86阐述了任意切矢量场（在坐标变换后）都可以表示成 $X^a|_U=(\frac{\partial}{\partial x^1})^a$，即其积分曲线是 x^1-参数曲线，在此条曲线上只有自变量 x^1 是变化的，其它自变量 $x^i(2\leqslant i)$ 都是常数．一个自然的问题是定理4.86能否推广到高维，即是否存在局部坐标系使得 $L^h=\mathrm{Span}_\infty\{(\frac{\partial}{\partial x^1})^a,\cdots,(\frac{\partial}{\partial x^h})^a\}$ 成立？这便是 Frobenius 定理．

定义 5.20 设 L^h 是定义在开子集 $U\subset M$ 上的光滑分布．若 $\forall p\in U$，存在 p 点一个开邻域 $p\in V\subset U$，以及 h 个光滑切矢量场 $X_1^a,\cdots,X_h^a\in\mathfrak{X}(V)$ 使得 $L^h=\mathrm{Span}_\infty\{X_1^a,\cdots,X_h^a\}$；并且这些光滑切矢量场满足封闭条件 $[X_\alpha,X_\beta]^a=c_{\alpha\beta}^\gamma X_\gamma^a$，其中 $c_{\alpha\beta}^\gamma\in C^\infty(V)$、$1\leqslant\alpha,\beta,\gamma\leqslant h$，则称 L^h 满足 **Frobenius 条件**．

定理 5.21 （Frobenius 定理）设 L^h 是开子集 $U\subset M$ 上的光滑分布，若 L^h 满足 Frobenius 条件，则 $\forall p\in U$，存在局部坐标系 $(V;x^i)$ 使得 $p\in V\subset U$，且

$$L^h=\mathrm{Span}_\infty\left\{\left(\frac{\partial}{\partial x^1}\right)^a,\cdots,\left(\frac{\partial}{\partial x^h}\right)^a\right\}. \tag{5.3-11}$$

L^h 有如此表述形式，自然是完全可积的．

定理5.21告诉我们，开子集 V 中的坐标面

$$\{(x^1,\cdots,x^h,\ x^{h+1},\cdots,x^m)\mid x^{h+1}=const,\cdots,x^m=const\}$$

是分布 L^h 的 h 维积分流形．此定理的逆也成立，即

定理 5.22 如果 L^h 完全可积，则 L^h 必然满足 Frobenius 条件．

5.4 Frobenius 定理的外型式表述

§5.3中 Frobenius 定理5.14是它的古典描述方式，本节用外型式场方式再次表述此定理．同 §5.3表述类似，通过包含映射 $\imath$ 将 n 维子流形 N 嵌入到 m 流形 M 中，且 $n<m$；我们需要用到拉回映射来表述 $(\imath,N)$ 是积分流形这一概念，因 N 的维数小于 M 的维数，所以从 M 拉回到 N 的一次外型式场 $\imath^*(\omega^i)_a,\ \forall(\omega^i)_a\in\mathfrak{X}^*(M),\ 1\leqslant i\leqslant m$ 中必然有些为零．

定义在 m 维光滑流形 M 的开子集 U 上的 r 个一次外微分型式场

$$(\omega^\alpha)_a=0,\qquad \text{其中 } (\omega^\alpha)_a\in\mathfrak{X}^*(U),\quad 1\leqslant\alpha\leqslant r \tag{5.4-1}$$

称为 U 上的 **Pfaff 方程组**．内指标标记微分式的个数．这里的 $(\omega^\alpha)_a=0$ 不是指一次外微分式为恒零元；恒零元是指 $\forall v^a\in\mathfrak{X}(U)$ 有 $(\omega^\alpha)_a v^a=\langle\omega^\alpha,v\rangle=0$．而 Pfaff 方程(5.4-1)是指寻找子流形 $(\imath,N)$ 使得

$$\imath^*\big((\omega^\alpha)_a\big)=0;\qquad \text{其中包含映射 } \imath:N\to U. \tag{5.4-2}$$

或者说 $(\omega^\alpha)_a$ 在子流形 N 上的限制为零．满足上述条件的映射 $\imath$ 和流形 N 未必存在，其存在性条件就是 Frobenius 条件．

先看一个例子．若 $r=1$，在二维流形上，Pfaff 方程是

$$(\omega)_a=P(x,y)(\mathrm{d}x)_a+Q(x,y)(\mathrm{d}y)_a=0,\qquad P,Q\in C^\infty(U). \tag{5.4-3}$$

当 $Q\neq0$ 时，上述方程等价于（直接去掉抽象指标记号）

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{P(x,y)}{Q(x,y)}. \tag{5.4-4}$$

这是通常的常微分方程式．作为 Pfaff 方程，它在二维中总是可积的——这正是 Frobenius 条件 $\mathrm{d}\omega\wedge\omega=0$ 在二维自动成立的表现．

在光滑流形 M 上开子集 U 的一次微分式(5.4-1)在各点的 $\mathbb{R}$-线性无关个数未必相同，这给研究带来诸多不便. 下面，我们只研究 U 上各点线性无关的一次微分式（$(\omega^\alpha)_a$）个数均为相同常数的情形，此常数称为 Pfaff 方程组的**秩**. 我们不妨假设它的秩是 r. 到目前为止，积分流形的定义仍旧模糊，下述命题有助于清晰化此概念.

命题 5.23 *给定 m 维光滑流形 M，定义在开子集 $U\subset M$ 上的秩为 r 的 Pfaff 方程组在局部上等价于$h(=m-r)$ 维光滑分布 L^h.*

证明 . 需要提醒读者这个命题只在局部成立. 我们先从分布导出 Pfaff 方程组.

假设点 $p\in V\subset U$ 邻域有局部坐标系 $(V;x^i)$（进一步缩小开集 U 的主要目的是：缩小后的 p 点开邻域 V 可用一个坐标域覆盖，同时紧致集 $\overline{V}\subset U$），$h(=m-r)$ 维光滑分布 L^h 可用 V 上 $\mathbb{R}$-线性无关的光滑切矢量场来张成，即

$$L^h|_V=\mathrm{Span}_\infty\left\{(v_{r+1})^a,\cdots,(v_m)^a\right\}. \tag{5.4-5}$$

将此 h 个切矢量场延拓至 m 个在 V 上处处线性无关的切矢量场，假设这些切矢量场的局部展开式为（其中 $1\leqslant i\leqslant m$）

$$(v_i)^a=\sum_{j=1}^m v_i^j\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a=\sum_{\alpha=1}^r v_i^\alpha\left(\frac{\partial}{\partial x^\alpha}\right)^a+\sum_{\mu=r+1}^m v_i^\mu\left(\frac{\partial}{\partial x^\mu}\right)^a. \tag{5.4-6}$$

因分布 L^h 要有 h 个 $\mathbb{R}$-线性无关的切矢量场，故不妨假设展开系数 $\det(v_\lambda^\mu)\neq 0$，$r<\mu,\lambda\leqslant m$. 其逆记为 $b_\lambda^{\mu'}$，即 $v_{\mu'}^\mu b_\lambda^{\mu'}=\delta_\lambda^\mu$；将逆矩阵乘在式(5.4-6)上，有

$$\begin{aligned}(u_\lambda)^a&\overset{def}{=}\sum_{\mu'=r+1}^m b_\lambda^{\mu'}(v_{\mu'})^a=\sum_{\mu'=r+1}^m\sum_{\alpha=1}^r b_\lambda^{\mu'}v_{\mu'}^\alpha\left(\frac{\partial}{\partial x^\alpha}\right)^a+\sum_{\mu,\mu'=r+1}^m b_\lambda^{\mu'}v_{\mu'}^\mu\left(\frac{\partial}{\partial x^\mu}\right)^a\\&=-\sum_{\alpha=1}^r l_\lambda^\alpha\left(\frac{\partial}{\partial x^\alpha}\right)^a+\left(\frac{\partial}{\partial x^\lambda}\right)^a,\qquad \text{其中 } l_\lambda^\alpha\equiv-\sum_{\mu'=r+1}^m b_\lambda^{\mu'}v_{\mu'}^\alpha.\end{aligned}$$

显然 $l_\lambda^\alpha\in C^\infty(U)$，所以仍然有

$$L^h|_V=\mathrm{Span}_\infty\left\{(u_{r+1})^a,\cdots,(u_m)^a\right\}. \tag{5.4-7}$$

补上 r 个切基矢 $(u_\alpha)^a=\left(\frac{\partial}{\partial x^\alpha}\right)^a$，$1\leqslant\alpha\leqslant r$；这样切标架场 $\{(u_1)^a,\cdots,(u_m)^a\}$ 便构成了 V 上的切基矢场. 容易验证与 $\{u^a\}$ 对偶的余切标架场是

$$(\theta^\alpha)_a=(\mathrm{d}x^\alpha)_a+\sum_{\mu=r+1}^m l_\mu^\alpha(\mathrm{d}x^\mu)_a,\quad (\theta^\lambda)_a=(\mathrm{d}x^\lambda)_a. \tag{5.4-8}$$

其中 $1\leqslant\alpha\leqslant r$，$r<\lambda\leqslant m$. 由上式可见，$h$ 维光滑分布 L^h 可以导出 $r(=m-h)$ 个 Pfaff 方程组 $(\theta^\alpha)_a=(\mathrm{d}x^\alpha)_a+\sum_{\mu=r+1}^m l_\mu^\alpha(\mathrm{d}x^\mu)_a$，其系数 l_μ^α 是由分布 L^h 基矢场的展开系数决定的.

反之，假设先给定秩为 r 的 Pfaff 方程组 $(\omega^\alpha)_a$，其中 $1\leqslant\alpha\leqslant r$. 在每一点 $p\in V$ 最多的线性无关微分型式场自然是 m 个，我们将 r 个一次外微分式延拓到 m 个处处相互独立的外微分式，并在局部坐标系展开，有

$$(\omega^i)_a=\sum_{k=1}^m\omega_k^i(\mathrm{d}x^k)_a=\sum_{\beta=1}^r\omega_\beta^i(\mathrm{d}x^\beta)_a+\sum_{\nu=r+1}^m\omega_\nu^i(\mathrm{d}x^\nu)_a,\quad 1\leqslant i\leqslant m. \tag{5.4-9}$$

同理，不妨假设 $\det(\omega_\beta^\alpha)\neq 0$，其中 $1\leqslant\alpha,\beta\leqslant r$；这个方阵自然有逆 b_α^γ，即 $\omega_\beta^\alpha b_\alpha^\gamma=\delta_\beta^\gamma$，其中 $1\leqslant\gamma\leqslant r$. 将逆矩阵乘在式(5.4-9)上，有

$$\begin{aligned}(\varphi^\gamma)_a&\overset{def}{=}\sum_{\alpha=1}^r b_\alpha^\gamma(\omega^\alpha)_a=\sum_{\alpha,\beta=1}^r b_\alpha^\gamma\omega_\beta^\alpha(\mathrm{d}x^\beta)_a+\sum_{\nu=r+1}^m b_\alpha^\gamma\omega_\nu^\alpha(\mathrm{d}x^\nu)_a\\&=(\mathrm{d}x^\gamma)_a+\sum_{\nu=r+1}^m c_\nu^\gamma(\mathrm{d}x^\nu)_a,\qquad\text{其中 }c_\nu^\gamma\equiv\sum_{\alpha=1}^r b_\alpha^\gamma\omega_\nu^\alpha.\end{aligned}$$

由于乘的是可逆矩阵，所以 $(\varphi^\gamma)_a$ 和 $(\omega^\gamma)_a$ 是等价的. $(\varphi^\gamma)_a(1\leqslant\gamma\leqslant r)$ 在 V 上是处处线性无关的，我们可以补上 $h=(m-r)$ 个余切矢量场 $(\varphi^\lambda)_a=(\mathrm{d}x^\lambda)_a(r<\lambda\leqslant m)$，这样 m 个 $\{(\varphi^1)_a,\cdots,(\varphi^m)_a\}$ 便构成了 $\mathfrak{X}^*(V)$ 的基矢场. 容易求出与其对偶的切标架场 $\{(X_1)^a,\cdots,(X_m)^a\}$ 是（其中 $1\leqslant\alpha\leqslant r$，$r<\lambda\leqslant m$）

$$(X_\alpha)^a=\left(\frac{\partial}{\partial x^\alpha}\right)^a,\qquad(X_\lambda)^a=\left(\frac{\partial}{\partial x^\lambda}\right)^a-\sum_{\beta=1}^r c_\lambda^\beta\left(\frac{\partial}{\partial x^\beta}\right)^a. \tag{5.4-10}$$

上式说明，从秩为 r 的 Pfaff 方程组 $(\omega^\alpha)_a$ 出发，可以找到一个 h 维光滑分布

$$L^h|_V=\mathrm{Span}_\infty\{(X_{r+1})^a,\cdots,(X_m)^a\}. \tag{5.4-11}$$

其系数 c_λ^β 是由 Pfaff 方程组 $(\omega^\alpha)_a$ 的展开系数决定的.

最终可以看到，秩为 r 的 Pfaff 方程组与 $h(=m-r)$ 维的分布 L^h 是相互确定、相互伴随的. 这说明，当给定一个 Pfaff 方程组时，便同时给定了一个光滑分布；反之亦然. ■

取 $L^h|_V=\mathrm{Span}_\infty\{(v_{r+1})^a,\cdots,(v_m)^a\}$ 和 $(\omega^\alpha)_a$ $(1\leqslant\alpha\leqslant r)$ 是命题5.23中相互伴随的分布 L^h 和一次外型式场. 因两者是相互对偶的，$\forall X^a\in L^h|_V$ 必然有

$(\omega^\alpha)_a X^a = 0$. 按照 §5.3中论述，假设光滑分布 $L^h|_V$ 的积分流形是 $(\imath, N)$（见定义5.19）；其中包含映射 $\imath$ 的定义是 $\imath : N \to V \subset U \subset M$. 此时虽然 TN 中的切矢量场与 $L^h|_V$ 是同构的，但需要用包含映射推前到 TV 中才能与 V 中的余切矢量场（即一次外型式场）$(\omega^\alpha)_a \in \mathfrak{X}^*(V)$ 作用. $\forall u^a \in TN \cong L^h|_V$，必然有

$$(\omega^\alpha)_a\big(\imath_* u^a\big) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \big(\imath^*(\omega^\alpha)_a\big)(u^a) = 0. \tag{5.4-12}$$

本节开头说过，Pfaff 方程组是在寻找一个子流形 $(\imath, N)$ 使得 $\imath^*(\omega^\alpha)_a = 0$ 成立，从上式可以看到：命题5.23中描述的、与 Pfaff 方程组(5.4-1)伴随的光滑分布 L^h 的积分流形 $(\imath, N)$ 就满足此要求. $\imath^*(\omega^\alpha)_a$ 在子流形 N 的切空间上式恒零元，在 N 外的空间不是恒零元.

我们再大致叙述一下这一过程：① 给定 m 维光滑流形 M 的一个开子集 U（根据需要可适当将其缩小至 V）；② 给定开子集 U 上秩为 r 的 Pfaff 方程组(5.4-1)（即 r 个余切矢量场）；③ 通过命题5.23中论述的方法找到与 Pfaff 方程组(5.4-1)相互伴随的光滑分布 L^h，分布维数是 $h = m - r$；④ 光滑分布 L^h 会对应一个积分流形 $(\imath, N)$，见定义5.19，此积分流形中的切矢量场满足式(5.4-12)，同时我们也把这个积分流形称为 Pfaff 方程组(5.4-1)的积分流形；⑤ 积分流形 $(\imath, N)$ 的存在性条件就是下面叙述的 Frobenius 定理.

在叙述 Frobenius 定理之前，先看一下 Pfaff 方程组与一般偏微分微分方程组的关系. 给定一般的一阶偏微分方程组

$$\frac{\partial y^\alpha(x)}{\partial x^i} = f_i^\alpha(x^1, \cdots, x^m; y^1, \cdots, y^n), \quad 1 \leqslant \alpha \leqslant n, \quad 1 \leqslant i \leqslant m. \tag{5.4-13}$$

其中 f_i^α 是宗量 $\{x^1, \cdots, x^m; y^1, \cdots, y^n\}$ 的光滑函数. 上式可改写为开子集 $U \times V \subset \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 的 Pfaff 方程组

$$(\omega^\alpha)_a = (\mathrm{d}y^\alpha)_a - \sum_{i=1}^m f_i^\alpha(x, y)(\mathrm{d}x^i)_a, \quad 1 \leqslant \alpha \leqslant n. \tag{5.4-14}$$

如果方程组(5.4-13)有解 $y^\alpha = g^\alpha(x^1, \cdots, x^m)$，那么构建映射 $\imath : U \to U \times V$ 为

$$\imath(x^1, \cdots, x^m) = \big(x^1, \cdots, x^m;\ g^1(x), \cdots, g^n(x)\big)\,. \tag{5.4-15}$$

可以看出 $(\imath, U)$ 是 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 的嵌入子流形. 式(5.4-14)中描述的 Pfaff 方程组是流形 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 中开子集 $U \times V$ 上的余切矢量场，可用映射 $\imath$ 将其拉回至 U 中

$$\imath^*\big((\omega^\alpha)_a\big) = (\mathrm{d}g^\alpha(x))_a - f_i^\alpha\big(x, g(x)\big)(\mathrm{d}x^i)_a = \left(\frac{\partial g^\alpha(x)}{\partial x^i} - f_i^\alpha\big(x, g(x)\big)\right)(\mathrm{d}x^i)_a.$$

因为 $g^\alpha(x^1,\cdots,x^m)$ 是方程组(5.4-13)的解，所以显然有 $i^*\big((\omega^\alpha)_a\big)=0$.

定理 5.24 设式(5.4-1)是定义在开子集 $U\subset M$ 上的秩为 r 的 Pfaff 方程组，则它完全可积的充分必要条件是：满足下述条件之一即可（其中 $1\leqslant\alpha\leqslant r$）

$$(\mathrm{d}\omega^\alpha)_{ab}=\sum_{\beta=1}^{r}(\phi^\alpha_\beta)_a\wedge(\omega^\beta)_b, \tag{5.4-16a}$$

$$0=(\mathrm{d}\omega^\alpha)_{ab}\wedge(\omega^1)_{c_1}\wedge(\omega^2)_{c_2}\cdots\wedge(\omega^r)_{c_r}, \tag{5.4-16b}$$

$$(\omega^\alpha)_a=\sum_{\beta=1}^{r}g^\alpha_\beta(x^1,\cdots,x^r)\cdot(\mathrm{d}x^\beta)_a,\quad \text{存在 } g^\alpha_\beta\in C^\infty(V). \tag{5.4-16c}$$

式(5.4-16)称为 Frobenius 条件．条件(5.4-16a)要求 $\forall p\in U$ 存在点 p 的开邻域 $V\subset U$ 使得存在 r^2 个 $(\phi^\alpha_\beta)_a\in\mathfrak{X}^*(V)$ 满足式(5.4-16a)．条件(5.4-16c)是指存在 $g^\alpha_\beta(x^1,\cdots,x^r)\in C^\infty(V)$ 和局部坐标系 $\{x\}$ 使得式(5.4-16c)成立即可．

证明 . 定理证明可参考文献[55]§7.14-7.17、[70]§3.2或其它类似书籍.

我们简单论述一下几个 Frobenius 条件的等价性．通过定理3.95极易证明条件(5.4-16a)与条件(5.4-16b)的等价性.

对条件(5.4-16c)取外微分可得到条件(5.4-16a)；这是说如果条件(5.4-16c)成立，那么 Pfaff 方程组完全可积．反之，如果那么 Pfaff 方程组完全可积，从定理5.21可知存在开子集 V 中的坐标面 $\{(x^1,\cdots,x^m)\mid x^{r+1}=const,\cdots,x^m=const\}$ 是分布 L^h 的 h 维积分流形．在此坐标系下，Pfaff 方程中的一次外微分型式场只能表示为

$$(\omega^\alpha)_a=\sum_{\beta=1}^{r}g^\alpha_\beta(x^1,\cdots,x^r)\cdot(\mathrm{d}x^\beta)_a,\qquad g^\alpha_\beta(x^1,\cdots,x^r)\in C^\infty(V). \tag{5.4-17}$$

这就是条件(5.4-16c). ■

在本节开头，我们描述了二维平面上的一个例子，下面把它拓展到 $\mathbb{R}^3$ 中.

例 5.25 取 $r=1$，在 $\mathbb{R}^3$ 的凸开子集 U 上，给定 Pfaff 方程

$$(\omega)_a=P(x,y,z)(\mathrm{d}x)_a+Q(x,y,z)(\mathrm{d}y)_a+R(x,y,z)(\mathrm{d}z)_a,\quad P,Q,R\in C^\infty(U).$$

通过式(5.4-16b)，很容易得到上述方程的完全可积条件，先计算其外微分

$$\mathrm{d}_b(\omega)_a=(\mathrm{d}P)_b\wedge(\mathrm{d}x)_a+(\mathrm{d}Q)_b\wedge(\mathrm{d}y)_a+(\mathrm{d}R)_b\wedge(\mathrm{d}z)_a. \tag{5.4-18}$$

然后与 $(\omega)_c$ 作外积

$$\mathrm{d}_b(\omega)_a\wedge(\omega)_c=(\mathrm{d}P)_b\wedge(\mathrm{d}x)_a\wedge(\omega)_c+(\mathrm{d}Q)_b\wedge(\mathrm{d}y)_a\wedge(\omega)_c+(\mathrm{d}R)_b\wedge(\mathrm{d}z)_a\wedge(\omega)_c.$$

将此式展开可得 Frobenius 条件（计算过程留给读者完成）：

$$P\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)+Q\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)+R\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)=0. \tag{5.4-19}$$

若读者需要更深入了解 Frobenius 定理在物理中的应用，可参考文献[61]Ch.8；那里给出了更多的例题（约 30 道例题），以及更加详尽、全面地描述.

5.5 流形定向与带边流形

5.5.1 流形定向

在 $\mathbb{R}^3$ 中的直角坐标系可以分为左手和右手两种，这称为坐标系的定向；定向概念可以向高维空间推广，但三维空间中直观的左手或右手定则很难推广. 设 $\mathbb{R}^3$ 中有两个原点重合的、正交归一坐标系 $\boldsymbol{e}_i$ 和 $\boldsymbol{f}_i$，联系这个坐标系的是一个实正交矩阵，即 $\boldsymbol{f}_i=a_i^j\boldsymbol{e}_j$；这个矩阵的行列式 $\det(a_i^j)=\pm1$，当其值为 $+1$ 时，我们称两个坐标系是定向相同的，否则是定向相反的. 此方式可以推广到高维.

设 V 是 m 维矢量空间，有两组基矢 $(e_i)^a$ 和 $(\epsilon_i)^a$ （一般不要求它们正交归一），联系它们的是一个非奇异 $m\times m$ 矩阵 A，即 $(\epsilon_i)^a=A_i^j(e_j)^a$；当 $\det(A)>0$ 时，我们称两组基矢量定向相同，当 $\det(A)<0$ 时，我们称两组基矢量定向相反；也就是行列式的正负将所有基矢组分为两个等价类，此时可称其一为右手的，另一个为左手的. 需要注意，矢量空间的变换矩阵 A 是常数矩阵，它的行列式只能大于或者小于零. 这一方式可以推广至微分流形的切空间（一类矢量空间），但流形切空间是逐点不同的. 用不那么严格的语言来说：

定义 5.26 设 M 是 m 维光滑流形，其微分结构 $\{(U,\varphi;x^i),(V,\psi;y^i),\cdots\}$ 是 M 的开覆盖；当 $U\cap V\neq\varnothing$ 时，如果坐标变换 $\psi\circ\varphi^{-1}:\varphi(U\cap V)\to\psi(U\cap V)$ 的 Jacobi 行列式 $\det(\frac{\partial y^i}{\partial x^j})>0$，则称 M 是**可定向**的光滑流形；满足 Jacobi 行列式大于零的两个坐标卡 (U,φ) 和 (V,ψ) 称为**定向相符的**或**同向的**；由定向相符的坐标卡组成的极大坐标卡集合（也就是微分结构）称为流形 M 的一个**定向**.

上面的定义大意是，先在流形 M 取一个开覆盖集合（同时取定坐标系），当点 $p\in U\cap V\neq\varnothing$ 时，p 点有两个坐标系[2]；在 p 点切空间便有两组基矢量 $\{(\frac{\partial}{\partial x^i})^a\}$ 和 $\{(\frac{\partial}{\partial y^i})^a\}$，这两组基矢量坐标变换的 Jacobi 行列式（取式(4.4-19)中逆变部分即可）肯定不是零；当 p 在流形 M 上移动时，此行列式的正负可能逐点不同，也就是有的点是正的，有的点是负的．如果能够通过调节坐标取向（比如令 $y^1=-y^1$）[3] 可以令所有点 Jacobi 行列式都大于零，则流形 M 是可定向的．否则就是不可定向的，典型例子是 Möbius 带．

上面定义是由切空间来描述的，这个定义能很好地退化到 $\mathbb{R}^3$ 中的定义；更为常用的定义是由余切空间来描述．先给出定义5.26的对偶定义：

定义 5.27 *如果 m 阶光滑流形 M 上存在一个连续的、处处非零的 m 阶外微分型式场 ω，则称 M 是**可定向**的光滑流形；ω 称为流形 M 的**定向**．反之，若不存在这样的外型式场，则称流形 M 不可定向．*

下面来分析两个定义的等价性．假设 M 有局部坐标系 $(U;x^i)$ 和 $(V;y^\alpha)$ 且 $U\cap V\neq\varnothing$，在 $U\cap V$ 上满足定义5.27中的外微分型式 ω 可表示为

$$\begin{aligned}\omega_{a_1\cdots a_m}=&h(x)\cdot(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}=f(y)\cdot(\mathrm{d}y^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}y^m)_{a_m}\\=&f(y)\frac{\partial(y^1,\cdots,y^m)}{\partial(x^1,\cdots,x^m)}(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}.\end{aligned}\tag{5.5-1}$$

定义5.27中还要求 $h(x)$ 和 $f(y)$ 是连续的、处处非零的，那么必然有 $h(x)>0$ 或 $h(x)<0$，不存在任何一个开子集 U，其上的 $h(x)$ 可变正负号；$f(y)$ 也如此．不妨假设 $h>0$ 且 $f>0$，如果任何一个小于零（比如 $f<0$），只需令坐标取负号（$y^1=-y^1$，其它坐标不变），然后新的系数大于零了（$-f(y)>0$）．因 $h>0$ 且 $f>0$，故由式(5.5-1)可知坐标变换产生的 Jacobi 行列式 $J'=\frac{\partial(y^1,\cdots,y^m)}{\partial(x^1,\cdots,x^m)}$ 处处大于零；J' 是定义5.26中 Jacobi 行列式 J 的转置逆，即 $J'=J^{-T}$；可见 $J>0$ 等价于 $J'>0$．这便说明了两个定义是等价的．

我们要求 ω 是 m 阶的，而流形 M 也是 m 阶的；由此可知流形 M 上任意两个连续且处处非零的 m 阶外微分型式场 ω 和 ω' 只相差一个非零倍数，即 $\omega'=c\cdot\omega$，其中 $c\in C^0(M)$．因 c 连续，故要么 $c>0$ 要么 $c<0$，在任何点都

[2]单独一个开子集 $(U;x^i)$ 内，定向是确定的，或者说不存在定向问题．因为 U 是能够被一个坐标系覆盖住，定向一定存在且相符合；如果非要讨论定向，可取恒等坐标变换，那么 Jacobi 行列式为 $+1$.

[3]比如通过调节坐标取向已将开子集 U 和 V 调整成定向相符．而 $V\cap W\neq\varnothing$，此时 V 中坐标必须和 U 中一致，不能再次调整 V 的坐标与 W 定向相符合，只能调整 W 的坐标与 V 定向相符合；以此类推.

有 $c\neq 0$. 这更加清晰地说明了：定向只有两种（可称为左手定向或右手定向）.

外微分型式场 ω 与局部坐标系 $(U;x)$ 定向相符合或者说同向是指(5.5-1)式中 $h(x)>0$；如果 $h(x)<0$ 则称定向相反.

5.5.2 带边流形

定义4.5中的开集不包含边界，比如包含边界的实心立方体在此定义下便不是流形；为了更好地描述现实中的物体，需要给出带边流形的定义. 引入记号：

$$\mathbb{R}^m_- \equiv\{(x^1,\cdots,x^m)\in\mathbb{R}^m \mid x^1\leqslant 0\}, \tag{5.5-2}$$

$$\partial\mathbb{R}^m_- \equiv\{(x^1,\cdots,x^m)\in\mathbb{R}^m \mid x^1= 0\}=\{0\}\times\mathbb{R}^{m-1}. \tag{5.5-3}$$

若局部坐标是从 x^0 开始的，则把上两式中的 $x^1\leqslant 0$ 换成 $x^0\leqslant 0$，及 $x^1=0$ 换成 $x^0=0$. 若用 $\mathbb{R}^m$ 中标准拓扑来看，$\mathbb{R}^m_-$ 不是 $\mathbb{R}^m$ 的开子集. 我们采用如下策略：使用诱导拓扑（见定义2.48）定义 $\mathbb{R}^m_-$ 中的开集. 此时 $\mathbb{R}^m_-$ 是诱导拓扑下的开集；$\partial\mathbb{R}^m_-$ 称为 $\mathbb{R}^m_-$ 的**边界**，$\mathrm{i}(\mathbb{R}^m_-)=\mathbb{R}^m_- -\partial\mathbb{R}^m_-$ 称为 $\mathbb{R}^m_-$ 的**内部**.

定义 5.28 只需把定义4.5中的 $\mathbb{R}^m$ 换成 $\mathbb{R}^m_-$ 便可得到**带边流形**定义，就不再重复叙述了. 有了带边流形定义，定义4.5中的流形可称为无边流形，以示区分.

若带边流形 M 有局部坐标 (U,ϕ) 将点 $p\in U$ 映射到 $\partial\mathbb{R}^m_-$，即 $\phi(p)\in\partial\mathbb{R}^m_-$，则称点 p 为流形 M 的**边界点**，所有这样的点构成的集合记为 ∂M.

定理 5.29 设 M 是 m 维光滑带边流形，且 $\partial M\neq\varnothing$. 那么可由 M 的微分结构 $\mathscr{A}$ 诱导出 ∂M 上的微分结构 $\widetilde{\mathscr{A}}$，使得 ∂M 成为 $m-1$ 维光滑无边流形. 此时包含映射 $(\imath,\partial M)$ 是 M 的正则嵌入闭子流形. 如果 M 是可定向的，那么 ∂M 也是可（诱导）定向的.（证明可参阅[70]$^{\S 3.4}$定理 4.1）

设 $(U;x^i)$ 是流形 M 的局部开邻域，并且 $U\cap\partial M\neq\varnothing$. 设开集 U 的定向为 $(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}$，**约定**：$U\cap\partial M$ 的诱导定向为 $(\mathrm{d}x^2)_{a_2}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}$.

5.6 单位分解定理

单位分解是近代数学中才产生的一个概念，它可将局部拼接成整体. 我们将略去定理的证明，可参考陈省身和陈维桓 [70, §3.3]. 文献[42]$^{\S 16}$提供了一份较易理解的证明，它只讨论了 $\mathbb{R}^n$ 空间问题，没有讨论一般流形.

定义 5.30 设光滑流形 M 上存在实函数 $f: M \to \mathbb{R}$，函数 f 的**支撑集**（support set）是指使 f 取非零值的点集的闭包，记作 $\mathrm{supp} f \equiv \overline{\{p \mid f(p) \neq 0, \forall p \in M\}}$.

定义 5.31 设 Σ 是光滑流形 M 的一个开覆盖；如果 M 的任意一个紧致子集只与 Σ 中有限个成员相交，则 Σ 是 M 的**局部有限开覆盖**.

定理 5.32 （单位分解定理）设 $\Sigma = \{W_i\}$ 是光滑流形 M 的一个开覆盖，则在 M 上**存在**一族光滑函数 $\{g_\alpha\}$，满足如下条件：**(1)** 对每一个 α，$0 \leqslant g_\alpha \leqslant 1$，支撑集 $\mathrm{supp} g_\alpha$ 是紧致的，并且有开集 $W_i \in \Sigma$ 使得 $\mathrm{supp} g_\alpha \subset W_i$；**(2)** $\forall p \in M$，存在 p 点的邻域 U，它只与有限多个支撑集 $\mathrm{supp} g_\alpha$ 相交；**(3)** $\sum_\alpha g_\alpha = 1$.

条件 (2) 一般称为局部有限性；这说明条件 (3) 左边的 g_α 只有有限个不为零，故和式是平凡收敛的. 函数族 $\{g_\alpha\}$ 称为从属于开覆盖 Σ 的单位分解.

5.7 流形上的积分

积分是联系局部与整体的有力工具，在数学、物理上都有着重要应用.

在数学分析中讲述过重积分定义与计算，以及重积分的变量替换定理. 设 Ω 和 Ω' 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，且有微分同胚映射 $\phi: \Omega' \to \Omega$；若标量函数 f 在其定义域是连续的，则有

$$\int_{\Omega'} f(x) \mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^m = \int_{\Omega} f \circ \phi(y) \left| \frac{\partial(x^1, \cdots, x^m)}{\partial(y^1, \cdots, y^m)} \right| \mathrm{d}y^1 \cdots \mathrm{d}y^m. \tag{5.7-1}$$

变量替换后出现了坐标变换的 Jacobi 行列式的绝对值，这是多重积分中的基本定理. 下面我们会把积分定义推广到流形上，关键问题是如何进行大范围的、与局部坐标选取无关的处理.

设 M 是 m 维的、已定向的、光滑流形；M 可能带边、也可能无边. 设 $\omega \in A^m(M)$，则 ω 的**支撑集**（support set）定义为

$$\mathrm{supp}\omega = \overline{\{p \in M \mid \omega(p) \neq 0\}}. \qquad \text{注意是闭包} \tag{5.7-2}$$

我们将积分学的讨论限制在有紧致支撑集的外微分型式场；将要定义的积分是一个线性映射，即 $\int: A^m(M) \to \mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}$-线性的.

先从简单情形开始，假定用一个坐标域就能覆盖住流形 M，并设其坐标为 $(M, \varphi; x^i)$. 这样 ω 的紧致支撑集自然是 M 的子集；假设有局部坐标表达（在此

例中局部即整体）

$$\omega_{a_1\cdots a_m}=f(x)(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m},\qquad f(x)\in C^\infty(M). \tag{5.7-3}$$

在数学分析中，标量函数 $f(x)$ 的黎曼积分早有定义，并且是一个有限实数；在此处，我们可以直接将流形 M 上外微分型式场 ω 的积分定义成黎曼积分，即

$$\int_M\omega\equiv\int_M f(x)(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}\overset{def}{=}\int_{\varphi(M)}(f\circ\varphi^{-1})\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^m. \tag{5.7-4}$$

下面需要验证，这个定义与局域坐标卡选取无关．设 $(M,\psi;y^i)$ 是此流形的另一套坐标系，ω 表达式变为

$$\omega_{a_1\cdots a_m}=g(y)(\mathrm{d}y^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}y^m)_{a_m}=g(y)\frac{\partial(y^1,\cdots,y^m)}{\partial(x^1,\cdots,x^m)}(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}.$$

由不同坐标系下的不同表达式(5.7-3)和上式，可说明有下式成立

$$f\circ\varphi^{-1}=(g\circ\psi^{-1})\circ(\psi\circ\varphi^{-1})\frac{\partial(y^1,\cdots,y^m)}{\partial(x^1,\cdots,x^m)}. \tag{5.7-5}$$

因坐标卡 ψ 和 φ 是定向相符的，故坐标变换的 Jacobi 行列式处处为正，即

$$\frac{\partial(y^1,\cdots,y^m)}{\partial(x^1,\cdots,x^m)}>0\quad\text{和}\quad\frac{\partial(x^1,\cdots,x^m)}{\partial(y^1,\cdots,y^m)}>0. \tag{5.7-6}$$

有了这些准备，容易验证积分定义与局部坐标卡无关．

$$\begin{aligned}\int_M\omega&=\int_{\psi(M)}(g\circ\psi^{-1})\mathrm{d}y^1\cdots\mathrm{d}y^m\\&=\int(g\circ\psi^{-1})\circ(\psi\circ\varphi^{-1})\frac{\partial(y^1,\cdots,y^m)}{\partial(x^1,\cdots,x^m)}\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^m\\&=\int_{\varphi(M)}(f\circ\varphi^{-1})\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^m.\end{aligned}$$

从上式可以看出，如果两个坐标卡定向不同，Jacobi 行列式会产生一个额外的负号．从上式还可以看出，m 阶外微分型式场的积分定义与式(5.7-1)相符合．如果不是，比如是一个二阶对称张量场，那么积分定义都成问题；当作变量替换时，二阶张量场无法由自身变换产生一个 Jacobi 行列式，也就无法与基本定理(5.7-1)相符合．微分流形中的积分定义（以及其它任何定义、公理等）原则上应能退化到

$\mathbb{R}^m$ 中的积分定义（以及相应定义、公理等），除了 m 阶外型式场（标量函数场与其同构），其它张量场都很难给出积分定义.

下面考虑一般情形. 设微分流形 M 有定向相符合的坐标卡开覆盖集合 $(U_\alpha, \varphi_\alpha; x^i_\alpha)$；$m$ 阶外微分型式场 $\omega \in A^m(M)$ 的局部坐标表达式为

$$\omega_{a_1\cdots a_m}|_{U_\alpha} = f_\alpha (\mathrm{d}x^1_\alpha)_{a_1} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}x^m_\alpha)_{a_m}, \qquad f_\alpha \in C^\infty(U_\alpha). \tag{5.7-7}$$

根据单位分解定理5.32，在 M 上有从属于 $\{U_\alpha\}$ 的单位分解 $\{h_\alpha\}$，其中 $\mathrm{supp} h_\alpha \subset U_\alpha$，$h_\alpha \in C^\infty(M)$，$\sum_\alpha h_\alpha = 1$，$1 \geqslant h_\alpha \geqslant 0$，所以有

$$\omega = \omega \cdot \sum_\alpha h_\alpha = \sum_\alpha h_\alpha \cdot \omega, \tag{5.7-8}$$

需注意，上式中的 “$\cdot$” 就是普通的乘法，不是复合映射. 因 $\mathrm{supp}\omega$ 是紧致的，所以上式右端只有有限项非零，即上式右端平凡收敛. 命

$$\int_M \omega \overset{def}{=} \int_M \sum_\alpha h_\alpha \cdot \omega = \sum_\alpha \int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)} \big((h_\alpha \cdot f_\alpha) \circ \varphi_\alpha^{-1}\big) \mathrm{d}x^1_\alpha \cdots \mathrm{d}x^m_\alpha. \tag{5.7-9}$$

自然需要验证这个定义与局坐标系选取无关，以及与单位分解选取无关. 设 $(V_\lambda, \psi_\lambda; y^i_\lambda)$ 是 M 的另一个定向相符的坐标卡，同时它也是 M 的局部有限开覆盖，再设 $\{g_\lambda\}$ 是从属于 $\{V_\lambda\}$ 的单位分解；同时假定 $\{U_\alpha\}$ 与 $\{V_\lambda\}$ 的定向相符合. m 阶外微分型式场 $\omega \in A^m(M)$ 在 $\{V_\lambda\}$ 中的局部坐标表达式为

$$\omega_{a_1\cdots a_m}|_{V_\lambda} = w_\lambda (\mathrm{d}y^1_\lambda)_{a_1} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}y^m_\lambda)_{a_m}, \qquad w_\lambda \in C^\infty(V_\lambda). \tag{5.7-10}$$

当 $U_\alpha \cap V_\lambda \neq \varnothing$ 时，两个坐标系定向是相符合的，仿照式(5.7-5)可得：

$$f_\alpha \circ \varphi_\alpha^{-1} = (w_\lambda \circ \psi_\lambda^{-1}) \circ (\psi_\lambda \circ \varphi_\alpha^{-1}) \cdot \frac{\partial(y^1_\lambda, \cdots, y^m_\lambda)}{\partial(x^1_\alpha, \cdots, x^m_\alpha)}. \tag{5.7-11}$$

由于 $\{h_\alpha\}$ 和 $\{g_\lambda\}$ 是单位分解，所以有

$$\left(\sum_\alpha h_\alpha\right)\Big|_{V_\lambda} = 1, \qquad \left(\sum_\lambda g_\lambda\right)\Big|_{U_\alpha} = 1. \tag{5.7-12}$$

我们来计算积分定义(5.7-9)右端的表达式：

$$\sum_\alpha \int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)} \big((h_\alpha \cdot f_\alpha) \circ \varphi_\alpha^{-1}\big) \cdot \mathrm{d}x^1_\alpha \cdots \mathrm{d}x^m_\alpha$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{\alpha} \int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)} \left(\sum_{\lambda} g_\lambda \circ \varphi_\alpha^{-1} \right) \cdot \left((h_\alpha \cdot f_\alpha) \circ \varphi_\alpha^{-1} \right) \cdot \mathrm{d}x_\alpha^1 \cdots \mathrm{d}x_\alpha^m \\
&= \sum_{\alpha\lambda} \int_{\varphi_\alpha(U_\alpha \cap V_\lambda)} \left((g_\lambda \cdot h_\alpha \cdot f_\alpha) \circ \varphi_\alpha^{-1} \right) \cdot \mathrm{d}x_\alpha^1 \cdots \mathrm{d}x_\alpha^m \\
&= \sum_{\alpha\lambda} \int_{\varphi_\alpha(U_\alpha \cap V_\lambda)} \left((g_\lambda \cdot h_\alpha \cdot w_\lambda \circ \psi_\lambda^{-1}) \circ (\psi_\lambda \circ \varphi_\alpha^{-1}) \cdot \frac{\partial(y_\lambda^1, \cdots, y_\lambda^m)}{\partial(x_\alpha^1, \cdots, x_\alpha^m)} \right) \cdot \mathrm{d}x_\alpha^1 \cdots \mathrm{d}x_\alpha^m \\
&= \sum_{\alpha\lambda} \int_{\psi_\lambda(U_\alpha \cap V_\lambda)} \left((g_\lambda \cdot h_\alpha \cdot w_\lambda) \circ \psi_\lambda^{-1} \right) \cdot \mathrm{d}y_\lambda^1 \cdots \mathrm{d}y_\lambda^m \\
&= \sum_{\lambda} \int_{\psi_\lambda(V_\lambda)} \left((g_\lambda \cdot w_\lambda) \circ \psi_\lambda^{-1} \right) \cdot \mathrm{d}y_\lambda^1 \cdots \mathrm{d}y_\lambda^m
\end{aligned}
$$

证明过程需要参考定义式(4.4-2)以及式(5.7-11)．上面这个长式推导说明积分定义(5.7-9)与局部坐标选取以及从属单位分解选取无关；即此定义是大范围的（或整体的）．除此以外，还需验证本节开头提到的：积分是一个线性映射．

$$
\begin{aligned}
\int_M (\omega + k \cdot \eta) &= \sum_{\alpha} \int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)} \left((h_\alpha \cdot (\omega_\alpha + k \cdot \eta_\alpha)) \circ \varphi_\alpha^{-1} \right) \cdot \mathrm{d}x_\alpha^1 \cdots \mathrm{d}x_\alpha^m \\
&= \sum_{\alpha} \int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)} \left((h_\alpha \cdot \omega_\alpha) \circ \varphi_\alpha^{-1} \right) \cdot \mathrm{d}x_\alpha^1 \cdots \mathrm{d}x_\alpha^m \\
&\quad + \sum_{\alpha} \int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)} \left((h_\alpha \cdot k \cdot \eta_\alpha) \circ \varphi_\alpha^{-1} \right) \cdot \mathrm{d}x_\alpha^1 \cdots \mathrm{d}x_\alpha^m \\
&= \int_M \omega + k \cdot \int_M \eta.
\end{aligned}
$$

其中 $k \in \mathbb{R}$，ω_α、η_α 分别是 ω、η 在不同开集上的分量；这便验证了积分是线性的．

例 5.33 子流形上积分定义（本例中假设支撑集都是紧致的）．

在 m 维、可定向光滑流形 M 上有 $r(< m)$ 维全反对称、连续协变张量场 $\omega \in A^r(M)$；一般说来，无法在 M 上直接定义关于 ω 的积分．若有 r 维已定向流形 N，且存在 $\phi : N \to M$ 是 N 在 M 中的光滑浸入子流形，则 $\phi^*\omega \in A^r(N)$；此时，ω 可以在 M 上定义积分为：

$$
\int_{\phi(N)} \omega \overset{def}{=} \int_N \phi^*\omega. \tag{5.7-13}
$$

例 5.34 利用单位分解定理求积分一例 $\int_{-\pi}^{\pi} x\mathrm{d}x$．

我们先给实数轴 $\mathbb{R}$ 建立一个单位分解. 令 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是由下式定义的函数

$$f(x)=\begin{cases}(1+\cos x)/2, & -\pi\leqslant x\leqslant\pi;\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}\tag{5.7-14}$$

f 是 C^1 类函数. 对每个整数 $n\geqslant 0$，令 $\phi_{2n+1}(x)=f(x-n\pi)$；对每个整数 $n\geqslant 1$，令 $\phi_{2n}(x)=f(x+n\pi)$；那么，函数组 $\{\phi_i\}$ 构成了 $\mathbb{R}$ 上的一个单位分解. $\{\phi_i\}$ 的支撑集 S_i 是一个形如 $[k\pi,(k+2)\pi]$ 的闭区间，这当然是紧致集，并且 $\mathbb{R}$ 上任一点都有一个小邻域 U，U 至多与集合 $\{S_i\}$ 中的三个相交；容易验证 $\sum_i\phi_i=1$. 下面计算积分.

$$\begin{aligned}&\int_{-\pi}^{\pi}x\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}x\sum_i\phi_i\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}x\phi_1\mathrm{d}x+\int_{-\pi}^{\pi}x\phi_2\mathrm{d}x+\int_{-\pi}^{\pi}x\phi_3\mathrm{d}x\\&=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x}{2}(1+\cos x)\mathrm{d}x+\int_{-\pi}^{0}\frac{x}{2}\big(1+\cos(x+\pi)\big)\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}\frac{x}{2}\big(1+\cos(x-\pi)\big)\mathrm{d}x\\&=0+\big(-1-\pi^2/4\big)+\big(1+\pi^2/4\big)=0.\end{aligned}$$

就本例来说直接计算比单位分解更简单；上面只是展示一下如何用单位分解定理来计算积分，可以初步感性认知单位分解定理下的积分.

5.8 Stokes–Cartan 定理

下面叙述 Stokes–Cartan 定理，这是流形论积分学中一个极为重要的定理，现在所用表述形式是由 Cartan 给出并证明的.

定理 5.35 设 M 是 $m+1$ 维、已定向、带边光滑流形，$\omega\in A^m(M)$，则

$$\int_M\mathrm{d}\omega=\int_{\partial M}\imath^*\omega.\tag{5.8-1}$$

其中 ∂M 是带边流形 M 的边界，具有从 M 诱导的定向（见 §5.5.2末尾）. 映射 $\imath:\partial M\to M$ 是包含映射，使 $(\imath,\partial M)$ 成为 M 的正则嵌入闭子流形.

证明 . 需注意 $\omega\in A^m(M)$ 是 $m+1$ 维光滑流形 M 上的 m 阶外微分型式场，无论是在流形 M 上，还是在 ∂M 上，积分定义都略显含混；需要用包含映射将其拉回到 ∂M 上，使其成为 ∂M 上的外微分型式场，然后才有良性积分定义.

为了与相对论内容匹配，取局部坐标为 $\{x^0, x^1, \cdots, x^m\}$，即从“0”开始.

甲 设 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 是 M 的定向相符的坐标卡集，使得局部坐标卡集 $\{U_\alpha\}$ 成为 M 的开覆盖；$\{h_\alpha\}$ 是从属于 $\{U_\alpha\}$ 的单位分解，则

$$\omega = \left(\sum\nolimits_\alpha h_\alpha\right) \cdot \omega = \sum\nolimits_\alpha (h_\alpha \cdot \omega).$$

因为支撑集 $\mathrm{supp}\omega$ 是紧致的，故 $\mathrm{supp}\omega$ 只与 $\{U_\alpha\}$ 中有限多个成员相交，因此上式最右端为平凡收敛. 于是

$$\int_M \mathrm{d}\omega = \sum_\alpha \int_M \mathrm{d}(h_\alpha \cdot \omega),$$

并且

$$\int_{\partial M} i^*\omega = \sum_\alpha \int_{\partial M} i^*(h_\alpha \cdot \omega).$$

所以，只要对于每一个指标 α 证明下式成立就可以了：

$$\int_M \mathrm{d}(h_\alpha \cdot \omega) = \int_{\partial M} i^*(h_\alpha \cdot \omega). \tag{5.8-2}$$

注意到此时外微分式 $h_\alpha \cdot \omega$ 的特性是

$$\mathrm{supp}(h_\alpha \cdot \omega) \subset \mathrm{supp}h_\alpha \cap \mathrm{supp}\omega \subset U_\alpha,$$

即支撑集 $\mathrm{supp}(h_\alpha \cdot \omega)$ 是紧致的，并且包含在坐标域 U_α 内. 这样，我们已经把问题归结为对于具有如下性质的 m 次外微分式 ω 证明式(5.8-1)成立：$\mathrm{supp}\omega$ 是紧致的，并且存在 M 的、与定向相符的坐标卡 (U, φ)，使得 $\mathrm{supp}\omega \subset U$. 也就是说，不显示写出单位分解 $\{h_\alpha\}$，以令证明过程简洁一些.

$\forall p \in U$，令 $x^i(p) = (\varphi(p))^i$. 假定 ω 的局部坐标表达式为：

$$\omega_{a_1\cdots a_m} = \sum_{j=0}^{m} (-)^j a_j (\mathrm{d}x^0)_{a_1} \wedge \cdots \wedge \widehat{\mathrm{d}x^j} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}x^m)_{a_m}, \tag{5.8-3}$$

其中 $a_j \in C^\infty(U)$，且 $\mathrm{supp}a_j \subset U$. 它的外微分 $\mathrm{d}\omega$ 的表达式为

$$\mathrm{d}_{a_0}\omega_{a_1\cdots a_m} = \left(\sum\nolimits_{j=0}^{m} \frac{\partial a_j}{\partial x^j}\right) (\mathrm{d}x^0)_{a_0} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}x^m)_{a_m}. \tag{5.8-4}$$

下面分两种情形进行讨论.

乙 $U\cap\partial M=\varnothing$. 此时 $U\subset \mathrm{i}(M)$ 且 $\imath^*\omega=0$，故式(5.8-1)的右端为零. 我们的目标是证明式(5.8-1)左端也是零. 因 $\mathrm{supp}\omega$ 是紧的，故不妨设 $\varphi(U)\subset\mathbb{R}^{m+1}_-$ 是有界的开区域，因此有充分大的正实数 K，使得 $\varphi(U)\subset\mathbb{R}^{m+1}_-\cap C$，其中

$$C=\left\{\left(x^0,\cdots,x^m\right)\in\mathbb{R}^{m+1}\mid -K\leqslant x^i\leqslant K,\ 0\leqslant i\leqslant m\right\}. \tag{5.8-5}$$

现在 $\mathrm{supp}\left(a_j\circ\varphi^{-1}\right)\subset\varphi(U)$，而 $\varphi(U)\backslash\mathrm{supp}\left(a_j\circ\varphi^{-1}\right)$ 是开集，所以可以让函数 $a_j\circ\varphi^{-1}$ 光滑地延拓到整个 $\mathbb{R}^{m+1}_-\cap C$，使得它在 $\varphi(U)$ 外的值为零. 由于 $U\subset\mathrm{i}(M)$，故有 $\mathrm{supp}\left(a_j\circ\varphi^{-1}\right)\subset\varphi(U)\subset\mathrm{i}(\mathbb{R}^{m+1}_-)$. 所以扩充后的函数 $a_j\circ\varphi^{-1}$ 在 $\mathbb{R}^{m+1}_-\cap C$ 的边界上皆取零值. 这样，对于 $1\leqslant j\leqslant m$ 有

$$\begin{aligned}\int_{-K}^{K}\frac{\partial\left(a_j\circ\varphi^{-1}\right)}{\partial x^j}\mathrm{d}x^j=&+a_j\circ\varphi^{-1}\left(x^0,\cdots,x^{j-1},K,x^{j+1},\cdots,x^m\right)\\&-a_j\circ\varphi^{-1}\left(x^0,\cdots,x^{j-1},-K,x^{j+1},\cdots,x^m\right)=0.\end{aligned}$$

同时

$$\int_{-K}^{0}\frac{\partial\left(a_0\circ\varphi^{-1}\right)}{\partial x^0}\mathrm{d}x^0=a_0\circ\varphi^{-1}\left(0,x^1,\cdots,x^m\right)-a_0\circ\varphi^{-1}\left(-K,x^1,\cdots,x^m\right)=0.$$

所以，有

$$\begin{aligned}\int_M\mathrm{d}\omega&=\int_{\varphi(U)}\left(\sum_{j=0}^{m}\frac{\partial\left(a_j\circ\varphi^{-1}\right)}{\partial x^j}\right)\mathrm{d}x^0\cdots\mathrm{d}x^m\\&=\sum_{j=0}^{m}\int_{\mathbb{R}^{m+1}_-\cap C}\frac{\partial\left(a_j\circ\varphi^{-1}\right)}{\partial x^j}\mathrm{d}x^0\cdots\mathrm{d}x^m\\&=\sum_{j=1}^{m}\int_{\substack{|x^i|\leqslant K\\ i\neq 0,j\\ x^0\leqslant 0}}\left(\int_{-K}^{K}\frac{\partial\left(a_j\circ\varphi^{-1}\right)}{\partial x^j}\mathrm{d}x^j\right)\mathrm{d}x^1\cdots\widehat{\mathrm{d}x^j}\cdots\mathrm{d}x^m\\&\quad+\int_{\substack{|x^i|\leqslant K\\ i>0}}\left(\int_{-K}^{0}\frac{\partial\left(a_0\circ\varphi^{-1}\right)}{\partial x^0}\mathrm{d}x^0\right)\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^m=0.\end{aligned}$$

丙 $U\cap\partial M\neq\varnothing$. 此时 (U,φ) 是 M 的、与定向相符的坐标卡，并且

$$U\cap\partial M=\left\{p\in U\mid\left(\varphi(p)\right)^0=0\right\}. \tag{5.8-6}$$

如在情形乙所述，可取充分大的正实数 K 使得 $\varphi(U)\subset\mathbb{R}^{m+1}_-\cap C$，其中 C 是如式(5.8-5)给出的方体. 由于 $\mathrm{supp}\left(a_j\circ\varphi^{-1}\right)\subset\varphi(U)$，而 $\varphi(U)\backslash\mathrm{supp}\left(a_j\circ\varphi^{-1}\right)$

是开集，故每一个函数 $a_j\circ\varphi^{-1}$ 可以光滑地延拓到整个 $\mathbb{R}_-^{m+1}\cap C$，使得它在 $\varphi(U)$ 外的值为零．特别是，扩充后的函数 $a_j\circ\varphi^{-1}$ 在 $\mathbb{R}_-^{m+1}\cap C$ 的边界上除了 $\partial\mathbb{R}_-^{m+1}\cap C$ 以外的值皆为零．这样，我们有

$$\begin{aligned}\int_M \mathrm{d}\omega &= \int_{\varphi(U)}\left(\sum_{j=0}^m \frac{\partial\left(a_j\circ\varphi^{-1}\right)}{\partial x^j}\right)\mathrm{d}x^0\cdots\mathrm{d}x^m\\ &=\sum_{j=0}^m\int_{\mathbb{R}_-^{m+1}\cap C}\frac{\partial\left(a_j\circ\varphi^{-1}\right)}{\partial x^j}\mathrm{d}x^0\cdots\mathrm{d}x^m\\ &=\sum_{j=1}^m\int_{\substack{|x^i|\leqslant K\\ i\neq 0,j\\ x^0\leqslant 0}}\left(\int_{-K}^K\frac{\partial\left(a_j\circ\varphi^{-1}\right)}{\partial x^j}\mathrm{d}x^j\right)\mathrm{d}x^1\cdots\widehat{\mathrm{d}x^j}\cdots\mathrm{d}x^m\\ &\quad+\int_{\substack{|x^i|\leqslant K\\ 1\leqslant i\leqslant m}}\left(\int_{-K}^0\frac{\partial\left(a_0\circ\varphi^{-1}\right)}{\partial x^0}\mathrm{d}x^0\right)\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^m\\ &=\int_{\substack{|x^i|\leqslant K\\ 1\leqslant i\leqslant m}}a_0\circ\varphi^{-1}\left(0,x^1,\cdots,x^m\right)\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^m.\end{aligned}$$

对于边界流形 ∂M 来说，式(5.8-6)表明 $U\cap\partial M$ 是 ∂M 的坐标域，它的诱导定向见 §5.5.2末尾．因为 $\operatorname{supp}\left(\imath^*\omega|_{\partial M}\right)\subset U\cap\partial M$，所以

$$\begin{aligned}\int_{\partial M}\imath^*\omega &= \int_{U\cap\partial M}\imath^*\omega=\int_{U\cap\partial M}\sum_{j=0}^m(-)^j a_j\mathrm{d}x^0\wedge\cdots\wedge\widehat{\mathrm{d}x^j}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^m\\ &\xlongequal[\text{的诱导定向}]{\text{使用}U\cap\partial M}\int_{U\cap\partial M}(-)^0a_0\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^m\\ &=\int_{\varphi(U)\cap\partial\mathbb{R}_-^{m+1}}\left(a_0\circ\varphi^{-1}\right)\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^m\\ &=\int_{\partial\mathbb{R}_-^{m+1}\cap C}\left(a_0\circ\varphi^{-1}\right)\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^m\\ &=\int_{\substack{|x^i|\leqslant K\\ 1\leqslant i\leqslant m}}a_0\circ\varphi^{-1}\left(0,x^1,\cdots,x^m\right)\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^m.\end{aligned}$$

故有 $\int_M\mathrm{d}\omega=\int_{\partial M}\imath^*\omega$． ■

例 5.36 设 M 是 $\mathbb{R}^2$ 上有界开集的闭包，其边界是 $C^r(r>0)$ 简单闭曲线．$\omega_b=f(\mathrm{d}x)_b+g(\mathrm{d}y)_b$ 是 M 上的 1 型式场；其外微分是 $\mathrm{d}_a\omega_b=(\frac{\partial g}{\partial x}-\frac{\partial f}{\partial y})(\mathrm{d}x)_a\wedge(\mathrm{d}y)_b$，由 Stokes–Cartan 定理(5.8-1)可得

$$\int_M\mathrm{d}_a\omega_b=\iint_M\left(\frac{\partial g}{\partial x}-\frac{\partial f}{\partial y}\right)(\mathrm{d}x)_a\wedge(\mathrm{d}y)_b=\int_{\partial M}\left(f\mathrm{d}x+g\mathrm{d}y\right).\tag{5.8-7}$$

这是经典的 Green 公式. ■

例 5.37 设 M 是 $\mathbb{R}^3$ 上有界开子集的闭包，其边界是 $C^r(r>0)$ 简单闭曲面 S. ω_{ab} 是 M 上的二次型式场，其表达式

$$\omega_{ab} = P(\mathrm{d}y)_a \wedge (\mathrm{d}z)_b + Q(\mathrm{d}z)_a \wedge (\mathrm{d}x)_b + R(\mathrm{d}x)_a \wedge (\mathrm{d}y)_b. \tag{5.8-8}$$

$$\mathrm{d}_c\omega_{ab} = \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)(\mathrm{d}x)_c \wedge (\mathrm{d}y)_a \wedge (\mathrm{d}z)_b. \tag{5.8-9}$$

上面同时给出了 ω_{ab} 的外微分表达式. 由 Stokes–Cartan 定理(5.8-1)可得

$$\iiint_M \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)(\mathrm{d}x)_c \wedge (\mathrm{d}y)_a \wedge (\mathrm{d}z)_b = \oiint_S (P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y).$$

这是经典的高斯散度公式. ■

例 5.38 设 M 是 $\mathbb{R}^3$ 中一块有向曲面，其边界 ∂M 是光滑简单闭曲线，具有从 M 诱导的定向（见 §5.5.2末尾）. P、Q、R 是包含 M 在内的一个区域上的光滑函数，命 $\omega_b = P(\mathrm{d}x)_b + Q(\mathrm{d}y)_b + R(\mathrm{d}z)_b$. 对此式取外微分，有

$$\begin{aligned}\mathrm{d}_a\omega_b = &\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)(\mathrm{d}y)_a \wedge (\mathrm{d}z)_b + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)(\mathrm{d}z)_a \wedge (\mathrm{d}x)_b \\ &+ \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)(\mathrm{d}x)_a \wedge (\mathrm{d}y)_b.\end{aligned}$$

从 Stokes–Cartan 定理可以得到

$$\begin{aligned}\int_{\partial M} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = &\iint_M \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x \\ &+ \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

上式正好是经典的 Stokes 公式. ■

练习 5-1 Stokes–Cartan 公式(5.8-1)等号右端的符号与 ∂M 边界的选择以及诱导定向密切相关. **(1)** 如果在式(5.5-2)中选择 $\{x^0 \geqslant 0\}$，请查验式(5.8-1)右端应该是正号、还是负号？**(2)** 如果在式(5.5-2)中选择 $\{x^m \geqslant 0\}$（或 $\{x^m \leqslant 0\}$）为边界，符号该如何确定？**(3)** 更改诱导定向，等号右端符号如何变化？（可参考[70]§3.4、[80]§5.2、[59]§22.6等）

小结

本章主要参考了[70]、[71]相应章节.

积分的定义(5.7-9)是不涉及度规的，故它可用于正定以及不定度规场.

第六章　仿射联络与曲率

联络是微分流形上非常重要的几何概念，起源于二维曲面几何上的平行移动．现在联络概念已推广到纤维丛上，而本章只讨论切丛上的联络，其实质是定义在切矢量场（切丛的截面）上的一种方向导数；并由此产生一种新的微分法则，即所谓的“协变微分”（或共变微分）．有了仿射联络，便可定义黎曼曲率张量，它是微分几何中的核心概念．我们还讨论了一般标架场上的曲率型式．

6.1　仿射联络

定义 6.1 设 M 是一个 m 维光滑流形，其上的 $\nabla_a : \mathfrak{X}(M)\times\mathfrak{X}(M)\to\mathfrak{X}(M)$（或用 D_a）是一个映射；下面式子中 $X^a, Y^a, Z^a\in\mathfrak{X}(M)$，$f\in C^\infty(M)$，$\lambda\in\mathbb{R}$．记 $X^a\nabla_a\equiv\nabla_X$，$\nabla_b(Y^a, X^b)\equiv\nabla_X Y^a$．若 ∇_a 满足如下条件：

(1) $\mathbb{R}$-线性：$\nabla_X(Y^a+\lambda\cdot Z^a)\overset{def}{=}\nabla_X Y^a+\nabla_X(\lambda\cdot Z^a)\equiv\nabla_X Y^a+\lambda\cdot\nabla_X Z^a$；

(2) 加法：$(f\cdot X^b+Y^b)\nabla_b Z^a\equiv\nabla_{f\cdot X+Y}Z^a\overset{def}{=}\nabla_{f\cdot X}Z^a+\nabla_Y Z^a$；

(3) $\nabla_X(f\cdot Y^a)\overset{def}{=}(\nabla_X f)Y^a+f\cdot\nabla_X Y^a\equiv X(f)Y^a+f\cdot\nabla_X Y^a$．

则称 ∇_a（或 D_a）是光滑流形 M 上的一个**仿射联络**，或**协变微分**；称 ∇_X 为**协变导数**．仿射联络专指切丛上的联络．定义了仿射联络的光滑流形 (M,∇_a) 被称为**仿射联络空间**．

定义6.1只给出了矢量场上的联络；下面把它拓展成张量场上的联络．

定义 6.2 下面式子中 $X^a\in\mathfrak{X}(M)$，$K\in\mathfrak{T}^r_s(M)$，$L\in\mathfrak{T}^p_q(M)$．若 ∇_a 满足：

(4) ∇_a 将 M 上任意 $\binom{r}{s}$ 型张量场映射为 $\binom{r}{s+1}$ 型张量场．

(5) Leibniz 法则：$\nabla_X(K\otimes L)\overset{def}{=}(\nabla_X K)\otimes L+K\otimes\nabla_X L$；

(6) ∇_X 与缩并运算 $C^\times_\times$ 可交换，即 $C^\times_\times(\nabla_X K^{\cdots}_{\cdots})\overset{def}{=}\nabla_X(C^\times_\times K^{\cdots}_{\cdots})$．

则称 ∇_a 是作用在光滑流形 M 上张量场的联络，仍称之为仿射联络．

注 6.3 仿射联络必然存在且不只一个，请参考定理7.19.

注 6.4 依定义，仿射联络 ∇_X 将 $\binom{r}{s}$ 型张量场映射为一个 $\binom{r}{s}$ 型张量场.

注 6.5 为避免抽象指标不匹配，∇_X 中的 X 不附加抽象指标，即不写成 ∇_{X^a}.

注 6.6 定义6.1中的三个条件是最基本的，定义6.2中的几条是在前三条基础上的附加原则. 其中 Leibniz 律是为了把联络应用到各阶张量而引入的.

我们进一步解释条目 (3)，联络作用在标量函数上，有

$$X^a\nabla_a f = X(f) = X^i\frac{\partial f}{\partial x^i} = X^i\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a(\mathrm{d}x^j)_a\frac{\partial f}{\partial x^j} = X^a(\mathrm{d}f)_a$$

$$\Rightarrow \quad \nabla_a f = (\mathrm{d}f)_a. \tag{6.1-1}$$

由此可知不同的联络 ∇_a、D_a 作用在标量场上皆相等，即 $\nabla_a f = (\mathrm{d}f)_a = \mathrm{D}_a f$. 也就是说：任何推广后的“导数”算符都必须能退化到普通微积分中的导数.

6.1.1 联络系数

为讨论联络系数，先要叙述一个命题，一般称之为**局部性定理**.

命题 6.7 设有仿射联络空间 (M,∇_a)，则仿射联络 ∇_a 具有如下局部性质：设 $X_1,X_2,Y_1,Y_2\in\mathfrak{X}(M)$，则如果存在 M 的开集 U 使得 $X_1|_U = X_2|_U$, $Y_1|_U = Y_2|_U$，那么必然有 $(\nabla_{X_1}Y_1)|_U = (\nabla_{X_2}Y_2)|_U$.

证明 . 很明显只要证明 $\nabla_{X_1}Y_1|_U = \nabla_{X_1}Y_2|_U$ 及 $\nabla_{X_1}Y_1|_U = \nabla_{X_2}Y_1|_U$ 便能证明命题了；而且两者证明非常相似，只需证明其一即可.

因流形 M 有局部紧致性，所以 $\forall p\in U$ 都存在开子集 V 和紧致集 $\overline{V}$ 使得 $\forall p\in V\subset\overline{V}\subset U$. 依命题4.24，存在 C^∞ 函数 $h:M\to\mathbb{R}$ 使得 $0\leqslant h\leqslant 1$，且 $h|_V = 1$，$h|_{M-U} = 0$；因此有 $h\cdot(Y_1-Y_2)\equiv 0$ 在整个流形 M 上成立；由定义6.1中 Leibniz 律可得联络 ∇_a 作用在此式的结果为

$$0 = X_1^a\nabla_a\big(h\cdot(Y_1-Y_2)\big) = (\nabla_{X_1}h)\cdot(Y_1-Y_2) + h\cdot\nabla_{X_1}(Y_1-Y_2).$$

将此式限制在 $p\in V$ 上，便可得到（注 $h|_V = 1$，$Y_1|_V = Y_2|_V$）

$$0 = \nabla_{X_1}(Y_1-Y_2)|_p \quad\Rightarrow\quad (\nabla_{X_1}Y_1)(p) = (\nabla_{X_1}Y_2)(p).$$

因点 p 的任意性，可得 $\nabla_{X_1}Y_1|_U = \nabla_{X_1}Y_2|_U$，进而可证明命题. ■

关于局部性定理的理解，请先参考切矢量场的评注4.56．读者需要注意，定义6.1是针对整体流形 M 而言；一般说来不能用一个坐标域覆盖住 M，目前我们不知道把定义在整个流形 M 上的仿射联络 ∇_a 作用在局部坐标系上具体会是什么样子．*局部性定理*说：只要 $X_1|_U = X_2|_U$, $Y_1|_U = Y_2|_U$，那么必然有 $(\nabla_{X_1}Y_1)|_U = (\nabla_{X_2}Y_2)|_U$．换句话说仿射联络的计算只需要知道切矢量场的局部性状即可，无需知道 p 点开邻域 V 外的性状；这和微积分中的“导数运算”完全一致．这也就说明只需要一个坐标域就能解决仿射联络的局部表示，无需多个坐标域结合使用，这与积分不同；流形上的积分（见 §5.7）需要用到单位分解定理来处理多个坐标域的情形．现在假设 $(U;x^i)$ 是 M 的一个局部坐标系，根据仿射联络定义可以得到 $(\frac{\partial}{\partial x^i})^b\nabla_b(\frac{\partial}{\partial x^j})^a \in \mathfrak{X}(U)$，故可定义

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a \overset{def}{=} \Gamma^k_{ji}\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right)^a \quad\Leftrightarrow\quad \nabla_c\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a \overset{def}{=} \Gamma^k_{ji}\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right)^a (\mathrm{d}x^i)_c. \tag{6.1-2}$$

其中 $\Gamma^k_{ji} \in C^\infty(U)$ 被称为仿射联络 ∇_a 在自然基底场 $\{(\frac{\partial}{\partial x^i})^a\}$ 下的**联络系数**；需注意它的两个下标不能随意交换，即一般情况下 $\Gamma^k_{ji} \neq \Gamma^k_{ij}$.

在切丛上有

$$\sum_i (\mathrm{d}x^i)_c\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b = \delta^b_c. \tag{6.1-3}$$

关于此式的进一步解释可参见例题6.20．利用上式可以证明式(6.1-2)的等价性；由式(6.1-2)的第一式两边乘以 $(\mathrm{d}x^i)_c$，有

$$\left[(\mathrm{d}x^i)_c\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b\right]\nabla_b\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a = \Gamma^k_{ji}\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right)^a (\mathrm{d}x^i)_c. \tag{6.1-4}$$

再利用式(6.1-3)即可得(6.1-2)的第二式．反向证明留给读者当练习．

设 ∇_a 是 M 上的一个仿射联络，再设 $(U;x^i)$ 和 $(V;y^\alpha)$ 是 M 的两个局部坐标系，并且 $U\cap V \neq \varnothing$；那么依定义(6.1-2)，联络 ∇_a 便有两个联络系数 $\Gamma^k_{ji}(x)$ 和 $\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y)$．在 $U\cap V$ 上显然有

$$\frac{\partial}{\partial x^i} = \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial y^\alpha} \quad\Leftrightarrow\quad \frac{\partial}{\partial y^\alpha} = \frac{\partial x^i}{\partial y^\alpha}\frac{\partial}{\partial x^i}. \tag{6.1-5}$$

因此，

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a = \Gamma^k_{ji}(x)\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right)^a = \Gamma^k_{ji}(x)\frac{\partial y^\rho}{\partial x^k}\left(\frac{\partial}{\partial y^\rho}\right)^a.$$

而上式左端还可以表示为

$$\begin{aligned}\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\left[\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}\left(\frac{\partial}{\partial y^\beta}\right)^a\right]&=\left(\frac{\partial}{\partial y^\beta}\right)^a\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\left[\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}\right]+\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}\nabla_{\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial y^\alpha}}\left[\left(\frac{\partial}{\partial y^\beta}\right)^a\right]\\&=\left(\frac{\partial}{\partial y^\beta}\right)^a\frac{\partial^2 y^\beta}{\partial x^i\partial x^j}+\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y)\left(\frac{\partial}{\partial y^\rho}\right)^a.\end{aligned}$$

结合上两式，有

$$\Gamma^k_{ji}(x)\frac{\partial y^\rho}{\partial x^k}=\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y)+\frac{\partial^2 y^\rho}{\partial x^j\partial x^i}\tag{6.1-6a}$$

$$=\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y)-\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}\frac{\partial y^\rho}{\partial x^k}\frac{\partial^2 x^k}{\partial y^\beta\partial y^\alpha}.\tag{6.1-6b}$$

上式是联络系数的基本关系式．式(6.1-6a)到(6.1-6b)可以这样验证，设坐标 y 是 x 函数，而 x 是 z 函数，求如下导数

$$\begin{aligned}&\frac{\partial^2 y^\rho\left(x\left(z\right)\right)}{\partial z^A\partial z^B}=\frac{\partial}{\partial z^A}\left(\frac{\partial y^\rho\left(x\left(z\right)\right)}{\partial z^B}\right)=\frac{\partial}{\partial z^A}\left(\frac{\partial y^\rho}{\partial x^i}\frac{\partial x^i\left(z\right)}{\partial z^B}\right)\\=&\frac{\partial}{\partial z^A}\left(\frac{\partial y^\rho}{\partial x^i}\right)\frac{\partial x^i\left(z\right)}{\partial z^B}+\frac{\partial y^\rho}{\partial x^i}\frac{\partial^2 x^i\left(z\right)}{\partial z^A\partial z^B}=\frac{\partial^2 y^\rho}{\partial x^i\partial x^j}\frac{\partial x^i\left(z\right)}{\partial z^A}\frac{\partial x^j\left(z\right)}{\partial z^B}+\frac{\partial y^\rho}{\partial x^l}\frac{\partial^2 x^l\left(z\right)}{\partial z^A\partial z^B}.\end{aligned}$$

令 $z\equiv y$，则上式最左端恒为零；有

$$\frac{\partial^2 y^\rho}{\partial x^i\partial x^j}\frac{\partial x^i\left(y\right)}{\partial y^\alpha}\frac{\partial x^j\left(y\right)}{\partial y^\beta}+\frac{\partial y^\rho}{\partial x^l}\frac{\partial^2 x^l\left(y\right)}{\partial y^\alpha\partial y^\beta}=0.\tag{6.1-7}$$

利用上式便可证明(6.1-6)．

从式(6.1-6)可以看到 Γ^k_{ij} 不满足张量分量变换公式(4.4-19)，所以它不是张量场．读者需注意，Γ^k_{ij} 只在流形 M 上才能定义，在线性空间 V 上是无法定义的；因为单个线性空间没有坐标系 $\{x^i\}$ 的概念，也就无法诞生 Γ^k_{ij} 了．

我们人为约定它们在局部坐标 $(U;x^i)$ 的抽象指标表达式为

$$\Gamma^c_{ab}=\Gamma^k_{ij}(\mathrm{d}x^i)_a(\mathrm{d}x^j)_b\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right)^c;\quad\Gamma^k_{ij}=\Gamma^c_{ab}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^b(\mathrm{d}x^k)_c.\tag{6.1-8}$$

再次强调，虽然有抽象指标记号，但 Γ^c_{ab} 不是张量场．

上面从联络得到了联络系数．反之，在 m 维光滑流形 M 的每个局部开集 $(U;x^i)$ 中给定 m^3 个光滑函数 $\Gamma^k_{ji}\in C^\infty(U)$，且在坐标变换时这些系数满足式(6.1-6)；那么在 M 上存在唯一的仿射联络与之相对应．证明如下；设流形

M 有开子集 $(U;x^i)$ 和 $(V;y^\alpha)$，并且 $U\cap V\neq\varnothing$；则 $\forall v^b\in\mathfrak{X}(U\cap V)$，可设 $v^b|_{U\cap V}=v^i(\frac{\partial}{\partial x^i})^b=v^\alpha(\frac{\partial}{\partial y^\alpha})^b$；令

$$\nabla_a v^b\big|_U \overset{def}{=} \left(\frac{\partial v^i}{\partial x^j}+v^k\Gamma^i_{kj}(x)\right)\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b(\mathrm{d}x^j)_a, \tag{6.1-9}$$

下面证明式(6.1-9)与局部坐标系选取无关，即在坐标变化下上式的形式协变：

$$\begin{aligned}\left(\nabla_a v^b\big|_U\right)\big|_{U\cap V}&=\left(\frac{\partial v^i}{\partial x^j}+v^k\Gamma^i_{kj}(x)\right)\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b(\mathrm{d}x^j)_a\\&=\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\left(v^\alpha\frac{\partial x^i}{\partial y^\alpha}\right)+v^\mu\frac{\partial x^k}{\partial y^\mu}\Gamma^i_{kj}(x)\right)\frac{\partial y^\rho}{\partial x^i}\left(\frac{\partial}{\partial y^\rho}\right)^b\frac{\partial x^j}{\partial y^\beta}(\mathrm{d}y^\beta)_a\\&\overset{\substack{6.1-6a\\6.1-7}}{=\!=\!=}\left(\frac{\partial v^\rho}{\partial y^\nu}+v^\mu\Gamma^\rho_{\mu\nu}(y)\right)\left(\frac{\partial}{\partial y^\rho}\right)^b(\mathrm{d}y^\nu)_a=\left(\nabla_a v^b\big|_V\right)\big|_{U\cap V}.\end{aligned}$$

这说明定义式(6.1-9)是大范围（整个流形 M）适用的. 不难验证式(6.1-9)的定义满足切矢量场的联络定义6.1，故它是一个仿射联络.

注 6.8 上面论述说明：当式(6.1-6)满足时，仿射联络与联络系数相互唯一确定.

微分结构（即覆盖整个流形的、相互容许的、极大坐标卡集合）能够自动产生切矢量场的概念，无需其它附加结构；有了切矢量场，便有了它的积分曲线，进而可以定义李导数了，见 §4.11. 仿射联络则不然，首先，它需要微分结构；其次，还需人为给定联络系数；联络系数是一种不同于微分结构的新结构.

6.1.2 张量场协变导数

式(6.1-2)给出了自然坐标基矢的协变导数定义，可从此式导出自然坐标对偶基矢的协变导数计算公式；从计算下式开始.

$$\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b\nabla_b\left[\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a(\mathrm{d}x^k)_a\right]=\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b\nabla_b\left[\delta^k_j\right]=\frac{\partial\delta^k_j}{\partial x^i}=0. \tag{6.1-10}$$

上式左端还可用 Leibniz 律展开，有

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\left[\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a(\mathrm{d}x^k)_a\right]=\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a\left[\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}(\mathrm{d}x^k)_a\right]+\left[\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a\right](\mathrm{d}x^k)_a.$$

综合以上两式，有

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}(\mathrm{d}x^k)_a=-\Gamma^k_{ji}(\mathrm{d}x^j)_a\quad\Leftrightarrow\quad\nabla_b(\mathrm{d}x^k)_a=-\Gamma^k_{ji}(\mathrm{d}x^j)_a(\mathrm{d}x^i)_b. \tag{6.1-11}$$

这是与式(6.1-2)同等重要的一个计算公式.

6.1.2.1 普通偏导数算符

给定 m 维仿射联络空间 (M,∇_a) 的局部坐标系 $(U;x^i)$，下面引入一个常用记号．T^k_{ij} 表示张量 T^c_{ab} 在自然坐标基底下的分量，用逗号“,”表示其在坐标域 $\{x\}$ 上的偏导数，即

$$T^k_{ij,l}\equiv\frac{\partial T^k_{ij}}{\partial x^l}. \tag{6.1-12}$$

我们把偏导数 $\partial_a\equiv \mathrm{d}_a$ 用抽象指标表示为

$$\partial_a\equiv \mathrm{d}_a=(\mathrm{d}x^j)_a\frac{\partial}{\partial x^j}. \tag{6.1-13}$$

微积分中，同一坐标域内两个偏导数次序可交换；这条原则在此处变成（下式中第一条）：在坐标域 $(U;x^i)$ 内偏导数 ∂_a 满足如下规则，

$$\partial_a\left[\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b\right]=0,\quad \partial_a\left[(\mathrm{d}x^i)_b\right]=0;\qquad 1\leqslant i\leqslant m. \tag{6.1-14}$$

上式中第二条可以这样证明：

$$0=\partial_a(\delta^j_i)=\partial_a\left(\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b(\mathrm{d}x^j)_b\right)=(\mathrm{d}x^j)_b\partial_a\left[\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b\right]+\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b\partial_a\left[(\mathrm{d}x^j)_b\right]$$

$$\Rightarrow\quad 0=\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b\partial_a\left[(\mathrm{d}x^j)_b\right]\quad\Rightarrow\quad \partial_a\left[(\mathrm{d}x^j)_b\right]=0.$$

由此可得在局部坐标域 $(U;x^i)$ 内张量场的偏导数为

$$\partial_aT^c_b=\partial_a\left[T^k_j\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right)^c(\mathrm{d}x^j)_b\right]=T^k_{j,i}\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right)^c(\mathrm{d}x^j)_b(\mathrm{d}x^i)_a. \tag{6.1-15}$$

在坐标域 $(U;x^i)$ 内，算符 ∂_a 满足仿射联络6.1的各条性质．联络不能只在一个坐标域内成立，在进行坐标变换时，联络形式必须是协变的（不同坐标系下，数学表达式“长得一样”才行）．再给 M 的另一个局部坐标系 $(V;y^\alpha)$，且 $U\cap V\neq\varnothing$，那么对 V 中自然坐标基矢的偏导数是：

$$\begin{aligned}\partial_a\left[\left(\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right)^b\right]=&\partial_a\left[\frac{\partial x^k}{\partial y^\alpha}\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right)^b\right]=(\mathrm{d}x^j)_a\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right)^b\times\frac{\partial}{\partial x^j}\frac{\partial x^k}{\partial y^\alpha}\\=&(\mathrm{d}x^j)_a\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right)^b\times\frac{\partial\delta^k_j}{\partial y^\alpha}=0.\end{aligned}$$

最后一步用到了常数的偏导数为零这一性质．$\forall v^b \in \mathfrak{X}(U\cap V)$，计算其偏导数

$$\begin{aligned}\partial_a(v^b|_V) =&(\mathrm{d}x^j)_a\frac{\partial}{\partial x^j}\left[v^\alpha\left(\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right)^b\right]=\left(\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right)^b(\mathrm{d}x^j)_a\frac{\partial}{\partial x^j}\left(v^i\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\right)\\ =&\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b(\mathrm{d}x^j)_a\frac{\partial v^i}{\partial x^j}+\left(\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right)^b(\mathrm{d}x^j)_a\times v^i\frac{\partial^2 y^\alpha}{\partial x^j\partial x^i}\\ =&\partial_a(v^b|_U)+\left(\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right)^b(\mathrm{d}x^j)_a\times v^i\frac{\partial^2 y^\alpha}{\partial x^j\partial x^i}.\end{aligned}$$

上面给出了详尽的计算过程．一般说来 $\frac{\partial^2 y^\alpha}{\partial x^j\partial x^i}\neq 0$，所以 $\partial_a v^b$ 在坐标变换时不具有协变属性．因此可以得到结论：∂_a 不是联络．

联络定义6.1隐藏了局部坐标卡，但隐含着：在任意局部坐标卡中，联络必须满足定义中的三条公理．从上面的推导可以看出，算符 ∂_a 只能在某个坐标卡满足三条公理，在与其相邻的不同坐标卡中可能不满足；这也说明 ∂_a 不是联络．

虽然 ∂_a 不是联络，但是在局部坐标 $(U;x^i)$ 上，当作用在标量函数场 f 上时，它们是相同的，即 $\partial_a f=\nabla_a f=\mathrm{d}_a f$．其实，几乎所有“导数”的算符，作用在标量场上时所得结果必须与微积分中结果相同；否则不能称为“导数”．

6.1.2.2 协变导数算符

有了联络系数，逆变、协变矢量场的协变导数分量表示为（计算见后）：

$$\nabla_a X^b=\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b(\mathrm{d}x^j)_a\left(\frac{\partial X^i}{\partial x^j}+X^k\Gamma^i_{kj}\right)\equiv\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b(\mathrm{d}x^j)_a X^i_{\ ;j}. \tag{6.1-16}$$

$$\nabla_a\omega_b=(\mathrm{d}x^j)_a(\mathrm{d}x^i)_b\left(\frac{\partial\omega_i}{\partial x^j}-\omega_k\Gamma^k_{ij}\right)\equiv(\mathrm{d}x^j)_a(\mathrm{d}x^i)_b\omega_{i;j}. \tag{6.1-17}$$

上两式最后的恒等号“$\equiv$”定义了：用分号“;”代表协变导数．即有

$$X^i_{\ ;j}\equiv\frac{\partial X^i}{\partial x^j}+X^k\Gamma^i_{kj}=X^i_{\ ,j}+X^k\Gamma^i_{kj}, \tag{6.1-18}$$

$$\omega_{i;j}\equiv\frac{\partial\omega_i}{\partial x^j}-\omega_k\Gamma^k_{ij}=\omega_{i,j}-\omega_k\Gamma^k_{ij}. \tag{6.1-19}$$

下面给出式(6.1-16)的计算过程：

$$\nabla_a X^b=\nabla_a\left[X^i\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b\right]\overset{6.1(3)}{=\!=\!=}\left[\nabla_a X^i\right]\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b+X^i\nabla_a\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b$$

$$\xlongequal[6.1-2]{6.1-13} \frac{\partial X^i}{\partial x^j}(\mathrm{d}x^j)_a\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b + X^k\Gamma^i_{kj}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b(\mathrm{d}x^j)_a.$$

整理之后便是式(6.1-16). 式(6.1-17)的计算类似，留给读者当练习.

有逆变与协变矢量的协变导数容易推广到高阶张量，下面给出 $\binom{1}{2}$ 型张量的协变导数计算公式（推导过程并不复杂，请读者自行完成）.

$$\nabla_a T^b{}_{cd} = \partial_a T^b{}_{cd} + \Gamma^b_{ea}T^e{}_{cd} - \Gamma^e_{ca}T^b{}_{ed} - \Gamma^e_{da}T^b{}_{ce}. \tag{6.1-20}$$

更高阶张量的协变导数公式，请读者自行写出，需注意系数的正负号.

在式(6.1-9)中，我们已经证明了 $\nabla_a X^b$ 的分量表达式在坐标系变换时具有协变性，再结合 $\nabla_a X^b$ 表达式形式可以断定它是一个 $\binom{1}{1}$ 型张量；与此类似也可证明式(6.1-17)是一个 $\binom{0}{2}$ 型张量；对更高阶张量场（比如(6.1-20)）也可作类似证明. 这些便验证了联络 ∇_a 把 $\binom{r}{s}$ 型张量场映射为 $\binom{r}{s+1}$ 型张量场.

例 6.9 注6.3中说切丛上的联络不止一个，现设切丛 TM 上有两个不同的仿射联络 ∇_a 和 D_a，与它们相对应的联络系数分别是 Γ^c_{ab} 和 $\widetilde{\Gamma}^c_{ab}$. 由评注6.8可知，在满足式(6.1-6)的前提下，联络和联络系数相互唯一确定；所以不同联络是指其对应的联络系数不同. 取流形 M 的局部坐标系 $(U;x)$，直接计算，有

$$(\nabla_a - \mathrm{D}_a)X^b = X^c\left(\Gamma^b_{ca} - \widetilde{\Gamma}^b_{ca}\right) \equiv X^c\Xi^b_{ca}. \tag{6.1-21}$$

虽然联络系数不是张量，但由上式，利用定理4.69易证 Ξ^b_{ca} 是 $\binom{1}{2}$ 型张量场.

比如，三维欧几里得空间上有笛卡尔坐标系 $\{x^i\}$，我们取 $\mathrm{D}_a \equiv \partial_a$，再取 $\Xi^b_{ca} = x_c x_a x^b$. 由定理8.5可知 D_a 是欧几里得空间的 Levi-Civita 联络；而由式(6.1-21)算出的 ∇_a 是不同于 D_a 的一个仿射联络. ■

6.1.3 挠率

定义 6.10 设 (M,∇_a) 是 m 维仿射空间，定义挠率张量 T^a_{bc}：

$$T^a_{bc}X^bY^c \overset{def}{=} \nabla_X Y^a - \nabla_Y X^a - [X,Y]^a, \qquad \forall X^a, Y^a \in \mathfrak{X}(M). \tag{6.1-22}$$

用推论4.70可证明 T^a_{bc} 是一张量场，请读者补齐. 很明显挠率下标是反对称的，在局部坐标系的分量表达式为

$$T^i_{jk} = T^a_{bc}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^b\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right)^c(\mathrm{d}x^i)_a = \Gamma^i_{kj} - \Gamma^i_{jk}. \tag{6.1-23}$$

当 Γ^i_{kj} 下标对称时，挠率恒为零．反之，若 $T^a_{bc}\equiv 0$，则 Γ^i_{kj} 下标对称．

定义 6.11 设 (M,∇_a) 是仿射空间，若挠率 T^a_{bc} 恒为零，则称 ∇_a 为**无挠联络**．

注 6.12 联络有挠时，系数 Γ^i_{jk} 有 m^3 个；无挠时，系数有 $\frac{1}{2}m^2(m+1)$ 个．

给定流形 (M,∇_a) 上标量场 f，有

$$\nabla_a\nabla_b f=\partial_a\nabla_b f-\Gamma^c_{ba}\nabla_c f=\partial_a\partial_b f-\Gamma^c_{ba}\partial_c f. \tag{6.1-24}$$

由此，得

$$\nabla_a\nabla_b f-\nabla_b\nabla_a f=-(\Gamma^c_{ba}-\Gamma^c_{ab})\nabla_c f=-T^c_{ab}\nabla_c f. \tag{6.1-25}$$

上式是协变导数对易子作用在标量场计算公式．此式也可当成挠率的定义式．

6.1.4 无挠联络的存在性

我们可以对仿射联络系数的下标进行对称和反对称分解，有

$$\Gamma^k_{ij}=\frac{1}{2}\left(\Gamma^k_{ij}+\Gamma^k_{ji}\right)+\frac{1}{2}\left(\Gamma^k_{ij}-\Gamma^k_{ji}\right)\overset{def}{=}\overset{s}{\Gamma}{}^k_{ij}+\overset{a}{\Gamma}{}^k_{ij}. \tag{6.1-26}$$

其中 $\overset{s}{\Gamma}{}^k_{ij}$ 是对称部分，$\overset{a}{\Gamma}{}^k_{ij}$ 是反对称部分．

当 Γ^k_{ij} 的反对称部分 $\overset{a}{\Gamma}{}^k_{ij}$ 为零时，联络无挠，这是平庸情形．

若 Γ^k_{ij} 是有挠的，则反对称部分 $\overset{a}{\Gamma}{}^k_{ij}$ 肯定非零；无论 Γ^k_{ij} 有挠与否，对称部分 $\overset{s}{\Gamma}{}^k_{ij}$ 肯定无挠的．只剩下最关键的一步，证明 $\overset{s}{\Gamma}{}^k_{ij}$ 是仿射联络，见下．根据注6.8，我们只需验证 $\overset{s}{\Gamma}{}^k_{ij}$ 满足式(6.1-6)即可．

$$\begin{aligned}0=&\Gamma^k_{ji}(x)\frac{\partial y^\rho}{\partial x^k}-\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y)-2\frac{\partial^2 y^\rho}{\partial x^j\partial x^i}+\Gamma^k_{ij}(x)\frac{\partial y^\rho}{\partial x^k}-\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}\Gamma^\rho_{\alpha\beta}(y)\\=&2\overset{s}{\Gamma}{}^k_{ji}\frac{\partial y^\rho}{\partial x^k}-2\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\overset{s}{\Gamma}{}^\rho_{\beta\alpha}(y)-2\frac{\partial^2 y^\rho}{\partial x^j\partial x^i}.\end{aligned}$$

由上式最后一步可见：$\overset{s}{\Gamma}{}^k_{ij}$ 满足式(6.1-6)，故它是无挠的仿射联络．

6.1.5 无挠联络的优点

给定仿射空间 (M,∇_a)，其联络无挠，则其联络系数的下指标是对称的，会给表达式带来诸多好处．本节中，$f\in C^\infty(M)$，$X^a,Y^a\in\mathfrak{X}(M)$，$\omega\in A^r(M)$，$T_{ab}\in\mathfrak{T}^0_2(M)$．所有证明留给读者当练习．

反对称化操作可令（无挠）协变导数退化为偏导数

$$\nabla_{[b}T_{cd]} = \partial_{[b}T_{cd]}, \tag{6.1-27}$$

$$\nabla_{[a}\partial_{b]}f = \partial_{[a}\partial_{b]}f = 0, \qquad \nabla_{[a}\nabla_{b}T_{cd]} = \partial_{[a}\partial_{b}T_{cd]} = 0. \tag{6.1-28}$$

需注意，上式必须是协变张量，不能有逆变部分．张量的协变指标可以是任意多个，协变导数也可以是任意多个．

下式中第一个等号是对易子的定义；联络无挠时第二个等号才成立．

$$[X,Y]^a = X^k\frac{\partial Y^j}{\partial x^k}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a - Y^k\frac{\partial X^j}{\partial x^k}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a = \nabla_X Y^a - \nabla_Y X^a. \tag{6.1-29}$$

6.1.5.1 李导数

李导数定义并不需要联络，但当联络无挠时表示更简洁．矢量场的李导数可由式(6.1-29)来表示（见(4.11-11)）．与式(4.11-12)对应的余切矢量场表达式为：

$$\pounds_X\omega_b = X^c\nabla_c\omega_b + \omega_c\nabla_b X^c = X^c\partial_c\omega_b + \omega_c\partial_b X^c. \tag{6.1-30}$$

$$\pounds_X T^a{}_{bc} = X^e\nabla_e T^a{}_{bc} - T^e{}_{bc}\nabla_e X^a + T^a{}_{ec}\nabla_b X^e + T^a{}_{be}\nabla_c X^e, \tag{6.1-31}$$

$$= X^e\partial_e T^a{}_{bc} - T^e{}_{bc}\partial_e X^a + T^a{}_{ec}\partial_b X^e + T^a{}_{be}\partial_c X^e. \tag{6.1-32}$$

上面第二式为 $\binom{1}{2}$ 型张量场的李导数；易将这个表达式推广到高阶张量．

下面几式通常称为 Henri Cartan（Élie Cartan 儿子）公式．

$$\pounds_X(\omega_{ba_2\cdots a_r}Y^b) - (\pounds_X\omega_{ba_2\cdots a_r})Y^b = \omega_{ba_2\cdots a_r}[X,Y]^b. \tag{6.1-33}$$

$$\pounds_X\omega_{a_1\cdots a_r} = \mathrm{d}_{a_1}(\omega_{ba_2\cdots a_r}X^b) + (\mathrm{d}\omega)_{ba_1\cdots a_r}X^b. \tag{6.1-34}$$

$$\pounds_X(\mathrm{d}\omega)_{ba_1\cdots a_r} = \mathrm{d}_b\pounds_X\omega_{a_1\cdots a_r}. \tag{6.1-35}$$

$$\pounds_X\circ\pounds_Y - \pounds_Y\circ\pounds_X = \pounds_{[X,Y]}. \quad \text{此式可作用在任意张量场上} \tag{6.1-36}$$

$$\pounds_X(\omega\wedge\psi) = (\pounds_X\omega)\wedge\psi + \omega\wedge\pounds_X\psi, \quad \forall\omega\in A^r(M),\ \psi\in A^s(M). \tag{6.1-37}$$

6.1.5.2 外微分

联络无挠时，式(5.2-3)与下式等价，定义(5.2-3)是最基本的；下式更好用．

$$(\mathrm{d}\omega)_{ba_1\cdots a_r} = (r+1)\nabla_{[b}\omega_{a_1\cdots a_r]}. \tag{6.1-38}$$

6.1.5.3 无挠联络系数为零的局部坐标系

当联络无挠时，$\forall p\in M$ 存在局部坐标系使得 p 点联络系数为零．设流形有局部坐标 $(U;x^i)$，联络系数 Γ'^k_{ij} 不为零，令

$$y^k=x^k+\frac{1}{2}\Gamma'^k_{ij}(p)\big(x^i-x^i(p)\big)\big(x^j-x^j(p)\big),\tag{6.1-39}$$

那么有

$$\left.\frac{\partial y^k}{\partial x^l}\right|_p=\delta^k_l,\qquad \left.\frac{\partial^2 y^k}{\partial x^l\partial x^n}\right|_p=\frac{1}{2}\Gamma'^k_{ln}(p)+\frac{1}{2}\Gamma'^k_{nl}(p)=\Gamma'^k_{ln}(p).\tag{6.1-40}$$

如果联络有挠，上面第二式是不成立的．显然，矩阵 $\frac{\partial y^k}{\partial x^l}$ 在 p 点附近的小邻域内是非退化的，式(6.1-39)给出 p 点的一个局部坐标变换．由(6.1-6a)得到在坐标系 $\{y\}$ 下的新联络系数 $\Gamma^k_{ji}(p)=0$.

6.1.6 平行移动

仿射联络的几何意义便是平行移动；平行移动在二维曲面论中有较为清晰的图像（见 §1.6），高维空间只有公式，没有图像．虽然图像不是十分清晰，我们仍然给出相应描述；先从定义开始．

定义 6.13 给定 m 维仿射空间 (M,∇_a)，$\gamma:[r,s]\to M$ 是 M 中的一条光滑曲线，$T^b=(\frac{\partial}{\partial t})^b|_{\gamma(t)}$ 是 $\gamma(t)$ 的切线切矢量．$\forall Y^a\in\mathfrak{X}(\gamma(t))$，若沿曲线 $\gamma(t)$ 上有

$$T^b\nabla_b Y^a\equiv\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}Y^a=0,\tag{6.1-41}$$

那么，称切矢场 Y^a 沿曲线 $\gamma(t)$ 是**平行**的．

可以认为 $Y^a(t)$ 只在 $\gamma(t)$ 上才有意义，在此条曲线之外（即 $M-\gamma(t)$ 上）没有定义．需注意，$\nabla_bY^a(t)$ 本身没有定义，因为这个导数需要 Y^a 在 $M-\gamma(t)$ 上值；但 $T^b\nabla_bY^a(t)$ 是有良定义的，它只需要知道 $\gamma(t)$ 上的 Y^a 值即可．还有一点需要澄清，真正切于曲线 $\gamma(t)$ 的矢量只有两个方向，即 $\pm(\frac{\partial}{\partial t})^a$；而 $Y^a(t)$ 是切于流形 M 的，它可能切于 $\gamma(t)$，也可能不切于 $\gamma(t)$，但上面定义中的 $Y^a(t)$ 都是在曲线 $\gamma(t)$ 上取值．

继续沿用定义6.13中的符号，设曲线 $\gamma(t)$ 的局部坐标参数表达式为 $\{x^i(t)\}$，矢量场 Y^a 在此曲线上的分量表达式为 $Y^a=Y^i(t)(\frac{\partial}{\partial x^i})^a$；由式(6.1-16)有

$$T^b\nabla_bY^a=\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a\left(\frac{\mathrm{d}Y^i(t)}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}x^j(t)}{\mathrm{d}t}Y^k(t)\Gamma^i_{kj}(t)\right).\tag{6.1-42}$$

测地线定义为（我们会在第九章专门讨论这个问题，在此就不展开了）：

定义 6.14 如果仿射空间 (M,∇_a) 中曲线 $\gamma(t)$ 沿自身切线平行，即 $T^b\nabla_b T^a=0$；则称其为仿射空间 M 的**测地线**．参数 t 为该曲线的**仿射参数**．

$Y^a(t)$ 是沿光滑曲线 $\gamma(t)$ 平行的切矢量场，由式(6.1-42)可知它满足

$$\frac{\mathrm{d}Y^i(t)}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}x^j(t)}{\mathrm{d}t}Y^k(t)\Gamma^i_{kj}(t)=0;\qquad Y^i(0)=Y^i_0,\quad 1\leqslant i\leqslant m. \tag{6.1-43}$$

很明显，一阶线性齐次常微分方程组(6.1-43)的解构成一个矢量空间，并且它的每一个解是由 T_pM 中的元素 Y^a_0 唯一确定的（常微分方程组解存在唯一性定理）．因此，沿光滑曲线 γ 的平行矢量场的集合构成一个与 T_pM 线性同构的矢量空间．特别地，对于任意取定的 $t\in[0,c]$，沿 γ 的平行矢量场给出了从 T_pM 到 $T_{\gamma(t)}M$ 的线性同构 $P^t_0:T_pM\to T_{\gamma(t)}M$，称为沿曲线 γ 从 $t=0$ 到 t 的**平行移动**．这样，由切矢量 $Y^a_0\in T_pM$ 确定的沿曲线 γ 平行的矢量场 $Y^a(t)$ 可以表示为：

$$Y^a(t)=P^t_0\left(Y^a_0\right),\qquad 0\leqslant t\leqslant c. \tag{6.1-44}$$

总之，在光滑流形上只要指定了联络，就可以建立平行移动的概念．下面的定理说明，切矢量场的协变导数（联络）也可以借助于平行移动来表示．

定理 6.15 设 (M,∇_a) 是一个 m 维仿射联络空间，$\gamma:[0,c]\to M$ 是 M 中任意一条光滑曲线．则对于任意的 $Y^a\in\mathfrak{X}(M)$，有（其中 $T^b=(\frac{\partial}{\partial t})^b|_{\gamma(t)}$）

$$T^b\nabla_b Y^a=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{P^t_{t+\Delta t}\big(Y^a\circ\gamma(t+\Delta t)\big)-Y^a\circ\gamma(t)}{\Delta t}. \tag{6.1-45}$$

证明 ．记 $p=\gamma(0)$．在 T_pM 中取定一个基底 $\{(e_i)^a\}$，且设 $\big(e_i(t)\big)^a=P^t_0\big((e_i)^a\big)$，则 $\big(e_i(0)\big)^a=(e_i)^a$，而且 $\big(e_i(t)\big)^a$ 是沿 γ 的平行矢量场，即有 $T^b\nabla_b\big(e_i(t)\big)^a\equiv 0$．由于 $P^t_0:T_pM\to T_{\gamma(t)}M$ 是线性同构，故 $\{\big(e_i(t)\big)^a\}$ 是 $T_{\gamma(t)}M$ 的基底．于是，Y^a 在 γ 上的限制可以表示为 $Y^a\big(\gamma(t)\big)=\sum_{i=1}^m Y^i(t)\big(e_i(t)\big)^a$，其中 $Y^i(t)$ 是 t 的光滑函数．故有

$$\nabla_T Y^a\big(\gamma(t)\big)=\nabla_T\big(Y^i(t)\big)\cdot\big(e_i(t)\big)^a+Y^i(t)\cdot\nabla_T\big(e_i(t)\big)^a=\frac{\mathrm{d}Y^i(t)}{\mathrm{d}t}\big(e_i(t)\big)^a.$$

在另一方面，因为 $P^t_{t+\Delta t}:T_{\gamma(t+\Delta t)}M\to T_{\gamma(t)}M$ 是线性同构，故

$$P^t_{t+\Delta t}\Big(Y^a\big(\gamma(t+\Delta t)\big)\Big)=P^t_{t+\Delta t}\left(Y^i(t+\Delta t)\big(e_i(t+\Delta t)\big)^a\right)=Y^i(t+\Delta t)\big(e_i(t)\big)^a.$$

从而

$$\frac{P^t_{t+\Delta t}\big(Y^a\circ\gamma(t+\Delta t)\big)-Y^a\circ\gamma(t)}{\Delta t}=\frac{Y^i(t+\Delta t)-Y^i(t)}{\Delta t}\big(e_i(t)\big)^a.$$

令上式中的 $\Delta t\to 0$，则得

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{P^t_{t+\Delta t}\big(Y^a\circ\gamma(t+\Delta t)\big)-Y^a\circ\gamma(t)}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}Y^i(t)}{\mathrm{d}t}\big(e_i(t)\big)^a=\nabla_T Y^a\big(\gamma(t)\big).$$

证毕. ■

式(6.1-45)指出：$\nabla_T Y^a$ 是切矢场 Y^a 在邻近两点 $\gamma(t)$、$\gamma(t+\Delta t)$ 的值之差与 Δt 的商的极限；只不过 $Y^a\big(\gamma(t+\Delta t)\big)$ 是 M 在 $\gamma(t+\Delta t)$ 处的切矢，必须借助于线性同构 $P^t_{t+\Delta t}$ 把它变为在 $\gamma(t)$ 处的切矢之后，才能与 $Y^a\big(\gamma(t)\big)$ 相减. 这也是联络的一个表观解释，两点 $\gamma(t)$、$\gamma(t+\Delta t)$ 的值原来是没有关联，无法作差；现在利用曲线 γ 上的平行移动将这两点联系起来，它们可以作差了；需要强调的是，平行移动表示下的联络是曲线依赖的，体现在联络系数 $\Gamma^i_{jk}\big(\gamma(t)\big)$ 上.

定理6.15初步说明了：由平行移动出发可以给仿射联络一个定义. 文献[89]第一章的附录给出了一个更严谨的证明. 这说明：仿射联络和平行移动是同一事物的两种不同表述.

练习 6-1 证明式(6.1-17).

练习 6-2 证明式(6.1-20)，并给出上下标分别为 p、q 个的一般性公式.

练习 6-3 证明 §6.1.5中所有公式；有数个公式证明很繁琐.

6.2 黎曼曲率张量

现代几何学中的黎曼曲率张量似乎是一个神秘的东西. 部分地是因为其名称显示它能够对难以捉摸的“空间弯曲”性质给出一个精确度量；部分地是因为尽管看上去它很简单，但它似乎控制了黎曼几何学的每一方面；又部分地因为虽然从过去到现在，学者们已花费极大努力，但距离完全掌握它还相距甚远. 笔者学识所限，无法深入展示黎曼曲率的种种精妙，我们只给出它的定义并叙述它的一些简单性质. 若读者有兴趣，可参阅更专业书籍.

定义 6.16 设 (M,∇_a) 是 m 维仿射空间，定义张量 $R^d{}_{cab}$ 如下：

$$R^d{}_{cab}X^aY^bZ^c\overset{def}{=}\nabla_X\nabla_Y Z^d-\nabla_Y\nabla_X Z^d-\nabla_{[X,Y]}Z^d. \tag{6.2-1}$$

其中 $\forall X^a, Y^a, Z^a \in \mathfrak{X}(M)$. 由上式定义的 $\binom{1}{3}$ 型张量场 $R^d{}_{cab}$ 是**黎曼曲率张量**.

注 6.17 我们已经约定 $\binom{1}{3}$ 型黎曼张量上指标降下来后放在第一个位置，以后为了节省角标空间，很多时候将 $R^d{}_{cab}$ 写成 R^d_{cab}. 上指标降下位置没有特别意义，完全是人为规定；不同文献的习惯未必相同，读者需小心.

我们来看一下 $\binom{1}{3}$ 型黎曼张量定义可以怎样变化.

$$\begin{aligned}
R^d{}_{cab}X^aY^bZ^c &= X^a\nabla_a\left(Y^b\nabla_bZ^d\right) - Y^b\nabla_b\left(X^a\nabla_aZ^d\right) - [X,Y]^e\nabla_eZ^d \\
&\overset{(6.1\text{-}22)}{=\!=\!=} X^a\left(\nabla_aY^b\right)\nabla_bZ^d + X^aY^b\nabla_a\nabla_bZ^d - Y^b\left(\nabla_bX^a\right)\nabla_aZ^d \\
&\quad - X^aY^b\nabla_b\nabla_aZ^d + \left[T^e_{bf}X^bY^f - X^b\nabla_bY^e + Y^b\nabla_bX^e\right]\nabla_eZ^d \\
&= X^aY^b\left(\nabla_a\nabla_bZ^d - \nabla_b\nabla_aZ^d\right) + T^e_{ab}X^aY^b\nabla_eZ^d.
\end{aligned}$$

因矢量 X^a, Y^b 的任意性，由上式可得

$$\nabla_a\nabla_bZ^d - \nabla_b\nabla_aZ^d = R^d{}_{cab}Z^c - T^e_{ab}\nabla_eZ^d. \tag{6.2-2}$$

由式(6.2-2)、式(6.1-25)及 Leibniz 律，经计算（留给读者）可以得到

$$\nabla_a\nabla_b\omega_c - \nabla_b\nabla_a\omega_c = -R^e{}_{cab}\omega_e - T^e_{ab}\nabla_e\omega_c, \tag{6.2-3}$$

$$\nabla_a\nabla_bS^d{}_c - \nabla_b\nabla_aS^d{}_c = +R^d{}_{eab}S^e{}_c - R^e{}_{cab}S^d{}_e - T^e_{ab}\nabla_eS^d{}_c. \tag{6.2-4}$$

从式(6.2-4)，不难将协变导数对易子推广到高维张量，需注意系数的正负号；上述双联络对易子公式一般称为 Ricci 恒等式.

由式(6.2-2)易得（注意利用挠率下标反对称性）：

$$R^d_{cab}Z^c = -\left(\nabla_b\nabla_aZ^d - \nabla_a\nabla_bZ^d + T^e_{ba}\nabla_eZ^d\right) = -R^d_{cba}Z^c$$

因 Z^c 的任意性，从而可知黎曼曲率 R^d_{cab} 关于指标 a、b 反对称，即

$$R^d_{cab} = -R^d_{cba}. \qquad \text{注意这个反对称性与挠率无关} \tag{6.2-5}$$

注 6.18 由协变导数对易子公式(6.1-25)、(6.2-2)、(6.2-3)和(6.2-4) 易得：协变导数对易子公式完全由黎曼曲率和挠率确定. 联络无挠时，挠率相关项消失.

注 6.19 已知联络 ∇_a 作用在张量积上遵循 Leibniz 法则，经计算可以确定双联络对易子 $(\nabla_a\nabla_b - \nabla_b\nabla_a)$ 也遵循 Leibniz 法则，即对 M 上任意两个张量场 K, L 有 $(\nabla_a\nabla_b - \nabla_b\nabla_a)(K\otimes L) = [(\nabla_a\nabla_b - \nabla_b\nabla_a)K]\otimes L + K\otimes(\nabla_a\nabla_b - \nabla_b\nabla_a)L$.

我们定义 **Ricci 曲率**以及另外一个曲率；这两个定义无需度量.

$$R_{cb} \overset{def}{=} R^{a}{}_{cab}. \tag{6.2-6}$$

$$R'_{cd} \overset{def}{=} R^{a}{}_{acd}. \tag{6.2-7}$$

显然有 $R'_{cd} = -R'_{dc}$，曲率(6.2-7)几乎无用.

由式(6.2-1)可得黎曼曲率在局部坐标表达式：

$$\begin{aligned}
R^{i}{}_{jln} &= R^{d}{}_{cab}\left(\frac{\partial}{\partial x^l}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial x^n}\right)^b\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^c(\mathrm{d}x^i)_d \\
&= (\mathrm{d}x^i)_d\left[\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^l}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^n}}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^d - \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^n}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^l}}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^d - \nabla_{[\frac{\partial}{\partial x^l},\frac{\partial}{\partial x^n}]}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^d\right] \\
&= (\mathrm{d}x^i)_d\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^l}}\left(\Gamma^k_{jn}\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right)^d\right) - (\mathrm{d}x^i)_d\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^n}}\left(\Gamma^k_{jl}\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right)^d\right) \\
&= \partial_l\Gamma^i_{jn} - \partial_n\Gamma^i_{jl} + \Gamma^k_{jn}\Gamma^i_{kl} - \Gamma^k_{jl}\Gamma^i_{kn}.
\end{aligned} \tag{6.2-8}$$

Ricci 曲率的局部坐标表达式：

$$R_{jn} \equiv R^{k}{}_{jkn} = \partial_k\Gamma^k_{jn} - \partial_n\Gamma^k_{jk} + \Gamma^k_{jn}\Gamma^l_{kl} - \Gamma^k_{jl}\Gamma^l_{kn}. \tag{6.2-9}$$

这两个表达式适用于有挠或无挠联络，需注意 Γ 下标的顺序.

6.2.1 黎曼曲率是张量之证明

从曲率的定义6.16与局部坐标无关，我们用推论4.70来证明它是 $\binom{1}{3}$ 型张量；只需验证它对三个切矢量是 $C^\infty(M)$-线性的即可. $\forall f \in C^\infty(M)$ 有

$$\begin{aligned}
&R^d_{cab}(f\cdot X^a)Y^bZ^c = \nabla_{f\cdot X}\nabla_Y Z^d - \nabla_Y\nabla_{f\cdot X}Z^d - \nabla_{[f\cdot X,Y]}Z^d \\
&\overset{\substack{(4.8\text{-}13)\\ 6.1}}{=\!=\!=} f\cdot\nabla_X\nabla_Y Z^d - \nabla_Y\big(f\cdot\nabla_X Z^d\big) - \nabla_{(f[X,Y]-Y(f)\cdot X)}Z^d \\
&= f\cdot\nabla_X\nabla_Y Z^d - \big(Y(f)\big)\cdot\nabla_X Z^d - f\cdot\nabla_Y\nabla_X Z^d - f\cdot\nabla_{[X,Y]}Z^d + \big(Y(f)\big)\cdot\nabla_X Z^d \\
&= f\cdot R^d_{cab}X^aY^bZ^c.
\end{aligned}$$

接着验证，

$$R^d_{cab}X^a(f\cdot Y^b)Z^c = \nabla_X\nabla_{f\cdot Y}Z^d - \nabla_{f\cdot Y}\nabla_X Z^d - \nabla_{[X,f\cdot Y]}Z^d$$

$$= -\left(R^d_{cba}(f\cdot Y^b)X^aZ^c\right) = -f\cdot\left(R^d_{cba}Y^bX^aZ^c\right) = f\cdot R^d_{cab}X^aY^bZ^c.$$

验证最后一个位置，

$$\begin{aligned}
&R^d_{cab}X^aY^b(f\cdot Z^c) = \nabla_X\nabla_Y(f\cdot Z^d) - \nabla_Y\nabla_X(f\cdot Z^d) - \nabla_{[X,Y]}(f\cdot Z^d)\\
=&f\cdot\nabla_X\nabla_Y Z^d + X(f)\cdot\nabla_Y Z^d + X\left(Y(f)\right)\cdot Z^d + Y(f)\cdot\nabla_X Z^d\\
&- f\cdot\nabla_Y\nabla_X Z^d - Y(f)\cdot\nabla_X Z^d - Y\left(X(f)\right)\cdot Z^d - X(f)\cdot\nabla_Y Z^d\\
&- [X,Y](f)\cdot Z^d - f\cdot\nabla_{[X,Y]}Z^d\\
=&f\cdot R^d_{cab}X^aY^bZ^c.
\end{aligned}$$

它对三个位置均有 $C^\infty(M)$-线性，故它是 $\binom{1}{3}$ 型张量.

鉴于这个张量的重要性，我们从局部坐标的分量语言再次证明它与局部坐标图选取无关，即在坐标变换时按四重线性变换规律变换.

设仿射空间 (M,∇_a) 中有两个相互容许的坐标图 $(U;x^i)$ 和 $(V;y^\alpha)$，且 $U\cap V\neq\varnothing$；那么在 $U\cap V$ 上有式(6.1-6a)成立，我们将利用此式来证明命题. 首先将此式两边求导，得

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial\Gamma^k_{ji}(x)}{\partial x^n}\frac{\partial y^\rho}{\partial x^k} + \Gamma^k_{ji}(x)\frac{\partial^2 y^\rho}{\partial x^k\partial x^n} = \frac{\partial^3 y^\rho}{\partial x^j\partial x^i\partial x^n} + \frac{\partial^2 y^\beta}{\partial x^j\partial x^n}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y)\\
&\quad + \frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}\frac{\partial^2 y^\alpha}{\partial x^i\partial x^n}\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y) + \frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial y^\gamma}{\partial x^n}\frac{\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y)}{\partial y^\gamma}.
\end{aligned}$$

将上式中的指标 i 和 n 互换得到新式子，并用上式减新式得

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{\partial\Gamma^k_{ji}(x)}{\partial x^n} - \frac{\partial\Gamma^k_{jn}(x)}{\partial x^i}\right)\frac{\partial y^\rho}{\partial x^k} + \Gamma^k_{ji}(x)\frac{\partial^2 y^\rho}{\partial x^k\partial x^n} - \Gamma^k_{jn}(x)\frac{\partial^2 y^\rho}{\partial x^k\partial x^i} = \qquad (6.2\text{-}10)\\
&\frac{\partial^2 y^\beta}{\partial x^j\partial x^n}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y) - \frac{\partial^2 y^\beta}{\partial x^j\partial x^i}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^n}\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y) + \frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial y^\gamma}{\partial x^n}\left(\frac{\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y)}{\partial y^\gamma} - \frac{\Gamma^\rho_{\beta\gamma}(y)}{\partial y^\alpha}\right).
\end{aligned}$$

将式(6.2-10)中等号左端的后两项用式(6.1-6a)代换，经运算得

$$\begin{aligned}
&\Gamma^k_{ji}(x)\frac{\partial^2 y^\rho}{\partial x^k\partial x^n} - \Gamma^k_{jn}(x)\frac{\partial^2 y^\rho}{\partial x^k\partial x^i}\\
=&\Gamma^k_{ji}(x)\left(\Gamma^l_{kn}(x)\frac{\partial y^\rho}{\partial x^l} - \frac{\partial y^\beta}{\partial x^k}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^n}\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y)\right) - \Gamma^k_{jn}(x)\left(\Gamma^l_{ki}(x)\frac{\partial y^\rho}{\partial x^l} - \frac{\partial y^\beta}{\partial x^k}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y)\right)\\
=&\frac{\partial y^\rho}{\partial x^l}\left(\Gamma^k_{ji}(x)\Gamma^l_{kn}(x) - \Gamma^k_{jn}(x)\Gamma^l_{ki}(x)\right) - \frac{\partial y^\beta}{\partial x^k}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^n}\Gamma^k_{ji}(x)\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y) + \frac{\partial y^\beta}{\partial x^k}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\Gamma^k_{jn}(x)\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y).
\end{aligned}$$

将式(6.2-10)中等号右端的前两项用式(6.1-6a)代换，经运算得

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial^2 y^\beta}{\partial x^j \partial x^n}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y) - \frac{\partial^2 y^\beta}{\partial x^j \partial x^i}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^n}\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y) = \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y)\times \\
&\left(\Gamma^l_{jn}(x)\frac{\partial y^\beta}{\partial x^l} - \frac{\partial y^\xi}{\partial x^j}\frac{\partial y^\zeta}{\partial x^n}\Gamma^\beta_{\xi\zeta}(y)\right) - \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^n}\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y)\left(\Gamma^l_{ji}(x)\frac{\partial y^\beta}{\partial x^l} - \frac{\partial y^\xi}{\partial x^j}\frac{\partial y^\zeta}{\partial x^i}\Gamma^\beta_{\xi\zeta}(y)\right) \\
=&\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial y^\beta}{\partial x^l}\Gamma^l_{jn}(x)\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y) - \frac{\partial y^\beta}{\partial x^l}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^n}\Gamma^l_{ji}(x)\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y) \\
&+ \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial y^\xi}{\partial x^j}\frac{\partial y^\zeta}{\partial x^n}\left(\Gamma^\rho_{\beta\zeta}(y)\Gamma^\beta_{\xi\alpha}(y) - \Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y)\Gamma^\beta_{\xi\zeta}(y)\right).
\end{aligned}$$

将上两式代入式(6.2-10)得

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{\partial\Gamma^k_{ji}(x)}{\partial x^n} - \frac{\partial\Gamma^k_{jn}(x)}{\partial x^i}\right)\frac{\partial y^\rho}{\partial x^k} + \frac{\partial y^\rho}{\partial x^l}\left(\Gamma^k_{ji}(x)\Gamma^l_{kn}(x) - \Gamma^k_{jn}(x)\Gamma^l_{ki}(x)\right) = \\
&\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial y^\xi}{\partial x^j}\frac{\partial y^\zeta}{\partial x^n}\left(\Gamma^\rho_{\beta\zeta}(y)\Gamma^\beta_{\xi\alpha}(y) - \Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y)\Gamma^\beta_{\xi\zeta}(y)\right) + \frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial y^\gamma}{\partial x^n}\left(\frac{\Gamma^\rho_{\beta\alpha}(y)}{\partial y^\gamma} - \frac{\Gamma^\rho_{\beta\gamma}(y)}{\partial y^\alpha}\right).
\end{aligned}$$

将此式整理后即有（参考式(6.2-8)）

$$\frac{\partial y^\rho}{\partial x^k}\cdot R^k_{jin}(x) = \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial y^\xi}{\partial x^j}\frac{\partial y^\zeta}{\partial x^n}\cdot R^\rho_{\alpha\xi\zeta}(y). \tag{6.2-11}$$

这便证明了黎曼曲率分量在坐标卡变换下具有协变性.

6.2.2 黎曼曲率对称性

本节在无挠联络情形下证明几个黎曼曲率的对称性.

从式(6.2-1)出发，将 X^a, Y^b, Z^c 进行轮换，有

$$\begin{aligned}
&R^d_{cab}X^aY^bZ^c + R^d_{abc}Y^bZ^cX^a + R^d_{bca}Z^cX^aY^b \\
=&\nabla_X\nabla_Y Z^d - \nabla_Y\nabla_X Z^d - \nabla_{[X,Y]}Z^d + \nabla_Y\nabla_Z X^d - \nabla_Z\nabla_Y X^d - \nabla_{[Y,Z]}X^d \\
&+ \nabla_Z\nabla_X Y^d - \nabla_X\nabla_Z Y^d - \nabla_{[Z,X]}Y^d \\
=&\left(\nabla_X(\nabla_Y Z^d - \nabla_Z Y^d) - \nabla_{[Y,Z]}X^d\right) + \left(\nabla_Y(\nabla_Z X^d - \nabla_X Z^d) - \nabla_{[Z,X]}Y^d\right) \\
&+ \left(\nabla_Z(\nabla_X Y^d - \nabla_Y X^d) - \nabla_{[X,Y]}Z^d\right) \\
=&\big[X,[Y,Z]\big]^d + \big[Y,[Z,X]\big]^d + \big[Z,[X,Y]\big]^d = 0.
\end{aligned}$$

上面计算参考了式(6.1-29)以及定理4.58中的 Jacobi 恒等式. 因 X^a, Y^b, Z^c 的任意性，又因上式最后恒为零，可知黎曼曲率张量有如下关系式（**第一 Bianchi 恒等式**或**循环恒等式**）

$$R^d_{cab}+R^d_{abc}+R^d_{bca}=0 \quad \overset{\substack{6.2-5\\3.8-9}}{\Longleftrightarrow} \quad R^d_{[abc]}=0. \tag{6.2-12}$$

我们从(6.2-2)出发，对其再次求导，有

$$\begin{aligned}
&\nabla_c\nabla_a\nabla_b Z^d-\nabla_c\nabla_b\nabla_a Z^d=\nabla_c(R^d_{eab}Z^e)=Z^e\nabla_c R^d_{eab}+R^d_{eab}\nabla_c Z^e.\\
&\nabla_a\nabla_b\nabla_c Z^d-\nabla_a\nabla_c\nabla_b Z^d=Z^e\nabla_a R^d_{ebc}+R^d_{ebc}\nabla_a Z^e.\\
&\nabla_b\nabla_c\nabla_a Z^d-\nabla_b\nabla_a\nabla_c Z^d=Z^e\nabla_b R^d_{eca}+R^d_{eca}\nabla_b Z^e.
\end{aligned}$$

后两式给出了将 a,b,c 轮换后的公式；将上面三个式子相加并重新组合，有

$$\begin{aligned}
&(\nabla_c\nabla_a\nabla_b Z^d-\nabla_a\nabla_c\nabla_b Z^d)+(\nabla_a\nabla_b\nabla_c Z^d-\nabla_b\nabla_a\nabla_c Z^d)+(\nabla_b\nabla_c\nabla_a Z^d-\nabla_c\nabla_b\nabla_a Z^d)\\
&=Z^e\nabla_c R^d_{eab}+R^d_{eab}\nabla_c Z^e+Z^e\nabla_a R^d_{ebc}+R^d_{ebc}\nabla_a Z^e+Z^e\nabla_b R^d_{eca}+R^d_{eca}\nabla_b Z^e\\
&\overset{6.2-4}{=\!=\!=}+R^d_{eca}\nabla_b Z^e-R^e_{bca}\nabla_e Z^d+R^d_{eab}\nabla_c Z^e-R^e_{cab}\nabla_e Z^d+R^d_{ebc}\nabla_a Z^e-R^e_{abc}\nabla_e Z^d\\
&=Z^e\nabla_c R^d_{eab}+R^d_{eab}\nabla_c Z^e+Z^e\nabla_a R^d_{ebc}+R^d_{ebc}\nabla_a Z^e+Z^e\nabla_b R^d_{eca}+R^d_{eca}\nabla_b Z^e.
\end{aligned}$$

因 Z^a 的任意性以及式(6.2-12)，从上式可得

$$\nabla_a R^d_{ebc}+\nabla_b R^d_{eca}+\nabla_c R^d_{eab}=0 \quad \overset{\substack{6.2-5\\3.8-9}}{\Longleftrightarrow} \quad \nabla_{[a}R^d_{|e|bc]}=0. \tag{6.2-13}$$

这是**第二 Bianchi 恒等式**，也称为 **Bianchi 微分恒等式**. 根据最新的考古[10]发现，黎曼本人早于其他任何学者发现了这个微分恒等式.

练习 6-4 证明式(6.2-3)、式(6.2-4)；并给出更一般性的公式.

练习 6-5 用不同的方法再次证明 Bianchi 微分恒等式.

6.3 曲率型式

给定 m 维仿射联络空间 (M,∇_a)，除了由局部坐标系 $(U;x^i)$ 确定的自然基底标架场 $\{(\frac{\partial}{\partial x^i})^a\}$ 外，还可以使用一般的局部标架场 $\{(e_i)^a\}$；它们是定义在流

形 M 的某开集 U 上的切矢量场，并且对于任意一点 $p\in U$，$(e_i)^a|_p$ 是切空间 T_pM 的基底．既然是切矢量场，自然可以用自然标架场来展开

$$(e_i)^a=\left(\frac{\partial}{\partial x^\alpha}\right)^a C^\alpha{}_i(x),\quad (e^i)_a=(\mathrm{d}x^\alpha)_a\left(C^{-T}\right)_\alpha{}^i;\ C^\alpha{}_i(x)\in C^\infty(U).\tag{6.3-1}$$

一般要求变换矩阵 C 的行列式 $\det(C)>0$，用以保证 $(e_i)^a$ 与 $(\frac{\partial}{\partial x^i})^a$ 定向相同．

现考虑一般的标架变换，若 $(\tilde e_i)^a$ 是另一局部标架，则存在光滑函数使得

$$(\tilde e_i)^a=(e_\mu)^aA^\mu{}_i,\quad (\tilde e^j)_a=(e^\nu)_aB_\nu{}^j;\qquad A^\mu{}_i,B_\nu{}^j\in C^\infty(U).\tag{6.3-2}$$

矩阵 A 和 B 的指标在前的是行指标，在后的是列指标（不论在上还是在下）；依照定理3.28，变换矩阵 A 和 B 是转置逆关系（$B^{-1}=A^T$）．设有张量 $T^a{}_b$，则

$$\begin{aligned}&T^a{}_b=T^\mu{}_\nu(e_\mu)^a(e^\nu)_b=\tilde T^i{}_j(\tilde e_i)^a(\tilde e^j)_b=\tilde T^i{}_j(e_\mu)^aA^\mu{}_i(e^\nu)_bB_\nu{}^j\\ \Rightarrow\quad &T^\mu{}_\nu=\tilde T^i{}_jA^\mu{}_iB_\nu{}^j\quad\Leftrightarrow\quad T^\mu{}_\nu A^\nu{}_kB_\mu{}^n=\tilde T^n{}_k.\end{aligned}\tag{6.3-3}$$

这是不同标架场下张量分量的变换关系．基矢场 $(e_\mu)^a$ 和 $(\tilde e_i)^a$ 可以是自然坐标基底，也可以是一般基底．

例 6.20 切丛上的恒等映射．

切丛上的恒等映射定义为：

$$\delta^a_b\overset{def}{=}\sum\nolimits_{i=1}^m(e_i)^a(e^i)_b.\tag{6.3-4}$$

对于任意切矢量 $v^b=v^j(e_j)^b$ 或余切矢量 $\omega_a=\omega_k(e^k)_a$，有

$$\delta^a_bv^b=(e_i)^a(e^i)_bv^j(e_j)^b=(e_i)^av^j\delta^i_j=(e_i)^av^i=v^a;\quad \text{类似有 }\delta^a_b\omega_a=\omega_b.$$

故式(6.3-4)为切丛上的恒等映射；那么，有

$$\nabla_cv^a=\nabla_c(\delta^a_bv^b)\overset{\text{Leibniz}\atop\text{法则}}{=\!=\!=}(\nabla_c\delta^a_b)\,v^b+\delta^a_b\nabla_cv^b.$$

因 v^a 是任意切矢量场，故必然可以得到

$$\nabla_c\delta^a_b\equiv0.\tag{6.3-5}$$

目前，我们还没有引入度规；在引入度规后（§8.1），会发现上面几式与度规相容．需要注意式(6.3-4)的定义无需度规；联络 ∇_c 可以有挠、也可以无挠． ■

6.3.1 联络型式

给定联络 ∇_a（有挠无挠均可），在任意基底场 $(e_i)^a$ 及其对偶标架场 $(e^i)_a$ 中，与坐标基底场系数(6.1-2)类似，同样可以定义联络系数（仍记为 Γ）：

$$(e_j)^b\nabla_b(e_i)^a \overset{def}{=} +\Gamma^k_{ij}(e_k)^a \quad\Leftrightarrow\quad \nabla_b(e_i)^a = +\Gamma^k_{ij}(e^j)_b(e_k)^a, \tag{6.3-6a}$$

$$(e_j)^b\nabla_b(e^i)_a = -\Gamma^i_{kj}(e^k)_a \quad\Leftrightarrow\quad \nabla_b(e^i)_a = -\Gamma^i_{kj}(e^j)_b(e^k)_a. \tag{6.3-6b}$$

上式推导中用到了式(6.3-4)、(6.3-5)．自然坐标系 $\{x^i\}$ 基底下的无挠联络系数关于下标是对称的，即 $\overset{x}{\Gamma}{}^k_{ij} = \overset{x}{\Gamma}{}^k_{ji}$．然而，一般基底场 $(e_i)^a$ 的无挠联络系数 Γ^k_{ij} 通常不具有这种对称性；参见式(6.3-18)．

定义**联络 1 型式场**（或联络一型式场，或联络型式场）：

$$(\omega^k{}_j)_a \overset{def}{=} \Gamma^k_{ji}(e^i)_a \equiv (e^i)_a(e^k)_c(e_i)^b\nabla_b(e_j)^c \equiv (e^k)_c\nabla_a(e_j)^c. \tag{6.3-7}$$

上指标降下位置是人为约定的．由上式可导出联络型式的另一种常用表示

$$\nabla_a(e^i)_b = -(\omega^i{}_j)_a(e^j)_b, \qquad \nabla_a(e_i)^b = +(\omega^j{}_i)_a(e_j)^b. \tag{6.3-8}$$

下面罗列一些标架场下的协变导数公式．对于任意标量场 f，有

$$e_i(f) = C^j{}_i(x)\frac{\partial f}{\partial x^j}, \tag{6.3-9}$$

$$\mathrm{d}_a(f) = \frac{\partial f}{\partial x^j}(\mathrm{d}x^j)_a = \frac{\partial f}{\partial x^i}C^i{}_\nu\cdot(C^{-T})_j{}^\nu(\mathrm{d}x^j)_a = [e_\nu(f)](e^\nu)_a. \tag{6.3-10}$$

依照约定，切矢场作用在标量场上时，去掉抽象指标．易得：

$$\nabla_a u^c = \left[e_j(u^i) + u^l\Gamma^i_{lj}\right](e^j)_a(e_i)^c = \left[\mathrm{d}_a(u^i) + u^l(\omega^i{}_l)_a\right](e_i)^c. \tag{6.3-11}$$

$$\nabla_a\mu_b = \left[e_j(\mu_k) - \mu_l\Gamma^l_{kj}\right](e^j)_a(e^k)_b = \left[\mathrm{d}_a(\mu_k) - \mu_l(\omega^l{}_k)_a\right](e^k)_b. \tag{6.3-12}$$

$$\nabla_a T^c_b = \left[e_j(T^i_k) - T^i_l\Gamma^l_{kj} + T^l_k\Gamma^i_{lj}\right](e^j)_a(e^k)_b(e_i)^c, \tag{6.3-13}$$

$$= \left[\mathrm{d}_a(T^i_k) - T^i_l(\omega^l{}_k)_a + T^l_k(\omega^i{}_l)_a\right](e^k)_b(e_i)^c. \tag{6.3-14}$$

我们从另一个角度再叙述一下联络型式场．设有 $m\times m$ 维矩阵 $E^\alpha{}_\beta (1\leqslant\alpha,\beta\leqslant m)$，其中矩阵 $E^\alpha{}_\beta$ 的第 α 行、第 β 列元素为 1，其余矩阵元是 0．那么联络型式场可以改写为（下式中的 $A^{\alpha\beta}_i(x)$ 是由联络系数决定的）：

$$(\omega^k{}_j)_a \equiv \Gamma^k_{ji}(e^i)_a = \sum_{\alpha,\beta=1}^{m}\sum_{i=1}^{m}(E^\alpha{}_\beta)^k{}_j A^{\alpha\beta}_i(x)(\mathrm{d}x^i)_a;\ A^{\alpha\beta}_i(x)\in C^\infty(U). \tag{6.3-15}$$

上式中 $(E^\alpha{}_\beta)^k{}_j$ 表示矩阵 $E^\alpha{}_\beta$ 的第 k 行、第 j 列的矩阵元．

6.3.2 标架变换

现在考虑在标架变换(6.3-2)下，联络型式如何变化．设联络 ∇_a 在标架场 $(\tilde{e}^i)_a$ 下的联络系数及联络型式分别为

$$(\tilde{e}_i)^b\nabla_b(\tilde{e}_j)^a=\widetilde{\Gamma}^k_{ji}(\tilde{e}_k)^a,\qquad (\tilde{\omega}^k{}_j)_a\equiv\widetilde{\Gamma}^k_{ji}(\tilde{e}^i)_a. \tag{6.3-16}$$

依照定义直接计算

$$\begin{aligned}
&(\tilde{e}_i)^b\nabla_b(\tilde{e}_j)^a=\widetilde{\Gamma}^k_{ji}(\tilde{e}_k)^a \xrightarrow{6.3-2} (\tilde{e}_i)^b\nabla_b\big(A^\nu{}_j(e_\nu)^a\big)=\widetilde{\Gamma}^k_{ji}\big(A^\rho{}_k(e_\rho)^a\big)\\
\Rightarrow&(e_\nu)^a(\tilde{e}_i)^b\nabla_bA^\nu{}_j+A^\nu{}_jA^\mu{}_i(e_\mu)^b\nabla_b(e_\nu)^a=\widetilde{\Gamma}^k_{ji}A^\rho{}_k(e_\rho)^a\\
\Rightarrow&(\tilde{e}_i)^b\nabla_bA^\sigma{}_j+A^\nu{}_jA^\mu{}_i\Gamma^\sigma_{\nu\mu}=\widetilde{\Gamma}^k_{ji}A^\sigma{}_k,\qquad \text{已缩并掉基矢}(e_\nu)^a\\
\Rightarrow&(\tilde{e}^i)_a(\tilde{e}_i)^b\nabla_bA^\sigma{}_j+A^\nu{}_jA^\mu{}_i\Gamma^\sigma_{\nu\mu}(\tilde{e}^i)_a=\widetilde{\Gamma}^k_{ji}A^\sigma{}_k(\tilde{e}^i)_a,\qquad \text{准备缩并基矢}(\tilde{e}_i)^b\\
\Rightarrow&\nabla_aA^\sigma{}_j+A^\nu{}_jA^\mu{}_i\Gamma^\sigma_{\nu\mu}(e^\rho)_aB_\rho{}^i=\widetilde{\Gamma}^k_{ji}A^\sigma{}_k(\tilde{e}^i)_a,\quad \text{已把基矢 }(\tilde{e}^i)_a\text{ 表示为 }(e^\rho)_aB_\rho{}^i
\end{aligned}$$

把上面最后一式的联络系数变成型式场，并应用矩阵 A,B 互逆，可以得到

$$\nabla_aA^\sigma{}_j+(\omega^\sigma{}_\nu)_aA^\nu{}_j=A^\sigma{}_k(\tilde{\omega}^k{}_j)_a\quad\Leftrightarrow\quad\tilde{\omega}=A^{-1}\mathrm{d}A+A^{-1}\omega A. \tag{6.3-17}$$

最后把公式表示成矩阵型式，显得较为简洁．

将上上式中的 $(e^\alpha)_a$ 取为 $(\mathrm{d}x^\alpha)_a$，可将式(6.3-17)表示成联络系数形式：

$$A^\alpha{}_i\frac{\partial A^\sigma{}_j}{\partial x^\alpha}+A^\alpha{}_iA^\nu{}_j\overset{x}{\Gamma}{}^\sigma_{\nu\alpha}=A^\sigma{}_k\widetilde{\Gamma}^k_{ji}. \tag{6.3-18}$$

上式中 $\overset{x}{\Gamma}$ 表示自然坐标 $\{x^i\}$ 的联络系数，$\widetilde{\Gamma}$ 是一般标架 $\{(\tilde{e}_i)^a\}$ 的联络系数．

例 6.21 广义相对论中的四标架假设（tetrad postulate）．

先参见例题6.20．我们将恒等映射变换一下，可以导出两个公式．

$$\begin{aligned}
0=&\nabla_c\delta^a_b=\nabla_c\left((\partial_\alpha)^aC^\alpha{}_i(e^i)_b\right)\\
=&\left(\frac{\partial C^\beta{}_i}{\partial x^\sigma}+C^\alpha{}_i\overset{x}{\Gamma}{}^\beta_{\alpha\sigma}-C^\beta{}_l\Gamma^l_{ij}\left(C^{-T}\right)_\sigma{}^j\right)(\partial_\beta)^a(e^i)_b(\mathrm{d}x^\sigma)_c.
\end{aligned}$$

去掉基矢，有

$$\frac{\partial C^\beta{}_i}{\partial x^\sigma}+C^\alpha{}_i\overset{x}{\Gamma}{}^\beta_{\alpha\sigma}-C^\beta{}_l\Gamma^l_{ij}\left(C^{-T}\right)_\sigma{}^j=0, \tag{6.3-19a}$$

$$\frac{\partial \left(C^{-T}\right)_{\rho}^{\ i}}{\partial x^{\sigma}} - \left(C^{-T}\right)_{\mu}^{\ i} \overset{x}{\Gamma}{}^{\mu}_{\rho\sigma} + \left(C^{-T}\right)_{\rho}^{\ l} \Gamma^{i}_{lj} \left(C^{-T}\right)_{\sigma}^{\ j} = 0. \tag{6.3-19b}$$

上式无非是(6.3-18)或其变种．式(6.3-19b)是由 $0 = \nabla_c((e_i)^a(\mathrm{d}x^\mu)_b(C^{-T})_\mu{}^i)$ 推演得到的．有些文献将式(6.3-19)称为“tetrad postulate”（四标架假设）；由于上两式为微分恒等式，不是假设，故这个称呼不准确． ■

6.3.3 Cartan 结构方程

由式(6.1-22)可知

$$\begin{aligned} T^a_{bc}(e^i)_a(e_j)^b(e_k)^c &= (e^i)_a\nabla_{e_j}(e_k)^a - (e^i)_a\nabla_{e_k}(e_j)^a - (e^i)_a[e_j,e_k]^a \\ &= \Gamma^l_{kj}(e_l)^a(e^i)_a - \Gamma^l_{jk}(e_l)^a(e^i)_a - (e^i)_a[e_j,e_k]^a. \end{aligned} \tag{6.3-20}$$

依照式(5.2-8)可知上式最后一项可以表示为

$$-(e^i)_a[e_j,e_k]^a = \big(\mathrm{d}_a(e^i)_b\big)(e_j)^a(e_k)^b - e_j\big((e^i)_b(e_k)^b\big) + e_k\big((e^i)_b(e_j)^b\big) = \big(\mathrm{d}_a(e^i)_b\big)(e_j)^a(e_k)^b,$$

带回(6.3-20)，得

$$\begin{aligned} T^a_{bc}(e^i)_a(e_j)^b(e_k)^c = \Gamma^i_{kj} - \Gamma^i_{jk} + \big(\mathrm{d}_a(e^i)_b\big)(e_j)^a(e_k)^b \quad &\Rightarrow \\ T^c_{ab}(e^i)_c = (\omega^i{}_k)_a(e^k)_b - (e^j)_a(\omega^i{}_j)_b + \mathrm{d}_a(e^i)_b. & \end{aligned}$$

由此，可得

$$\mathrm{d}_a(e^i)_b - (e^j)_a \wedge (\omega^i{}_j)_b = T^c_{ab}(e^i)_c = \frac{1}{2}T^i_{jk}(e^j)_a \wedge (e^k)_b. \tag{6.3-21}$$

这是 **Cartan 第一结构方程**.

由黎曼曲率的定义(6.2-1)，可得

$$\begin{aligned} &R^d_{cab}(e_i)^a(e_j)^b(e_k)^c = \nabla_{e_i}\nabla_{e_j}(e_k)^d - \nabla_{e_j}\nabla_{e_i}(e_k)^d - \nabla_{[e_i,e_j]}(e_k)^d \\ =&\nabla_{e_i}\left(\Gamma^p_{kj}(e_p)^d\right) - \nabla_{e_j}\left(\Gamma^p_{ki}(e_p)^d\right) - [e_i,e_j]^c\Gamma^p_{kl}\left(e^l\right)_c(e_p)^d \\ =&(e_p)^d e_i\left(\Gamma^p_{kj}\right) + \Gamma^p_{kj}\Gamma^n_{pi}(e_n)^d - (e_p)^d e_j\left(\Gamma^p_{ki}\right) - \Gamma^p_{ki}\Gamma^n_{pj}(e_n)^d - \left(e^l\right)_c[e_i,e_j]^c\Gamma^p_{kl}(e_p)^d. \end{aligned}$$

对上式两边缩并 $(e^n)_d$，得

$$R^n_{kij} = e_i(\Gamma^n_{kj}) - e_j(\Gamma^n_{ki}) + \Gamma^l_{kj}\Gamma^n_{li} - \Gamma^l_{ki}\Gamma^n_{lj} - (e^l)_c[e_i,e_j]^c\Gamma^n_{kl}. \tag{6.3-22}$$

注意 $e_i(\Gamma^n_{kj})$ 是切矢量场 e_i 作用在标量函数场 Γ^n_{kj} 上，省略了抽象指标．依照式(5.2-8)，上式最后一项可表示为

$$-\left[\Gamma^n_{kl}\left(e^l\right)_c\right][e_i,e_j]^c=\mathrm{d}_a(\omega^n{}_k)_b(e_i)^a(e_j)^b-e_i\left(\Gamma^n_{kj}\right)+e_j\left(\Gamma^n_{ki}\right). \tag{6.3-23}$$

将上式代入(6.3-22)，得

$$R^n{}_{kij}=+\Gamma^l_{kj}\Gamma^n_{li}-\Gamma^l_{ki}\Gamma^n_{lj}+\left[\mathrm{d}_a(\omega^n{}_k)_b\right](e_i)^a(e_j)^b \quad\Leftrightarrow \tag{6.3-24}$$

$$\frac{1}{2}R^n{}_{kij}(e^i)_a\wedge(e^j)_b=\mathrm{d}_a(\omega^n{}_k)_b+(\omega^n{}_l)_a\wedge(\omega^l{}_k)_b. \tag{6.3-25}$$

这是 **Cartan 第二结构方程**．两个结构方程适用于有挠或无挠联络．

定义 6.22 定义联络 ∇_a 在局部标架场 $(e_i)^a$ 下的**挠率型式**与**曲率型式**如下：

$$(\Theta^i)_{ab}\overset{def}{=}\mathrm{d}_a(e^i)_b-(e^j)_a\wedge(\omega^i{}_j)_b, \tag{6.3-26}$$

$$(\Omega^i{}_j)_{ab}\overset{def}{=}\mathrm{d}_a(\omega^i{}_j)_b+(\omega^i{}_l)_a\wedge(\omega^l{}_j)_b. \tag{6.3-27}$$

它们都是 2 型式场．由结构方程可得上两式在一般标架场上的具体表示：

$$(\Theta^i)_{ab}=\frac{1}{2}T^i_{jk}(e^j)_a\wedge(e^k)_b=T^i_{jk}(e^j)_a(e^k)_b, \tag{6.3-28}$$

$$(\Omega^i{}_j)_{ab}=\frac{1}{2}R^i{}_{jkl}(e^k)_a\wedge(e^l)_b=R^i{}_{jkl}(e^k)_a(e^l)_b. \tag{6.3-29}$$

则两个 Cartan 结构方程可以表示成如下常用形式：

$$\mathrm{d}_a(e^i)_b=(e^j)_a\wedge(\omega^i{}_j)_b+(\Theta^i)_{ab}, \tag{6.3-30a}$$

$$\mathrm{d}_a(\omega^i{}_j)_b=(\omega^l{}_j)_a\wedge(\omega^i{}_l)_b+(\Omega^i{}_j)_{ab}. \tag{6.3-30b}$$

6.3.4 Bianchi 恒等式

下两式分别称为联络的第一、第二 Bianchi 恒等式.

定理 6.23 挠率形式和曲率形式满足下式（有挠、无挠联络均适用）：

$$\mathrm{d}_c(\Theta^i)_{ab}=(e^j)_c\wedge(\Omega^i{}_j)_{ab}-(\Theta^j)_{ca}\wedge(\omega^i{}_j)_b, \tag{6.3-31a}$$

$$\mathrm{d}_c(\Omega^i{}_j)_{ab}=(\omega^k{}_j)_c\wedge(\Omega^i{}_k)_{ab}-(\Omega^k{}_j)_{ca}\wedge(\omega^i{}_k)_b. \tag{6.3-31b}$$

证明 . 对式(6.3-30a)取外微分，有（见式(5.2-5)）

$$
\begin{aligned}
0=\mathrm{d}_c\mathrm{d}_a(e^i)_b&=\big(\mathrm{d}_c(e^j)_a\big)\wedge(\omega^i{}_j)_b-(e^j)_c\wedge\big(\mathrm{d}_a(\omega^i{}_j)_b\big)+\mathrm{d}_c(\Theta^i)_{ab}\quad\Rightarrow\\
\mathrm{d}_c(\Theta^i)_{ab}&=-\big[(e^l)_c\wedge(\omega^j{}_l)_a+(\Theta^j)_{ca}\big]\wedge(\omega^i{}_j)_b+(e^j)_c\wedge\big[(\omega^l{}_j)_a\wedge(\omega^i{}_l)_b+(\Omega^i{}_j)_{ab}\big]\\
&=(e^j)_c\wedge(\Omega^i{}_j)_{ab}-(\Theta^j)_{ca}\wedge(\omega^i{}_j)_b.
\end{aligned}
$$

这便是第一式. 再对(6.3-30b)取外微分，有

$$
\begin{aligned}
0=\mathrm{d}_c\mathrm{d}_a(\omega^i{}_j)_b&=\big[\mathrm{d}_c(\omega^l{}_j)_a\big]\wedge(\omega^i{}_l)_b-(\omega^l{}_j)_c\wedge\big[\mathrm{d}_a(\omega^i{}_l)_b\big]+\mathrm{d}_c(\Omega^i{}_j)_{ab}\quad\Rightarrow\\
\mathrm{d}_c(\Omega^i{}_j)_{ab}&=-\big[(\omega^p{}_j)_c\wedge(\omega^l{}_p)_a+(\Omega^l{}_j)_{ca}\big]\wedge(\omega^i{}_l)_b+(\omega^l{}_j)_c\wedge\big[(\omega^p{}_l)_a\wedge(\omega^i{}_p)_b+(\Omega^i{}_l)_{ab}\big]\\
&=(\omega^l{}_j)_c\wedge(\Omega^i{}_l)_{ab}-(\Omega^l{}_j)_{ca}\wedge(\omega^i{}_l)_b.
\end{aligned}
$$

这便是第二式. ■

定理 6.24 联络无挠时，式(6.3-31)分别是通常的第一、第二 Bianchi 恒等式.

证明 . 联络无挠等价于 $(\Theta^i)_{ab}\equiv 0$，故式(6.3-31a)变为

$$
0=(e^j)_c\wedge(\Omega^i{}_j)_{ab}\overset{6.3-29}{=\!=\!=}\frac{1}{2}R^i_{jkl}(e^j)_c\wedge(e^k)_a\wedge(e^l)_b\overset{3.8-56}{\Longrightarrow}R^i_{[jkl]}=0. \tag{6.3-32}
$$

这是第一 Bianchi 恒等式，与式(6.2-12)相同.

应用无挠联络的式(6.3-30a)，直接计算式(6.3-31b)，有

$$
\begin{aligned}
0=&\mathrm{d}_c(\Omega^i{}_j)_{ab}-(\omega^k{}_j)_c\wedge(\Omega^i{}_k)_{ab}+(\Omega^k{}_j)_{ca}\wedge(\omega^i{}_k)_b\\
=&\frac{1}{2}\mathrm{d}_c(R^i_{jpn})\wedge(e^p)_a\wedge(e^n)_b+\frac{1}{2}R^i_{jkn}\big[\mathrm{d}_c(e^k)_a\big]\wedge(e^n)_b\\
&-\frac{1}{2}R^i_{jsk}(e^s)_c\wedge\mathrm{d}_a(e^k)_b+\frac{1}{2}(-R^i_{kpn}\Gamma^k_{js}+R^k_{jsp}\Gamma^i_{kn})(e^s)_c\wedge(e^p)_a\wedge(e^n)_b\\
=&\frac{1}{2}(e^s)_c\wedge(e^p)_a\wedge(e^n)_b\big[e_s(R^i_{jpn})+R^i_{jkn}\Gamma^k_{sp}-R^i_{jsk}\Gamma^k_{pn}-R^i_{kpn}\Gamma^k_{js}+R^k_{jsp}\Gamma^i_{kn}\big]\\
\overset{*}{=}&\frac{1}{2}(e^s)_c\wedge(e^p)_a\wedge(e^n)_b\big[e_s(R^i_{jpn})+R^i_{jkn}(\Gamma^k_{sp}+\Gamma^k_{ps})\\
&-R^i_{jkn}\Gamma^k_{ps}-R^i_{jsk}\Gamma^k_{pn}-R^i_{kpn}\Gamma^k_{js}+R^k_{jsp}\Gamma^i_{kn}\big]\\
=&\frac{1}{2}(e^s)_c\wedge(e^p)_a\wedge(e^n)_b\big[e_s(R^i_{jpn})-R^i_{jkn}\Gamma^k_{ps}-R^i_{jsk}\Gamma^k_{pn}-R^i_{kpn}\Gamma^k_{js}+R^k_{jsp}\Gamma^i_{kn}\big].
\end{aligned}
$$

在“$\overset{*}{=}$”步中作了一个技巧性处理：先加减 $R^i_{jkn}\Gamma^k_{ps}$ 项，然后 $R^i_{jkn}\Gamma^k_{ps}$ 和 $R^i_{jkn}\Gamma^k_{sp}$ 组成红色圆括号内的项；红色括号内的两项关于下标 s 和 p 对称，而方括号外面是外微分式（关于 s 和 p 反对称），故此项消失了．由式(3.8-56)继续计算有

$$
\begin{aligned}
0 =& e_{[s}(R^i_{|j|pn]}) - R^i_{jk[n}\Gamma^k_{ps]} - R^i_{j[s|k|}\Gamma^k_{pn]} - R^i_{k[pn}\Gamma^k_{|j|s]} + R^k_{j[sp}\Gamma^i_{|k|n]} \quad \xRightarrow[3.8-9]{6.2-5} \\
0 =& e_s(R^i_{jpn}) + e_p(R^i_{jns}) + e_n(R^i_{jsp}) \\
& - R^i_{jkn}\Gamma^k_{ps} - R^i_{jkp}\Gamma^k_{sn} - R^i_{jks}\Gamma^k_{np} - R^i_{jsk}\Gamma^k_{pn} - R^i_{jpk}\Gamma^k_{ns} - R^i_{jnk}\Gamma^k_{sp} \\
& - R^i_{kpn}\Gamma^k_{js} - R^i_{kns}\Gamma^k_{jp} - R^i_{ksp}\Gamma^k_{jn} + R^k_{jsp}\Gamma^i_{kn} + R^k_{jpn}\Gamma^i_{ks} + R^k_{jns}\Gamma^i_{kp} \\
=& + e_s(R^i_{jpn}) + R^k_{jpn}\Gamma^i_{ks} - R^i_{kpn}\Gamma^k_{js} - R^i_{jkn}\Gamma^k_{ps} - R^i_{jpk}\Gamma^k_{ns} \\
& + e_p(R^i_{jns}) + R^k_{jns}\Gamma^i_{kp} - R^i_{kns}\Gamma^k_{jp} - R^i_{jks}\Gamma^k_{np} - R^i_{jnk}\Gamma^k_{sp} \\
& + e_n(R^i_{jsp}) + R^k_{jsp}\Gamma^i_{kn} - R^i_{ksp}\Gamma^k_{jn} - R^i_{jkp}\Gamma^k_{sn} - R^i_{jsk}\Gamma^k_{pn}.
\end{aligned}
$$

由此式，参考式(6.3-13)可得第二 Bianchi 恒等式

$$
R^i_{jpn;s} + R^i_{jns;p} + R^i_{jsp;n} = 0 \ \Leftrightarrow\ \nabla_a R^d_{ebc} + \nabla_b R^d_{eca} + \nabla_c R^d_{eab} = 0. \tag{6.3-33}
$$

与式(6.2-13)相同． ■

练习 6-6 由式(6.3-17)导出式(6.3-18)．

练习 6-7 由式(6.3-18)导出式(6.1-6)．

练习 6-8 证明式(6.3-19b)．试着讨论式(6.3-18)与式(6.3-19)的关系．

注 6.25 本节的型式理论摆脱了局部自然坐标，是切标架丛（见227页）上的理论．抽象指标记号的优势在于协变导数计算以及缩并计算的清晰性．它的劣势在曲率型式理论中体现明显：角标、符号过于繁杂；使公式显得十分笨重．

6.4 平直与弯曲

本小节内容在无挠仿射空间 (M,∇_a) 的局部开集 $(U;x^i)$ 上讨论．

由测地线定义6.14以及式(6.1-42)可知 U 中测地线方程为：

$$
\frac{\mathrm{d}^2x^i(t)}{\mathrm{d}t^2} + \Gamma^i_{jk}(t)\frac{\mathrm{d}x^j(t)}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}x^k(t)}{\mathrm{d}t} = 0, \qquad 1 \leqslant i \leqslant m, \quad t \in (-\delta,\delta). \tag{6.4-1}
$$

若 U 中所有测地线能表述成直线形式

$$x^i(t)=a^it+b^i,\quad a^i,b^i\in\mathbb{R},\quad 1\leqslant i\leqslant m,\quad t\in(-\delta,\delta) \tag{6.4-2}$$

那么我们可以认为 U 是平直的，这正是欧式空间平直属性的推广描述．我们将上式代入式(6.4-1)，并利用 $\Gamma^i_{jk}(t)=\Gamma^i_{kj}(t)$ 可以得到：

$$\Gamma^i_{jk}(t)=0,\qquad t\in(-\delta,\delta),\quad 1\leqslant i,j,k\leqslant m. \tag{6.4-3}$$

这也就是说在局部坐标系 $(U;x^i)$ 中仿射联络系数都为零．反之若存在局部坐标卡 $(U;x^i)$ 使得其中仿射联络系数都为零，那么由式(6.4-1)可知：U 中测地线必然可以表示成上述直线形式(6.4-2)．两者是相互等价的描述．

若 U 平直（测地线全为直线形式(6.4-2)），则由式(6.2-8)可知：

$$R^i_{jkl}=0. \tag{6.4-4}$$

这便论证了：若 M 的局部开集 U 平直（测地线全为直线形式(6.4-2)），那么 U 上黎曼曲率恒为零．此命题的逆命题也成立，即有

定理 6.26 设有无挠仿射空间 (M,∇_a)，M 为平直（测地线全为直线形式）的充分必要条件是：其切矢量丛上黎曼曲率张量为零．

下面证明“⇐”．因联络无挠，故方程(6.3-30)变为

$$\mathrm{d}_a(e^\mu)_b=(e^\nu)_a\wedge(\omega^\mu{}_\nu)_b, \tag{6.4-5a}$$

$$\mathrm{d}_a(\omega^\mu{}_\nu)_b=(\omega^\sigma{}_\nu)_a\wedge(\omega^\mu{}_\sigma)_b+(\Omega^\mu{}_\nu)_{ab}. \tag{6.4-5b}$$

上式的基矢量是 $(e_\mu)^a$（称为旧的）．

现另选一套新基矢 $(\tilde e_i)^a$，在标架变换(6.3-2)下（即 $(\tilde e_i)^a=(e_\mu)^aA^\mu{}_i$，$(\tilde e^j)_a=(e^\nu)_aB_\nu{}^j$，其中 $A\cdot B^T=I$），新的联络系数及联络微分型式场为式(6.3-16)：

$$(\tilde e_i)^b\nabla_b(\tilde e_j)^a=\tilde\Gamma^k_{ji}(\tilde e_k)^a,\qquad(\tilde\omega^k{}_j)_a\equiv\tilde\Gamma^k_{ji}(\tilde e^i)_a. \tag{6.3-16}$$

新旧一次微分型式场基本变换关系为式(6.3-17)：

$$\mathrm{d}_aA^\sigma{}_j+(\omega^\sigma{}_\nu)_aA^\nu{}_j=A^\sigma{}_k(\tilde\omega^k{}_j)_a. \tag{6.3-17}$$

我们的目的是在点 $p\in U$ 附近寻找一组适当的光滑函数 $A^\sigma{}_k\in C^\infty(U)$ 使得 $\det(A^\sigma{}_k)\neq0$，并且在新标架场 $(\tilde e_i)^a$ 下新联络型式场 $(\tilde\omega^k{}_j)_a$ 恒为零，也就是新的

联络系数 $\tilde{\Gamma}^k_{ji}$ 恒为零；由上面的式子(6.3-16)可知 $(\tilde{e}_i)^b\nabla_b(\tilde{e}_j)^a=0$，也就是新标架场 $(\tilde{e}_i)^a$ 式平行标架场．由上面的式(6.3-17)可知，这个问题转化为如下 Pfaff 方程（未知量是 $A^\sigma{}_j$）的求解．

$$(\pi^\sigma{}_j)_a \overset{def}{=} \mathrm{d}_a A^\sigma{}_j + (\omega^\sigma{}_\nu)_a A^\nu{}_j = 0,\ \det(A^\sigma{}_k)\neq 0,\ 1\leqslant j,k,\sigma,\nu\leqslant m. \tag{6.4-6}$$

此 Pfaff 方程是由 m^2 个一次微分式组成的，它的秩是 m^2．我们对此式再次求外微分，并利用黎曼曲率为零的条件（即 $(\Omega^\mu{}_\nu)_{ab}=0$）

$$\begin{aligned}\mathrm{d}_b(\pi^\sigma{}_j)_a =&\big(\mathrm{d}_b(\omega^\sigma{}_\nu)_a\big)A^\nu{}_j + (\mathrm{d}_b A^\nu{}_j)\wedge(\omega^\sigma{}_\nu)_a\\ \overset{\substack{6.4-5b\\ 6.4-6}}{=\!=\!=}&(\omega^\xi{}_\nu)_b\wedge(\omega^\sigma{}_\xi)_a A^\nu{}_j + \big((\pi^\nu{}_j)_b - (\omega^\nu{}_\xi)_b A^\xi{}_j\big)\wedge(\omega^\sigma{}_\nu)_a = (\pi^\nu{}_j)_b\wedge(\omega^\sigma{}_\nu)_a.\end{aligned}$$

于是 Pfaff 方程组(6.4-6)满足 Frobenius 条件(5.4-16)；由 Frobenius 定理5.24可知此方程组完全可积．也就是存在新的标架场 $(\tilde{e}_i)^a$，其上的仿射联络系数都为零（$(\tilde{\omega}^\mu{}_\nu)_b$ 恒为零），将其代入 Cartan 第一结构方程(6.4-5a)，可以得到：

$$\mathrm{d}_a(\tilde{e}^\mu)_b = (\tilde{e}^\nu)_a\wedge(\tilde{\omega}^\mu{}_\nu)_b = 0. \tag{6.4-7}$$

也就是每一个 $(\tilde{e}^\mu)_b$ 都是闭的，由 Poincaré 引理5.12可知存在 $p\in M$ 的局部坐标邻域 U 以及其上的光滑函数族 $\{x^\mu\}$ 使得 $(\tilde{e}^\mu)_a=\mathrm{d}_a x^\mu=(\mathrm{d}x^\mu)_a$，$(1\leqslant\mu\leqslant m)$；这说明在 U 内存在自然标架场 $\{(\frac{\partial}{\partial x^\mu})^a\}$ 等于 $(\tilde{e}_\mu)^a$．在这个新标架中 U 上测地线全为直线形式(6.4-2)（即 U 是平直的）．证毕．

在定义度量后，还有后续描述，见 §8.7.2．有了上述论证，可定义：

定义 6.27 设仿射空间 M 上有无挠联络 ∇_a．若其切丛上的黎曼曲率恒为零，则称 M 为**平直的**（或**平坦的**，flat）；否则称 M 为**弯曲的**（curved）．

小结

本章主要参考了[72]相应章节．

第七章　纤维丛初步

本章简要介绍矢量丛和标架丛，极简单地阐述纤维丛．本章采用 §3.7记号．

矢量丛定义并不需要李群概念．纤维丛（§7.6之后的内容）内容只需要李变换群的定义，并不需要更多李群概念．因此，即使没有李群知识也不大影响阅读§7.6、§7.7内容．§7.8内容需要一些李群、李代数概念（见第十三章）．

7.1　丛

丛是更复杂的矢量丛和纤维丛概念的基本底层结构．

定义 7.1 丛（bundle）是一个三元组 (E,B,π)，其中 $\pi:E\to B$（或 $E\xrightarrow{\pi}B$）是一个连续满射；拓扑空间 B 称为**底空间**，拓扑空间 E 称为**总空间**或**丛空间**，映射 π 称为**丛投影**；$\forall b\in B$，空间 $\pi^{-1}(b)\subset E$ 称为植于 b 点的**纤维**（fibre）．

直观地，我们认为丛是纤维 $\pi^{-1}(b)$ 的并集，并被空间 E 的拓扑“粘在一起”．

定义 7.2 如果 E' 是 E 的子空间，B' 是 B 的子空间，且 $\pi'=\pi|_{E'}:E'\to B'$；那么称丛 (E',B',π') 是 (E,B,π) 的**子丛**．

定义 7.3 若映射 $s:B\to E$ 使得 $\pi\circ s=\mathrm{id}$ 成立，则称 s 是丛 (E,B,π) 的**截面**．换句话说，截面 s 把 $b\in B$ 点映射成纤维 $\pi^{-1}(b)$ 中的元素，即 $s(b)\in\pi^{-1}(b)$．

给一个最简单的例子，设有拓扑空间 B、F，$B\times F$ 是积空间；则 $(B\times F,B,\pi)$ 构成丛，其中 π 是 $B\times F$ 到 B 的投影．笛卡尔积丛 $(B\times F,B,\pi)$ 的每个截面 s 具有 $s(b)=\big(b,f(b)\big)$ 的形式，其中映射 $f:B\to F$ 是由 s 唯一决定的．上述命题证明过程大致是：“$f:B\to F$ 是由 s 唯一决定的”是显然的，因为 s 就是在每一点处指定了纤维丛中的元素，也就是说唯一决定了 f．假设每个映射 $s:B\to B\times F$ 具有 $s(b)=\big(\tau(b),f(b)\big)$ 的形式；由于 $b=\pi\circ s(b)=\tau(b)$，所以 s 为 $B\times F$ 截面的充要条件是 $s(b)=\big(b,f(b)\big)$ 对于每个 $b\in B$ 成立．

7.2 矢量丛定义

从 §4.7的微分流形 TM 所具有的特殊构造可抽象出如下定义：

定义 7.4 设 E、M 是两个光滑流形，维数分别是 $q+m$ 和 m；$\pi: E \to M$ 是光滑满映射；$V \equiv \mathbb{R}^q$ 是 q 维矢量空间. 假设流形 M 上存在一个开覆盖 $\{U_\alpha; \alpha \in I\}$ 以及一组映射 $\{\psi_\alpha; \alpha \in I\}$；$\pi^{-1}(U_\alpha)$ 是流形 E 的开覆盖；它们满足如下条件：

(1) $\forall \alpha \in I$，映射 ψ_α 是从 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 到 $U_\alpha \times \mathbb{R}^q$ 的微分同胚，且 $\forall p \in U_\alpha$ 有

$$\psi_\alpha(v) \overset{def}{=} (p, y), \quad v \in \pi^{-1}(U_\alpha),\ y \in \mathbb{R}^q; \quad \text{且} \quad \pi \circ \psi_\alpha^{-1}(p, y) = p.$$

(2) 对于任意固定的 $p \in U_\alpha$，$\psi_{\alpha,p}^{-1}(\cdot) \equiv \psi_\alpha^{-1}(p, \cdot): \mathbb{R}^q \to \pi^{-1}(p)$ 是微分同胚映射；而且当 $p \in U_\alpha \cap U_\beta \neq \varnothing$ 时，映射（称为**过渡函数族**或转移函数族）

$$g_{\beta\alpha}^p(\cdot) \equiv \psi_{\beta,p} \circ \psi_{\alpha,p}^{-1}(\cdot): \mathbb{R}^q \to \mathbb{R}^q, \qquad g_{\beta\alpha}^p\text{的上角标 } p \text{ 可省略}$$

是线性同构，也就是说 $g_{\beta\alpha}^p \in GL(q, \mathbb{R})$，$GL(q, \mathbb{R})$ 是实一般线性群.

(3) 当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \varnothing$ 时，映射 $g_{\beta\alpha}: U_\alpha \cap U_\beta \to GL(q, \mathbb{R})$ 是 C^∞ 的.

则称 (E, M, π) 是光滑流形 M 上秩为 q 的实**矢量丛**，其中 E 称为**丛空间**，M 称为**底空间**（底流形），π 称为**丛投影**，$V = \mathbb{R}^q$ 称为**纤维型**. ■

定义 7.5 把定义7.4中的实空间 $\mathbb{R}^q$ 换成复矢量空间 $\mathbb{C}^q$，并把 $GL(q, \mathbb{R})$ 换成复群 $GL(q, \mathbb{C})$；则称 $\big(E, M, \pi, \mathbb{C}^q, GL(q, \mathbb{C})\big)$ 是流形 M 上的**复矢量丛**. ■

条件 (1) 中的映射 $\psi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times \mathbb{R}^q$ 称为矢量丛 E 在 U_α 上的**局部平凡化**，$U_\alpha \times \mathbb{R}^q$ ($\underset{\varphi^{-1}}{\overset{\varphi}{\longleftrightarrow}}$ $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^q$) 也就是纤维 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 的局部坐标卡.

由定义7.4中条件 (2) 可知，若映射 $\psi_{\alpha,p}^{-1}(\cdot)$、$\psi_{\beta,p}^{-1}(\cdot)$ 分别将 $\mathbb{R}^q$ 中的两个元素 y_α、y_β 映射成丛 E 中的同一个点，则有

$$\psi_{\alpha,p}^{-1}(y_\alpha) = \psi_{\beta,p}^{-1}(y_\beta) \quad \Leftrightarrow \quad g_{\beta\alpha}^p(y_\alpha) = y_\beta. \tag{7.2-1}$$

我们把 $\mathbb{R}^q$ 中的元素记成列矢量，即 $y = (y^1, \cdots, y^q)^T$；那么上式可以理解成：$GL(q)$ 是左作用在 $\mathbb{R}^q$ 上的李变换群. 有了这样的理解，很容易将矢量丛概念推广到一般纤维丛.

矢量丛定义7.4中的条件 (1) 和 (2) 结合起来说明，丛空间 E 可以看成一堆笛卡尔积空间 $\{U_\alpha \times \mathbb{R}^q\}$；并且当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \varnothing$ 时，$\forall p \in U_\alpha \cap U_\beta$，应该将纤维 $\{p\} \times \mathbb{R}^q \subset U_\alpha \times \mathbb{R}^q$ 和纤维 $\{p\} \times \mathbb{R}^q \subset U_\beta \times \mathbb{R}^q$ 粘合起来，粘合规则是(7.2-1)式.

由下面命题可见：矢量丛 $\pi : E \to M$ 在直观上可以想象为“植”在流形 M 上的一“簇”矢量空间；任一点 $p \in M$ 的纤维 $\pi^{-1}(p)$ 都是一个线性空间.

命题 7.6 设 $\pi : E \to M$ 是光滑流形 M 上秩为 q 的矢量丛，则在每一点 $p \in M$ 上的纤维 $\pi^{-1}(p)$ 有自然的线性结构，使它成为 q 维矢量空间.

证明 . 设 $p \in U_\alpha$，$\psi_\alpha^{-1} : U_\alpha \times \mathbb{R}^q \to \pi^{-1}(U_\alpha)$ 是局部平凡化映射. 在纤维 $\pi^{-1}(p)$ 中定义加法和数乘法如下：对于任意的 $v, w \in \pi^{-1}(p)$ 及 $\lambda \in \mathbb{R}$，令

$$v + \lambda \cdot w \overset{def}{=} \psi_{\alpha,p}^{-1}\big(\psi_{\alpha,p}(v) + \lambda \cdot \psi_{\alpha,p}(w)\big). \tag{7.2-2}$$

我们已知 $\psi_{\alpha,p}(v) \in \mathbb{R}^q$，故 $\psi_{\alpha,p}(v)$ 自身是线性空间 $\mathbb{R}^q$ 中的矢量；我们借助 $\psi_{\alpha,p}$、$\psi_{\alpha,p}^{-1}$ 是同胚映射，将这种线性结构传递至 $\pi^{-1}(p)$ 中. 很明显由式(7.2-2)定义的 $v + \lambda w$ 是纤维 $\pi^{-1}(p)$ 中的元素.

我们先证明：在 $\pi^{-1}(p)$ 中由式(7.2-2)定义的加法和数乘与局部平凡化 ψ_α 的选取无关. 实际上，若有 $p \in U_\alpha \cap U_\beta$，$\psi_\beta : \pi^{-1}(U_\beta) \to U_\beta \times \mathbb{R}^q$ 是另一个局部平凡化映射，则由定义7.4中的条件 (2) 可知，存在过渡函数 $g_{\beta\alpha}^p \in GL(q)$ 使得 $g_{\beta\alpha}^p = \psi_{\beta,p} \circ \psi_{\alpha,p}^{-1} : \mathbb{R}^q \to \mathbb{R}^q$，并且 $g_{\beta\alpha}^p$ 是左作用在 $\mathbb{R}^q$ 上的线性变换. 因此 $g_{\beta\alpha}^p \circ \psi_{\alpha,p} = \psi_{\beta,p} : \pi^{-1}(p) \to \mathbb{R}^q$. 因 $g_{\beta\alpha}^p$ 是线性变换，故有 $\psi_{\beta,p}(v) + \lambda \cdot \psi_{\beta,p}(w) = g_{\beta\alpha}^p \cdot \big(\psi_{\alpha,p}(v) + \lambda\psi_{\alpha,p}(w)\big)$. 由此式可得

$$\psi_{\beta,p}^{-1}\big(\psi_{\beta,p}(v) + \lambda\psi_{\beta,p}(w)\big) = \psi_{\beta,p}^{-1} \circ g_{\beta\alpha}^p\big(\psi_{\alpha,p}(v) + \lambda\psi_{\alpha,p}(w)\big) = \psi_{\alpha,p}^{-1}\big(\psi_{\alpha,p}(v) + \lambda\psi_{\alpha,p}(w)\big).$$

上式说明了：式(7.2-2)定义的加法和数乘与局部平凡化的选取无关.

接着，容易验证 $\pi^{-1}(p)$ 关于式(7.2-2)定义的加法和数乘满足线性空间的八条公理（留给读者），零元素是 $\psi_{\alpha,p}^{-1}(0)$. ■

在把 E 看成一堆积流形 $\{U_\alpha \times \mathbb{R}^q\}$ 并且同一点上的各条纤维保持线性关系地粘合起来的结果时，过渡函数族 $\{g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to GL(q)\}$ 起到核心的作用；它满足如下条件.

命题 7.7 **(1)** $g_{\alpha\alpha}^p = I$, $\forall p \in U_\alpha$，I 是 $q \times q$ 单位矩阵；

(2) 若 $U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma \neq \varnothing$，则 $\forall p \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ 有 $g_{\alpha\beta}^p \cdot g_{\beta\gamma}^p = g_{\alpha\gamma}^p$；

(3) 对于 $p \in U_\alpha \cap U_\beta$ 有 $g_{\alpha\beta}^p = (g_{\beta\alpha}^p)^{-1}$.

证明 . (1)：由定义，有 $g_{\alpha\alpha}^p = \psi_{\alpha,p} \circ \psi_{\alpha,p}^{-1} = \mathrm{id}$，自然对应 $q \times q$ 单位矩阵.

(2)：由定义，有 $g^p_{\alpha\beta}=\psi_{\alpha,p}\circ\psi^{-1}_{\beta,p}$，$g^p_{\beta\gamma}=\psi_{\beta,p}\circ\psi^{-1}_{\gamma,p}$. 所以当 $p\in U_\alpha\cap U_\beta\cap U_\gamma$ 时，有 $g^p_{\alpha\beta}\cdot g^p_{\beta\gamma}=g^p_{\alpha\beta}\circ g^p_{\beta\gamma}=\psi_{\alpha,p}\circ\psi^{-1}_{\gamma,p}=g^p_{\alpha\gamma}$.

(3)：在条件 (2) 中令 $\gamma=\alpha$，则 $g^p_{\alpha\beta}\cdot g^p_{\beta\alpha}=g^p_{\alpha\alpha}=I$，因此 $g^p_{\alpha\beta}=\left(g^p_{\beta\alpha}\right)^{-1}$.

这个命题对一般纤维丛的过渡函数族同样成立. ■

定理 7.8 设 M 是一个 m 维光滑流形，$\{U_\alpha:\alpha\in I\}$ 是 M 的一个开覆盖. 如果对于任意一对指标 $\alpha,\beta\in I$，在 $U_\alpha\cap U_\beta\neq\varnothing$ 时，都指定了一个光滑映射 $g_{\alpha\beta}:U_\alpha\cap U_\beta\to GL(q)$，使得它们满足命题7.7中的条件 (1) 和 (2)；则存在一个秩为 q 的矢量丛 (E,M,π)，以 $\{g_{\alpha\beta}:U_\alpha\cap U_\beta\to GL(q)\}$ 为它的过渡函数族.

证明 . 见定理7.30. 本定理说明过渡函数族是构造矢量丛的核心. ■

定义 7.9 设 (E,M,π) 是矢量丛，若 $s:M\to E$ 是一个 C^∞ 映射，并且满足 $\pi\circ s\equiv\mathrm{id}:M\to M$，则称映射 s 是矢量丛 E 的一个**截面**. 若 $s:U\to E$，其中 U 是 M 某坐标卡中的开集，则称映射 s 是定义在 U 上的**局部截面**. 光滑截面的集合记为 $\Gamma(E)$.

命题 7.10 设 $\pi:E\to M$ 是一个矢量丛，则截面空间 $\Gamma(E)$ 是一个 $C^\infty(M)$ - 模.

证明 . 命题7.6中已经证明矢量丛的每条纤维 $\pi^{-1}(p)$ 是与纤维型 $V\equiv\mathbb{R}^q$ 同构的线性空间；故可以逐点定义截面的加法和实值函数的乘法. 设 $s,t\in\Gamma(E)$，f 是 M 上的实值光滑函数，则 $\forall p\in M$，定义

$$(s+t)(p)\overset{def}{=}s(p)+t(p);\qquad (fs)(p)\overset{def}{=}f(p)\cdot s(p). \tag{7.2-3}$$

则 $s+t$、fs 仍是矢量丛 E 的光滑截面. 这便证明了 $\Gamma(E)$ 是 $C^\infty(M)$ - 模；$\Gamma(E)$ 自然也是实线性空间，通常是无穷维的. ■

设矢量丛 (E,M,π) 的秩为 q，$\{U_\alpha\}$ 是 M 的开覆盖. 用 $\{e_i\}$ 表示 $\mathbb{R}^q$ 的一组基底，则由局部平凡化映射，有

$$s_i^{(\alpha)}(p)=\psi_\alpha^{-1}(p,e_i),\qquad \forall p\in U_\alpha,\quad \alpha\text{固定},\quad 1\leqslant i\leqslant q. \tag{7.2-4}$$

便可得到 q 个映射 $s_i^{(\alpha)}:U_\alpha\to E$（$\alpha$ 固定）. 显然有 $\pi\circ s_i^{(\alpha)}=\mathrm{id}$. 这说明 $\{s_i^{(\alpha)}(p)\}$ 是 q 个矢量丛 E 上的局部截面；由于 $\{e_i\}$ 是线性无关的，则 $\{s_i^{(\alpha)}(p)\}$ 也是线性无关的. $\{s_i^{(\alpha)}(p)\}$ 称为定义在 U_α 上矢量丛 E 的**局部标架场**.

上述描述方式说明了 M 上的矢量丛 E 上一定存在 q 个局部标架场，但整个 M 上未必存在这样的标架场.

7.3 矢量丛例子

例 7.11 按照定义7.4，§4.7中叙述的 $\pi : TM \to M$ 是 M 上秩为 m 的矢量丛，称为微分流形 M 上的**切矢量丛**，简称**切丛**.

在 §4.7已经给出了切丛的微分结构；这个微分结构的局部坐标表达式为 (p, v)，其中 p 是底流形 M 上任意一点，v 是 T_pM 中任一矢量. 我们定义丛投影为 $\pi\big((p, v)\big) = p$. 由 §4.7式(4.7-6)

$$v^i = \tilde{v}^j \left.\frac{\partial x^i_\alpha}{\partial x^j_\beta}\right|_p \quad \Leftrightarrow \quad \tilde{v}^j = v^i \left.\frac{\partial x^j_\beta}{\partial x^i_\alpha}\right|_p \tag{4.7-6}$$

可知，过渡函数族 $g_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \to GL(q)$ 是局部坐标卡变换的 Jacobi 矩阵：

$$g_{\beta\alpha} = \psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1} = \frac{\partial x^j_\beta}{\partial x^i_\alpha}. \qquad \text{注意}g_{\beta\alpha}\text{是}m \times m\text{阶矩阵} \tag{7.3-1}$$

截面 s 是从 M 上一点 p 映射到切丛 TM 中的一个确定元素，需要注意只能选 TM 中一个元素，不可能多于一个；并且有 $\pi \circ s = \mathrm{id}$. 我们已知 TM 的局部平凡化是 $U_\alpha \times \mathbb{R}^m$；故 s 的像必然是 (p, y)，其中 $y \in \mathbb{R}^m$，$p \in U_\alpha$；很明显截面 s 就是**切矢量场**，换句话说切丛的截面与切矢量场是同义语. ■

例 7.12 设流形 M 是单位圆周，试表示其切丛.

M 的局部坐标为 $\{x\}$ 取为

$$x = \begin{cases} \theta & -\epsilon < \theta < \pi + \epsilon \quad \text{开集记为}U \\ \phi & \pi - \epsilon < \phi < 2\pi + \epsilon \quad \text{开集记为}V \end{cases} \qquad \text{其中} 0 < \epsilon < \frac{\pi}{2}$$

当 $U \cap V \neq \varnothing$ 时，两个坐标有 C^∞ 相容性关系：$\phi = \theta + \pi$. 容易算出此时的过渡函数族是 $g_{UV} = g_{VU} = 1$. 圆周上任一点的切矢量是 $c'(x) = (-\sin x,\ \cos x)$. $\forall p = (\cos x,\ \sin x) \in M$，令 $v_p = (-\sin x,\ \cos x)_p$. 那么我们可以定义单位圆周切丛的丛映射为 $\pi\big((p, v_p)\big) = p$，此切丛的局部平凡化是 $\psi\big(\pi^{-1}(p)\big) = (p, v_p)$. ■

例 7.13 余切丛 T^*M.

自然存在与切丛对偶的余切丛；我们较为详尽地描述它. 设 M 是 m 维光滑流形，$p \in M$ 点的余切空间记为 T^*_pM，记

$$T^*M \equiv \bigcup_{p \in M} T^*_pM = \{\omega \in T^*_pM \mid \forall p \in M\}. \tag{7.3-2}$$

T^*M 是流形 M 上全体余切矢量的集合．我们要给它赋予一个拓扑结构和微分结构，使它成为一个 $2m$ 维的光滑流形．与切丛情形类似，我们将略去如下证明：T^*M 是 Hausdorff 空间；T^*M 存在开覆盖 $\bigcup_{\alpha\in I}\pi^{-1}(U_\alpha)$，并且这族开覆盖构成 T^*M 的可数拓扑基．

下面建立 T^*M 拓扑．定义丛投影映射 $\pi: T^*M\to M$ 如下：

$$\pi(\omega)=p;\qquad \forall\omega\in T_p^*M,\quad p\in M.$$

这样，对每一个点 $p\in M$，都有 $\pi^{-1}(p)=T_p^*M$；容易看出映射 π 是满射．

设微分流形 M 有微分结构 $\mathscr{A}=\{(U_\alpha,\varphi_\alpha;x^i)\mid\alpha\in I\}$，令

$$\pi^{-1}(U_\alpha)\equiv\bigcup_{p\in U_\alpha}T_p^*M.$$

当 α 遍历整个指标集 I 后，便有 $\bigcup_{\alpha\in I}\pi^{-1}(U_\alpha)=T^*M$．很明显 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 是 T^*M 的子集；因 T_p^*M 是 m 维的，而点 $p\in U_\alpha$（U_α 是 m 维）又是可变动的，所以可知 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 是 $2m$ 维；进而 T^*M 也是 $2m$ 维的．

设 $(x_p^1,\cdots,x_p^m)$ 是 p 点在映射 φ_α 作用下的坐标；矢量 $\omega\in\pi^{-1}(U_\alpha)$ 可以在 p 点自然余切基矢 $\mathrm{d}x^i\big|_p$ 下展开，其分量是 $(\omega_1,\cdots,\omega_m)$．$\forall\alpha\in I$，定义局部平凡化 $\psi_\alpha:\pi^{-1}(U_\alpha)\to U_\alpha\times\mathbb{R}^m\xrightarrow{\varphi_\alpha}\varphi_\alpha(U_\alpha)\times\mathbb{R}^m$（其中 $\varphi_\alpha(U_\alpha)\subset\mathbb{R}^m$ 维数是 m）．

$$\psi_\alpha\left(\omega_i\,\mathrm{d}x^i\big|_p\right)\overset{def}{=}\left(x_p^1,\cdots,x_p^m,\omega_1,\cdots,\omega_m\right),\ \forall p\in U_\alpha,\ \omega\in\pi^{-1}(p).\tag{7.3-3}$$

因 $(x_p^1,\cdots,x_p^m)$ 与 $(\omega_1,\cdots,\omega_m)$ 都是可变动的，所以上述定义更好地说明了 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 是 $2m$ 维的．不难看出映射 ψ_α 是双射，其逆存在；我们可以规定 ψ_α 和 ψ_α^{-1} 是连续映射，相当于规定了 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 中的开集；这样，式(7.3-3)中的映射便是拓扑同胚的，它将 $\varphi_\alpha(U_\alpha)\times\mathbb{R}^m$ 中的（通常）拓扑携带到 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 中．很明显 $(\pi^{-1}(U_\alpha),\psi_\alpha)$ 是 T^*M 一个坐标卡，这样我们建立了 T^*M 的拓扑结构．

我们开始建立 T^*M 上的微分结构；只需验证坐标卡 $\left(\pi^{-1}(U_\alpha),\psi_\alpha\right)$ 是 C^∞ 相容的．实际上，$\pi^{-1}(U_\alpha)\cap\pi^{-1}(U_\beta)\neq\varnothing\ \Leftrightarrow\ U_\alpha\cap U_\beta\neq\varnothing$．当 $U_\alpha\cap U_\beta\neq\varnothing$ 时，设分别存在坐标卡 $(U_\alpha;x_\alpha^i)$ 和 $(U_\beta;x_\beta^i)$；则，它们间的坐标变换是 C^∞ 的，即 Jacobi 矩阵 $\frac{\partial x_\beta^j}{\partial x_\alpha^i}$ 是 $\{x_\alpha^i\}$ 的 C^∞ 函数，同样，其逆矩阵 $\frac{\partial x_\alpha^i}{\partial x_\beta^j}$ 也是 $\{x_\beta^j\}$ 的 C^∞ 函数．设 $p\in U_\alpha\cap U_\beta$，则式(7.3-3)中的 ω 在 p 点的表达式有两个等价描述：

$$\omega=\omega_i\,\mathrm{d}x_\alpha^i\big|_p=\tilde{\omega}_j\,\mathrm{d}x_\beta^j\big|_p$$

不难得到两者分量的变换关系：

$$\tilde{\omega}_j = \omega_i \left.\frac{\partial x^i_\alpha}{\partial x^j_\beta}\right|_p \quad \Leftrightarrow \quad \omega_i = \tilde{\omega}_j \left.\frac{\partial x^j_\beta}{\partial x^i_\alpha}\right|_p . \tag{7.3-4}$$

上述坐标变换关系中的 Jacobi 矩阵是 C^∞ 的，坐标 $(\omega_1, \cdots, \omega_m)$ 本身也是 C^∞ 的，那么坐标变换 $\omega_i \leftrightarrow \tilde{\omega}_j$ 是 C^∞ 的；而 $U_\alpha \cap U_\beta$ 自身的坐标变换 $x^i_\alpha \leftrightarrow x^j_\beta$ 本来就是 C^∞ 的；T^*M 坐标是由两者结合得到的 $(x^1, \cdots, x^m, \omega_1, \cdots, \omega_m)$，它的坐标变换自然也是 C^∞ 的. 由100页定义4.5中第二条和命题4.6可知，这个坐标卡集合是相容的，那么便建立了 T^*M 的 C^∞ 微分结构，从而它是微分流形了.

由式(7.3-4)可以直接看出余切丛的过渡函数族是

$$g_{\alpha\beta} = \frac{\partial x^j_\beta}{\partial x^i_\alpha}. \qquad \text{注意}g_{\alpha\beta}\text{是}m \times m\text{阶矩阵} \tag{7.3-5}$$

上式恰好是切丛过渡函数族的转置逆. ■

例 7.14 矢量丛 E 的对偶丛 E^*.

前面已经给出了切丛、余切丛的例子，它们是相互对偶的；下面详细叙述对偶丛的概念. 设 V^* 是 V 的对偶空间，E^* 是流形 M 上以 V^* 为纤维型的矢量丛，丛投影记作 $\tilde{\pi}$. 丛 E^* 的局部平凡化是 $\tilde{\psi}_\alpha : \tilde{\pi}^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times \mathbb{R}^q$；丛 E 的局部平凡化是 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times \mathbb{R}^q$. 如果对任意一点 $p \in U_\alpha \cap U_\beta \neq \varnothing$，当 $y_\alpha, y_\beta \in V$，$\lambda_\alpha, \lambda_\beta \in V^*$ 分别适合

$$\psi^{-1}_{\alpha,p}(y_\alpha) = \psi^{-1}_{\beta,p}(y_\beta), \qquad \tilde{\psi}^{-1}_{\alpha,p}(\lambda_\alpha) = \tilde{\psi}^{-1}_{\beta,p}(\lambda_\beta) \tag{7.3-6}$$

时，总是有

$$\langle y_\alpha, \lambda_\alpha \rangle = \langle y_\beta, \lambda_\beta \rangle . \tag{7.3-7}$$

则可定义纤维 $\pi^{-1}(p)$ 和 $\tilde{\pi}^{-1}(p)$ 之间的一个配合，使它们成为互相对偶的矢量空间. 纤维 $\pi^{-1}(p)$ 和 $\tilde{\pi}^{-1}(p)$ 的配合定义为

$$\left\langle \psi^{-1}_\alpha(p, y_\alpha),\ \tilde{\psi}^{-1}_\alpha(p, \lambda_\alpha) \right\rangle \overset{def}{=} \langle y_\alpha, \lambda_\alpha \rangle . \tag{7.3-8}$$

这与 U_α 的选取是无关的（验证见后）. 这时我们称矢量丛 E^* 为 E 的对偶丛.

若在 V 和 V^* 中分别取彼此对偶的基底，V 中元素 y 记作列矢量，V^* 中元素 λ 记作行矢量，则 V 和 V^* 的配合表现为矩阵乘法（注 $\langle y, \lambda \rangle = \langle \lambda, y \rangle$）：

$$\langle y, \lambda \rangle = \lambda \cdot y = (\lambda^1, \cdots, \lambda^q)(y^1, \cdots, y^q)^T.$$

由(7.3-6)的第一式得 $y_\beta = g^p_{\beta\alpha}\cdot y_\alpha$；把它代入式(7.3-7)得到

$$\langle y_\alpha, \lambda_\alpha\rangle = \lambda_\alpha\cdot y_\alpha = \lambda_\alpha\cdot (g^p_{\beta\alpha})^{-1}\cdot y_\beta \quad 且 \quad \lambda_\beta\cdot y_\beta = \langle y_\beta,\lambda_\beta\rangle,$$

由上式可以得到：

$$\lambda_\beta = \lambda_\alpha\cdot (g^p_{\beta\alpha})^{-1} \xrightarrow[7.7(3)]{\text{命题}} \lambda_\alpha\cdot g^p_{\alpha\beta}. \tag{7.3-9}$$

如果仍把 V^* 看作一般的线性空间，把其中元素记成列矢量，$GL(V^*)$ 的元素左作用在 V^* 上．则由上式可以得到 E^* 的过渡函数是

$$h_{\beta\alpha} = (g^p_{\alpha\beta})^T \quad \in GL(q). \tag{7.3-10}$$

容易验证 $h_{\beta\alpha}$ 满足命题7.7中的条件．

下面验证式(7.3-8)右端的数值与局部平凡化 ψ_α、$\tilde\psi_\alpha$ 的取法无关．若另有 U_β 包含点 p，则 $U_\alpha\cap U_\beta\neq\varnothing$，且

$$y_\beta = g_{\beta\alpha}\cdot y_\alpha;\quad \lambda_\beta = h_{\beta\alpha}\cdot\lambda_\alpha = (g_{\alpha\beta})^T\cdot\lambda_\alpha. \qquad y,\lambda\text{都是列矢量}$$

这样（下式中 y 是列矢量，λ 是行矢量）

$$\begin{aligned}&\left\langle \psi^{-1}_\beta(p,y_\beta),\ \tilde\psi^{-1}_\beta(p,\lambda_\beta)\right\rangle = \langle y_\beta,\lambda_\beta\rangle = \lambda_\beta\cdot y_\beta = (\lambda_\alpha\cdot g_{\alpha\beta})\cdot(g_{\beta\alpha}\cdot y_\alpha)\\ =&\lambda_\alpha\cdot g_{\alpha\alpha}\cdot y_\alpha = \langle y_\alpha,\lambda_\alpha\rangle = \left\langle \psi^{-1}_\alpha(p,y_\alpha),\ \tilde\psi^{-1}_\alpha(p,\lambda_\alpha)\right\rangle.\end{aligned}$$

由此可见，式(7.3-8)给出了矢量空间 $\pi^{-1}(p)$ 和 $\tilde\pi^{-1}(p)$ 之间的一个确定的配合，它关于每一个自变量都是线性的，且与局部平凡化（就是局部坐标卡）取法无关；因此 $\pi^{-1}(p)$ 和 $\tilde\pi^{-1}(p)$ 是相互对偶的矢量空间．

当 E 是 M 上的切丛 TM 时，其过渡函数族 $\{g_{\alpha\beta}\}$ 是坐标变换的 Jacobi 矩阵．余切丛 T^*M 的过渡函数族恰好是 $g_{\alpha\beta}$ 的转置逆矩阵，所以余切丛、切丛是相互对偶丛． ■

例 7.15 矢量丛的直和．

设 $\pi: E\to M$、$\tilde\pi:\tilde E\to M$ 是 M 上的两个矢量丛，纤维型空间分别是 V、$\tilde V$，过渡函数族分别是 $\{g_{\alpha\beta}\}$、$\{\tilde g_{\alpha\beta}\}$．命

$$h_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} g_{\alpha\beta} & 0\\ 0 & \tilde g_{\alpha\beta}\end{pmatrix}.$$

它是左作用在直和空间 $V\oplus\tilde{V}$ 上的线性自同构，对于 $y\in V$、$\tilde{y}\in\tilde{V}$，有

$$h_{\alpha\beta}\cdot(y_\beta\oplus\tilde{y}_\beta)=h_{\alpha\beta}\cdot\begin{pmatrix}y_\beta & 0\\ 0 & \tilde{y}_\beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}g_{\alpha\beta}\cdot y_\beta & 0\\ 0 & \tilde{g}_{\alpha\beta}\cdot\tilde{y}_\beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}y_\alpha & 0\\ 0 & \tilde{y}_\alpha\end{pmatrix}.$$

很明显，函数族 $\{h_{\alpha\beta}:U_\alpha\cap U_\beta\to GL(V\oplus\tilde{V})\}$ 满足命题7.7中的条件 (1) 和 (2)；因此，根据定理7.8在 M 上存在以 $\{h_{\alpha\beta}\}$ 为过渡函数族、以 $V\oplus\tilde{V}$ 为纤维型的矢量丛，记作 $E\oplus\widetilde{E}$，称为矢量丛 E 和 $\widetilde{E}$ 的直和. ■

例 7.16 矢量丛的张量积.

假定矢量丛 E、$\tilde{E}$ 如例7.15所述. 用 $h_{\alpha\beta}$ 表示线性变换 $g_{\alpha\beta}$ 和 $\tilde{g}_{\alpha\beta}$ 的张量积，它左作用在张量积 $V\otimes\tilde{V}$ 上，其定义是：对于 $v\in V$、$\tilde{v}\in\tilde{V}$，有

$$h_{\alpha\beta}\cdot(v\otimes\tilde{v})\overset{def}{=}(g_{\alpha\beta}\cdot v)\otimes(\tilde{g}_{\alpha\beta}\cdot\tilde{v}).$$

容易验证，函数族 $\{h_{\alpha\beta}:U_\alpha\cap U_\beta\to GL(V\otimes\tilde{V})\}$ 满足命题7.7中的条件 (1)、(2). 因此，根据定理7.8在 M 上存在以 $\{h_{\alpha\beta}\}$ 为过渡函数族、以 $V\otimes\tilde{V}$ 为纤维型的矢量丛，记作 $E\otimes\tilde{E}$，称为矢量丛 E 和 $\tilde{E}$ 的张量积. ■

例 7.17 光滑流形上的张量丛.

在例7.11、7.13已经给出切丛、余切丛的示例，下面用矢量丛的张量积来构造一般的张量丛；这也是例7.16的一个应用. 我们仅以 $\binom{1}{1}$ 型张量丛为例来说明. 令 V_1^1 表示 $\mathbb{R}^m$ 上的 $\binom{1}{1}$ 型张量空间；显然它可以表示成

$$V_1^1=\mathrm{Span}_{\mathbb{R}}\left\{\frac{\partial}{\partial x^k}\otimes\mathrm{d}x^j\right\}.$$

这是切空间和余切空间的张量积. 过渡函数族是

$$g_{\alpha\beta}=\frac{\partial x^l_\alpha}{\partial x^k_\beta}\otimes\frac{\partial x^j_\beta}{\partial x^i_\alpha}.\qquad\text{矩阵张量积；}\alpha,\beta\text{不求和}$$

有了纤维型和过渡函数族，由例7.16可知存在由 1 个切丛与 1 个余切丛构成的张量积，它就是 $\binom{1}{1}$ 型张量丛. 这个张量丛自然可以拓展到 $\binom{r}{s}$ 型，即

$$T^r_s(M)=\bigcup_{p\in M}T^r_s(p);\qquad T^r_s(p)\text{是}p\in M\text{点的张量}$$

张量丛的光滑截面是光滑张量场. ■

7.4 矢量丛联络

联络的概念可以推广到任意矢量丛，下面会看到而光滑流形上的联络定义6.1恰好是该流形的切丛上的联络．矢量丛上的联络提供了对矢量丛的任意光滑截面求微分的手段，或者说联络就是截面的协变导数．

定义 7.18 设 (E,M,π) 是流形 M 上的一个矢量丛，$\Gamma(E)$ 是该矢量丛光滑截面的集合．矢量丛 E 上的一个**联络** ∇ 是指存在映射 $\nabla:\Gamma(E)\times\mathfrak{X}(M)\to\Gamma(E)$．并且此映射满足以下条件：$\forall X,Y\in\mathfrak{X}(M)$，$\forall\xi,\eta\in\Gamma(E)$，$\forall c\in\mathbb{R}$，及 $\forall f\in C^\infty(M)$，有如下三条公理成立（令 $\nabla(\xi,X)\equiv\nabla_X\xi$ ，**协变导数**）．

(1) $\mathbb{R}$ 线性：$\nabla_X(\xi+c\eta)\overset{def}{=}\nabla_X\xi+\nabla_X(c\eta)\equiv\nabla_X\xi+c\nabla_X\eta$；

(2) 加法：$\nabla_{X+fY}\xi\overset{def}{=}\nabla_X\xi+\nabla_{fY}\xi\equiv\nabla_X\xi+f\nabla_Y\xi$；

(3) $\nabla_X(f\xi)\overset{def}{=}(\nabla_X f)\xi+f\nabla_X\xi\equiv X(f)\xi+f\nabla_X\xi$．

定义7.18中的条件 (2) 表明 $\nabla_X\xi$ 关于自变量 X 有张量性质，于是可以把联络 ∇ 看作映射 $\nabla:\Gamma(E)\to\Gamma(T^*M\otimes E)$，使得 $(\nabla\xi)(X)=\nabla_X\xi$，$\forall\xi\in\Gamma(E),X\in\mathfrak{X}(M)$ 成立．

在矢量丛 (E,M,π) 上，定义7.18所描述的联络是否存在？见下．

定理 7.19 设 (E,M,π) 是任意矢量丛，则矢量丛 E 上必定存在一个联络．

证明 . 请参考[70]p.104定理 1.1．由此可知矢量丛联络必然存在，且不止一个．这个定理证明过程会用到式(7.4-12)，这是该式重要的原因之一． ■

与命题6.7类似，矢量丛上的联络也有局部性定理（证明也类似，略）；见下．

命题 7.20 设 ∇ 是矢量丛 (E,M,π) 上的一个联络，$\xi,\eta\in\Gamma(E)$，$X,Y\in\mathfrak{X}(M)$，U 是 M 上的一个开集．若 $\xi|_U=\eta|_U$，$X|_U=Y|_U$；则 $(\nabla_X\xi)|_U=(\nabla_Y\eta)|_U$．

7.4.1 张量丛联络

有了矢量丛联络定义，我们先看一下之前给出的仿射联络定义．若 (E,M,π) 中的 E 是 M 的切丛，则定义7.18中的 ∇ 是 M 上切矢场的联络6.1．若 (E,M,π) 中的 E 是 M 的张量丛，则定义7.18中的 ∇ 是 M 上张量场的联络．因切丛、张量丛是两个不同的矢量丛，故它们的联络也不相同；这正是我们将仿射联络分成两个定义（6.1、6.2）的原因．定义6.1只是切丛上的联络，原则上它不能作用在张量场上；定义6.2中额外附加了几个条件，于是将定义6.1拓展到了张量场．

接下来，我们从另外一个角度再次探讨张量场上的联络．例7.15和7.16给出了矢量丛的直和与张量积；此操作也可以拓展到矢量丛联络．设 $\nabla^{(i)}$ 是矢量丛 (E_i, M, π_i)（$i=1,2$）上的联络．由 E_1 和 E_2 可以构造矢量丛的直和 $E_1\oplus E_2$ 和张量积 $E_1\otimes E_2$．我们要给出 $\nabla^{(1)}$ 和 $\nabla^{(2)}$ 在这两个矢量丛上的诱导联络；对于任意的 $X\in\mathfrak{X}(M)$，和对于任意的 $\xi_i\in\Gamma(E_i)$，极其自然地定义：

$$\nabla_X(\xi_1\oplus\xi_2)\overset{def}{=}\left(\nabla^{(1)}_X\xi_1\right)\oplus\nabla^{(2)}_X\xi_2, \tag{7.4-1}$$

$$\nabla_X(\xi_1\otimes\xi_2)\overset{def}{=}\left(\nabla^{(1)}_X\xi_1\right)\otimes\xi_2+\xi_1\otimes\nabla^{(2)}_X\xi_2. \tag{7.4-2}$$

容易验证：上面两个映射满足定义7.18中的三个公理，因而是矢量丛 $E_1\oplus E_2$ 和 $E_1\otimes E_2$ 上的联络．我们规定式(7.4-2)中 ∇_X 与缩并运算可对易．

例 7.21 对偶丛 $(E^*, M, \tilde{\pi})$ 上的联络 ∇^*（导出后，将 ∇^* 简记为 ∇）．

设 $\alpha\in\Gamma(E)$，$\alpha^*\in\Gamma(E^*)$，两者的配合是 $\langle\alpha^*,\alpha\rangle\equiv\alpha^*(\alpha)$．目前我们并不清楚 $\nabla^*_X\alpha^*$ 是如何定义的，下面导出它．对于任意的 $X\in\mathfrak{X}(M)$，有

$$\nabla_X(\alpha^*\otimes\alpha)\overset{7.4-2}{=\!=\!=}(\nabla^*_X\alpha^*)\otimes\alpha+\alpha^*\otimes\nabla_X\alpha.$$

令 α^* 与 α 缩并（也就是求配合），可得标量函数场 $C(\alpha^*\otimes\alpha)=\alpha^*(\alpha)$；而 $\nabla_X\big(\alpha^*(\alpha)\big)=X\big(\alpha^*(\alpha)\big)$；再利用缩并与 ∇_X 可对易，由上式得

$$(\nabla^*_X\alpha^*)(\alpha)=X\big(\alpha^*(\alpha)\big)-\alpha^*\big(\nabla_X\alpha\big). \tag{7.4-3}$$

通过上面操作得到了一个映射 $(\alpha^*,X)\to\nabla^*_X\alpha^*$，容易看出映射 ∇^* 是从笛卡尔积 $\Gamma(E^*)\times\mathfrak{X}(M)$ 到对偶丛截面 $\Gamma(E^*)$ 的一个联络（请读者验证式(7.4-3)中的 ∇^*_X 满足定义7.18）；称 ∇^* 为与矢量丛联络 ∇ 相互对偶的对偶丛联络． ■

有了张量积上联络定义(7.4-2)以及对偶丛上的联络(7.4-3)，我们再来看看张量丛上联络与切丛联络的关系．注意到切丛、余切丛相互对偶，故从联络(7.4-3)可得余切丛的联络．现在有了切矢量场的联络，以及余切矢量场的联络，我们利用式(7.4-2)可以得到任意张量丛 $T^p_q(M)$ 上的联络．张量丛 $T^p_q(M)$ 是 p 个 TM 与 q 个 T^*M 构成的张量积矢量丛，对于任意的 $\tau\in\Gamma(T^p_q(M))=\mathfrak{T}^p_q(M)$，$\nabla_X\tau$ 结果便是式(6.1-20)，请读者补齐计算．

至此，我们详细讨论了矢量丛上联络与我们之前定义的仿射联络之间的联系；结论很简单：把矢量丛上的联络用到张量丛上自然得到了定义6.1、6.2．

7.4.2 局部标架表示

设 (E,M,π) 是一个秩为 q 的矢量丛，U 是 M 的任意一个非空开子集，$\tilde{\pi}$ 是 π 在 $\pi^{-1}(U)$ 上的限制，则有矢量丛 E 在 U 上的限制：$\tilde{\pi}:E|_U=\pi^{-1}(U)\to U$.

利用矢量丛联络的局部性定理不难知道，从 E 上的联络 ∇ 可以诱导出局部开集 $E|_U$ 上的联络. 若在 $U\subset M$ 上存在局部切标架场 $\{e_i,\ 1\leqslant i\leqslant m\}$，其余切标架场是 $\{e^{*i},\ 1\leqslant i\leqslant m\}$；以及矢量丛 $E|_U$ 上的局部标架场 $\{s_\alpha,\ 1\leqslant\alpha\leqslant q\}$，$s^{*\alpha}$ 是其对偶标架场；那么对于 $X\in\mathfrak{X}(M)$，$\xi\in\Gamma(E)$，可设

$$X|_U=\sum_{i=1}^m X^ie_i,\quad \xi|_U=\sum_{\alpha=1}^q\xi^\alpha s_\alpha,\qquad \text{其中 } X^i,\xi^\alpha\in C^\infty(U).$$

可以假定

$$\nabla_{e_i}s_\alpha\overset{def}{=}\Gamma^\beta_{\alpha i}s_\beta,\qquad \text{其中 } \Gamma^\beta_{\alpha i}\in C^\infty(U). \tag{7.4-4}$$

$\Gamma^\beta_{\alpha i}$ 称为联络 ∇ 在标架场 $\{e_i\}$ 及 $\{s_\alpha\}$ 下的**联络系数**.

根据联络的条件，有

$$\begin{aligned}(\nabla_X\xi)|_U=&\nabla_{X|_U}(\xi|_U)=X^i\nabla_{e_i}(\xi^\alpha s_\alpha)=X^i\big((\nabla_{e_i}\xi^\alpha)s_\alpha+\xi^\alpha\nabla_{e_i}s_\alpha\big)\\ \overset{7.4-4}{=\!=\!=}&\sum\nolimits_{\alpha,\beta=1}^q\sum\nolimits_{i=1}^m X^i\big(e_i(\xi^\alpha)+\xi^\beta\Gamma^\alpha_{\beta i}\big)s_\alpha.\end{aligned} \tag{7.4-5}$$

式(7.4-5)为协变导数 $\nabla_X\xi$ 在局部标架场下的表达式. 记

$$\omega^\alpha{}_\beta\equiv\sum\nolimits_{i=1}^m\Gamma^\alpha_{\beta i}e^{*i}\quad\Leftrightarrow\quad\langle\omega^\alpha{}_\beta,\ e_i\rangle=\Gamma^\alpha_{\beta i}.\qquad\langle\cdot,\cdot\rangle\text{ 是配合} \tag{7.4-6}$$

$\omega^\alpha{}_\beta$ 称为联络 ∇ 在局部标架场 $\{s_\alpha\}$ 下的**联络型式** [1]. 则

$$\nabla s_\alpha=s_\beta\omega^\beta{}_\alpha,\quad\text{及}\quad\nabla_{e_i}s_\alpha=s_\beta\langle\omega^\beta{}_\alpha,\ e_i\rangle=\langle s_\beta\omega^\beta{}_\alpha,\ e_i\rangle. \tag{7.4-7}$$

上式中用到了

$$\nabla_{e_i}(\cdots)\equiv\langle\nabla(\cdots),\ e_i\rangle. \tag{7.4-8}$$

并且由式(7.4-5)可得

$$(\nabla\xi)|_U=\big(\mathrm{d}\xi^\beta+\xi^\alpha\omega^\beta{}_\alpha\big)\,s_\beta. \tag{7.4-9}$$

这是协变微分 $\nabla\xi$ 在局部标架场 $\{s_\alpha\}$ 下的表达式.

[1] 如果用抽象指标表示此联络型式，则为 $\big(\omega^\alpha{}_\beta\big)_a=\sum_{i=1}^m\Gamma^\alpha_{\beta i}(e^i)_a,\quad 1\leqslant i\leqslant m,\ 1\leqslant\alpha,\beta\leqslant q$. 同时需要注意 $(e^i)_a\in\mathfrak{X}^*(U)$，不是丛空间 E 上的对偶矢量.

若 $\{\tilde{s}_\alpha\}$ 是矢量丛 E 在 U 上的另一个局部标架场，设

$$\tilde{s}_\alpha = a^\beta{}_\alpha s_\beta, \qquad \nabla\tilde{s}_\alpha = \tilde{\omega}^\beta{}_\alpha \tilde{s}_\beta. \quad \text{其中 } a^\beta{}_\alpha \in C^\infty(U) \tag{7.4-10}$$

在 U 上的每一点处 $\det\left(a^\beta{}_\alpha\right) > 0$，用以保证标架场定向相同．则有

$$\nabla\tilde{s}_\alpha = (\mathrm{d}a^\beta{}_\alpha)s_\beta + a^\beta{}_\alpha \nabla s_\beta = \left(\mathrm{d}a^\beta{}_\alpha + a^\gamma{}_\alpha \omega^\beta{}_\gamma\right) s_\beta. \tag{7.4-11}$$

与式(7.4-10)的第二式相比较，可得

$$a^\beta{}_\gamma \tilde{\omega}^\gamma{}_\alpha = \mathrm{d}a^\beta{}_\alpha + \omega^\beta{}_\gamma a^\gamma{}_\alpha \;\Leftrightarrow\; \tilde{\omega}^\sigma{}_\alpha = (a^{-1})^\sigma{}_\beta \mathrm{d}a^\beta{}_\alpha + (a^{-1})^\sigma{}_\beta \omega^\beta{}_\gamma a^\gamma{}_\alpha. \tag{7.4-12}$$

式(7.4-12)是联络型式在局部标架场变换下的变换公式．此式与(6.3-17)相似，该式只适用于切标架丛；式(7.4-12)适用于矢量丛（包含切标架丛）．

例 7.22 矢量丛截面的平行．

设 ∇ 是矢量丛 (E, M, π) 上的一个联络，令 $p \in M$．$\forall \xi \in \Gamma(E)$，$\forall v \in T_pM$，$\nabla_v \xi$ 是光滑截面 ξ 在 p 点沿切矢量 v 的协变导数．另外，对于 M 中的光滑曲线 $\gamma : [0, b] \to M$，如果 $\xi \in \Gamma(E)$ 满足 $\nabla_{\gamma'(t)}\xi = 0,\ \forall t \in [0, b]$，则称光滑截面 ξ 沿曲线 γ 是**平行**的；当然，此时只需要 ξ 沿 γ 有定义即可．类似于仿射联络空间，对于任意的 $p \in M$，还可以定义矢量 $\xi \in \pi^{-1}(p)$ 沿底流形 M 上从 p 出发的光滑曲线 γ 的平行移动，从而得到在两个不同点 $p, q \in M$ 处的纤维 $\pi^{-1}(p)$ 和 $\pi^{-1}(q)$ 之间的线性同构，该同构与连接 p, q 的光滑曲线 γ 有关．这种推广并不困难，不再赘述． ■

例 7.23 对偶丛联络的局部表示．

把式(7.4-3)的截面分别取成标架，$X \to e_i$，有

$$(\nabla_{e_i} s^{*\alpha})(s_\beta) = e_i\left(s^{*\alpha}(s_\beta)\right) - s^{*\alpha}\left(\nabla_{e_i} s_\beta\right) = -s^{*\alpha}\left(\Gamma^\gamma_{\beta i} s_\gamma\right) = -\Gamma^\alpha_{\beta i}. \tag{7.4-13}$$

从外在形式上来看，上述公式与仿射联络的公式(6.1-11)完全相同． ■

7.4.3 拉回丛上的诱导联络

设 M、N 是光滑流形，维数分别为 m、n；$M \xrightarrow{\phi} N$ 是光滑浸入映射．命

$$\phi^*TN \equiv \bigcup_{p\in M} \{p\} \times T_{\phi(p)}N. \tag{7.4-14}$$

则 ϕ^*TN 是流形 M 上秩为 n 的矢量丛（证明见后）；称为切丛 TN 通过映射 ϕ 拉回到 M 上的矢量丛，简称**拉回丛**. 拉回丛 ϕ^*TN 的截面称为 N 中**沿映射** ϕ **定义的切矢量场**.

下面证明 ϕ^*TN 是流形 M 上秩为 n 的矢量丛. 定义丛投影 $\pi:\phi^*TN\to M$ 使得对于任意 $p\in M$ 有 $\pi\big(\{p\}\times T_{\phi(p)}\big)=\{p\}$. 任取 N 的一族局部坐标系 $\mathcal{V}=\{(V_a;y^\lambda)\mid a\in J\}$，使得 $\phi(M)\subset\cup_{a\in J}V_a$. 再取 M 的一族局部坐标系 $\mathcal{U}=\{(U_\alpha;x^i)\mid\alpha\in I\}$，对于任意点 $p\in M$，存在包含 p 的局部坐标卡 $(U_p;x^i_p)$ 以及 $\alpha\in I$，使得 $U_p\subset U_\alpha$ 成立.

我们在纤维 $\pi^{-1}(U_p)$ 上引入如下局部坐标系 $\big(x^i_p(q,v),v^\lambda_p(q,v)\big)$，其中 $1\leqslant i\leqslant m$，$1\leqslant\lambda\leqslant n$；坐标由

$$x^i_p(q,v)=x^i_p(q),\quad v=v^\lambda_p(q,v)\left.\frac{\partial}{\partial y^\lambda_\alpha}\right|_{\phi(q)},\qquad\forall(p,v)\in\pi^{-1}(U_p)$$

来确定. 可以证明 $\{U_p;(x^i_p,v^\lambda_p)\mid p\in M\}$ 是 ϕ^*TN 的一个开覆盖，也就确定了 ϕ^*TN 的一个微分结构，使之成为微分流形. $\forall\alpha\in I$，定义局部平凡化映射为

$$\psi_\alpha\left(p,\ v^\lambda\left.\frac{\partial}{\partial y^\lambda_\alpha}\right|_{\phi(p)}\right)=(p,v^\lambda);\qquad\forall p\in U_\alpha,\quad(v^\lambda)\in\mathbb{R}^n.$$

显然，ψ_α 是光滑同胚. ϕ^*TN 的局部开覆盖 $\{U_p;(x^i_p,v^\lambda_p)\mid p\in M\}$，以及局部平凡化映射即可使得 ϕ^*TN 成为流形 M 上的一个秩为 n 的矢量丛.

下面讨论**拉回丛上的诱导联络**. 设 N 上有仿射联络 D，借助它能够在 ϕ^*TN 上引入诱导联络 ∇，具体构造如下. 对于任意 $\xi\in\Gamma(\phi^*TN)$ 和 $p\in M$，取 N 在点 $\phi(p)\in N$ 的开邻域 V 以及 M 在点 p 的邻域 U 使得 $\phi(U)\subset V$，并在 V 上取局部标架场 $\{e_\alpha\}$. 则在邻域 U 上 ξ 可以表示为 $\xi|_U=\xi^\alpha\cdot e_\alpha$，其中 $\xi^\alpha\in C^\infty(U)(1\leqslant\alpha\leqslant n)$. $\forall X\in T_pM$，构造**拉回丛上的诱导联络**为：

$$\nabla_X\xi\overset{def}{=}X(\xi^\alpha)e_\alpha\big(\phi(p)\big)+\xi^\alpha(p)\mathrm{D}_{\phi_*(X(p))}e_\alpha\big(\phi(p)\big)\quad\in\pi^{-1}(p).\tag{7.4-15}$$

可以证明上式右端与局部标架场 $\{e_\alpha\}$ 的选取无关（见后）. 如果 $X\in\mathfrak{X}(M)$，则式(7.4-15)给出的 $\nabla_X\xi$ 是拉回丛 $\pi:\phi^*TN\to M$ 的光滑截面. 于是，得到映射 $\nabla:\Gamma(\phi^*TN)\times\mathfrak{X}(M)\to\Gamma(\phi^*TN)$. 不难验证，式(7.4-15)给出的映射 ∇ 满足定义7.18中的所有条件，因而是矢量丛 ϕ^*TN 上的一个联络.

现证明此定义与局部标架场 $\{e_\alpha\}$ 选取无关．设另有标架场 $\{\tilde{e}_\sigma\}$，它们之间存在变换关系 $\tilde{e}_\sigma = e_\alpha A^\alpha{}_\sigma \Leftrightarrow \tilde{e}_\sigma B^\sigma{}_\alpha = e_\alpha$（$A = B^{-1}$）．则 ϕ 上矢量场 ξ 可展为

$$\xi = e_\alpha \xi^\alpha = \tilde{e}_\sigma \tilde{\xi}^\sigma = e_\alpha A^\alpha{}_\sigma \tilde{\xi}^\sigma = \tilde{e}_\sigma B^\sigma{}_\alpha \xi^\alpha. \tag{7.4-16}$$

将上式代入诱导联络(7.4-15)，有（为节省空间，省略后缀 $\phi(p)$、p 等；拉回丛 ϕ^*TN 上的标架场 e_α 和变换系数 A、B 在 $\phi(p)$ 处取值，系数 ξ^α 在 p 点取值）

$$\begin{aligned}
\nabla_X \xi =& X(\xi^\alpha) e_\alpha\big(\phi(p)\big) + \xi^\alpha(p) \mathrm{D}_{\phi_*(X(p))} e_\alpha\big(\phi(p)\big) \\
=& X\left(A^\alpha{}_\sigma \tilde{\xi}^\sigma\right) \tilde{e}_\rho B^\rho{}_\alpha + A^\alpha{}_\sigma \tilde{\xi}^\sigma \mathrm{D}_{\phi_* X}\big(\tilde{e}_\rho B^\rho{}_\alpha\big) \\
=& X\left(A^\alpha{}_\sigma\right) \tilde{\xi}^\sigma \tilde{e}_\rho B^\rho{}_\alpha + X(\tilde{\xi}^\rho) \tilde{e}_\rho + \tilde{\xi}^\rho \mathrm{D}_{\phi_* X}\big(\tilde{e}_\rho\big) + A^\alpha{}_\sigma \tilde{\xi}^\sigma \tilde{e}_\rho X(B^\rho{}_\alpha \circ \phi) \\
=& \tilde{\xi}^\sigma \tilde{e}_\rho \big(X(A^\alpha{}_\sigma) B^\rho{}_\alpha + A^\alpha{}_\sigma X(B^\rho{}_\alpha)\big) + X(\tilde{\xi}^\rho) \tilde{e}_\rho + \tilde{\xi}^\rho \mathrm{D}_{\phi_* X}\big(\tilde{e}_\rho\big) \\
=& \tilde{\xi}^\sigma \tilde{e}_\rho X(\delta^\rho_\sigma) + X(\tilde{\xi}^\rho) \tilde{e}_\rho + \tilde{\xi}^\rho \mathrm{D}_{\phi_* X}\big(\tilde{e}_\rho\big) = X(\tilde{\xi}^\rho) \tilde{e}_\rho + \tilde{\xi}^\rho \mathrm{D}_{\phi_* X}\big(\tilde{e}_\rho\big).
\end{aligned}$$

这便证明了诱导联络定义与标架场选取无关．

注意到，对于任意的 $X \in \mathfrak{X}(M), \phi_*(X) \in \Gamma(\phi^*TN)$．现在进一步假定 N 是广义黎曼流形，则 D 是相应的 Levi-Civita 联络（见 §8.1.1）．则根据联络 ∇ 的构造以及 Levi-Civita 联络 D 的性质，可以证明下面两个恒等式：

$$X\langle \xi, \eta \rangle = \langle \nabla_X \xi, \eta \rangle + \langle \xi, \nabla_X \eta \rangle, \ \forall X \in \mathfrak{X}(M), \ \xi, \eta \in \Gamma(\phi^*TN). \tag{7.4-17}$$

$$\phi_*([X, Y]) = \nabla_X \phi_*(Y) - \nabla_Y \phi_*(X), \quad \forall X, Y \in \mathfrak{X}(M). \tag{7.4-18}$$

第一个式子说明度规与诱导联络是相容的，第二个式子说明诱导联络是无挠的．

继续采用式(7.4-15)中记号．在 TN 上，有

$$\mathrm{D}_{\phi_* X} \xi = \phi_* X \left(\xi^\alpha\big(\phi(p)\big)\right) e_\alpha\big(\phi(p)\big) + \xi^\alpha\big(\phi(p)\big) \mathrm{D}_{\phi_* X} e_\alpha\big(\phi(p)\big). \tag{7.4-19}$$

因 ϕ 是浸入映射，故在局部上它是单一的；由此我们可以认为：$U \subset M$ 局部微分同胚于 $\phi(U) \subset V \subset N$．因此，在这个认同下，有

$$\nabla_X \xi = \mathrm{D}_{\phi_* X} \xi. \tag{7.4-20}$$

先证诱导联络与度规相容．

$$X\langle \xi, \eta \rangle = \nabla_X \langle \xi, \eta \rangle = \mathrm{D}_{\phi_* X} \langle \xi, \eta \rangle = \langle \mathrm{D}_{\phi_* X} \xi, \eta \rangle + \langle \xi, \mathrm{D}_{\phi_* X} \eta \rangle = \langle \nabla_X \xi, \eta \rangle + \langle \xi, \nabla_X \eta \rangle.$$

再证诱导联络无挠．可设 $\phi_*X=X^\alpha e_\alpha$、$\phi_*Y=Y^\beta e_\beta$．

$$\begin{aligned}\nabla_X(\phi_*Y)-\nabla_Y(\phi_*X)&=\big(X^\alpha e_\alpha(Y^\sigma)\big)e_\sigma+Y^\pi X^\alpha\nabla_{e_\alpha}e_\pi\\&\quad-\big(Y^\alpha e_\alpha(X^\sigma)\big)e_\sigma-X^\pi Y^\alpha\nabla_{e_\alpha}e_\pi\\&=\Big(X^\alpha e_\alpha(Y^\sigma)+Y^\pi X^\alpha\Gamma^\sigma_{\pi\alpha}-Y^\alpha e_\alpha(X^\sigma)-X^\pi Y^\alpha\Gamma^\sigma_{\pi\alpha}\Big)e_\sigma\\&=\Big(X^\alpha e_\alpha(Y^\sigma)-Y^\alpha e_\alpha(X^\sigma)+X^\alpha Y^\pi\big(\Gamma^\sigma_{\pi\alpha}-\Gamma^\sigma_{\alpha\pi}\big)\Big)e_\sigma\\&\overset{8.7-16}{=\!=\!=}\big[\phi_*X,\phi_*Y\big]\overset{\text{定理}\ 4.65}{=\!=\!=}\phi_*[X,Y].\end{aligned}$$

例 7.24 浸入曲线例子．

设 $\gamma:[a,b]\to N$ 是仿射联络空间 (N,D) 上的正则光滑曲线，即切矢量 γ' 处处不为零；则 γ 在局部上是正则嵌入．因此，对于任意的 $X\in\Gamma(\gamma^*TN)$，X 在局部上是 N 上的切矢量在曲线 γ 上的限制，因而协变导数 $\mathrm{D}_{\gamma'(t)}X$ 处处有意义．根据诱导联络 ∇ 和 $\mathrm{D}_{\gamma'(t)}X$ 的定义可知

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}X=\mathrm{D}_{\gamma'(t)}X,\qquad\forall X\in\Gamma(\gamma^*TN).\tag{7.4-21}$$

据此，X 沿曲线 γ 是平行矢量场的条件可以改写为 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}X=0$．特别地，$\gamma$ 是测地线等价于 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}\gamma'=0$． ■

7.5 矢量丛曲率

将式(7.4-12)改成矩阵形式；令 $\omega=(\omega^\beta{}_\gamma)$、$\tilde\omega=(\tilde\omega^\beta{}_\gamma)$、$A=(a^\beta{}_\gamma)$，则有

$$A\tilde\omega=\mathrm{d}A+\omega A\quad\Leftrightarrow\quad\tilde\omega=A^{-1}\mathrm{d}A+A^{-1}\omega A.\tag{7.5-1}$$

式(7.5-1)比式(7.4-12)简洁了许多．下面，我们将利用式(7.5-1)导出曲率表达式，这再次说明式(7.5-1)（也就是式(7.4-12)）是微分几何中非常基本的重要公式．对(7.5-1)第一式求一次外微分，有

$$\mathrm{d}(A\tilde\omega)=\mathrm{d}\circ\mathrm{d}A+\mathrm{d}(\omega A)\ \Rightarrow\ (\mathrm{d}A)\wedge\tilde\omega+A\mathrm{d}\tilde\omega=(\mathrm{d}\omega)A-\omega\wedge\mathrm{d}A.\tag{7.5-2}$$

其中矩阵之间的外积“$\wedge$”表示矩阵在相乘时，矩阵元素的积是外积．我们以二维方阵为例来说明这个外积；设二维方阵 A、B 的矩阵元是 1 型式场，有

$$\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}\wedge\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}\\b_{21}&b_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}\wedge b_{11}+a_{12}\wedge b_{21}&a_{11}\wedge b_{12}+a_{12}\wedge b_{22}\\a_{21}\wedge b_{11}+a_{22}\wedge b_{21}&a_{21}\wedge b_{12}+a_{22}\wedge b_{22}\end{pmatrix}.$$

将(7.5-1)第一式改写为 $\mathrm{d}A = A\tilde{\omega} - \omega A$，然后代入(7.5-2)，有

$$A(\tilde{\omega}\wedge\tilde{\omega} + \mathrm{d}\tilde{\omega}) = (\mathrm{d}\omega + \omega\wedge\omega)A. \tag{7.5-3}$$

定义 7.25 $\Omega \equiv \mathrm{d}\omega + \omega\wedge\omega$ 叫作矢量丛联络 ∇ 在局部开集 U 上的**曲率型式**.

很明显 Ω 是二型式场. 这样，式(7.5-3)可记成：

$$\widetilde{\Omega} = A^{-1}\Omega A. \tag{7.5-4}$$

这是曲率型式在局部标架变换时的变换公式. 上式是齐次的，即等号右端没有与 Ω 无关的常数项；而 ω 的变换公式(7.5-1)不是齐次的，有非齐次项 $A^{-1}\mathrm{d}A$.

设 X、Y 是 M 上任意两个切矢量场，则由曲率型式 Ω 定义了从 $\Gamma(E)$ 到 $\Gamma(E)$ 的线性变换 $R(X,Y)$. $\forall p\in U\subset M$ 任取两个切矢量 $X,Y\in T_p(M)$，则用曲率型式 Ω 可定义从纤维 $\pi^{-1}(p)$ 到自身的线性变换 $R(X,Y)$. 它的定义如下：设 $\xi\in\pi^{-1}(p)$，它用矢量丛 E 在 U 上的局部标架场 $s_\alpha = (s_1,\cdots,s_q)$ 可表成 $\xi = \xi^\alpha s_\alpha$，其中 $\xi^\alpha\in\mathbb{R}$. 则命

$$R(X,Y)\xi \overset{def}{=} \sum\nolimits_{\alpha,\beta=1}^{q} \xi^\alpha \Omega^\beta{}_\alpha(X,Y)s_\beta|_p. \tag{7.5-5}$$

如果读者不清楚上式的指标记号，请参阅200页定义6.22. 如用抽象指标表示，则有 $(\Omega^\beta{}_\alpha)_{ab}$，需要用 M 上切矢量去缩并两个抽象指标 “$_{ab}$”，不能用丛空间的矢量去缩并；可参见 §7.9. 由于曲率型式 $\Omega = \left(\Omega^\beta{}_\alpha\right)$ 在局部标架场改变时按(7.5-4)式变换，故 $\Omega^\beta{}_\alpha(X,Y)$ 是线性空间 $\pi^{-1}(p)$ 上的 $\binom{1}{1}$ 型张量. 因此，式(7.5-5)所定义的 $R(X,Y)$ 是与局部标架选取无关的、从 $\pi^{-1}(p)$ 到自身的线性变换.

如果 X、Y 是光滑流形 M 上的两个光滑切矢量场，则 $R(X,Y)$ 是 $\Gamma(E)$ 上的线性算子，它的定义是：对任意的 $\xi\in\Gamma(E)$，及 $p\in M$，

$$\big(R(X,Y)\xi\big)(p) \overset{def}{=} R\left(X_p,Y_p\right)\xi_p. \tag{7.5-6}$$

我们把 $R(X,Y)$ 称为联络 ∇ 的**曲率算子**.

定理 7.26 设 (E,M,π) 是矢量丛，$\forall X,Y\in\mathfrak{X}(M)$，$\forall\xi\in\Gamma(E)$，有

$$R(X,Y)\xi = \nabla_X\nabla_Y\xi - \nabla_Y\nabla_X\xi - \nabla_{[X,Y]}\xi. \tag{7.5-7}$$

证明 . 设 U 是 M 的局部开子集. 因为外微分、联络具有局部属性，故曲率算子也是局部算子；所以只要考虑式(7.5-7)两边分别在局部截面上的作用就行了. 设

截面 $\xi\in\Gamma(E|_U)$ 的局部表示为：$\xi=\sum_{\alpha=1}^q\xi^\alpha s_\alpha$，其中 $\xi^\alpha\in C^\infty(U)$. 则有

$$\begin{aligned}\nabla_X\xi=&\left(X(\xi^\alpha)+X^i\xi^\beta\Gamma^\alpha_{\beta i}\right)s_\alpha=\left(X(\xi^\alpha)+\xi^\beta\left\langle\omega^\alpha{}_\beta,\,X\right\rangle\right)s_\alpha.\\ \nabla_Y\nabla_X\xi=&\Big(Y\left(X(\xi^\alpha)+\xi^\beta\left\langle\omega^\alpha{}_\beta,\,X\right\rangle\right)+\left(X(\xi^\gamma)+\xi^\beta\left\langle\omega^\gamma{}_\beta,\,X\right\rangle\right)\left\langle\omega^\alpha{}_\gamma,\,Y\right\rangle\Big)s_\alpha.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\nabla_X\nabla_Y\xi-\nabla_Y\nabla_X\xi=&\Big(X\left(Y(\xi^\alpha)+\xi^\beta\left\langle\omega^\alpha{}_\beta,\,Y\right\rangle\right)+\left(Y(\xi^\gamma)+\xi^\beta\left\langle\omega^\gamma{}_\beta,\,Y\right\rangle\right)\left\langle\omega^\alpha{}_\gamma,\,X\right\rangle\\ &-Y\left(X(\xi^\alpha)+\xi^\beta\left\langle\omega^\alpha{}_\beta,\,X\right\rangle\right)-\left(X(\xi^\gamma)+\xi^\beta\left\langle\omega^\gamma{}_\beta,\,X\right\rangle\right)\left\langle\omega^\alpha{}_\gamma,\,Y\right\rangle\Big)s_\alpha\\ \xlongequal{5.2-8}&\Big([X,Y](\xi^\alpha)+\xi^\beta\big(\mathrm{d}\omega^\alpha{}_\beta(X,Y)+\left\langle[X,Y],\,\omega^\alpha{}_\beta\right\rangle+(\omega^\alpha{}_\gamma\wedge\omega^\gamma{}_\beta)(X,Y)\big)\Big)s_\alpha\\ =&\nabla_{[X,Y]}\xi+\sum\nolimits_{\alpha,\beta=1}^q\xi^\beta\Omega^\alpha{}_\beta(X,Y)s_\alpha.\end{aligned}$$

由式(7.5-5)可知定理得证. ■

定理 7.27 有以下性质：**(1)** $R(X,Y)=-R(Y,X)$；**(2)** $R(fX,Y)=f\cdot R(X,Y)$；**(3)** $R(X,Y)(f\xi)=f\cdot\big(R(X,Y)\xi\big)$. 其中 $X,Y\in\Gamma(TM)$，$f\in C^\infty(M)$，$\xi\in\Gamma(E)$.

证明 . 证明过程与 §6.2.1类似，请读者补齐. ■

定理 7.28 曲率型式 Ω 适合第二 Bianchi 恒等式：$\mathrm{d}\Omega=\Omega\wedge\omega-\omega\wedge\Omega$.

证明 . 对 $\Omega=\mathrm{d}\omega+\omega\wedge\omega$ 的两边求外微分得到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\Omega=&\mathrm{d}\omega\wedge\omega-\omega\wedge\mathrm{d}\omega=(\Omega-\omega\wedge\omega)\wedge\omega-\omega\wedge(\Omega-\omega\wedge\omega)\\ =&\Omega\wedge\omega-\omega\wedge\Omega.\end{aligned}$$

虽然 Ω 是 2 型式场、ω 是 1 型式场，但式子 $\Omega\wedge\omega=\omega\wedge\Omega$ 只在它们是标量值时成立；现在两者是矩阵，故 $\Omega\wedge\omega=\omega\wedge\Omega$ 不成立. ■

7.6 纤维丛极简概要

矢量丛的纤维是矢量空间，矢量丛是一种特殊的纤维丛. 一般纤维丛的纤维型是一个有李变换群（见 §13.14）左（或右）作用在其上的光滑流形.

定义 7.29 设 E、M、F 是光滑流形，G 是左（或右）作用在流形 F 上的李变换群．若有光滑满映射 $\pi: E \to M$，并且下列条件成立：

(1) M 有一个开覆盖 $\{U_\alpha \mid \alpha \in I\}$，并且对每个 $\alpha \in I$ 有光滑同胚

$$\psi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times F, \quad \text{使得 } \pi \circ \psi_\alpha^{-1}(p, f) = p, \quad \forall p \in U_\alpha, f \in F \text{ 成立}.$$

(2) 对每一固定点 $p \in U_\alpha$，记 $\psi_{\alpha,p}(f) \equiv \psi_\alpha(p, f)$, $\forall f \in F$，则 $\psi_{\alpha,p}: \pi^{-1}(p) \to F$ 是光滑同胚；并且当 $p \in U_\alpha \cap U_\beta$ 时，光滑同胚 $\psi_{\alpha,p} \circ \psi_{\beta,p}^{-1}: F \to F$ 是 G 的一个元素 $g_{\alpha\beta}^p \in G$ 在 F 上的左（或右）作用，即 $\psi_{\alpha,p} \circ \psi_{\beta,p}^{-1}(f) = g_{\alpha\beta}^p \cdot f$, $\forall f \in F$.

(3) 当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \varnothing$ 时，映射 $g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \to G$ 是光滑的．

则称 (E, M, π, F, G) 为光滑流形 M 上的一个**纤维丛**；E 称为**丛空间**；M 称为**底空间**；F 称为**纤维型**；π 称为**丛投影**；条件 (1) 中的映射称为**局部平凡化**.

矢量丛定义7.4、纤维丛定义7.29取自陈省身著述，其中包含了局部坐标卡；这种叙述方式多少有些过时了；但较易理解，适合于物理工作者．文献[27]给出了现代定义方式，但需要更多的数学准备知识，比如范畴论；有兴趣的读者可研读之．下面我们继续一般纤维丛理论的叙述．

一般纤维丛也有类似于定理7.8的存在性定理，叙述如下．

定理 7.30 设 M 是一个 m 维光滑流形，$\{U_\alpha \mid \alpha \in I\}$ 是 M 的一个开覆盖；G 是左作用在光滑流形 F 上的李变换群．如果对于任意一对指标 $\alpha, \beta \in I$，在 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \varnothing$ 时，都指定了一个光滑映射 $g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \to G$，使得它们满足命题7.7中的条件 (1) 和 (2)（需将命题7.7中的 $GL(q)$ 换成李变换群 G）．那么存在一个纤维丛 (E, M, π, F, G)，它以 F 为纤维型，并且它的过渡函数族恰好是 $\{g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \to G\}$.

证明 . 可参考文献[27]第五章定理 3.2；或[73]$^{\S 10.2}$定理 2.2 以及 §10.3 定理 3.1. 一般纤维丛的存在性定理自然包含了矢量丛上的存在性定理7.8. ■

定义 7.31 设 (E, M, π, F, G) 是一纤维丛，若 $F = G$，且 G 在 F 上的左（或右）作用就是 G 在它自身上的左（或右）移动（左、右移动自然是自由且可迁的）；则称此丛为 M 上以 G 为结构群的 **G-主丛**，记为 (E, M, π, G).

定义 7.32 设 (E, M, π, F, G) 和 $(\widetilde{E}, M, \tilde{\pi}, \widetilde{F}, G)$ 是同一个光滑流形 M 上两个纤维丛．若存在 M 的一个开覆盖 $\{U_\alpha\}$，使得两个纤维丛有相同的过渡函数族 $\{g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \to G\}$，则称这两个纤维丛是**相配的**（associated）.

纤维丛的相配关系是一个等价关系，具有自反性、对称性、传递性.

命题 7.33 每一个纤维丛 (E, M, π, F, G) 都有与它相配的 G-主丛.

证明 . 设纤维丛 $\pi : E \to M$ 的过渡函数族是 $\{g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to G\}$. G 在它自身上的左移动可看作 G 左作用于自身的李变换群，并且是自由的、可迁的；则根据定理7.30可知存在纤维丛 $(\widetilde{E}, M, \tilde{\pi}, G, G)$ 以 $\{g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to G\}$ 为过渡函数族，这是与原纤维丛 (E, M, π, F, G) 相配的 G-主丛. ■

这个命题再次强调了过渡函数族对于一般纤维丛的核心作用，并且在结构群为 G 的纤维丛的相配类中确有一个 G-主丛作为它的代表.

因 G-主丛的结构群和纤维型是一般的李群，不再是线性变换群 $GL(V)$ 和 $\mathbb{R}^q$，故类似于定义7.18中的三条公理的框架几乎无法推广到 G-主丛. 1950 年，Ehresmann 给出了 G-主丛的联络定义；G-主丛联络可以导出矢量丛定义7.18中的三条公理；以上内容可参阅[73]第十章或[56]第八章.

7.7 标架丛

本节取自[73]第 10.2 节.

标架丛不是矢量丛，它是 $GL(q)$-主丛，它是矢量丛的相配丛. 相配丛是相互的，在纤维丛理论中，更多时候称矢量丛是 $GL(q)$-标架丛的相配丛.

给定一个秩为 q 的矢量丛 (E, M, π)，我们从矢量丛 E 出发构造光滑流形 M 上的标架丛；它在局部上是 M 的开子集与一般线性群 $GL(q)$ 的乘积空间，并且与矢量丛 E 共享同一个过渡函数族. 具体作法如下.

设矢量丛 (E, M, π) 的局部平凡化结构是 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha) \mid \alpha \in I\}$，其中 $(U_\alpha; x^i_\alpha)$ 是 M 的局部坐标系. 用 $\{e_i;\ 1 \leqslant i \leqslant q\}$ 表示实矢量空间 $\mathbb{R}^q$ 的标准基底，并令

$$s_i^{(\alpha)}(p) = \psi_\alpha^{-1}(p, e_i), \qquad p \in U_\alpha. \tag{7.7-1}$$

则 $s^{(\alpha)} = \left(s_1^{(\alpha)}, \cdots, s_q^{(\alpha)}\right)$ 是矢量丛 E 在 U_α 上的局部标架场. $\forall p \in U_\alpha$，用 $F(p)$（“F” 是 Frame 的首字母）表示由矢量空间 $\pi^{-1}(p)$ 中所有基底构成的集合，则在 $GL(q)$ 和 $F(p)$ 之间有双射关系. 验证如下，令 $A \in GL(q)$ 所对应的标架是

$$f(p) = \left(f_1(p), \cdots, f_q(p)\right) = \left(s_1^{(\alpha)}(p), \cdots, s_q^{(\alpha)}(p)\right) \cdot A \equiv s^{(\alpha)}(p) \cdot A, \tag{7.7-2}$$

注意 $A\in GL(q)$ 对标架是右作用，对矢量分量是左作用．上式即为

$$f_i(p)=A^j{}_i\psi_\alpha^{-1}(p,e_j)=\psi_{\alpha,p}^{-1}(A^j{}_ie_j),\qquad 1\leqslant i\leqslant q. \tag{7.7-3}$$

因 $\psi_{\alpha,p}^{-1}$ 是线性同构，故矩阵 A 可移进移出．这说明了 $GL(q)$ 和 $F(p)$ 是双射．

$$令\quad F(E)\equiv\bigcup_{p\in M}F(p), \tag{7.7-4}$$

并且定义映射 $\tilde\pi:F(E)\to M$ 使得

$$\tilde\pi\big(F(p)\big)=\{p\},\quad \forall p\in M. \tag{7.7-5}$$

下面借助矢量丛 E 的局部平凡化，引入空间 $F(E)$ 的局部平凡化结构．事实上，$\forall\alpha\in I$，定义映射 $\varphi_\alpha:\tilde\pi^{-1}(U_\alpha)\to U_\alpha\times GL(q)$，使得

$$\varphi_\alpha^{-1}(p,A)\overset{def}{=}s^{(\alpha)}(p)\cdot A,\qquad \forall(p,A)\in U_\alpha\times GL(q). \tag{7.7-6}$$

容易看出，这样定义的映射 φ_α 是从 $\tilde\pi^{-1}(U_\alpha)$ 到 $U_\alpha\times GL(q)$ 上的双射．借助映射 φ_α 可以在 $F(E)$ 上引进拓扑结构和光滑结构，使得每一个 φ_α 是光滑同胚，并且 $\tilde\pi:F(E)\to M$ 是光滑映射；具体作法可以参照例7.13．特别地，通过映射 $\varphi_\alpha:\tilde\pi^{-1}(U_\alpha)\to U_\alpha\times GL(q)$ 以及 M 在坐标邻域 U_α 上的坐标映射可以给出 $F(E)$ 在 $\tilde\pi^{-1}(U_\alpha)$ 上的局部坐标系，记为 $\big(\tilde\pi^{-1}(U_\alpha);x^i_\alpha,A^j{}_k\big)$．

从上面的构造可以看出，$F(E)$ 在局部上是乘积空间 $U_\alpha\times GL(q)$，它在每一点 $p\in M$ 处的纤维是 $\tilde\pi^{-1}(p)=F(p)$，后者与 $GL(q)$ 是等同的．换言之，$F(E)$ 是将一族乘积空间 $U_\alpha\times GL(q),\alpha\in I$，沿底流形 M 上同一点 $p\in U_\alpha\cap U_\beta$ 的纤维 $\{p\}\times GL(q)\subset U_\alpha\times GL(q)$ 和 $\{p\}\times GL(q)\subset U_\beta\times GL(q)$ 按照一定规则粘合起来的结果．具体地说，设 $p\in U_\alpha\cap U_\beta$，$A,B\in GL(q)$，那么

$$\varphi_\alpha^{-1}(p,A)=\varphi_\beta^{-1}(p,B)\quad\Leftrightarrow\quad A=\varphi_{\alpha,p}\circ\varphi_{\beta,p}^{-1}(B), \tag{7.7-7}$$

当且仅当（其中 $1\leqslant i\leqslant q$）

$$s^{(\alpha)}(p)\cdot A=s^{(\beta)}(p)\cdot B\quad\Leftrightarrow\quad\psi_\alpha^{-1}(p,A^j{}_ie_j)=\psi_\beta^{-1}(p,B^j{}_ie_j). \tag{7.7-8}$$

上式等价于（注意 $\psi_{\alpha,p}\circ\psi_{\beta,p}^{-1}$ 是线性同构，矩阵 B 可移进移出）

$$A^j{}_ie_j=\psi_{\alpha,p}\circ\psi_{\beta,p}^{-1}(B^j{}_ie_j)=B^k{}_i\ \psi_{\alpha,p}\circ\psi_{\beta,p}^{-1}(e_k)=\big(g^p_{\alpha\beta}\big)^j{}_kB^k{}_ie_j. \tag{7.7-9}$$

即有

$$A = g^p_{\alpha\beta}\cdot B \quad \Leftrightarrow \quad A^j{}_i = \left(g^p_{\alpha\beta}\right)^j{}_k B^k_i. \tag{7.7-10}$$

将上式与式(7.7-7)相比较得知：

$$\varphi_{\alpha,p}\circ\varphi^{-1}_{\beta,p} = g^p_{\alpha\beta} = \psi_{\alpha,p}\circ\psi^{-1}_{\beta,p}. \tag{7.7-11}$$

通过上面论述可知：标架丛 $\tilde{\pi}:F(E)\to M$ 和矢量丛 $\pi:E\to M$ 共享同一个过渡函数族 $\{g_{\alpha\beta}:U_\alpha\cap U_\beta\to GL(q)\}$；它们的底流形也相同．矢量丛的纤维型是 $\mathbb{R}^q$；标架丛的纤维型是 $GL(q)$，故它是 $GL(q)$-主丛．依定义7.32称纤维丛 $\tilde{\pi}:F(E)\to M$ 是与矢量丛 $\pi:E\to M$ 相配的**标架丛**，记作 $\left(F(E),M,\tilde{\pi}\right)$，或 $\tilde{\pi}:F(E)\to M$，或 $F(E)$.

对前面的叙述做一个小结：设 $\{(U_\alpha,\psi_\alpha)\mid\alpha\in I\}$ 是矢量丛 $\pi:E\to M$ 的局部平凡化结构，使得 $(U_\alpha;x^i_\alpha)$ 是底流形 M 的局部坐标系，则 $\{(U_\alpha,\varphi_\alpha);\alpha\in I\}$ 是与 E 相配的标架丛 $\tilde{\pi}:F(E)\to M$ 的一个局部平凡化结构，且通过局部平凡化映射 $\varphi_\alpha:\tilde{\pi}(U_\alpha)\to U_\alpha\times GL(q)$ 给出了丛空间 $F(E)$ 上的局部坐标系 $\left(\tilde{\pi}^{-1}(U_\alpha);x^i_\alpha,A^b{}_a\right)$.

下面，我们从矢量丛的联络导 ∇ 导出标架丛上的诱导联络 ∇^F．任取 $\alpha\in I$，然后令其固定不变；有 $\nabla s^{(\alpha)}_a=\omega^{(\alpha)b}_a s^{(\alpha)}_b$、$\omega^{(\alpha)b}_a=\Gamma^{(\alpha)b}_{ai}\mathrm{d}x^i_\alpha$ 成立，其中 $\omega^{(\alpha)b}_a$ 是联络 ∇ 在局部标架场 $\{s^{(\alpha)}_a\}$ 下的联络型式．采用式(7.7-2)的记号，则活动标架 $f=s^{(\alpha)}\cdot A$ 的联络定义为：

$$\begin{aligned}\nabla^F f &\overset{def}{=} \left(\nabla s^{(\alpha)}\right)\cdot A + s^{(\alpha)}\cdot\mathrm{d}A = s^{(\alpha)}\cdot\left(\omega^{(\alpha)}\cdot A+\mathrm{d}A\right)\\ &= f\cdot A^{-1}\left(\mathrm{d}A+\omega^{(\alpha)}\cdot A\right) = f\cdot\theta.\end{aligned} \tag{7.7-12}$$

其中 θ 表达式见(7.7-13)．之后，将 ∇^F 简记为 ∇.

$$\theta^b{}_a = \left(A^{-1}\right)^b{}_c\left(\mathrm{d}A^c{}_a+\omega^{(\alpha)c}_d A^d{}_a\right) = \left(A^{-1}\right)^b{}_c\left(\mathrm{d}A^c{}_a+A^d{}_a\Gamma^{(\alpha)c}_{di}\mathrm{d}x^i_\alpha\right). \tag{7.7-13}$$

定理 7.34 由式(7.7-13)定义的 $\theta^b{}_a(1\leqslant a,b\leqslant q)$ 是大范围定义在丛空间 $F(E)$ 上的 q^2 个 1 次微分式，即 $\theta=(\theta^b_a)$ 是大范围定义在 $F(E)$ 上的 $\mathfrak{gl}(q)$-值的 1 次外微分式，其中 $\mathfrak{gl}(q)$ 是一般线性群 $GL(q)$ 的李代数.

证明 . 设 $\left(U_\beta;x^i_\beta\right)$ 是 M 的另一局部坐标系，$\left(\tilde{\pi}^{-1}(U_\beta);x^i_\beta,B^b{}_a\right)$ 是在 $F(E)$ 上对应的局部坐标系．若 $U_\alpha\cap U_\beta\neq\varnothing$，则有坐标变换 $A=g^p_{\alpha\beta}\cdot B$（参看式(7.7-10)），

其中 $g_{\alpha\beta}:U_\alpha\cap U_\beta\to GL(q)$ 是过渡函数．对(7.7-10)取外微分，有

$$\mathrm{d}A^b{}_a=\mathrm{d}\left(g_{\alpha\beta}\right)^b{}_c\cdot B^c{}_a+\left(g_{\alpha\beta}\right)^b{}_c\cdot\mathrm{d}B^c{}_a. \tag{7.7-14}$$

另一方面，联络型式遵循如下的变换公式（即，式(7.4-12)）

$$\left(g_{\alpha\beta}\right)^a{}_c\,\omega_b^{(\beta)c}=\mathrm{d}\left(g_{\alpha\beta}\right)^a{}_b+\omega_c^{(\alpha)a}\left(g_{\alpha\beta}\right)^c{}_b. \tag{7.7-15}$$

将式(7.7-15)代入式(7.7-14)得到

$$\begin{aligned}&\mathrm{d}A^b{}_a+A^c{}_a\omega_c^{(\alpha)b}=\left(g_{\alpha\beta}\right)^b{}_c\left(\mathrm{d}B^c{}_a+B^d{}_a\omega_d^{(\beta)c}\right).\quad\xrightarrow{7.7-10}\\&\left(A^{-1}\right)^b{}_d\left(\mathrm{d}A^d{}_a+A^c{}_a\omega_c^{(\alpha)d}\right)=\left(B^{-1}\right)^b{}_d\left(\mathrm{d}B^d{}_a+B^c{}_a\omega_c^{(\beta)d}\right).\end{aligned}$$

上式表明定义与局部标架选取无关，故在大范围上有定义． ■

7.7.1 切标架丛

取矢量丛 (E,M,π) 为切丛 (TM,M,π)，与之相配的标架丛就是切标架丛 $\left(F(TM),M,\tilde{\pi}\right)$．本节前面的内容自然适用于切标架丛．再次强调：切标架丛 $\left(F(TM),M,\tilde{\pi}\right)$ 和切丛 (TM,M,π) 的纤维型是不同的，切丛是线性空间 $\mathbb{R}^m$，切标架丛是 $GL(m)$；但是它们却有相同的过渡函数族：$GL(m)$．

§6.3中的一般切矢量场 $\{(e_i)^a\}$ 是与切标架丛 $\left(F(TM),M,\tilde{\pi}\right)$ 相配的切丛上的切矢量场．在那里，我们通过标架变换的方式引入它们；并导出了众多内容，比如联络型式、Cartan 结构方程、Bianchi 恒等式等

一般说来，光滑流形 M 上不存在整体的标架场．由于 M 上一定存在联络（见定理7.19）；故，根据上述定理，在切标架丛 $F(TM)$ 上总是存在整体标架场的．在这个意义上来说，流形 $F(TM)$ 显得比底流形 M 简单．

切标架丛 $\left(F(TM),M,\tilde{\pi}\right)$ 的纤维型是 $GL(m)$；若把纤维型限定为它的子群 $O(m)$，则得到它的子丛**正交切标架丛**，记为 $\mathcal{O}(TM)$．当底流形已定向时，则纤维型与结构群变为 $SO(m)$．

对狭义、广义相对论而言，切标架丛 $\left(F(TM),M,\tilde{\pi}\right)$ 的纤维型与结构群是 $O(1,3)$．当底流形已定向时，则纤维型与结构群变为 $SO^+(1,3)$．

7.8 矢量丛与规范场概述

要完整、严谨的从纤维丛角度叙述规范场理论必须先了解 G-主丛的联络、曲率等知识；这超出了本书的范畴，可参考文献[73]第十章或类似文献.

设底流形 M 是 m 维的光滑实流形，M 上植有 G-标架丛（G 是 $GL(q,\mathbb{C})$ 的子群）. 设群 G 的李代数是 $\mathfrak{g}$（李代数的维数是 r），$\mathfrak{g}$ 的基为 $\{T_a \mid a=1,\cdots,r\}$（$T_a$ 是 q 维方阵）. 若进一步要求 G 是半单的，那么依定理13.146可知矩阵群 G 的李代数 $\mathfrak{g}$ 诱导出的 Killing 型是非退化的；进而可在丛空间 E 上定义**丛度量**$\langle\cdot,\cdot\rangle_{\mathfrak{g}}$ 为 Killing 型的负值 （这样，对于紧致半单群 G 来说，$\langle\cdot,\cdot\rangle_{\mathfrak{g}}$ 为正定）.

在开子集 $U\subset M$、$V\subset M$ 上分别引入局部坐标 $\{x^i\}$、$\{\tilde{x}^i\}$，并假定 $U\cap V\neq\varnothing$；在纤维型 $\mathbb{C}^q$ 上引入局部标架 s_α（$1\leqslant\alpha\leqslant q$）；故矢量丛有局部标架 $\{\frac{\partial}{\partial x^i};s_\alpha\}$. 在上述前提下，与矢量丛相配的 G-标架丛（G-主丛）的联络型式 θ 为：

$$\theta^b{}_a=\left(a^{-1}\right)^b{}_\beta\left(\mathrm{d}a^\beta{}_a+\omega^\beta{}_\alpha a^\alpha{}_a\right),\qquad \text{其中 } a^b{}_a\in G \tag{7.7-13}$$

其中 $\omega^\beta{}_\alpha$ 是：

$$\omega^\beta{}_\alpha=\sum\nolimits_{a=1}^{r}\sum\nolimits_{i=1}^{m}A_i^a(x)(T_a)^\beta{}_\alpha\mathrm{d}x^i;\ 1\leqslant\alpha,\beta\leqslant q,\ A_i^a(x)\in C^\infty(U). \tag{7.8-1}$$

上式中 T_a 是结构群 G 的李代数 $\mathfrak{g}$ 的基矢矩阵，它们是 q 维常数方阵.

我们省略了大量内容（G-主丛联络理论）才得到式(7.8-1). G-主丛理论中有定理表明在主丛联络中可以自然地引入结构群 G 的李代数 $\mathfrak{g}$，见式(7.8-1). 若不使用 G-主丛，只考虑矢量丛，则在矢量丛联络7.18中无法自然引入结构群 G 的李代数 $\mathfrak{g}$. 我们借用 G-主丛的目的就是要在式(7.8-1)中自然引入 G 的李代数 $\mathfrak{g}$.

当 G-标架丛是 $GL(m)$-切标架丛时，其结构群便是 $GL(m)$；与切标架丛相配的矢量丛就是切丛. 此时 G-标架丛联络(7.8-1)就是(6.3-15)（请读者验证之）.

由 §7.4.2、§7.7内容可知由矢量丛联络可诱导出标架丛联络. 反之，若先给定 G-标架丛联络（见上面两式），G-主丛联络理论表明：标架丛联络也可自然诱导出矢量丛联络；两个丛的联络是相互唯一确定的，即式(7.4-7)和式(7.7-13). 由 G-标架丛联络(7.8-1)诱导出的与之相配矢量丛的联络 ω 自然满足式(7.4-12)：

$$\tilde{\omega}^\sigma{}_\alpha=(a^{-1})^\sigma{}_\beta\mathrm{d}a^\beta{}_\alpha+(a^{-1})^\sigma{}_\beta\omega^\beta{}_\gamma a^\gamma{}_\alpha,\qquad \text{其中 } a^\beta{}_\gamma\in G \tag{7.4-12}$$

至此，我们由 G-标架丛联络得到了与之相配矢量丛的联络方阵 ω（见(7.8-1)）.

矢量丛 G 型联络 由式(7.8-1)可得矢量丛联络系数表达式（见式(7.4-6)）：

$$\Gamma_{\alpha i}^{\beta}=\left\langle \omega^{\beta}{}_{\alpha},\ \frac{\partial}{\partial x^{i}}\right\rangle=\sum\nolimits_{a=1}^{r}A_{i}^{a}(x)(T_{a})^{\beta}{}_{\alpha};\quad 1\leqslant\alpha,\beta\leqslant q. \tag{7.8-2}$$

把式(7.4-12)写成联络系数的形式（$a^{\beta}{}_{\gamma}=[g_{VU}]^{\beta}{}_{\gamma}\in G$）：

$$\left[g_{VU}(x)\right]^{\beta}{}_{\gamma}\tilde{\Gamma}_{\alpha j}^{\gamma}(\tilde{x})=\left(\frac{\partial\left[g_{VU}(x)\right]^{\beta}{}_{\alpha}}{\partial x^{i}}+\left[g_{VU}(x)\right]^{\gamma}{}_{\alpha}\Gamma_{\gamma i}^{\beta}(x)\right)\times\frac{\partial x^{i}}{\partial\tilde{x}^{j}}. \tag{7.8-3}$$

满足变换关系(7.8-3)的式(7.8-2)称为矢量丛的**G 型联络**.

注 7.35 从上面得到 G 型联络的过程来看，貌似我们只需将矢量丛的结构群 $GL(q)$ 直接限定在其子群 G 上即可．实际情况要复杂的多．首先，需要验证子群 G 满足**约化定理**（[73]$^{\S 10.3}$定理 3.5）；其次，再去探讨联络的约化.

例 7.36 联络系数(7.8-3)的变换关系可以推广到一般情形.

联络系数(7.8-3)是在自然标架 $\{\frac{\partial}{\partial x^{i}}\}$ 下的关系式．我们将自然标架换成一般的切标架场 $\{e_i\}$，那么在变换 $\tilde{s}_{\alpha}=a^{\gamma}{}_{\alpha}s_{\gamma}$、$\tilde{e}_{j}=\mathcal{C}^{i}{}_{j}e_{i}$ 下，有

$$\begin{aligned}\tilde{s}_{\gamma}\tilde{\Gamma}_{\alpha j}^{\gamma}=&\nabla_{\tilde{e}_{j}}\tilde{s}_{\alpha}=\mathcal{C}^{i}{}_{j}\nabla_{e_{i}}\left(a^{\gamma}{}_{\alpha}s_{\gamma}\right)=\mathcal{C}^{i}{}_{j}\left(\left(\nabla_{e_{i}}a^{\gamma}{}_{\alpha}\right)s_{\gamma}+a^{\gamma}{}_{\alpha}\nabla_{e_{i}}s_{\gamma}\right)\\=&\mathcal{C}^{i}{}_{j}s_{\beta}\left(e_{i}\left(a^{\beta}{}_{\alpha}\right)+a^{\gamma}{}_{\alpha}\Gamma_{\gamma i}^{\beta}\right).\end{aligned}$$

由上式可以得到

$$a^{\beta}{}_{\gamma}\tilde{\Gamma}_{\alpha j}^{\gamma}=\mathcal{C}^{i}{}_{j}\left(e_{i}\left(a^{\beta}{}_{\alpha}\right)+a^{\gamma}{}_{\alpha}\Gamma_{\gamma i}^{\beta}\right). \tag{7.8-4}$$

当把 $\{e_i\}$ 取成自然标架 $\{\frac{\partial}{\partial x^{i}}\}$ 时，式(7.8-4)变成了式(7.8-3). ■

7.8.1 曲率相关内容的分量表述

取 U 的自然标架 $\{\frac{\partial}{\partial x^{i}}\}$、丛空间的标架 $\{s_{\alpha}\}$；对于 $X=X^{i}\partial_{i}$、$Y=Y^{j}\partial_{j}$，不难看出 $R(X,Y)s_{\alpha}\in\Gamma(E)$；由(7.5-5)、(7.5-6)得（其中 $\xi=\xi^{\alpha}(x)s_{\alpha}$）

$$\langle s^{*\gamma},\ R(X,Y)\xi\rangle=\xi^{\alpha}\Omega^{\beta}{}_{\alpha}(X,Y)\langle s^{*\gamma},\ s_{\beta}\rangle=\xi^{\alpha}\Omega^{\gamma}{}_{\alpha}(X,Y).$$

故有

$$R^{\beta}{}_{\alpha ij}\equiv\Omega^{\beta}{}_{\alpha}(\partial_{i},\partial_{j})\equiv\langle s^{*\beta},\ R(\partial_{i},\partial_{j})s_{\alpha}\rangle. \tag{7.8-5a}$$

$$R\equiv R^{\beta}{}_{\alpha ij}\ s_{\beta}\otimes s^{*\alpha}\otimes\mathrm{d}x^{i}\otimes\mathrm{d}x^{j}. \tag{7.8-5b}$$

坐标变换 下面导出在变换 $\tilde{s}_\alpha = a^\gamma{}_\alpha s_\gamma$、$x^i \to \tilde{x}^i$ 下，曲率分量表达式是如何变换的．我们从式(7.5-4)、(7.5-5)、(7.5-6)出发进行探讨．

$$\widetilde{\Omega} = A^{-1}\Omega A \quad \Rightarrow \quad \widetilde{\Omega}^\beta{}_\alpha\left(\frac{\partial}{\partial\tilde{x}^i},\frac{\partial}{\partial\tilde{x}^j}\right) = \left(a^{-1}\right)^\beta{}_\rho a^\sigma{}_\alpha \Omega^\rho{}_\sigma\left(\frac{\partial x^k}{\partial\tilde{x}^i}\frac{\partial}{\partial x^k},\frac{\partial x^l}{\partial\tilde{x}^j}\frac{\partial}{\partial x^l}\right).$$

由此可以得到局部坐标变换下，曲率分量的变换表达式（$a \in G$）：

$$\widetilde{R}^\beta{}_{\alpha ij} = R^\rho{}_{\sigma kl}\left(a^{-1}\right)^\beta{}_\rho a^\sigma{}_\alpha \frac{\partial x^k}{\partial\tilde{x}^i}\frac{\partial x^l}{\partial\tilde{x}^j}. \tag{7.8-6}$$

曲率分量表达式 由式(7.5-7)可以得到（请与式(6.2-8)比对）：

$$R^\beta{}_{\alpha ij} = \frac{\partial}{\partial x^i}\Gamma^\beta_{\alpha j} - \frac{\partial}{\partial x^j}\Gamma^\beta_{\alpha i} + \Gamma^\sigma_{\alpha j}\Gamma^\beta_{\sigma i} - \Gamma^\sigma_{\alpha i}\Gamma^\beta_{\sigma j}. \tag{7.8-7}$$

上式中各分量指标的取值范围是：$1 \leqslant i,j \leqslant m$，$1 \leqslant \alpha,\beta,\sigma \leqslant q$.

曲率协变导数 先计算局部自然标架上的导数：

$$\begin{aligned}
\nabla_{\partial_k} R =& \nabla_{\partial_k}\left(R^\beta{}_{\alpha ij} s_\beta \otimes s^{*\alpha} \otimes \mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j\right) \\
=& \frac{\partial R^\beta{}_{\alpha ij}}{\partial x^k} s_\beta \otimes s^{*\alpha} \otimes \mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j + R^\beta{}_{\alpha ij}\left(\nabla_{\partial_k} s_\beta\right) \otimes s^{*\alpha} \otimes \mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j \\
&+ R^\beta{}_{\alpha ij} s_\beta \otimes \left(\nabla_{\partial_k} s^{*\alpha}\right) \otimes \mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j + R^\beta{}_{\alpha ij} s_\beta \otimes s^{*\alpha} \otimes \left(\nabla_{\partial_k}\mathrm{d}x^i\right) \otimes \mathrm{d}x^j \\
&+ R^\beta{}_{\alpha ij} s_\beta \otimes s^{*\alpha} \otimes \mathrm{d}x^i \otimes \left(\nabla_{\partial_k}\mathrm{d}x^j\right) \\
=& \left(\frac{\partial R^\beta_{\alpha ij}}{\partial x^k} + R^\rho_{\alpha ij}\Gamma^\beta_{\rho k} - R^\beta_{\rho ij}\Gamma^\rho_{\alpha k} - R^\beta_{\alpha lj}\overset{x}{\Gamma}{}^l_{ik} - R^\beta_{\alpha il}\overset{x}{\Gamma}{}^l_{jk}\right) s_\beta \otimes s^{*\alpha} \otimes \mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j.
\end{aligned}$$

其中 Γ 是矢量丛 E 的联络系数，$\overset{x}{\Gamma}$ 是切丛 TM 的仿射联络系数．我们记

$$R^\beta{}_{\alpha ij;k} \equiv \frac{\partial R^\beta{}_{\alpha ij}}{\partial x^k} + R^\rho{}_{\alpha ij}\Gamma^\beta_{\rho k} - R^\beta{}_{\rho ij}\Gamma^\rho_{\alpha k} - R^\beta{}_{\alpha lj}\overset{x}{\Gamma}{}^l_{ik} - R^\beta{}_{\alpha il}\overset{x}{\Gamma}{}^l_{jk}. \tag{7.8-8}$$

对于任意的 $Z = Z^k\partial_k \in \mathfrak{X}(U)$，则有

$$\nabla_Z R = Z^k R^\beta{}_{\alpha ij;k}\ s_\beta \otimes s^{*\alpha} \otimes \mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j. \tag{7.8-9}$$

Bianchi 微分恒等式分量表达式 需要注意曲率方阵 $\Omega\equiv(\Omega^{\beta}{}_{\alpha})$ 中的每个矩阵元 $\Omega^{\beta}{}_{\alpha}$ 都是 $U\subset M$ 上的 2 型式场，即 $\Omega^{\beta}{}_{\alpha}=\frac{1}{2}R^{\beta}{}_{\alpha ij}\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j$，其中 $R^{\beta}{}_{\alpha ij}\in C^\infty(U)$. 将其代入定理7.28中的式子 $\mathrm{d}\Omega=\Omega\wedge\omega-\omega\wedge\Omega$，有

$$\begin{aligned}
0=&2(\mathrm{d}\Omega-\Omega\wedge\omega+\omega\wedge\Omega)\\
=&\partial_k R^{\beta}_{\alpha ij}\mathrm{d}x^k\wedge\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j-R^{\beta}_{\rho ij}\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j\wedge\omega^{\rho}_{\alpha}+\omega^{\beta}_{\rho}\wedge R^{\rho}_{\alpha ij}\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j\\
\overset{7.4-6}{=\!=}&\left(R^{\beta}_{\alpha ij,k}-R^{\beta}_{\rho ij}\Gamma^{\rho}_{\alpha k}+\Gamma^{\beta}_{\rho k}R^{\rho}_{\alpha ij}\right)\mathrm{d}x^k\wedge\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j\\
\overset{7.8-8}{=\!=}&\left(R^{\beta}_{\alpha ij;k}+R^{\beta}_{\alpha lj}\overset{x}{\Gamma}{}^{l}_{ik}+R^{\beta}_{\alpha il}\overset{x}{\Gamma}{}^{l}_{jk}\right)\mathrm{d}x^k\wedge\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j\\
\overset{\text{定理}\ 7.27}{=\!=}&\left(R^{\beta}_{\alpha ij;k}+R^{\beta}_{\alpha lj}\overset{x}{\Gamma}{}^{l}_{ik}-R^{\beta}_{\alpha li}\overset{x}{\Gamma}{}^{l}_{jk}\right)\mathrm{d}x^k\wedge\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j.
\end{aligned}$$

利用外微分场的全反对称性，有

$$0=R^{\beta}_{\alpha ij;k}+R^{\beta}_{\alpha lj}\overset{x}{\Gamma}{}^{l}_{ik}-R^{\beta}_{\alpha li}\overset{x}{\Gamma}{}^{l}_{jk}+R^{\beta}_{\alpha jk;i}+R^{\beta}_{\alpha li}\overset{x}{\Gamma}{}^{l}_{kj}-R^{\beta}_{\alpha lj}\overset{x}{\Gamma}{}^{l}_{ki}+R^{\beta}_{\alpha ki;j}+R^{\beta}_{\alpha lk}\overset{x}{\Gamma}{}^{l}_{ji}-R^{\beta}_{\alpha lk}\overset{x}{\Gamma}{}^{l}_{ij}.$$

若仿射联络满足无挠条件（$\overset{x}{\Gamma}{}^{l}_{kj}=\overset{x}{\Gamma}{}^{l}_{jk}$），则可得 Bianchi 微分恒等式：

$$R^{\beta}{}_{\alpha ij;k}+R^{\beta}{}_{\alpha jk;i}+R^{\beta}{}_{\alpha ki;j}=0\quad\Leftrightarrow\quad R^{\beta}{}_{\alpha[ij;k]}=0. \tag{7.8-10}$$

7.8.2 平直时空规范场

在经典场论中，需将 M 选为平直的四维闵氏流形 $(\mathbb{R}^4_1,\eta)$；且不作坐标变换 $x^i\to\tilde{x}^j$，只作变换 $s_\alpha\to\tilde{s}_\beta$. 以下两例就在这样的假设下来阐述.

例 7.37 $U(1)$ 规范场.

取 $G=U(1)=\exp(\mathbb{i}\theta)$，则它的李代数 $\mathfrak{g}=\{(\mathbb{i})\}$.

即令式(7.8-3)中的 $g_{VU}(x)=e^{\mathbb{i}\theta}$、$T_a=(\mathbb{i})$，则式(7.8-3)化为：

$$e^{\mathbb{i}\theta}\tilde{\Gamma}^{1}_{1j}=\frac{\partial e^{\mathbb{i}\theta}}{\partial x^j}+\Gamma^{1}_{1j}e^{\mathbb{i}\theta}\quad\overset{\text{代入式}\ 7.8-2}{\Longrightarrow}\quad\tilde{A}_j(x)=\frac{\partial\theta}{\partial x^j}+A_j(x).$$

这正是电磁规范势的规范变换公式；此时式(7.8-2)中的 A^q_i 对应电磁规范势.

把式(7.8-2)（$U(1)$ 群是可对易群）代入曲率公式(7.8-7)，有

$$R^{1}_{1ij}=\mathbb{i}(\partial_iA_j-\partial_jA_i). \tag{7.8-11}$$

上式正是电磁场强公式 $\mathbb{i}^{-1}R^{1}_{1ij}\equiv F_{ij}=\partial_iA_j-\partial_jA_i$. ■

例 7.38 非对易规范场（结构群 G 是半单、紧致、非对易方阵群）.

非对易规范场也称为 Yang–Mills 场（杨振宁与米尔斯于 1954 年发现，这是杨先生最重要的学术贡献）. 请参考任一本相关书籍，读者你会发现(7.8-2)式就是 Yang–Mills 场，式(7.8-3)正是 Yang–Mills 场需要满足的规范变换. 把(7.8-2)式代入曲率公式(7.8-7)（$R^{\beta}_{\alpha ij}=\partial_i\Gamma^{\beta}_{\alpha j}-\partial_j\Gamma^{\beta}_{\alpha i}+\Gamma^{\sigma}_{\alpha j}\Gamma^{\beta}_{\sigma i}-\Gamma^{\sigma}_{\alpha i}\Gamma^{\beta}_{\sigma j}$），有：

$$\begin{aligned} R^{\beta}{}_{\alpha ij} =&\partial_i A^a_j (T_a)^{\beta}{}_{\alpha}-\partial_j A^a_i (T_a)^{\beta}{}_{\alpha}+A^c_j (T_c)^{\sigma}{}_{\alpha} A^b_i (T_b)^{\beta}{}_{\sigma}-A^b_i (T_b)^{\sigma}{}_{\alpha} A^c_j (T_c)^{\beta}{}_{\sigma} \\ =&\sum\nolimits_{a=1}^{r}(T_a)^{\beta}{}_{\alpha}\times\big(\partial_i A^a_j-\partial_j A^a_i+\sum\nolimits_{b,c=1}^{r} A^b_i A^c_j C^a_{bc}\big). \end{aligned} \tag{7.8-12}$$

其中 C^a_{bc} 是李代数 $\mathfrak{g}$ 的结构常数（注意 $(T_a)^{\beta}{}_{\alpha}$ 是常数矩阵）. 式(7.8-12)正是非对易规范场的场强公式，它是非对易规范场论的基础. 当 G 可对易时，(7.8-12)式退化为(7.8-11)式. 虽然数学家们早在 1940 年代就已知晓矢量丛的曲率(7.8-7)；但是一直到 1975 年，才由物理学家杨振宁发现规范场强(7.8-12)与矢量丛的曲率本质相同. 由此可以窥见数学与物理之间的鸿沟. ■

注 7.39 我们省略 G-主丛理论，使用矢量丛联络、曲率来描述规范场（比如 Yang–Mills 场(7.8-2)、规范变换(7.8-3)、场强(7.8-12)）；从纯数学角度来看这是不严谨的. 因笔者只想初步阐述纤维丛与规范场关系，故这种写法是划算的.

注 7.40 笔者初级观点：若物理学者不了解纤维丛，并不影响理解平直时空的 Yang–Mills 理论. 比如 Weinberg 三卷本《量子场论》貌似没有涉及纤维丛.

7.9 张量值型式

本小节采用抽象指标记号，并与之前几节部分公式作比较.

我们采用不那么严谨的数学语言来叙述一下纤维丛中张量值 p-型式概念（tensor valued p-form）. 流形 M 上的具有 $\binom{r}{s}$ **型的张量值 p-（外）型式**是指：

$$\underbrace{\mathfrak{X}(M)\times\cdots\times\mathfrak{X}(M)}_{\text{共}p\text{个}}\xrightarrow{T}\mathcal{T}^r_s(V)\text{张量分量};\quad \text{记为 }\big(T^{i_1\cdots i_r}{}_{k_1\cdots k_s}\big)_{a_1\cdots a_p}.$$

其中映射 T 是一个全反对称的 p 重线性映射；空间 V 可以是流形 M，也可以是 $\mathbb{R}^q$（或 $\mathbb{C}^q$）；指标 $\{i,k\}$ 取值范围跟随空间 V 的维数；抽象指标 $\{a_1\cdots a_p\}$ 表示此型式属于流形 M 余切丛，具体分量指标取值范围是 M 的维数.

例 7.41 $\binom{0}{0}$ 型张量值 p-型式就是通常的 p-型式，比如 M 上余切矢量 μ_a.

例 7.42 M 上余切标架场 $(e^i)_a$（$(e_i)_a$）为 $\binom{1}{0}$（$\binom{0}{1}$）型张量值 1-型式.

例 7.43 §7.5中的曲率型式 $(\Omega^\mu{}_\nu)_{ab}$ 为流形 M 上的 $\binom{1}{1}$ 型张量值 2-型式.

例 7.44 因联络系数不是张量，故 M 上的联络型式场 $(\omega^i{}_j)_a$ 不是张量值型式. 由于它是方阵，所以一般情形下称之为 $\mathfrak{gl}(q)$-外型式，参见式(7.7-13).

我们定义作用在 $\binom{r}{s}$ 型的张量值 p-型式上**外协变微分**为：

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_b\left(T^{i_1\cdots i_r}{}_{k_1\cdots k_s}\right)_{a_1\cdots a_p} &\overset{def}{=} \mathrm{d}_b\left(T^{i_1\cdots i_r}{}_{k_1\cdots k_s}\right)_{a_1\cdots a_p} \qquad \mathrm{d}_b\text{为外微分算子}\\ &+\sum_{n=1}^{r}(\omega^{i_n}{}_l)_b\wedge\left(T^{i_1\cdots i_{n-1}li_{n+1}\cdots i_r}{}_{k_1\cdots k_s}\right)_{a_1\cdots a_p}\\ &-\sum_{n=1}^{s}(\omega^{l}{}_{k_n})_b\wedge\left(T^{i_1\cdots i_r}{}_{k_1\cdots k_{n-1}lk_{n+1}k_s}\right)_{a_1\cdots a_p}.\end{aligned}\tag{7.9-1}$$

从式(7.9-1)右端的构造可以看出：$\mathcal{D}_b\left(T^{i_1\cdots i_r}{}_{k_1\cdots k_s}\right)_{a_1\cdots a_p}$ 是 $\binom{r}{s}$ 型张量值的 $(p+1)$-型式. 严谨证明可参阅主纤维丛联络理论.

例 7.45 对 $\binom{r}{s}$ 型张量值的 0-型式来说，$\mathcal{D}$ 就是矢量丛上的联络 ∇.

例 7.46 对 $\binom{0}{0}$ 型张量值的 p-型式来说，$\mathcal{D}$ 就是外微分算子 d.

例 7.47 Cartan 第一结构方程(6.3-30a)可改写为：

$$\mathcal{D}_a(e^i)_b=\mathrm{d}_a(e^i)_b+(\omega^i{}_j)_a\wedge(e^j)_b=(\Theta^i)_{ab}.\tag{7.9-2}$$

例 7.48 第一 Bianchi 恒等式(6.3-31a)可改写为：

$$\mathcal{D}_c(\Theta^i)_{ab}=\mathrm{d}_c(\Theta^i)_{ab}+(\omega^i{}_j)_c\wedge(\Theta^j)_{ab}=(e^j)_c\wedge(\Omega^i{}_j)_{ab}.\tag{7.9-3}$$

例 7.49 定义7.25中的曲率型式（包含式(6.3-30b)）可改写为：

$$\mathcal{D}_a(\omega^\mu{}_\nu)_b=\mathrm{d}_a(\omega^\mu{}_\nu)_b+(\omega^\mu{}_\rho)_a\wedge(\omega^\rho{}_\nu)_b=(\Omega^\mu{}_\nu)_{ab}.\tag{7.9-4}$$

例 7.50 定理7.28中第二 Bianchi 恒等式（包含式(6.3-31b)）可改写为：

$$\mathcal{D}_c(\Omega^\mu{}_\nu)_{ab}=\mathrm{d}_c(\Omega^\mu{}_\nu)_{ab}-(\omega^\rho{}_\nu)_c\wedge(\Omega^\mu{}_\rho)_{ab}+(\omega^\mu{}_\rho)_c\wedge(\Omega^\rho{}_\nu)_{ab}=0.\tag{7.9-5}$$

例 7.51 双外协变微分为：

$$\mathcal{D}_c\mathcal{D}_b\left(T^{i_1\cdots i_r}{}_{k_1\cdots k_s}\right)_{a_1\cdots a_p}=+\sum_{n=1}^{r}(\Omega^{i_n}{}_l)_{cb}\wedge\left(T^{i_1\cdots i_{n-1}li_{n+1}\cdots i_r}{}_{k_1\cdots k_s}\right)_{a_1\cdots a_p}$$

$$-\sum_{n=1}^{s}(\Omega^{l}{}_{k_n})_{cb}\wedge\left(T^{i_1\cdots i_r}{}_{k_1\cdots k_{n-1}lk_{n+1}k_s}\right)_{a_1\cdots a_p}. \tag{7.9-6}$$

直接代入即可证明上式，但计算较为繁琐（略）.

小结

本章主要参考了[70]§3.1、第四章，[73]第十章.

从 §4.2到本页，我们没有实质使用度量（除 §4.2.3、§7.4.3、§7.8）；故，所有内容适用于正定度量、不定度量. 从下章开始引入度量（度规，metric）.

笔者这样安排度规的原因有两个：首先，是参考了[70]的结构，该书中前四章并未涉及度规，从第五章开始才有度规. 其次，在爱因斯坦的《自传笔记》[14]p.67中写道：为什么广义相对论的建立又需要七年（指从 1908–1915）的时间？主要的原因在于，要摆脱坐标自身有直接度规意义的观念是不容易的. 度规困扰了爱因斯坦七年之久，为此，笔者从一开始就不引入度规，直至下一章才引入.

第八章　黎曼几何

截止到此处，在微分流形中还没有引入度规这个结构；即便如此也定义了联络、黎曼曲率、测地线等等重要几何量．从本章开始引入度规结构，这使得微分几何内容更加丰富；一件很重要的事：可以定义曲线长度了．

8.1　黎曼流形

8.1.1　黎曼流形定义

定义 8.1 在 m 维光滑流形 M 的余切丛上指定一个处处非退化、光滑、对称 $\binom{0}{2}$ 型张量场 g 后，称 (M,g) 为**广义黎曼流形**，g 称为**黎曼度规**或**基本度规**.

注 8.2 文献[70]$^{\S 5.1}$中的定理 1.1 表明光滑流形必存在正定的黎曼度规；需注意此定理不是平庸的，没有这个定理，正定的黎曼度规有点像空中楼阁．并不是任何光滑流形都能定义广义 Lorentz 型度规，需满足一些条件；文献[45]命题 5.37 给出了广义 Lorentz 型度规的存在性定理．

注 8.3 黎曼度规 g 的抽象指标记号与 §4.1.2相同．指定度规后，点 $p\in M$ 切空间的切矢量与余切空间的对偶矢量存在自然同构，即认为 $u^a\in T_pM$ 和 $T_p^*M\ni u_a=g_{ab}u^b$ 是同一矢量的不同表现形式．定理3.29证明了 V^{**} 自然同构于 V，继而将两者认为等同，即 $V^{**}\equiv V$；然而，由于黎曼流形上的这种自然同构是基于附加结构 g_{ab} 的（逐点不同），与前者的自然同构略有区别，故不能记 $T_pM=T_p^*M$，只能记作 $T_pM\cong T_p^*M$.

黎曼流形专指正定度规情形．不定度规专指度规惯性指数既有正、又有负情形．广义黎曼流形（Generalized Riemannian）是指度规惯性指数可能全是正的，可能全是负，也可能有正有负．广义黎曼流形还被称为半黎曼流形（Semi-

Riemannian）或伪黎曼流形（Pesudo-Riemannian，也被翻译成“赝”或“准”）. 需要指出的是有的文献中广义黎曼流形专指非正定度规流形，即不包含正定度规情形；各个文献中此称谓内涵不完全一致. 之后的行文中，我们将尽量严格区分“黎曼流形”和“广义黎曼流形”；度规场 g_{ab} 在正交归一基矢下的非对角元全是零，对角元是 ±1；所有对角元素的和（即这些 ±1 的和）称为度规场 g_{ab} 的**号差**；比如我们采用的闵氏时空度规号差是 $+2$（$g=\mathrm{diag}(-1,1,1,1)$）.

定义 8.4 给定 m 维广义黎曼流形 (M,g)，∇_a 是 M 上的仿射联络，如果有 $\nabla_a g_{bc}=0$，则称仿射联络 ∇_a 为流形 M 的**容许联络**.

下面我们导出容许联络的一个常用表达式，$\forall X^a,Y^a,Z^a\in\mathfrak{X}(M)$，

$$\begin{aligned}&\nabla_X(g_{ab}Y^aZ^b)=(\nabla_Xg_{ab})Y^aZ^b+g_{ab}(\nabla_XY^a)Z^b+g_{ab}Y^a\nabla_X(Z^b)\\&\xRightarrow{\nabla_ag_{bc}=0}X(g_{ab}Y^aZ^b)=g_{ab}(\nabla_XY^a)Z^b+g_{ab}Y^a\nabla_X(Z^b).\end{aligned}\tag{8.1-1}$$

定理 8.5 给定 m 维广义黎曼流形 (M,g)，则在 M 上存在唯一的无挠、容许仿射联络，称为流形 M 的 **Levi-Civita 联络**.

证明 . 设 ∇_a 是 M 上的容许仿射联络，在局部坐标 $(U;x^i)$ 下，有

$$\nabla_ag_{bc}=0\quad\Rightarrow\quad\partial_ag_{bc}=\Gamma^e_{ba}g_{ec}+\Gamma^e_{ca}g_{be}.\tag{8.1-2}$$

将上式进行指标轮换

$$\partial_bg_{ca}=\Gamma^e_{cb}g_{ea}+\Gamma^e_{ab}g_{ce},\qquad-\partial_cg_{ab}=-\Gamma^e_{ac}g_{eb}-\Gamma^e_{bc}g_{ae}.$$

上面三式相加，并利用无挠条件（$\Gamma^e_{ab}=\Gamma^e_{ba}$），有

$$\Gamma^c_{ab}=\frac12g^{ce}\left(\frac{\partial g_{ae}}{\partial x^b}+\frac{\partial g_{eb}}{\partial x^a}-\frac{\partial g_{ab}}{\partial x^e}\right)\quad\Leftrightarrow\quad\Gamma^k_{ij}=\frac12g^{kl}\left(\frac{\partial g_{il}}{\partial x^j}+\frac{\partial g_{lj}}{\partial x^i}-\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l}\right),\tag{8.1-3a}$$

$$\Gamma_{dab}=g_{dc}\Gamma^c_{ab}=\frac12\left(\frac{\partial g_{ad}}{\partial x^b}+\frac{\partial g_{db}}{\partial x^a}-\frac{\partial g_{ab}}{\partial x^d}\right)\Leftrightarrow\Gamma_{kij}=\frac12\left(\frac{\partial g_{ik}}{\partial x^j}+\frac{\partial g_{kj}}{\partial x^i}-\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k}\right).\tag{8.1-3b}$$

式(8.1-3b)为局部坐标系下的第一类 Christoffel 记号（给出了抽象指标及分量表示方式）；第一类 Christoffel 记号用的较少. 式(8.1-3a)为局部坐标系下的第二类 Christoffel 记号（给出了抽象指标及分量表示方式），简称（第二类）克氏符，第二类克氏符与度规号差无关. 需注意，两个克氏符都不是张量，上指标降下位置是人为约定的. 由此可见无挠容许联络系数由度规唯一确定.

反过来，给定联络系数(8.1-3a)，经计算不难确定它满足式(6.1-6)的变换关系；由注解6.8可知，这相当于在流形 M 上定义一个联络 ∇_a. 通过计算不难确定由式(8.1-3a)定义的联络是无挠、容许、仿射联络.

注：依照微分几何历史，这个仿射联络称为 Christoffel–Levi-Civita 联络或许更为准确；也有人称之为黎曼联络. 我们仍旧使用 Levi-Civita 联络这个称呼. 本定理一般称作黎曼几何基本定理. 本定理适用于正定、不定度规. ■

注 8.6 约定：如无特殊声明，在此以后所用联络皆是 Levi-Civita 联络.

例 8.7 证明 Koszul 公式：

$$2X_a\nabla_Y Z^a = Y(Z_aX^a)+Z(X_aY^a)-X(Y_aZ^a)-Y_a[Z,X]^a+Z_a[X,Y]^a+X_a[Y,Z]^a.$$

证明 . 从相容性条件(8.1-1)出发，将它们写出并轮换

$$\begin{aligned}X(Y^aZ_a) =& Z_a\nabla_X Y^a + Y_a\nabla_X Z^a.\\ Y(X^aZ_a) =& Z_a\nabla_Y X^a + X_a\nabla_Y Z^a.\\ Z(X^aY_a) =& X_a\nabla_Z Y^a + Y_a\nabla_Z X^a.\end{aligned}$$

后两式相加再减掉第一式，得

$$\begin{aligned}Y(X^aZ_a)+Z(X^aY_a)-X(Y^aZ_a) &= Z_a\nabla_Y X^a + X_a\nabla_Y Z^a + X_a\nabla_Z Y^a\\ &\quad + Y_a\nabla_Z X^a - Z_a\nabla_X Y^a - Y_a\nabla_X Z^a\\ &\xlongequal[\text{无挠条件}]{6.1-29} X_a\nabla_Y Z^a + X_a\nabla_Z Y^a + Z_a[Y,X]^a + Y_a[Z,X]^a\\ &= 2X_a\nabla_Y Z^a + X_a[Z,Y]^a + Z_a[Y,X]^a + Y_a[Z,X]^a.\end{aligned}$$

将上式简单整理一下便可得到 Koszul 公式. ■

例 8.8 用 Koszul 公式证明 Levi-Civita 联络的唯一性.

在黎曼几何基本定理的证明过程中，我们说联络系数由度规唯一确定，从而指出 Levi-Civita 联络是唯一的. 下面我们用 Koszul 公式再次证明这个唯一性. 假设在 (M,g) 上有两个无挠、容许仿射联络 ∇_a、D_a；我们注意到 Koszul 公式等号右端与仿射联络无关，故有

$$X_a\left(\nabla_Y Z^a - \mathrm{D}_Y Z^a\right) = 0.$$

因 X^a、Y^a、Z^a 的任意性，故必有 $\nabla_a = \mathrm{D}_a$. ■

例 8.9 三维欧几里得空间球坐标系.

球坐标系 r,θ,ϕ 与平面直角坐标系 x,y,z 变换关系是

$$x=r\sin\theta\cos\phi,\quad y=r\sin\theta\sin\phi,\quad z=r\cos\theta. \tag{8.1-4}$$

球坐标系 r,θ,ϕ 下的度规是

$$g=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&r^2&0\\0&0&r^2\sin^2\theta\end{pmatrix},\qquad g^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&r^{-2}&0\\0&0&r^{-2}\sin^{-2}\theta\end{pmatrix}. \tag{8.1-5}$$

由(8.1-3)可得非零克氏符

$$\begin{aligned}&\Gamma^r_{\theta\theta}=-r,\quad \Gamma^r_{\phi\phi}=-r\sin^2\theta,\quad \Gamma^\theta_{r\theta}=\Gamma^\theta_{\theta r}=\frac{1}{r},\\&\Gamma^\theta_{\phi\phi}=-\sin\theta\cos\theta,\quad \Gamma^\phi_{r\phi}=\Gamma^\phi_{\phi r}=\frac{1}{r},\quad \Gamma^\phi_{\theta\phi}=\Gamma^\phi_{\phi\theta}=\cot\theta.\end{aligned} \tag{8.1-6}$$

利用上式，由式(6.2-8)可得黎曼曲率所有分量都是零. ■

8.1.2 曲线长度

给定 m 维广义黎曼流形 (M,g)，其任一点的切空间便是通常的线性空间，依照推论3.46，其度规有式(3.4-14)的形式且没有非零分量（因非退化）.

定义 8.10 给定光滑广义黎曼流形 (M,g)，如果其每点切空间的度规惯性指数（即式(3.4-14)）只有一个负号，其余皆为正号（本书使用度规符号是 $(-+\cdots+)$，其它文献可能与此整体差一负号），则称 M 为**广义 Minkowski 流形**. 此度规称为**广义 Lorentz 度规**或者广义闵氏度规. 当没有“广义”两个字时，专指四维 Minkowski 流形（或其子流形），Lorentz 度规的符号是 $(-+++)$.

需注意，上述定义与定义4.1有重复部分. 定义4.1专指平直空间；而定义8.10可以是平直的，也可以是弯曲的. 从此以后，定义8.10包含定义4.1.

当度规场是非退化时，那么流形 M 度规场惯性指数的正负号逐点相同. 如果度规场惯性指数会改变，比如 M 上有点 p 和 q，其中 p 点度规是正定的，而 q 点度规是 $(-+\cdots+)$；那么根据度规是连续函数可以肯定存在一点的度规惯性指数为零（分量 g_{11}），因而退化，矛盾！

定义 8.11 给定 m 维广义黎曼流形 (M,g)，$\forall X^a\in\mathfrak{X}(M)$；如果 X^a 在任意坐标下的每个分量都为零，则称为**零矢量**（Zero Vector）；如果 $g_{ab}X^aX^b<0$，则称为**类时矢量**（time-like）；如果 $g_{ab}X^aX^b>0$，则称为**类空矢量**（space-like）；如果 $g_{ab}X^aX^b=0$ 且 X^a 不是零矢量，则称为**零模矢量**（Null Vector）.

定义 8.12 给定**四维** Minkowski 流形 (M,g)，$\forall X^a\in\mathfrak{X}(M)$，若 X^a 是零模矢量，也可称之为**类光矢量**（light-like）. 我们不在 $m(>4)$ 维广义闵氏流形上使用类光矢量这一词语，我们只在四维流形及其子流形上使用类光矢量一词儿.

在古典微分几何中，分段光滑曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 弧长被定义为

$$s=\sum_i\int_{t_i}^{t_{i+1}}\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\right|\mathrm{d}t=\sum_i\int_{t_i}^{t_{i+1}}\sqrt{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}}\mathrm{d}t=\sum_i\int_{t_i}^{t_{i+1}}\sqrt{\mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}}.$$

其中点 t_i 是分段点；由于曲线的导数可正可负，所以加了绝对值；弧长参数 s 被称为**自然参数**. 这个定义可以推广到广义黎曼流形中.

设广义黎曼流形 (M,g) 中有分段光滑曲线 $\gamma:\mathbb{R}\to M$，曲线 $\gamma(t)$ 的切线切矢量是 $\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)^a$（见式(4.4-8)），微分流形中的内积需要用度规来描述. 曲线 $\gamma(t)$ **弧长**的定义为（即把式(5.7-13)限定在一维）：

$$L(\gamma)\overset{def}{=}\sum_i\int_{t_i}^{t_{i+1}}\sqrt{\left|g_{ab}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)^a_\gamma\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)^b_\gamma\right|}\mathrm{d}t.\tag{8.1-7}$$

因度规可能是不定的，故上式中加了绝对值. 如果度规是正定的，即(3.4-14)式中惯性指数全部是 $+1$，则没有必要加这个绝对值.

对于正定度规而言，式(8.1-7)是个良定义，对于不定度规而言要复杂一些. 比如对于广义闵氏时空中曲线可能一段类时，与其毗邻的一段变成类空曲线；虽然这种不伦不类曲线的线长（从数学角度）可以采取分段方式用式(8.1-7)来定义，但是这种不伦不类的曲线长度在物理上貌似没有什么意义.

很明显，如果曲线是零模的，那么线长恒为零.

设流形 M 有局域坐标系 $(U;x^i)$，分段光滑曲线 $\gamma(t)$ 的分段 $[t_i,t_{i+1}]$ 完全落在一个坐标域内（若不是，增加分段）；则式(8.1-7)在局部坐标系的表示为

$$L(\gamma)=\sum_i\int_{t_i}^{t_{i+1}}\sqrt{\left|g_{jk}\frac{\mathrm{d}x^j\circ\gamma}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}x^k\circ\gamma}{\mathrm{d}t}\right|}\mathrm{d}t=\sum_i\int_{t_i}^{t_{i+1}}\sqrt{|g_{jk}\mathrm{d}x^j\mathrm{d}x^k|}.\tag{8.1-8}$$

其中包括度规分量 $g_{jk}=\left[g_{ab}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right)^b\right]\Big|_{\gamma(t)}$ 在内的所有量必须在曲线 $\gamma(t)$ 上取值. 曲线线长公式中被积分部分

$$\mathrm{d}s^2\equiv g_{jk}\mathrm{d}x^j\mathrm{d}x^k, \tag{8.1-9}$$

一般称为**线元**. 虽然是平方形式，但线元可正可负. 可见给出线元就相当于给出了局部坐标系 $(U;x^i)$ 下的度规场，线元无非是度规场的一种记号而已.

例 8.13 在流形 $\mathbb{R}^2$ 中，给定线元

$$\mathrm{d}s^2=-x^2\mathrm{d}t^2+t\mathrm{d}x^2+4\mathrm{d}t\mathrm{d}x. \tag{8.1-10}$$

我们来读取度规场信息，在坐标系 $\{t,x\}$ 下的度规分量是 $g_{tt}=-x^2$, $g_{xx}=t$, $g_{tx}=g_{xt}=2$. 度规可用抽象指标记号表示为

$$g_{ab}=-x^2(\mathrm{d}t)_a(\mathrm{d}t)_b+t(\mathrm{d}x)_a(\mathrm{d}x)_b+2(\mathrm{d}t)_a(\mathrm{d}x)_b+2(\mathrm{d}x)_a(\mathrm{d}t)_b. \tag{8.1-11}$$

请读者熟悉从线元读取度规信息的方式、方法. ■

为简单起见，下面只讨论曲线属性不变的一段 $[r_1,r_2]$，然后拼接所有分段即可. 若曲线 $\gamma(t)$ 重参数化为 $\tilde{\gamma}(u)$，其中 $u=u(t)$，变换 $u(t)$ 是单调的（见定义4.17后的讨论），即 $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}u}>0$ 或 $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}u}<0$；则曲线线长公式(8.1-7)是不变的

$$L(\tilde{\gamma})=\int_{u(r_1)}^{u(r_2)}\sqrt{\left|g_{ab}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\right)^a\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\right)^b\right|}\mathrm{d}u=\int_{u(r_1)}^{u(r_2)}\sqrt{\left|g_{ab}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)^a\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)^b\right|}\left|\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}u}\right|\cdot\mathrm{d}u.$$

不论 $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}u}>0$ 还是 $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}u}<0$，代入上式后都会得到弧长公式在形式上是不变的，即与重参数化无关，或者说在重参数化后曲线线长不变.

如果我们将曲线 $\gamma(t)$ 参数 t 选为线长 s，那么从上式可以看到必有

$$\sqrt{\left|g_{ab}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^a\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^b\right|_{\gamma(s)}}=1. \tag{8.1-12}$$

也就是当光滑曲线 γ 的参数是弧长 s 时，其切线切矢量 $(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s})^a$ 的长度是 1.

8.1.3 广义黎曼流形之积

设 (M,g) 和 (N,h) 是两个广义黎曼流形，维数分别是 m 和 n；两者笛卡尔积是 $M\times N$，$\forall(p,q)\in M\times N$，其中 $p\in M$，$q\in N$. 有自然投影 $\pi_M: M\times N\to M$，$\pi_N: M\times N\to N$，定义如下映射 $\alpha: M\to M\times N$，$\beta: N\to M\times N$ （下式中 $p\in M$，$q\in N$ 是任取的，取定后固定不变）：

$$\alpha(x)=(x,q),\ \forall x\in M;\qquad \beta(y)=(p,y),\ \forall y\in N. \tag{8.1-13}$$

显然有 $\pi_M\circ\alpha=\mathrm{id}: M\to M$ 和 $\pi_N\circ\beta=\mathrm{id}: N\to N$. α 和 β 相当于包含映射，自然是正则嵌入的.

假设 T_pM 的局部坐标系是 $\{x^i\}$，对应的自然坐标基矢场是 $\{(\frac{\partial}{\partial x^i})^a\}$；$T_pN$ 的局部坐标系是 $\{y^\alpha\}$，对应的自然坐标基矢场是 $\{(\frac{\partial}{\partial y^\alpha})^a\}$；那么，$T_p(M\times N)$ 的局部坐标系是 $\{x^i,y^\alpha\}$，对应的自然坐标基矢场是 $\{(\frac{\partial}{\partial x^i})^a,(\frac{\partial}{\partial y^\alpha})^a\}$；很明显坐标 x 与 y 相互独立. 切映射 $\alpha_{p*}: T_pM\to T_{(p,q)}(M\times N)$ 产生的基矢映射关系为：

$$\alpha_{p*}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a\Big|_p=\frac{\partial x^k}{\partial x^i}\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right)^a+\frac{\partial y^\beta}{\partial x^i}\left(\frac{\partial}{\partial y^\beta}\right)^a=\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a\Big|_{(p,q)} \tag{8.1-14}$$

上式最左端的基矢在流形 M 中取值；最右端基矢在积流形 $M\times N$ 中取值. 与上式类似，切映射 $\beta_{q*}: T_qN\to T_{(p,q)}(M\times N)$ 产生的基矢映射关系为：

$$\beta_{q*}\left(\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right)^a\Big|_q=\frac{\partial x^k}{\partial y^\alpha}\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right)^a+\frac{\partial y^\beta}{\partial y^\alpha}\left(\frac{\partial}{\partial y^\beta}\right)^a=\left(\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right)^a\Big|_{(p,q)} \tag{8.1-15}$$

上式最左端的基矢在流形 N 中取值；最右端基矢在积流形 $M\times N$ 中取值.

上两式可以说明 $(\alpha_{p*}T_pM)\cap(\beta_{q*}T_qN)=\mathbf{0}$，即两个切空间交集只有零矢量. 而积流形 $M\times N$ 的维数是 $m+n$，自然它的切空间 $T_{(p,q)}(M\times N)$ 维数也如此；T_pM 的维数是 m，T_pN 的维数是 n；由此不难得到

$$T_{(p,q)}(M\times N)=\alpha_{p*}T_pM\ \oplus\ \beta_{q*}T_qN, \tag{8.1-16}$$

即积 $M\times N$ 的切空间可表示成 M 和 N 的切空间（用映射推前后）的直和.

$\forall X_M^a,Y_M^b\in T_pM$ 和 $\forall X_N^a,Y_N^b\in T_qN$；记

$$X^a=\alpha_{p*}X_M^a\ \oplus\ \beta_{q*}X_N^a,\qquad Y^b=\alpha_{p*}Y_M^b\ \oplus\ \beta_{q*}Y_N^b. \tag{8.1-17}$$

定义积流形 $M\times N$ 的度规为

$$G_{ab}X^aY^b \overset{def}{=} g_{ab}X^a_M Y^b_M + h_{ab}X^a_N Y^b_N. \tag{8.1-18}$$

由 g_{ab},h_{ab} 的对称性可以得到 G_{ab} 是对称张量；光滑性也可类似得到．下面验证它的非退化性，只需验证 G_{ab} 在基矢下的矩阵是非退化的即可；设在给定基矢下 g 和 h 的矩阵分别是 g_{ij} 和 $h_{\alpha\beta}$，不难看出 G_{ab} 的 $m+n$ 维方矩阵是

$$G_{(i\alpha)(j\beta)} = \begin{pmatrix} g_{ij} & 0 \\ 0 & h_{\alpha\beta} \end{pmatrix}, \tag{8.1-19}$$

因 $\det(G_{(i\alpha)(j\beta)}) = \det(g_{ij})\cdot\det(h_{\alpha\beta})$，故 $G_{(i\alpha)(j\beta)}$ 非退化性是显然的．这样便证明了 G_{ab} 符合广义黎曼度规要求．

显然本节所有结论都可以推广到有限个广义黎曼流形间的笛卡尔积．

练习 8-1 证明式(8.1-3a)定义的联络是无挠、容许、仿射联络．

练习 8-2 详尽给出例题8.7中略掉的步骤．

8.2 曲率张量

在 §6.2中给出了黎曼曲率张量定义，同时也描述了它的数条性质．在引入度规后，再次研究这个重要的几何量；同时给出几个其它几个曲率的定义与性质．

8.2.1 $\binom{0}{4}$ 型黎曼曲率张量

广义黎曼流形 (M,g) 中已指定度规，约定 $R^d{}_{cab}$ 上标降在第一个位置：

$$R_{dcab} \overset{def}{=} g_{de}R^e{}_{cab}. \tag{8.2-1}$$

由克氏符可求 $\binom{0}{4}$ 型黎曼张量的分量表达式，由式(6.2-8)和(8.1-3)得

$$R_{ijkn} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 g_{in}}{\partial x^j\partial x^k} - \frac{\partial^2 g_{jn}}{\partial x^i\partial x^k} - \frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^j\partial x^n} + \frac{\partial^2 g_{jk}}{\partial x^i\partial x^n}\right) + \Gamma^l_{jk}\Gamma_{lin} - \Gamma^l_{jn}\Gamma_{lik}. \tag{8.2-2}$$

计算并不困难，请读者补齐．由式(8.2-2)可见 $\binom{0}{4}$ 型黎曼张量对度规 g_{ij} 而言是半线性的，非线性部分只体现在一阶导数上[1]．但此张量还包含度规的逆（g^{ij}）．

[1]我们只以 $\binom{0}{4}$ 型黎曼张量这个二阶偏导数式子来说明线性、半线性、拟线性、非线性的描述性概念．如果此张量的一阶偏导数和二阶偏导数本身是线性的（没有 $\frac{\partial^2 g_{jn}}{\partial x^h\partial x^q}\frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^l\partial x^p}$，$\frac{\partial^2 g_{jn}}{\partial x^h\partial x^q}\frac{\partial g_{ik}}{\partial x^l}$，$\frac{\partial^2 g_{jn}}{\partial x^h\partial x^i}g_{kl}$，$\frac{\partial g_{jn}}{\partial x^h}\frac{\partial g_{ik}}{\partial x^l}$，

定理 8.14 广义黎曼流形 M 的黎曼曲率有如下对称性或反对称性：

$$R_{abcd} = R_{cdab}, \tag{8.2-3}$$

$$R_{abcd} = -R_{bacd} = -R_{abdc}, \tag{8.2-4}$$

$$R_{a[bcd]} = 0 \ \Leftrightarrow \ R_{[b|a|cd]} = 0 \ \Leftrightarrow \ R_{[bc|a|d]} = 0 \ \Leftrightarrow \ R_{[bcd]a} = 0, \tag{8.2-5}$$

$$R_{ab[cd;e]} = 0, \tag{8.2-6}$$

$$R_{[abcd]} = 0. \tag{8.2-7}$$

证明 . 由于已经证明过黎曼曲率的分量表达式是坐标卡变换协变的（见 §6.2.1），所以可以由式(8.2-2)的对称性直接得到式(8.2-3).

借用式(8.2-3)，由式(6.2-5)可证明式(8.2-4)的全部.

接下来是第一、第二 Bianchi 恒等式（已由式(6.2-12)和(6.2-13)证明）.

下面证明式(8.2-7)；由式(3.8-20)和式(3.8-24)可得

$$\begin{aligned} 24 \cdot R_{[abcd]} =& \delta^{ijkl}_{abcd} R_{ijkl} = \left(-\delta^l_a \cdot \delta^{ijk}_{bcd} + \delta^l_b \cdot \delta^{ijk}_{acd} - \delta^l_c \cdot \delta^{ijk}_{abd} + \delta^l_d \cdot \delta^{ijk}_{abc}\right) R_{ijkl} \\ =& 3!(-R_{[bcd]a} + R_{[acd]b} - R_{[abd]c} + R_{[abc]d}) = 0. \end{aligned}$$

上式最后一步用到了第一 Bianchi 恒等式. ■

例 8.15 m 维广义黎曼流形 (M, g) 中曲率张量 R_{abcd} 的独立取值数目.

解: 由式(8.2-3)知可把黎曼曲率 R_{abcd} 当成“指标”为 (ab) 和 (cd) 的矩阵 $R_{(ab)(cd)}$，由式(8.2-4)的反对称性可以看出，每一个“指标”取独立值的数目是：$\frac{1}{2}m(m-1)$. 而“指标”为 (ab) 和 (cd) 是对称的，所以单由式(8.2-3)和(8.2-4)使张量 R_{abcd} 留下的独立分量数目等于 $\frac{1}{2}m(m-1)$ 维对称矩阵的独立矩阵元数目，即 $\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}m(m-1)\right]\left[\frac{1}{2}m(m-1)+1\right]$. 而全反对称(8.2-7)又给附加上 $m(m-1)(m-2)(m-3)/4!$ 个限制，最终黎曼曲率张量 R_{abcd} 留下的独立分量数目等于

$$\begin{aligned} C_m &= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}m(m-1)\right]\left[\frac{1}{2}m(m-1)+1\right] - \frac{1}{4!}m(m-1)(m-2)(m-3) \\ &= \frac{1}{12}m^2(m^2-1). \end{aligned} \tag{8.2-8}$$

$\frac{\partial g_{kn}}{\partial x^h} g_{ij}$，$g_{ij}g_{kn}$ 等项），并且这些偏导数前的系数是常数或 x^i 的函数，那么称为线性. 所有不是线性的皆称为非线性，但是非线性内部又可以略作区分. 如果最高阶偏导数（此处指二阶偏导数，例如 $\frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^j \partial x^n}$）前的系数是常数或者只是 x^i 的函数，那么称为半线性（semi-linear）. 如果最高阶偏导数前的系数除了包含 x^i，还包含 g_{ij} 或 $\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k}$，那么称为拟线性（quasi-linear）.

需要强调的是，上述独立分量个数只是代数意义上的，由于还有第二 Bianchi 微分恒等式，独立分量数目还会减少. ■

当维数 $m=1$ 时 $C_1=0$，这说明曲线的内秉曲率 R_{1111} 恒为零. 当曲线嵌入到高维空间中，可以有非零的外曲率，但这不是内蕴性质.

当维数 $m=2$ 时 $C_2=1$，只有一个独立的分量，本质上是高斯曲率.

当维数 $m=3$ 时 $C_3=6$.

当维数 $m=4$ 时 $C_4=20$.

8.2.2 Ricci 曲率和标量曲率

Ricci 曲率张量定义见式(6.2-6)（$R_{ab}\equiv R^{c}{}_{acb}$）. 定义标量曲率 R 为：

$$R\overset{def}{=}g^{ab}R_{ab}. \tag{8.2-9}$$

由度量 g_{ab} 决定的黎曼曲率有对称性 $R_{abcd}=R_{cdab}$；从而可以看出 Ricci 曲率张量是一个对称张量，即 $R_{ab}=R_{ba}$. 由式(8.2-4)和(8.2-3)可知：

$$\begin{aligned} g^{ab}R_{abcd}&=0=g^{cd}R_{abcd},\\ R_{bd}&=g^{ac}R_{abcd}=-g^{ac}R_{abdc}=-g^{ac}R_{bacd}=+g^{ac}R_{badc}. \end{aligned}$$

所以 Ricci 曲率 R_{bd} 本质上是唯一能从 R_{abcd} 构造出来的二阶张量. 同样，标量曲率本质上也是唯一的.

$$0=g^{ab}g^{bd}R_{abcd},\qquad R=g^{bd}g^{ac}R_{abcd}.$$

从式(8.2-7)可得 $\epsilon^{abcd}R_{abcd}=0$；故，由反对称性构造标量的途径被否定了.

8.2.3 爱因斯坦张量

定义爱因斯坦张量 G_{ab} 为

$$G_{ab}\overset{def}{=}R_{ab}-\frac{1}{2}g_{ab}R. \tag{8.2-10}$$

其中 R_{ab},R 分别是 Ricci 曲率和标量曲率.

由第二 Bianchi 恒等式(6.2-13)可以证明爱因斯坦张量的一个重要特征．首先，利用度规 g_{ab} 与联络 ∇_c 相容，先将式(6.2-13)中的上指标“d”降下来，再对式(6.2-13)两端进行缩并运算，得

$$\begin{aligned}0 =&g^{ec}g^{ad}(\nabla_a R_{debc}+\nabla_b R_{deca}+\nabla_c R_{deab})=g^{ec}(\nabla^a R_{aebc}-\nabla_b R_{ec}+\nabla_c R_{eb})\\ =&\nabla^a R_{ab}-\nabla_b R+\nabla^e R_{eb}=2\nabla^a R_{ab}-\nabla_b R.\end{aligned}\tag{8.2-11}$$

由此式可得如下重要公式（缩并 Bianchi 微分恒等式）：

$$\nabla^a G_{ab}\equiv\nabla^a R_{ab}-\frac{1}{2}g_{ab}\nabla^a R\equiv\nabla^a R_{ab}-\frac{1}{2}\nabla_b R\equiv 0.\tag{8.2-12}$$

需注意，微分恒等式(8.2-12)对任意 m 维广义黎曼流形都成立；并且只要 G_{ab} 满足可微条件即可，不论 G_{ab} 是否满足爱氏场方程组（$G_{ab}=8\pi T_{ab}$）.

定义 8.16 设有 m 维广义黎曼流形 (M,g)，若存在实常数 λ 使得 $R_{ab}=\lambda g_{ab}$ 在流形 M 上每一点都成立，则称 (M,g) 是**爱因斯坦流形**．进一步，若 $\lambda=0$，称 (M,g) 为 **Ricci 平坦流形**.

由第300页式(8.10-18)可知常曲率空间必为爱氏流形；反之未必.

对于爱氏流形，由定义可得其标量曲率为：

$$R=g^{ab}R_{ab}=\lambda\cdot g^{ab}g_{ab}=\lambda g^a{}_a=m\lambda,\quad m\text{ 是 }M\text{ 的维数}.\tag{8.2-13}$$

命题 8.17 维数大于 2 的广义黎曼流形 (M,g) 是爱因斯坦流形的充分必要条件是：$R_{ab}=f\cdot g_{ab}$，$f\in C^\infty(M)$.

证明 . 必要性是显然的．下面证明充分性．对此式两边取散度，有

$$\nabla^a R_{ab}=\nabla^a(f\cdot g_{ab})=\nabla_b f.$$

由上式与式(8.2-12)可知：

$$\frac{1}{2}\nabla_b R=\nabla_b f\xrightarrow{8.2-13}\frac{1}{2}m\nabla_b f=\nabla_b f\quad\Rightarrow\quad f\text{ 是常数}.$$

请注意：推导式(8.2-13)的过程中并不要求 λ 是常数，该式也适用于 λ 为标量函数的情形．由上式可知标量函数 f 必然是常数，故 (M,g) 是爱氏流形． ■

8.2.4 Weyl 张量

设有 m 维广义黎曼流形 (M,g)，定义 Weyl 张量（也称作共形张量）为：

$$\begin{aligned} C_{abcd} \overset{def}{=} R_{abcd} &- \frac{1}{m-2}\left(g_{ac}R_{bd} - g_{ad}R_{bc} + g_{bd}R_{ac} - g_{bc}R_{ad}\right) \\ &+ \frac{1}{(m-1)(m-2)}\left(g_{ac}g_{bd} - g_{ad}g_{bc}\right)R. \end{aligned} \tag{8.2-14}$$

要求 $m \geqslant 3$；一维、二维流形中无法定义 Weyl 张量.

C_{abcd} 有 R_{abcd} 全部对称性（见定理8.14）. 此外，Weyl 张量的迹恒零.

$$g^{ac}C_{abcd}=0. \tag{8.2-15}$$

直接计算即可证明上式. 当只考虑 Weyl 张量与黎曼张量有相同的对称性，可以得到独立个数相同于黎曼张量独立个数；但考虑到“指标”(ab) 和 (cd) 对称性，式(8.2-15)对独立 Weyl 张量分量个数给出的限制是 $\frac{1}{2}m(m+1)$，最终 Weyl 张量独立分量个数是

$$C_m = \frac{1}{12}m^2(m^2-1) - \frac{1}{2}m(m+1) = \frac{1}{12}m(m+1)(m+2)(m-3). \tag{8.2-16}$$

当 $m=3$ 时，独立 Weyl 张量是零；当 $m=4$ 时，独立 Weyl 张量是 $C_4=10$ 个.

三维空间（包括平直与弯曲）中，黎曼曲率和 Ricci 曲率都有 6 个独立分量，上面的公式也说明此时独立 Weyl 张量的分量个数是零，所以 Ricci 曲率代表了全部黎曼曲率，Weyl 张量恒为零.

8.2.5 四维流形的曲率

黎曼曲率 由式(8.2-8)可知四维黎曼曲率独立分量个数是 20 个. 从定理8.14经过对称性分析，可将 R_{abcd} 指标取为 (ab) 和 (cd) 的矩阵，写成表格8.1. 因为此矩阵是对称的，所以只需写出一半；同时这个表格忽略了恒为零的分量. 由式(6.2-12)，有 $R_{1234}+R_{1342}+R_{1423}=0$，可令 R_{1234} 不独立，已在表中消掉.

Bianchi 恒等式 此处,我们只讨论四维流形上的 Bianchi 恒等式(6.2-13)$R_{ij[kl;s]}=0$. 前两个指标 (ij) 是对称的，所以有 6 个可区分；后三个指标要求 $k\neq l\neq s$ 且反对称循环相加，所以只有 $C_4^3=4$ 个可区分，综上，共有 24 个可区分的 Bianchi

表 8.1: 独立黎曼曲率分量

分量 列 / 行	N=2	N=3		N=4		
	(12)	(13)	(23)	(14)	(24)	(34)
(12)	1212	1213	1223	1214	1224	~~1234~~
(13)		1313	1323	1314	1324	1334
(23)			2323	2314	2324	2334
(14)				1414	1424	1434
(24)					2424	2434
(34)						3434

恒等式. 但是由于各种对称性，下列四个式子是恒为零的（请读者自行验证），不能算作方程等式.

$$R_{12[34;1]} - R_{13[41;2]} + R_{14[12;3]} = 0, \quad R_{23[41;2]} - R_{24[12;3]} + R_{21[23;4]} = 0,$$
$$R_{34[12;3]} - R_{31[23;4]} + R_{32[34;1]} = 0, \quad R_{41[23;4]} - R_{42[34;1]} + R_{43[41;2]} = 0.$$

这导致 Bianchi 恒等式只有 20 个线性独立.

练习 8-3 证明式(8.2-2).

练习 8-4 用不同方法再次证明式(8.2-3).

练习 8-5 证明二维爱因斯坦张量恒为零（见式(8.2-10)）.

练习 8-6 证明三维 Weyl 张量恒为零（见式(8.2-14)）.

练习 8-7 证明式(8.2-15).

8.3 一般仿射联络

设有 m 维广义黎曼流形 (M, g). 现在有了 Levi-Civita 联络，我们初步阐述一下一般仿射联络与它的关系. 我们将有挠、与度规不相容的仿射联络记为 $\overset{\bullet}{\underset{\circ}{\nabla}}_a$；将有挠、但与度规相容的仿射联络记为 $\overset{\circ}{\nabla}_a$；将无挠、但与度规不相容的仿射联络记为 $\overset{\bullet}{\nabla}_a$；而 Levi-Civita 联络记为 ∇_a；相应的联络系数、联络型式也要增加这种小圆圈（小圆点）；这种有区分的记号只适用于本节.

只需把本节公式中的小圆圈（小圆点）去掉即可得到 Levi-Civita 联络.

在 §6.3中，我们定义了联络 1 型式，现在有了度规可以把它的指标进行升降；为此，我们先做如下铺垫．在标架场 $\{(e_\mu)^a\}$ 上，度规表示为

$$g_{ab}=g_{\mu\nu}(e^\mu)_a(e^\nu)_b,\qquad g^{ab}=g^{\mu\nu}(e_\mu)^a(e_\nu)^b. \tag{8.3-1}$$

再引入两个记号

$$(e_\rho)_a \overset{def}{=} g_{ab}(e_\rho)^b = g_{\mu\nu}(e^\mu)_a(e^\nu)_b(e_\rho)^b = g_{\mu\rho}(e^\mu)_a, \tag{8.3-2}$$

$$(e^\rho)^a \overset{def}{=} g^{ab}(e^\rho)_b = g^{\mu\nu}(e_\mu)^a(e_\nu)^b(e^\rho)_b = g^{\mu\rho}(e_\mu)^a. \tag{8.3-3}$$

上面两式说明，基矢的内外指标均可用度规相应指标进行升降．需要说明，如果没有度规，无法定义 $(e_\rho)_a$ 和 $(e^\rho)^a$．我们在 §4.1.2曾经引入过这两个记号，在那里是平直空间；这里是弯曲空间或平直空间．由此可得：

$$g_{ab}=(e_\mu)_a(e^\mu)_b,\ g^{ab}=(e^\mu)^a(e_\mu)^b;\ g_{\mu\nu}=(e_\mu)_a(e_\nu)^a,\ g^{\mu\nu}=(e^\mu)^a(e^\nu)_a. \tag{8.3-4}$$

可以再定义内指标降下来的 1 型式场和曲率型式：

$$(\overset{\bullet}{\mathring{\omega}}_{\mu\nu})_a \overset{def}{=} g_{\mu\sigma}(\overset{\bullet}{\mathring{\omega}}{}^\sigma{}_\nu)_a = g_{\mu\sigma}(e^\sigma)_c\overset{\bullet}{\mathring{\nabla}}_a(e_\nu)^c = (e_\mu)_c\overset{\bullet}{\mathring{\nabla}}_a(e_\nu)^c = g_{\mu\sigma}\overset{\bullet}{\mathring{\Gamma}}{}^\sigma_{\nu\tau}(e^\tau)_a, \tag{8.3-5}$$

$$(\overset{\bullet}{\mathring{\Omega}}_{\mu\nu})_{ab} \overset{def}{=} g_{\mu\sigma}(\overset{\bullet}{\mathring{\Omega}}{}^\sigma{}_\nu)_{ab} = \frac{1}{2}\overset{\bullet}{R}_{\mu\nu\rho\sigma}(e^\rho)_a\wedge(e^\sigma)_b = \overset{\bullet}{R}_{\mu\nu\rho\sigma}(e^\rho)_a(e^\sigma)_b. \tag{8.3-6}$$

式(8.3-5)计算用到了式(6.3-7)．与之相似，可定义 $(\overset{\bullet}{\mathring{\omega}}{}^{\mu\nu})_a$、$(\overset{\bullet}{\mathring{\Omega}}{}^{\mu\nu})_{ab}$（略）．

相容性条件 自然坐标下的相容性条件(8.1-2)在一般标架场下变为

$$\begin{aligned}&0=\mathring{\nabla}_a g_{bc} \quad\Rightarrow\quad 0=(\mathring{\nabla}_a g_{\mu\nu})(e^\mu)_b(e^\nu)_c+g_{\mu\nu}\big(\mathring{\nabla}_a(e^\mu)_b\big)(e^\nu)_c+g_{\mu\nu}(e^\mu)_b\big(\mathring{\nabla}_a(e^\nu)_c\big)\\ &\Rightarrow\quad 0=(\mathrm{d}_a g_{\mu\nu})(e^\mu)_b(e^\nu)_c-g_{\mu\nu}\big((e^j)_b(\mathring{\omega}^\mu{}_j)_a\big)(e^\nu)_c-g_{\mu\nu}(e^\mu)_b\big((e^j)_c(\mathring{\omega}^\nu{}_j)_a\big).\end{aligned}$$

上式应用了式(6.3-8)（$\mathring{\nabla}_a(e^\mu)_b=-(e^j)_b(\mathring{\omega}^\mu{}_j)_a$）．消去基矢，得到度规在一般标架场下的相容性条件，即 $\mathring{\nabla}_a g_{bc}=0$ 的具体表达式（另一式子留给读者证明）：

$$\mathrm{d}_a g_{\mu\nu}=(\mathring{\omega}_{\nu\mu})_a+(\mathring{\omega}_{\mu\nu})_a=\left(g_{\mu\sigma}\mathring{\Gamma}^\sigma_{\nu\tau}+g_{\nu\sigma}\mathring{\Gamma}^\sigma_{\mu\tau}\right)(e^\tau)_a, \tag{8.3-7a}$$

$$-\mathrm{d}_a g^{\mu\nu}=(\mathring{\omega}^{\nu\mu})_a+(\mathring{\omega}^{\mu\nu})_a=\left(g^{\mu\sigma}\mathring{\Gamma}^\nu_{\sigma\tau}+g^{\nu\sigma}\mathring{\Gamma}^\mu_{\sigma\tau}\right)(e^\tau)_a. \tag{8.3-7b}$$

仿射联络系数分解 我们使用第一类克氏符来推演．先列出挠率张量：

$$T^c_{ab}=\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ c}_{ba}-\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ c}_{ab},\qquad T_{cab}=\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{cba}-\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{cab}.$$

由于仿射联络与度量未必相容，故设

$$\begin{aligned}L_{cab}&=+\overset{\bullet}{\nabla}{}^{\circ}_c g_{ab}=+\partial_c g_{ab}-\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{abc}-\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{bac},\\ L_{abc}&=+\overset{\bullet}{\nabla}{}^{\circ}_a g_{bc}=+\partial_a g_{bc}-\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{bca}-\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{cba},\\ -L_{bca}&=-\overset{\bullet}{\nabla}{}^{\circ}_b g_{ca}=-\partial_b g_{ca}+\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{cab}+\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{acb}.\end{aligned}$$

显然有 $L_{cab}=L_{cba}$．上三式相加，有

$$\begin{aligned}L_{cab}+L_{abc}-L_{bca}=&2\Gamma_{bac}-\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{abc}-\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{bac}-\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{bca}-\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{cba}+\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{cab}+\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{acb}\\ =&2\Gamma_{bac}+T_{cba}+T_{abc}-\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{bac}-\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{bca}.\end{aligned}$$

根据 §6.1.4论证已知

$$\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{bac}=\frac{1}{2}\left(\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{bac}+\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{bca}\right)+\frac{1}{2}\left(\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{bac}-\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{bca}\right)=\frac{1}{2}\left(\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{bac}+\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{bca}\right)+\frac{1}{2}T_{bca}.$$

结合以上两式，有

$$\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{bac}=\Gamma_{bac}+\frac{1}{2}\left(T_{cba}+T_{abc}-T_{bac}\right)+\frac{1}{2}\left(L_{bca}-L_{cab}-L_{abc}\right).$$

定义

$$K_{bac}\overset{def}{=}\frac{1}{2}\left(-T_{bac}+T_{cba}+T_{abc}\right).\tag{8.3-8}$$

$$C_{bac}\overset{def}{=}\frac{1}{2}\left(L_{bac}-L_{cab}-L_{abc}\right)=\frac{1}{2}\left(\overset{\bullet}{\nabla}{}^{\circ}_b g_{ac}-\overset{\bullet}{\nabla}{}^{\circ}_c g_{ab}-\overset{\bullet}{\nabla}{}^{\circ}_a g_{bc}\right).\tag{8.3-9}$$

不难看出 $K_{bac}=-K_{abc}$，$C_{bac}=C_{bca}$．则有

$$\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ}_{bac}=\Gamma_{bac}+K_{bac}+C_{bac}.\tag{8.3-10a}$$

$$\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ b}_{ac}=\Gamma^b_{ac}+K^b_{ac}+C^b_{ac}.\tag{8.3-10b}$$

第一项 Γ^b_{ac} 是无挠且与度规相容的克氏符，自然坐标基底下的表达式为(8.1-3)式．第二项 K^b_{ac} 叫**扭曲张量**（contorsion）．第三项 C^b_{ac} 是度规不相容项．由此易得：

$$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{\circ}_c v^b=\partial_c v^b+\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ b}_{ac}v^a=\nabla_c v^b+(K^b_{ac}+C^b_{ac})v^a,\tag{8.3-11}$$

$$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{\circ}_c \omega_b=\partial_c\omega_b-\overset{\bullet}{\Gamma}{}^{\circ a}_{bc}\omega_a=\nabla_c\omega_b-(K^a_{bc}+C^a_{bc})\omega_a.\tag{8.3-12}$$

曲率关系 我们知道一般仿射联络的黎曼曲率表示式为(6.2-8)；下面把(8.3-10)式代入之，则可以得到一般曲率 $\overset{\bullet}{\underset{\circ}{R}}{}^i_{jln}$ 与度规 g_{ij} 决定的曲率 R^i_{jln} 之间的关系.

$$\begin{aligned}
\overset{\bullet}{\underset{\circ}{R}}{}^i_{jln} =&\partial_l\overset{\bullet}{\underset{\circ}{\Gamma}}{}^i_{jn} - \partial_n\overset{\bullet}{\underset{\circ}{\Gamma}}{}^i_{jl} + \overset{\bullet}{\underset{\circ}{\Gamma}}{}^k_{jn}\overset{\bullet}{\underset{\circ}{\Gamma}}{}^i_{kl} - \overset{\bullet}{\underset{\circ}{\Gamma}}{}^k_{jl}\overset{\bullet}{\underset{\circ}{\Gamma}}{}^i_{kn}\\
=&R^i_{jln} + \partial_l K^i_{jn} + \partial_l C^i_{jn} - \partial_n K^i_{jl} - \partial_n C^i_{jl} + \Gamma^k_{jn}K^i_{kl} + \Gamma^k_{jn}C^i_{kl}\\
&+ K^k_{jn}\Gamma^i_{kl} + K^k_{jn}K^i_{kl} + K^k_{jn}C^i_{kl} + C^k_{jn}\Gamma^i_{kl} + C^k_{jn}K^i_{kl} + C^k_{jn}C^i_{kl} - \Gamma^k_{jl}K^i_{kn}\\
&- \Gamma^k_{jl}C^i_{kn} - K^k_{jl}\Gamma^i_{kn} - K^k_{jl}K^i_{kn} - K^k_{jl}C^i_{kn} - C^k_{jl}\Gamma^i_{kn} - C^k_{jl}K^i_{kn} - C^k_{jl}C^i_{kn}\\
=&R^i_{jln} + \partial_l K^i_{jn} + \Gamma^i_{kl}K^k_{jn} - \Gamma^k_{jl}K^i_{kn} - \Gamma^k_{nl}K^i_{jk} + \Gamma^k_{nl}K^i_{jk}\\
&+ \partial_l C^i_{jn} + \Gamma^i_{kl}C^k_{jn} - \Gamma^k_{jl}C^i_{kn} - \Gamma^k_{nl}C^i_{jk} + \Gamma^k_{nl}C^i_{jk}\\
&- \left(\partial_n K^i_{jl} + \Gamma^i_{kn}K^k_{jl} - \Gamma^k_{jn}K^i_{kl} - \Gamma^k_{ln}K^i_{jk}\right) - \Gamma^k_{ln}K^i_{jk}\\
&- \left(\partial_n C^i_{jl} + \Gamma^i_{kn}C^k_{jl} - \Gamma^k_{jn}C^i_{kl} - \Gamma^k_{ln}C^i_{jk}\right) - \Gamma^k_{ln}C^i_{jk}\\
&+ K^k_{jn}K^i_{kl} + K^k_{jn}C^i_{kl} + C^k_{jn}K^i_{kl} + C^k_{jn}C^i_{kl}\\
&- K^k_{jl}K^i_{kn} - K^k_{jl}C^i_{kn} - C^k_{jl}K^i_{kn} - C^k_{jl}C^i_{kn}.
\end{aligned}$$

利用由度规决定的克氏符的对称性（$\Gamma^k_{nl} = \Gamma^k_{ln}$），并配上基矢，有：

$$\begin{aligned}
\overset{\bullet}{\underset{\circ}{R}}{}^e_{cab} =&R^e_{cab} + \nabla_a(K^e_{cb} + C^e_{cb}) - \nabla_b(K^e_{ca} + C^e_{ca})\\
&+ (K^e_{fa} + C^e_{fa})(K^f_{cb} + C^f_{cb}) - (K^e_{fb} + C^e_{fb})(K^f_{ca} + C^f_{ca}).
\end{aligned}$$

若记 $\Xi^a_{cb} \equiv K^a_{cb} + C^a_{cb}$，则有：

$$\overset{\bullet}{\underset{\circ}{R}}{}^e_{cab} = R^e_{cab} + \nabla_a\Xi^e_{cb} - \nabla_b\Xi^e_{ca} + \Xi^e_{fa}\Xi^f_{cb} - \Xi^e_{fb}\Xi^f_{ca}, \tag{8.3-13a}$$

$$\overset{\bullet}{\underset{\circ}{R}}{}_{cb} = R_{cb} + \nabla_a\Xi^a_{cb} - \nabla_b\Xi^a_{ca} + \Xi^a_{fa}\Xi^f_{cb} - \Xi^a_{fb}\Xi^f_{ca}, \tag{8.3-13b}$$

$$\overset{\bullet}{\underset{\circ}{R}} = R + g^{bc}\nabla_a\Xi^a_{cb} - \nabla^c\Xi^a_{ca} + \Xi^a_{fa}\Xi^f_{cb}g^{bc} - \Xi^a_{fb}\Xi^f_{ca}g^{bc}. \tag{8.3-13c}$$

8.4 等距映射

8.4.1 线性空间等距

定义 8.18 设在实数域上有两个线性空间 V 和 W，V 上定义了度规 g，W 上定义了度规 h；两个空间存在同构映射 $T : V \to W$；若 T 还保度规不变，即

$$g_{ab}v^a u^b = h_{ab}T(v^a)T(u^b) \;\Leftrightarrow\; \langle v, u\rangle_g = \langle T(v), T(u)\rangle_h, \quad \forall v^a, u^b \in V. \tag{8.4-1}$$

则称 T 是线性空间上的**等距映射**. 线性空间度规定义见 §4.1.

命题 8.19 设有两个线性空间 V 和 W，V 上定义了度规 g，W 上定义了度规 h. 存在等距映射 $T:V\to W$ 的充分必要条件是：V、W 有相同的维数，并且 g 的正（负）惯性指数个数等于 h 的正（负）惯性指数个数.

证明 . 度规定义要求它是非退化的. 在 V 中选定正交归一基矢 $\{(e_i)^a\}$，在 W 中选定正交归一基矢 $\{(\epsilon_j)^a\}$. 在正交归一基矢下，度规惯性指数参见式(3.4-14).

“$\Rightarrow$”. T 等距，则它首先是线性同构，故 V、W 的维数相等. 将 V 中基矢 $\{(e_i)^a\}$ 代入式(8.4-1)可得（其中 $\eta=\mathrm{diag}(-\cdots-+\cdots+)$）

$$h_{ab}T\big((e_i)^a\big)T\big((e_j)^b\big)=g_{ab}(e_i)^a(e_j)^b=\eta_{ij}. \tag{8.4-2}$$

$\{(e_i)^a\}$ 在等距、线性同构下的像是 $T\big((e_i)^a\big)$，显然它是 W 中的基底；故在 W 中存在基底使得 h 的正（负）惯性指数个数等于 g 的正（负）惯性指数个数.

“$\Leftarrow$”. 因 V、W 有相同的维数，故必然存在线性同构映射 $\sigma:V\to W$；我们将具体表达式选为 $\sigma\big((e_i)^a\big)=(\epsilon_i)^a$（这个线性映射是人为选定的，如果选为其它形式，比如 $\sigma\big((e_i)^a\big)=-9.4(\epsilon_i)^a$，那么会给证明造成困难）. 因 g 的正（负）惯性指数个数等于 h 的正（负）惯性指数个数，故可令 $g_{ab}(e_i)^a(e_j)^b=h_{ab}(\epsilon_i)^a(\epsilon_j)^b$（因 $(e_i)^a$ 和 $(\epsilon_i)^a$ 都是正交归一的，故可作此种选择）. 在上述线性同构映射约定下，以及度规 g、h 关系约定下，σ 是等距的，即

$$\begin{aligned}h_{ab}\sigma(v^a)\sigma(u^b)=&h_{ab}\sigma\big(v^i(e_i)^a\big)\sigma(u^j(e_j)^b)=v^iu^jh_{ab}\sigma\big((e_i)^a\big)\sigma((e_j)^b)\\=&v^iu^jh_{ab}(\epsilon_i)^a(\epsilon_j)^b=v^iu^jg_{ab}(e_i)^a(e_j)^b=g_{ab}v^au^b.\end{aligned}$$

令 $T=\sigma$，这样就找到了线性等距同构映射. 证毕. ■

定理 8.20 设在实数域上有两个线性空间 V 和 W，V 上定义了度规 g，W 上定义了度规 h；V 和 W 是等距的. U 是 V 的非零、非退化子空间，且映射 $\sigma:U\to\sigma(U)\subset W$ 是等距映射；那么 σ 能够延拓成 V 到 W 的等距映射.

证明 . 由定理3.34可知，线性空间上度规与非退化、对称实矩阵有双射关系. 设 g 在 U 上的限制所对应的矩阵是 A_1，h 在 $\sigma(U)$ 上的限制所对应的矩阵是 A_2，很明显 A_1,A_2 的维数是相同的. 因 σ 是 U 到 $\sigma(U)$ 的等距，不难证明矩阵 $A_1\overset{c}{\sim}A_2$，即两个矩阵是合同关系.

因 g 在 U 上限制非退化，故 $\sigma(U)$ 也非退化；V 和 W 可作正交直和分解：

$$V = U \oplus U^{\perp}, \qquad W = \sigma(U) \oplus \big(\sigma(U)\big)^{\perp}. \tag{8.4-3}$$

因 V 和 W 是等距的，那么 g、h 所对应的矩阵自然也是合同的：

$$(g) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & B_1 \end{pmatrix} \overset{c}{\sim} \begin{pmatrix} A_2 & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix} = (h). \tag{8.4-4}$$

其中 B_1 是 g 在 $U^{\perp}$ 上对应的非退化、对称矩阵；B_2 是 h 在 $\big(\sigma(U)\big)^{\perp}$ 上对应的非退化、对称矩阵；B_1, B_2 维数相同. 由 Witt 定理3.48可知必有 $B_1 \overset{c}{\sim} B_2$，既然是合同关系，我们可以认为存在等距映射 $\mu : U^{\perp} \to \big(\sigma(U)\big)^{\perp}$. 因有正交补关系(8.4-3)，故 $\forall v^a \in V$ 都可以唯一分解成：$v^a = u^a + u_p^a$，其中 $u^a \in U, u_p^a \in U^{\perp}$. 现在定义新的等距映射 $\nu : V \to W$：

$$\nu(v^a) = \nu(u^a + u_p^a) \overset{def}{=} \sigma(u^a) + \mu(u_p^a). \tag{8.4-5}$$

当 $v^a \in U$ 时，即 $u_p^a = 0$ 时，$\nu = \sigma$；故 ν 是 σ 的延拓.

本定理一般称作 **Witt 等距延拓定理.** ■

8.4.2 微分流形等距

给定两个广义黎曼流形 (M, g) 和 (N, h)，它们的维数分别是 m 和 n，且 $m \leqslant n$；两个流形间存在光滑浸入（或嵌入）映射 $\phi : M \to N$.

定义 8.21 如果 $g_{ab} = \phi^* h_{ab}$，即 $\forall p \in M$，以及 $\forall u^a, v^b \in T_pM$ 都有

$$g_{ab} u^a v^b = h_{ab}(\phi_* u^a)(\phi_* v^b) \quad \Leftrightarrow \quad \langle u, v \rangle_g = \langle \phi_* u,\ \phi_* v \rangle_h , \tag{8.4-6}$$

则称 ϕ 是从 (M, g) 到 (N, h) 的一个**等距浸入**（或嵌入）映射.

等距浸入在局部上必是等距嵌入. 等距浸入不要求两个流形维数相等. 浸入映射 ϕ 会将 (N, h) 中的度规拉回到 M 中，这时 M 中有两个度规，但 g_{ab} 未必等于 $\phi^* h_{ab}$；只有两者相等才是等距的.

例 8.22 在等距浸入8.21中，两个流形维数未必相同. 比如给定流形 M 是实直线，和流形 N 是二维实平面，两者都是正定欧氏度规；自然存在将实直线等距浸入（其实是正则嵌入）到二维平面的包含映射 $\imath$.

例 8.23 把二维球面正则嵌入到 $\mathbb{R}^3$ 中也是等距嵌入，详见例10.15.

定义 8.24 若 ϕ 是等距浸入映射，再要求 ϕ 是微分同胚，那么称 ϕ 是从 (M,g) 到 (N,h) 的一个**整体等距同胚**映射，简称**等距**.

定义 8.25 若 ϕ 是等距浸入映射，再要求 $\forall p\in M$，$\phi_*:T_pM\to T_{\phi(p)}N$ 是线性同构，则称 ϕ 是从 (M,g) 到 (N,h) 的**局部等距同构**映射，简称**局部等距**.

整体等距同胚自然可以得到流形 M 和 N 的维数相等. 局部等距同构要求 M 和 N 的切空间是同构，自然得到 M 和 N 的切空间维数相等，从而流形 M 和 N 的维数也相等. 局部等距同构映射并不要求整体上是微分同胚，只要求每点切空间线性等距同构即可；由于局部等距时两个流形的维数相等，此时的浸入是局部微分同胚，即 $p\in M$ 点某开邻域到 $\phi(p)\in N$ 点某开邻域间的等距同胚；故局部等距同构也可以称为**局部等距同胚**.

注 8.26 等距映射（isometric map）也称为等度规（度量）映射，简称**等度映射**. 对于正定黎曼几何来说，这两种叫法是等同的. 对于不定黎曼几何来说，距离的定义并非像正定情形那样明确，故**等度映射**更为贴切. 但笔者读着“等距”比“等度”更为顺口，所以使用“等距”这个术语.

例 8.27 设 S^1 是 $\mathbb{R}^2$ 中的单位圆，指数映射 $\exp\equiv(\cos t,\sin t):\mathbb{R}^1\to S^1$，将 $\mathbb{R}^1$ 中的非紧致开集映射到 $\mathbb{R}^2$ 中的紧致闭子集 S^1. 指数映射 exp 只是切空间的局部等距同构映射，不是流形上的整体等距同胚映射. 流形 $\mathbb{R}$ 和 S^1 之间不存在微分同胚映射. 此例清楚地显示了局部等距概念和整体等距概念都是需要的.

例 8.28 设两个广义黎曼流形 (M,g) 和 (N,h) 间存在整体等距同胚（或局部等距同构）映射 $\phi:M\to N$，再设 $(U;x^i)$ 和 $(V;y^\alpha)$ 分别是 M 和 N 的局部坐标. 依照等距的定义，参考式(4.5-5)，有

$$g_{ab}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^b=h_{ab}\left(\phi_*\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a\right)\left(\phi_*\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^b\right)\Leftrightarrow g_{ij}=\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}h_{\alpha\beta}. \tag{8.4-7}$$

这便是等距同胚（或局部等距同构）在局部坐标系下的具体表示.

8.4.3 等距同胚保联络不变

定理 8.29 给定两个广义黎曼流形及 Levi-Civita 联络 (M,∇_a,g) 和 (N,D_a,h)，它们之间存在局部等距映射 $\phi:M\to N$；那么，$\forall p\in M$，和 $\forall X^a\in T_pM$，

$\forall Y^a \in \mathfrak{X}(M)$，都有

$$\phi_* \left(\nabla_X Y^a\right) = \mathrm{D}_{\phi_* X} \left(\phi_* Y^a\right). \tag{8.4-8}$$

即，作用在切矢场上的 Levi-Civita 联络 ∇_a 和 D_a 在局部等距下形式不变.

证明 . 设 $(U; x^i)$ 和 $(V; y^\alpha)$ 分别是 M 和 N 的局部坐标. 式(8.4-8)左端为

$$\phi_*(\nabla_X Y^a) = \left(X^i \frac{\partial Y^j}{\partial x^i}\right) \phi_* \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a + (X^i Y^j) \phi_* \left[\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a\right].$$

式(8.4-8)右端为（参考式(4.5-5)）

$$\mathrm{D}_{\phi_* X}(\phi_* Y^a) = X^i \left(\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i} \frac{\partial Y^j(x)}{\partial y^\alpha}\right) \phi_* \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a + X^i Y^j(x) \mathrm{D}_{\phi_* \frac{\partial}{\partial x^i}} \left(\phi_* \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a\right).$$

综合上面两式，可知要证明式(8.4-8)，等价于证明

$$\phi_* \left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a\right) = \mathrm{D}_{\phi_* \frac{\partial}{\partial x^i}} \left(\phi_* \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a\right). \tag{8.4-9}$$

式(8.4-9)左端为

$$\phi_* \left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a\right) = \phi_* \left(\Gamma^k_{ji}(x) \left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right)^a\right) = \Gamma^k_{ji}(x) \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^k} \left(\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right)^a.$$

其中 $\Gamma(x)$ 是 ∇_a 的联络系数. 式(8.4-9)右端为

$$\begin{aligned} \mathrm{D}_{\phi_* \frac{\partial}{\partial x^i}} \left(\phi_* \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a\right) &= \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i} \mathrm{D}_{\frac{\partial}{\partial y^\alpha}} \left(\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j} \left(\frac{\partial}{\partial y^\beta}\right)^a\right) \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial y^\beta}\right)^a \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i} \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \left(\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}\right) + \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i} \frac{\partial y^\beta}{\partial x^j} \gamma^\rho_{\beta\alpha}(y) \left(\frac{\partial}{\partial y^\rho}\right)^a. \end{aligned}$$

其中 $\gamma^\rho_{\beta\alpha}(y)$ 是 D_a 联络系数. 综合上述两式，要证明式(8.4-9)等价于证明

$$\Gamma^k_{ji}(x) \frac{\partial y^\rho}{\partial x^k} = \frac{\partial^2 y^\rho}{\partial x^j \partial x^i} + \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i} \frac{\partial y^\beta}{\partial x^j} \gamma^\rho_{\beta\alpha}(y). \tag{8.4-10}$$

要证明上式，需用局部等距概念，以及式(8.4-7)和它的逆变换（即下式）：

$$h_{\alpha\beta}(y) = \frac{\partial x^i}{\partial y^\alpha} \frac{\partial x^j}{\partial y^\beta} g_{ij}(x), \qquad h^{\alpha\beta}(y) = \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i} \frac{\partial y^\beta}{\partial x^j} g^{ij}(x). \tag{8.4-11}$$

式(8.4-10)右端第二项为（注意将上式代入）

$$\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i} \frac{\partial y^\beta}{\partial x^j} \gamma^\rho_{\beta\alpha}(y) = \frac{1}{2} \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i} \frac{\partial y^\beta}{\partial x^j} h^{\pi\rho} \left(\frac{\partial h_{\alpha\pi}}{\partial y^\beta} + \frac{\partial h_{\pi\beta}}{\partial y^\alpha} - \frac{\partial h_{\alpha\beta}}{\partial y^\pi}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}\frac{\partial y^\rho}{\partial x^k}\frac{\partial y^\pi}{\partial x^l}g^{kl}\left[\frac{\partial}{\partial y^\beta}\left(\frac{\partial x^o}{\partial y^\alpha}\frac{\partial x^n}{\partial y^\pi}g_{on}\right)+\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\left(\frac{\partial x^o}{\partial y^\pi}\frac{\partial x^n}{\partial y^\beta}g_{on}\right)-\frac{\partial}{\partial y^\pi}\left(\frac{\partial x^o}{\partial y^\alpha}\frac{\partial x^n}{\partial y^\beta}g_{on}\right)\right]$$
$$=\cdots=\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}\frac{\partial y^\rho}{\partial x^o}\frac{\partial^2 x^o}{\partial y^\beta\partial y^\alpha}+\frac{\partial y^\rho}{\partial x^k}\Gamma_{ij}^k(x).$$

上式计算冗长，中间省略一些步骤，请读者补齐．将上式代入式(8.4-10)，得

$$\Gamma_{ji}^k(x)\frac{\partial y^\rho}{\partial x^k}\overset{?}{=}\frac{\partial^2 y^\rho}{\partial x^j\partial x^i}+\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}\frac{\partial y^\rho}{\partial x^l}\frac{\partial^2 x^l}{\partial y^\beta\partial y^\alpha}+\frac{\partial y^\rho}{\partial x^k}\Gamma_{ij}^k(x). \tag{8.4-12}$$

利用式(6.1-7)发现上式是个恒等式，这样便证明了式(8.4-10)，那么自然可以得到式(8.4-9)，最终证明了式(8.4-8)． ■

注 8.30 其实还可以更简单地证明．因 ϕ 局部等距，则可认为两个坐标卡是恒等的，即 $y^i\equiv x^i$；进而度规完全相同，见式(8.4-7)；故式(8.4-10)为恒等式．

注 8.31 把定理8.29中的局部等距换成等距浸入，定理未必成立（见例10.16）．

例 8.32 定理8.29的另一种证明途径．

所有符号与定理8.29相同．在 N 中已有 Levi-Civita 联络 D_a，利用它，可在 M 中定义一个算符 $\bar\nabla_a$ 如下（$\bar\nabla_X\equiv X^a\bar\nabla_a$）：

$$\bar\nabla_X Y^a\overset{def}{=}\phi_*^{-1}\left(\mathrm{D}_{\phi_*X}(\phi_*Y^a)\right). \tag{8.4-13}$$

如果 ϕ 仅是浸入映射，则没有逆，无法进行上述定义．我们先验证它是 M 上的一个仿射联络，先验证 $\mathbb{R}$-线性（设 $Z^a\in\mathfrak{X}(M)$，$\lambda\in\mathbb{R}$）：

$$\begin{aligned}\bar\nabla_X(Y^a+\lambda Z^a)=&\phi_*^{-1}\left(\mathrm{D}_{\phi_*X}(\phi_*Y^a+\lambda\phi_*Z^a)\right)=\phi_*^{-1}\left(\mathrm{D}_{\phi_*X}\phi_*Y^a+\lambda\mathrm{D}_{\phi_*X}\phi_*Z^a\right)\\=&\phi_*^{-1}\left(\mathrm{D}_{\phi_*X}\phi_*Y^a\right)+\lambda\phi_*^{-1}\left(\mathrm{D}_{\phi_*X}\phi_*Z^a\right)=\bar\nabla_X Y^a+\lambda\bar\nabla_X Z^a.\end{aligned}$$

再验证加法（$f\in C^\infty(M)$）：

$$\begin{aligned}\bar\nabla_{f\cdot Y+Z}X^a=&\phi_*^{-1}\left(\mathrm{D}_{\phi_*(f\cdot Y+Z)}\phi_*X^a\right)=\phi_*^{-1}\left(\mathrm{D}_{\phi_*(fY)}\phi_*X^a+\mathrm{D}_{\phi_*Z}\phi_*X^a\right)\\=&\phi_*^{-1}\left(\mathrm{D}_{\phi_*(fY)}\phi_*X^a\right)+\phi_*^{-1}\left(\mathrm{D}_{\phi_*Z}\phi_*X^a\right)=\bar\nabla_{f\cdot Y}X^a+\bar\nabla_Z X^a.\end{aligned}$$

接着验证 Leibniz 法则（参见命题4.63）：

$$\begin{aligned}\bar\nabla_X(f\cdot Y^a)=&\phi_*^{-1}\left(\mathrm{D}_{\phi_*X}\phi_*(fY^a)\right)=\phi_*^{-1}\left(\mathrm{D}_{\phi_*X}((f\circ\phi^{-1})(\phi_*Y^a))\right)\\=&\phi_*^{-1}\left((\phi_*X(f\circ\phi^{-1}))(\phi_*Y^a)\right)+\phi_*^{-1}\left((f\circ\phi^{-1})\mathrm{D}_{\phi_*X}(\phi_*Y^a)\right)\end{aligned}$$

$$=X(f)Y^a+f\cdot\phi_*^{-1}\left(\mathrm{D}_{\phi_*X}(\phi_*Y^a)\right)=X(f)Y^a+f\cdot\bar{\nabla}_XY^a.$$

这样便证明了式(8.4-13)中定义的算符 $\bar{\nabla}_a$ 是 M 上的一个仿射联络.

下面验证仿射联络(8.4-13)是无挠的，自然要利用 D_a 的无挠性.

$$\begin{aligned}T^a_{bc}X^bY^c=&\bar{\nabla}_XY^a-\bar{\nabla}_YX^a-[X,Y]^a=\phi_*^{-1}\left(\mathrm{D}_{\phi_*X}\phi_*Y^a\right)-\phi_*^{-1}\left(\mathrm{D}_{\phi_*Y}\phi_*X^a\right)-[X,Y]^a\\=&\phi_*^{-1}\left(\mathrm{D}_{\phi_*X}\phi_*Y^a-\mathrm{D}_{\phi_*Y}\phi_*X^a-[\phi_*X,\phi_*Y]^a\right)=\phi_*^{-1}(0)=0.\end{aligned}$$

最后验证仿射联络(8.4-13)与度规相容条件(8.1-1)，这步需用局部等距条件.

$$\begin{aligned}X(g_{ab}Y^aZ^b)=&\phi_*^{-1}\circ\phi_*\left(X(g_{ab}Y^aZ^b)\right)=\phi_*^{-1}\left(\phi_*X((\phi^{-1*}g_{ab})\phi_*Y^a\phi_*Z^b)\right)\\=&\phi_*^{-1}\left(\phi_*X(h_{ab}\phi_*Y^a\phi_*Z^b)\right)\\=&\phi_*^{-1}\left(h_{ab}(\mathrm{D}_{\phi_*X}\phi_*Y^a)\phi_*Z^b+h_{ab}\phi_*Y^a\mathrm{D}_{\phi_*X}\phi_*Z^b\right)\\=&g_{ab}(\bar{\nabla}_XY^a)Z^b+g_{ab}Y^a\bar{\nabla}_XZ^b.\end{aligned}$$

上式说明了仿射联络(8.4-13)与度规 g_{ab} 相容. 根据定理8.5可知由(8.4-13)式定义的仿射联络 $\bar{\nabla}_a$ 就是 M 上的 Levi-Civita 联络 ∇_a. 证毕.

命题 8.33 给定两个广义黎曼流形及 Levi-Civita 联络 (M,∇_a,g) 和 (N,D_a,h)，它们之间存在局部等距映射 $\phi:M\to N$；那么，$\forall p\in M$，和 $\forall X^a\in T_pM$，$\forall f\in C^\infty(M)$，都有

$$\Phi_*(\nabla_Xf)=\mathrm{D}_{\phi_*X}(\phi^{-1*}f).\tag{8.4-14}$$

也就是说，作用在标量场上的 Levi-Civita 联络在局部等距映射下不变. Φ_* 定义与定理4.71中的 Φ^* 定义类似，矢量 $X^a\in T_pM$ 需要用 ϕ_* 推前，而 $f\in C^\infty(M)$ 需要用 ϕ^{-1*} 拉回到 $C^\infty(N)$.

证明 . 式(8.4-14)左端为

$$\Phi_*(\nabla_Xf)=\phi^{-1*}\big(X(f)\big)=(X^i\circ\phi^{-1})\cdot\frac{\partial f\circ\phi^{-1}\big(y(x)\big)}{\partial x^i}=(X^i\circ\phi^{-1})\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial f\circ\phi^{-1}}{\partial y^\alpha}.$$

式(8.4-14)右端为

$$\mathrm{D}_{\phi_*X}(\phi^{-1*}f)=\phi_*X\big(\phi^{-1*}(f)\big)=(X^i\circ\phi^{-1})\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial f\circ\phi^{-1}}{\partial y^\alpha}.$$

综合以上两式，可见命题正确. ■

命题 8.34 给定两个广义黎曼流形及 Levi-Civita 联络 (M,∇_a,g) 和 (N,D_a,h)，它们之间存在局部等距映射 $\phi:M\to N$；那么，$\forall p\in M$，和 $\forall X^a\in T_pM$，$\forall\omega_a\in\mathfrak{X}^*(M)$，都有

$$\Phi_*(\nabla_X\omega_a)=\mathrm{D}_{\phi_*X}(\phi^{-1*}\omega_a). \tag{8.4-15}$$

也就是说，作用在协变矢量场上的 Levi-Civita 联络在局部等距映射下不变.

证明 . 利用命题8.33和定理8.29容易证明本命题. $\forall Y^a\in\mathfrak{X}(M)$ 有

$$\begin{aligned}\Phi_*\big(\nabla_X(\omega_aY^a)\big)=&\Phi_*\big((\nabla_X\omega_a)Y^a+\omega_a\nabla_XY^a\big)\\=&\big(\Phi_*(\nabla_X\omega_a)\big)\phi_*Y^a+\phi^{-1*}(\omega_a)\mathrm{D}_{\phi_*X}(\phi_*Y^a).\end{aligned}$$

而 ω_aY^a 本身还是标量场，还可用式(8.4-14)操作

$$\begin{aligned}\Phi_*\big(\nabla_X(\omega_aY^a)\big)=&\mathrm{D}_{\phi_*X}\big(\phi^{-1*}(\omega_aY^a)\big)=\mathrm{D}_{\phi_*X}\big((\phi^{-1*}\omega_a)(\phi_*Y^a)\big)\\=&\big(\mathrm{D}_{\phi_*X}(\phi^{-1*}\omega_a)\big)(\phi_*Y^a)+(\phi^{-1*}\omega_a)\big(\mathrm{D}_{\phi_*X}(\phi_*Y^a)\big).\end{aligned}$$

综合以上两式，可证式(8.4-15). ■

综上可见，局部等距映射保 Levi-Civita 联络（可作用在任何 $\binom{r}{s}$ 型张量场上）不变；尤其作用在黎曼曲率、Ricci 曲率、标量曲率和 Weyl 曲率上是保形式不变的. 如果把局部等距同构变成整体等距同胚，上面所有定理仍旧正确.

鉴于黎曼曲率的重要性，我们还是将其叙述成定理形式.

定理 8.35 设有局部等距映射 $\phi:M\to N$. $\forall X^a,Y^a,Z^a,W^a\in\mathfrak{X}(M)$，有

$$\Phi_*\big(R^M_{dcab}X^aY^bZ^cW^d\big)=\big(R^N_{dcab}(\phi_*X^a)(\phi_*Y^b)(\phi_*Z^c)(\phi_*W^d)\big)\circ\phi. \tag{8.4-16}$$

其中 R^M_{dcab}、R^N_{dcab} 分别是 M、N 上的黎曼曲率. 式(8.4-16)简记为 $R^M_{dcab}=\phi^*R^N_{dcab}$.

一般情形下，定理8.35的逆命题是不成立的，见例题14.6.

定理 8.36 设 (M,g,∇_a) 和 (N,h,D_a) 间存在局部等距 $\phi:M\to N$. 则

(1) M 上曲线 $\gamma(t)$ 的切矢的等距切映射是 $\gamma(t)$ 的等距像 $\tilde\gamma\equiv\phi\circ\gamma$ 的切矢.

(2) $\gamma(t)$ 是 M 上测地线的充要条件是 $\tilde\gamma$ 是 N 上测地线.

证明 . 流形 M 上有光滑曲线 $\gamma(t)$，它在流形 N 中的像曲线是 $\tilde\gamma(t)=\phi\circ\gamma(t)$. 通过式(4.5-8)可知两条曲线的切矢量关系是（因 ϕ 是局部等距，下式不只在 $t=0$

点成立，而在整条曲线上成立，即参数 t 可取定义域内所有值）：

$$\phi_*\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\gamma(t)}\right)^a=\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\phi\circ\gamma(t)}\right)^a=\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\tilde{\gamma}(t)}\right)^a. \tag{8.4-17}$$

这便证明了 (1)．那么由局部等距保联络不变性可知

$$\phi_*\left(\nabla_{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|_\gamma}\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\gamma}\right)^a\right)=\mathrm{D}_{\phi_*\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|_\gamma}\phi_*\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\gamma}\right)^a=\mathrm{D}_{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|_{\tilde{\gamma}}}\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\tilde{\gamma}}\right)^a. \tag{8.4-18}$$

流形 M 上测地线（见定义6.14）自然是光滑曲线中的一类；故(8.4-18)式适用于测地线，由此可知 (2) 成立：$\gamma(t)$ 是测地线等价于 $\tilde{\gamma}(t)$ 是测地线． ■

练习 8-8 补全定理8.29证明过程中漏掉的步骤．

练习 8-9 证明定理8.35，详尽写出每一步．

8.5 Killing 切矢量场

德国数学家 Wilhelm Killing (1847 - 1923) 给出了广义黎曼流形中的局部等距同构变换无穷小生成元，即现今被称为 Killing 切矢量场的知识．

定义 8.37 广义黎曼流形 (M,g) 上处处非零的光滑切矢量场 ξ^a 被称为 **Killing 切矢量场**是指：如果 ξ^a 诱导出的局部单参数变换群是局部等距同构变换．

设切矢量场 ξ^a 诱导出的（局部）单参数微分同胚群是 $\phi_t:M\to M$（见§4.10），由定义8.25可知，局部等距同构是指 $g_{ab}=\phi_t^*g_{ab}$ 对任意 t 成立．

定理 8.38 ξ^a 为 Killing 切矢量场的充要条件是满足如下条件之一即可．

$$(1):\quad \pounds_\xi g_{ab}=0. \tag{8.5-1}$$

$$(2):\quad \nabla_a\xi_b+\nabla_b\xi_a=0\quad\Leftrightarrow\quad\nabla_{(a}\xi_{b)}=0\quad\Leftrightarrow\quad\nabla_a\xi_b=\nabla_{[a}\xi_{b]}. \tag{8.5-2}$$

证明 ．参考李导数定义(4.11-3)可知局部等距同构等价于 $\pounds_\xi g_{ab}=0$，这说明条件 (1) 正确．由下式可直接得到条件 (2) 也正确，式(8.5-2)称为 **Killing 方程**．

$$0=\pounds_\xi g_{ab}\overset{6.1-31}{=\!=\!=}\xi^c\nabla_c g_{ab}+g_{cb}\nabla_a\xi^c+g_{ac}\nabla_b\xi^c=\nabla_a\xi_b+\nabla_b\xi_a.$$

证明过程中注意 Levi-Civita 联络是无挠、容许仿射联络． ■

将 Killing 方程(8.5-2)的指标收缩，可得一个常用公式：

$$\nabla_a\xi^a=0. \tag{8.5-3}$$

8.5.1 基本性质

定理 8.39 非零 ξ^a 是局部开集 U 的 Killing 切矢量场的充要条件是：存在局部坐标系 $(U;x^i)$ 使得度规场 g_{ab} 的全部分量满足 $\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^1}=0$，并且 $\xi^a|_U=(\frac{\partial}{\partial x^1})^a$.

证明 . 先证“⇒”. 由定理4.86可知，对于任意非零 Killing 切矢量场 ξ^a 都存在局部适配坐标系$(U;x^i)$ 使得 $\xi^a|_U=(\frac{\partial}{\partial x^1})^a$. 因 ξ^a 是 Killing 切矢量场，故

$$\pounds_\xi g_{ij}\overset{4.11-13}{=\!=\!=}\left(\pounds_\xi g_{ab}\right)\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^b=0\ \Rightarrow\ 0=\pounds_\xi g_{ij}=\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^1}. \tag{8.5-4}$$

再证“⇐”. $(\frac{\partial}{\partial x^1})^a$ 可以看作是 U 上的一个切矢量场，并且 $\{x^i\}$ 就是局部适配坐标系. 根据 §4.10中理论可知，它一定会诱导一个局部单参数可微变换群 $\phi_t:U\to U$. $\forall f\in C^\infty(U)$，ϕ_t 所诱导出的李导数就是 $\pounds_{\frac{\partial}{\partial x^1}}f=\frac{\partial f}{\partial x^1}$. 把它应用到度规场 g_{ab} 上，有

$$0=\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^1}=\pounds_\xi g_{ij}\overset{4.11-13}{=\!=\!=}\left(\pounds_{\frac{\partial}{\partial x^1}}g_{ab}\right)\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^b. \tag{8.5-5}$$

因局部自然标架场 $\{(\frac{\partial}{\partial x^i})^a\}$ 恒不为零，故必有 $\pounds_{\frac{\partial}{\partial x^1}}g_{ab}=0$；所以 $(\frac{\partial}{\partial x^1})^a$ 是局部开集 U 上的 Killing 切矢量场. ■

例 8.40 流形 M 上局部等距8.25的局部坐标系表述.

与例8.28类似，设有广义黎曼流形 (M,g)；为简单起见，我们只研究单参数微分变换群 $\phi_t:M\to M$. 再设 $(U;x)$ 和 $(V;y)$ 分别是 $\forall p\in M$ 和 $q=\phi_t(p)\in M$ 的局部坐标，即 $y=\phi_t(x)$. 为了更有区分度，我们混用拉丁、希腊字母. 映射 ϕ_t 将 q 点的度规拉回 p 点，由于两点距离无穷小，可记 $y^a=x^a+\epsilon^a(x)$；则

$$\begin{aligned}\tilde g_{ab}(x)\overset{def}{=}\phi_t^*g_{ab}(q)=\phi_t^*\left[g_{\alpha\beta}(y)(\mathrm dy^\alpha)_a(\mathrm dy^\beta)_b\right]&\overset{4.5-6}{=\!=\!=}\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}g_{\alpha\beta}(y)(\mathrm dx^i)_a(\mathrm dx^j)_b\\&=(\delta_i^\alpha+\partial_i\epsilon^\alpha)\left(\delta_j^\beta+\partial_j\epsilon^\beta\right)\left(g_{\alpha\beta}(x)+\epsilon^k\partial_kg_{\alpha\beta}(x)+\cdots\right)(\mathrm dx^i)_a(\mathrm dx^j)_b\\&\overset{\text{忽略高}\atop\text{阶小量}}{=\!=\!=}\left[g_{ij}(x)+g_{\alpha j}(x)\partial_i\epsilon^\alpha+g_{i\beta}(x)\partial_j\epsilon^\beta+\epsilon^c\partial_cg_{ij}(x)\right](\mathrm dx^i)_a(\mathrm dx^j)_b\\&\overset{6.1-32}{=\!=\!=}g_{ab}(x)+\pounds_\epsilon g_{ab}(x).\end{aligned}$$

现在点 p（其局部用坐标 $\{x\}$ 表示）处有两个度量，一个是 $\tilde g_{ab}(x)$，另一个是 $g_{ab}(x)$；两个度量未必相等. 上式说明：当 ϕ_t 不是局部等距同构变换时（即矢量

场 ϵ^a 不是 Killing 场，$\pounds_\epsilon g_{ab}\neq 0$），那么我们无法得到 $g_{ab}(x)=\tilde{g}_{ab}(x)$. 若 ϕ_t 是局部等距同构变换，则可得其局部坐标系表达式为（去掉自然坐标基矢量）：

$$g_{ij}(x)=\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}g_{\alpha\beta}(y). \tag{8.5-6}$$

注意如下区别：由单点张量坐标变换式（见式(4.4-19)）可以得到 $\tilde{g}_{ij}=\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial y^\beta}{\partial x^j}g_{\alpha\beta}$，等号左端是 $\tilde{g}$；这个式子等号两端必须是同一点的张量. 在变换式(8.5-6)中，我们用坐标 $\{x\}$、$\{y\}$ 来代表两个不同点（p、q 两点距离非常近）. 两式的核心差异是一个是单点张量变换，另一个是两点张量变换；但公式形式完全相同.

若等距，则必有 $\tilde{g}_{ab}(x)=g_{ab}(x)$，故式(8.5-6)中的 $g_{ij}(x)$ 上是否带有波浪号则是无关紧要的；式(4.4-19)与(8.5-6)差异的核心不是这个波浪号. ■

例 8.41 设 ξ^a 和 η^a 是广义黎曼流形 (M,g) 上的两个 Killing 切矢量场.

$$\pounds_{[\xi,\eta]}g_{ab}\overset{6.1-36}{=\!=\!=}\pounds_\xi\circ\pounds_\eta g_{ab}-\pounds_\eta\circ\pounds_\xi g_{ab}=\pounds_\xi(0)-\pounds_\eta(0)=0. \tag{8.5-7}$$

故 $[\xi,\eta]^a$ 也是 Killing 切矢量场. 本例也可直接把 $[\xi,\eta]^a$ 代入 Killing 方程去证明，但计算过程略繁琐；留作习题. ■

定理 8.42 设两个广义黎曼流形 (M,g,∇_a) 和 (N,h,D_a) 间存在局部等距同构 $\phi:M\to N$，$\xi^a\in\mathfrak{X}(M)$. 则 $\phi_*\xi^a$ 是 N 上 Killing 切矢量场的充要条件是 ξ^a 是 M 上 Killing 切矢量场.

证明 . 由定理8.38出发，得

$$\nabla_a\xi_b+\nabla_b\xi_a=0\Leftrightarrow\phi^{-1*}\big(\nabla_a\xi_b+\nabla_b\xi_a\big)=0\overset{\text{命题 8.34}}{\Longleftrightarrow}\mathrm{D}_a(\phi^{-1*}\xi_b)+\mathrm{D}_b(\phi^{-1*}\xi_a)=0.$$

上式便证明了定理. ■

定理 8.43 设有广义黎曼流形 (M,g)，ξ^a 是其上 Killing 切矢量场，T^a 是其测地线 $\gamma(t)$ 的切线切矢量. 那么有 $\nabla_T(T^a\xi_a)=0$，即 $T^a\xi_a$ 沿测地线 $\gamma(t)$ 是常数.

证明 . 测地线定义见6.14，即 $\nabla_T T^a=0$.

$$\nabla_T(T^a\xi_a)=T^a\nabla_T\xi_a+\xi_a\nabla_T T^a=T^aT^b\nabla_b\xi_a\overset{8.38(2)}{=\!=\!=}T^{(a}T^{b)}\nabla_{[b}\xi_{a]}\overset{3.8-22}{=\!=\!=}0.$$

在广义相对论中，经常用到这个定理. ■

8.5.2 Killing 切矢量场与曲率关系

Killing 切矢量场 ξ_a 满足如下对易子式子（见式(6.2-3)）

$$\nabla_a\nabla_b\xi_c-\nabla_b\nabla_a\xi_c=-R^e_{cab}\xi_e. \tag{8.5-8}$$

由上式和 Bianchi 第一恒等式(6.2-12)可得

$$\begin{aligned}0=-R^e_{[cab]}\xi_e&=\nabla_{[a}\nabla_b\xi_{c]}-\nabla_{[b}\nabla_a\xi_{c]}=\nabla_{[c}\nabla_a\xi_{b]}-\nabla_{[c}\nabla_b\xi_{a]}\xrightarrow{8.5-2}2\nabla_{[c}\nabla_a\xi_{b]}\\&\xrightarrow{8.5-2}\quad 0=\nabla_c\nabla_a\xi_b+\nabla_a\nabla_b\xi_c-\nabla_b\nabla_a\xi_c.\end{aligned} \tag{8.5-9}$$

将式(8.5-9)带回(8.5-8)可得

$$\nabla_a\nabla_b\xi_c-\nabla_c\nabla_a\xi_b-\nabla_a\nabla_b\xi_c=-R^e_{cab}\xi_e\quad\Rightarrow\quad\nabla_c\nabla_a\xi_b=R^e_{cab}\xi_e. \tag{8.5-10}$$

这是 Killing 场与黎曼曲率的关系式之一．将上式中指标收缩可得第二式：

$$\nabla_c\nabla^c\xi_b=-R_{eb}\xi^e. \tag{8.5-11}$$

用 Killing 场 ξ^b 缩并约化 Bianchi 恒等式(8.2-11)两端，经计算可得

$$\xi^b\nabla_bR=0. \tag{8.5-12}$$

这是第三个 Killing 场与曲率间的关系式.

设 ξ^a 是 M 上的 Killing 切矢量场，则曲率的李导数为：

$$\pounds_\xi R_{abcd}=0;\qquad\pounds_\xi R_{ac}=0;\qquad\pounds_\xi R=0. \tag{8.5-13}$$

上式的计算过程如下：

$$\begin{aligned}\pounds_\xi R^a_{bcd}&\xrightarrow{6.1-31}\nabla_\xi R^a_{bcd}-R^e_{bcd}\nabla_e\xi^a+R^a_{ecd}\nabla_b\xi^e+R^a_{bed}\nabla_c\xi^e+R^a_{bce}\nabla_d\xi^e\\&\xrightarrow{6.2-13}-\nabla_c(\xi^eR^a_{bde})-\nabla_d(\xi^eR^a_{bec})+R^a_{bde}\nabla_c\xi^e+R^a_{bec}\nabla_d\xi^e\\&\quad-R^e_{bcd}\nabla_e\xi^a+R^a_{ecd}\nabla_b\xi^e+R^a_{bed}\nabla_c\xi^e+R^a_{bce}\nabla_d\xi^e\\&\xrightarrow{8.5-10}-\nabla_c(\nabla_d\nabla_b\xi^a)+\nabla_d(\nabla_c\nabla_b\xi^a)+R^a_{bde}\nabla_c\xi^e+R^a_{bec}\nabla_d\xi^e\\&\quad-R^e_{bcd}\nabla_e\xi^a+R^a_{ecd}\nabla_b\xi^e+R^a_{bed}\nabla_c\xi^e+R^a_{bce}\nabla_d\xi^e\\&\xrightarrow{6.2-4}-R^e_{bdc}\nabla_e\xi^a+R^a_{edc}\nabla_b\xi^e-R^e_{bcd}\nabla_e\xi^a+R^a_{ecd}\nabla_b\xi^e\xrightarrow[\text{反对称性}]{\text{利用曲率}}0.\end{aligned}$$

其实，Killing 切矢量场可诱导出单参数等距变换群，等距变换自然保黎曼曲率不变（定理8.35），故黎曼曲率沿 Killing 场的李导数恒为零.

定理 8.44 m 维广义黎曼流形 M 上最多有 $m(m+1)/2$ 个线性独立 Killing 场.

证明 . 定理中线性独立是指 $\mathbb{R}$-线性独立3.3，也就是组合系数必须是实常数；不是 $C^\infty(M)$-线性独立（见第127页及135页）.

在给出点 p 的 ξ_a 和 $\nabla_b\xi_a$ 后，我们可以从式(8.5-10)决定 ξ_a 在 p 点的二阶导数. 对式(8.5-10)继续求协变导数则可陆续得出 ξ_a 在 p 点的高阶导数，所有高阶导数都可表示成 $\xi_a(p)$ 和 $\nabla_b\xi_a(p)$ 的 $C^\infty(M)$ 线性组合. 于是，在点 p 的某个小邻域内，任意度规 g_{ab} 的 Killing 切矢量场 $\xi_a(x)$ 都可以表示为 $x^\mu - x^\mu_p$ 的 Taylor 级数（如果它存在）：

$$\begin{aligned}\xi_a(x) =&\xi_\rho(x)\left(\mathrm{d}x^\rho\right)_a = \left(\mathrm{d}x^\rho\right)_a\Big(\xi_\rho(p) + \xi_{\rho;\mu}(p)(x^\mu - x^\mu_p)\\ &+\frac{1}{2!}\xi_{\rho;\mu;\nu}(p)(x^\mu - x^\mu_p)(x^\nu - x^\nu_p) + \cdots\Big).\end{aligned}$$

依照前面分析，所有高于一阶的导数都能表示为 $\xi_a(p)$ 和 $\nabla_b\xi_a(p)$ 的 $C^\infty(M)$ 线性组合；故将上式重新组合为

$$\xi_a(x) = \left(\mathrm{d}x^\rho\right)_a\left(A^\lambda_\rho(x^\mu;p)\xi_\lambda(p) + B^{\lambda\nu}_\rho(x^\mu;p)\xi_{\lambda;\nu}(p)\right). \tag{8.5-14}$$

对于 m 维流形，$\xi_\lambda(p)$ 有 m 个分量指标；因反对称关系(8.5-2)，$\xi_{\lambda;\nu}(p)$ 的独立分量指标有 $m(m-1)/2$ 个.

我们来看看 p 点邻域内共有多少个 $\mathbb{R}$-线性独立的 $\xi^n_a(x)$，这些 $\xi^n_a(x)$ 都可表示成式(8.5-14)的样子；$\xi^n_a(x)$ 的右上角标 n 表示满足式(8.5-14)且互不相同的 Killing 场. 假设当有 N 个 $\xi^n_a(x)$ 时，存在非零实常数 $\{c_n\}$ 使得下式成立：

$$0 = \sum_{n=1}^N c_n\xi^n_\rho(x) = A^\lambda_\rho(x^\mu;p)\sum_{n=1}^N\left(c_n\xi^n_\lambda(p)\right) + B^{\lambda\nu}_\rho(x^\mu;p)\sum_{n=1}^N\left(c_n\xi^n_{\lambda;\nu}(p)\right). \tag{8.5-15}$$

如果 N 是个极大的正整数，那么上式必然成立；我们是来求 N 的最小值. 由于 $A^\lambda_\rho(x^\mu;p)$ 和 $B^{\lambda\nu}_\rho(x^\mu;p)$ 是 $C^\infty(M)$ 函数场，它们不会为零；故要使(8.5-15)式成立，必然等价于下式成立

$$\sum_{n=1}^N\left(c_n\xi^n_\lambda(p)\right) = 0 \quad \text{并且} \quad \sum_{n=1}^N\left(c_n\xi^n_{\lambda;\nu}(p)\right) = 0. \tag{8.5-16}$$

我们把上式改成一个线性代数方程组

$$\begin{pmatrix} \xi_1^1(p) & \xi_1^2(p) & \cdots & \xi_1^N(p) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \xi_m^1(p) & \xi_m^2(p) & \cdots & \xi_m^N(p) \\ \xi_{1;2}^1(p) & \xi_{1;2}^2(p) & \cdots & \xi_{1;2}^N(p) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \xi_{m-1;m}^1(p) & \xi_{m-1;m}^2(p) & \cdots & \xi_{m-1;m}^N(p) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_N \end{pmatrix} = 0. \tag{8.5-17}$$

显然只有 $N > m(m+1)/2$ 时（列数大于行数），上式才肯定有非零解；故点 $p \in M$ 邻域内 $\mathbb{R}$-线性独立的 Killing 切矢量场 $\xi_a(x)$ 的最大个数是 $m(m+1)/2$. 需要注意的是，并不是任何情形下流形 M 的独立 Killing 切矢量场都能达到 $m(m+1)/2$ 个；很多时候独立场个数都小于这个数. ■

8.5.3 平直闵氏空间的 Killing 切矢量场

本节试着找到 $m+1$ 维平直（黎曼曲率为零）Minkowski 空间 $\mathbb{R}_1^{m+1}$ 的全部 Killing 切矢量场. 根据定理8.44可知 $\mathbb{R}_1^{m+1}$ 最多有 $(m+2)(m+1)/2$ 个 $\mathbb{R}$-线性独立的 Killing 切矢量场. 求解 Killing 方程是寻找 Killing 切矢量场的通用方式；一般说来在弯曲时空这种方式很难奏效（方程复杂，很难求出精确解），但在平直时空却很好用. 我们已知 $\mathbb{R}_1^{m+1}$ 的度规场是

$$\eta_{ab} = -(\mathrm{d}x^0)_a(\mathrm{d}x^0)_b + \sum_{i=1}^{m}(\mathrm{d}x^i)_a(\mathrm{d}x^i)_b. \tag{8.5-18}$$

对于平直空间，黎曼曲率恒为零，协变导数变为偏导数；自然坐标基矢场 $(\frac{\partial}{\partial x^\mu})^a$ 和其对偶基矢场 $(\mathrm{d}x^\mu)_a$ 都是常矢量场，不逐点变化. 由式(8.5-10)可知

$$\partial_c\partial_a\xi_b = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2\xi_\sigma}{\partial x^\mu \partial x^\nu} = 0. \tag{8.5-19}$$

这说明 $\xi_b = \xi_\mu(\mathrm{d}x^\mu)_b$ 的系数 ξ_μ 是坐标 x_α 的线性函数，即

$$\xi_\mu = \sum_\alpha c_{\mu\alpha}x_\alpha + a_\mu, \qquad c_{\mu\alpha}, a_\mu\text{是实常数.} \tag{8.5-20}$$

平直闵氏空间的 Killing 方程(8.5-2)是

$$\frac{\partial\xi_\mu}{\partial x^\nu} + \frac{\partial\xi_\nu}{\partial x^\mu} = 0. \tag{8.5-21}$$

式(8.5-20)最简单情形为 $c_{\mu\alpha}=0,\ a_\mu\neq 0$，它自然满足式(8.5-21)，故下式

$$\xi^a=\left(\frac{\partial}{\partial x^\mu}\right)^a,\qquad 0\leqslant\mu\leqslant m,\quad \text{共 } m+1 \text{ 个} \tag{8.5-22}$$

是平直闵氏空间的 Killing 切矢量场，我们将其标记为第一组．上式中取 $a_\mu=1$；如果 a_μ 取任何非零实常数，都不会导致新的 $\mathbb{R}$-线性独立 Killing 切矢量场．下面只讨论 $a_\mu=0$ 情形．

将式(8.5-20)代入 Killing 方程(8.5-21)得

$$0=\sum_\alpha\frac{\partial c_{\mu\alpha}x_\alpha}{\partial x^\nu}+\sum_\alpha\frac{\partial c_{\nu\alpha}x_\alpha}{\partial x^\mu}=\sum_\alpha c_{\mu\alpha}\eta_{\alpha\nu}+\sum_\alpha c_{\nu\alpha}\eta_{\alpha\mu}. \tag{8.5-23}$$

当 $\mu=\nu$ 时，式(8.5-23)变成了

$$0=\sum_\alpha c_{\mu\alpha}\eta_{\alpha\mu}=c_{\mu\mu}\eta_{\mu\mu},\qquad \text{重复指标}\mu\text{不求和.} \tag{8.5-24}$$

$\eta_{\mu\mu}=\pm1$，这说明 $c_{\mu\mu}=0$，也就是 Killing 场分量 ξ_μ 不含 x^μ（或 x_μ）．

下面只考虑 $\mu\neq\nu$ 的情形，式(8.5-23)变成了

$$0=c_{\mu\nu}\eta_{\nu\nu}+c_{\nu\mu}\eta_{\mu\mu},\qquad \text{重复指标不求和.} \tag{8.5-25}$$

下面针对平直闵氏空间开始讨论式(8.5-25)；因度规 $\eta=\mathrm{diag}(-1,1,\cdots,1)$，其中“$-1$”只有一个，所以可以取 $\mu=0,\ \nu=i(i>0)$，有

$$0=c_{0i}\eta_{ii}+c_{i0}\eta_{00}=c_{0i}-c_{i0}. \tag{8.5-26}$$

由上式可以得到平直闵氏空间的第二组 Killing 切矢量场

$$\xi^a=x^0\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a+x^i\left(\frac{\partial}{\partial x^0}\right)^a,\qquad 1\leqslant i\leqslant m,\quad \text{共 } m \text{ 个.} \tag{8.5-27}$$

因系数 $c_{\mu\nu}$ 是实常数，不妨取其值为 ±1，这不影响 Killing 场的线性独立性．

下面考虑 η 中“$+1$”部分；可取 $\mu=j,\ \nu=i$，式(8.5-25)变为

$$0=c_{ji}\eta_{ii}+c_{ij}\eta_{jj}=c_{ji}+c_{ij},\qquad j>i>0. \tag{8.5-28}$$

由上式可以得到平直闵氏空间的第三组 Killing 切矢量场

$$\xi^a=-x^j\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a+x^i\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a,\ 1\leqslant i<j\leqslant m,\ \text{共 }\frac{m(m-1)}{2}\text{ 个.} \tag{8.5-29}$$

依据定理8.44可知，上述三组 Killing 切矢量场（共有 $(m+2)(m+1)/2$ 个）是 $m+1$ 维平直闵氏空间的全部 Killing 切矢量场．

我们将在 §13.15继续探讨这些 Killing 切矢量场的物理意义．

8.6 广义黎曼流形上的算子

本节介绍几个广义黎曼流形上的常用算子，这在数学、物理中有着较为广泛的应用；这些算子都是适用于整体的，都有局部坐标表示，它们为构造流形不变量提供了有力的工具．本节中我们假设 (M,g) 是 m 维、已定向的广义黎曼流形；如无特殊声明，假设局部坐标系是 $(U;x^i)$．

8.6.1 体积元

定向无非是给定一个 m 阶处处非零的外微分型式场（见定义5.27）．在积分的定义中（见式(5.7-1)或(5.7-9)），也是对一个 m 阶外微分型式场进行的．在有了度规后，可以定义一个特殊的 m 阶外微分型式场 $\Omega_{a_1\cdots a_m}$，称之为与度规 g_{ab} 相容的**体积元**，简称**体元**；即

$$\Omega^{a_1\cdots a_m}\Omega_{a_1\cdots a_m}=(-)^s m!,\quad \text{其中 } \Omega^{a_1\cdots a_m}=g^{a_1b_1}\cdots g^{a_mb_m}\Omega_{b_1\cdots b_m}. \tag{8.6-1}$$

其中 s 是度规 g_{ab} 负本征值的个数（即式(3.4-14)中“-1”的个数），对于广义 Minkowski 时空来说 $s=1$．因为它是 m 阶的微分型式场，所以它的基矢量只有一个，它同构于标量函数场（见 §3.8.2.1）．体积元 $\Omega_{a_1\cdots a_m}$ 可表示为

$$\Omega_{a_1\cdots a_m}=\Omega\,(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}. \tag{8.6-2}$$

将此式代入到式(8.6-1)中，有

$$\begin{aligned}(-)^s m!=&\Omega^2\ g^{a_1b_1}\cdots g^{a_mb_m}(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}(\mathrm{d}x^1)_{b_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{b_m}\\
\overset{3.8-46}{=\!=\!=}&\Omega^2\delta^{1\cdots m}_{i_1\cdots i_m}\delta^{1\cdots m}_{j_1\cdots j_m}g^{i_1j_1}\cdots g^{i_mj_m},\qquad \text{将 } \delta^{1\cdots m}_{i_1\cdots i_m} \text{ 按定义展开，得}\\
=&\Omega^2\delta^{1\cdots m}_{j_1\cdots j_m}\left((g^{1j_1}\cdots g^{mj_m})-(g^{2j_1}g^{1j_2}\cdots g^{mj_m})+\cdots\right),\qquad \text{共 } m!\text{ 项}\\
\overset{4}{=\!=}&m!\Omega^2\delta^{1\cdots m}_{j_1\cdots j_m}g^{1j_1}\cdots g^{mj_m}\overset{3.8-36}{=\!=\!=}m!\Omega^2\det(g^{ij}).\end{aligned}$$

其中 $\overset{4}{=\!=}$ 步是交换 $\{j\}$ 中次序（以第二项为例：先进行变量代换，将哑标 $j_1\to k, j_2\to j_1$，即 $-\delta^{123\cdots m}_{kj_1j_3\cdots j_m}g^{2k}g^{1j_1}\cdots g^{mj_m}$；然后交换 $\delta^{123\cdots m}_{kj_1j_3\cdots j_m}$ 中的 kj_1 次序，会产生一个“$-$”，即变为 $+\delta^{123\cdots m}_{j_1kj_3\cdots j_m}g^{2k}g^{1j_1}\cdots g^{mj_m}$，与前面的负号刚好负负得正；接着再作变量替换 $k\to j_2$，这样第二项便与第一项完全相同；这样的项共有 $m!$

个.）. 由此便可得到 $\Omega^2=(-)^s g$，其中 $g\equiv\det(g_{ij})$（注 $\det(g_{ij})$ 与 $\det(g^{ij})$ 刚好互为倒数）；便可得常用体积元公式：

$$\Omega_{a_1\cdots a_m}=\pm\sqrt{(-)^s g}\,(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}, \tag{8.6-3a}$$

$$=\pm\sqrt{(-)^s g}\,(e^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(e^m)_{a_m}. \tag{8.6-3b}$$

上式第一行采用的是自然切标架场 $\{(\partial_i)^a,(\mathrm{d}x^i)_a\}$，第二行采用的是更为一般的切标架场 $\{(e_i)^a,(e^i)_a\}$；$g\equiv\det(g_{ij})=\det(g(e_i,e_j))$，其基矢跟随切标架场变换. 虽然是在局部坐标系下得到的表达式，但上式在坐标变换下是形式不变的，换句话说此式是定义在整个流形 M 上的；验证过程留给读者（即另选一个局部坐标系 $\{y\}$ 进行坐标变换，$\sqrt{(-)^s g}$ 会产生一个 Jacobi 行列式；m 阶外积也会产生一个 Jacobi 行列式；两者刚好互逆，故形式不变）. 其实从求解过程便可看出此点，我们是从式(8.6-1)出发的，此式是缩并式，其结果是在 M 上不变的. 虽然体积元 $\Omega_{a_1\cdots a_m}$ 是整个流形上的坐标变换形式不变量，但单独的 $(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}$ 以及标量函数场 $g\equiv\det(g_{ij})$ 不是.

有了体积元，再重复一下定向问题. 给定可定向的广义黎曼流形 (M,g)，其有坐标图册 $(U_\alpha,\varphi_\alpha;x^j_\alpha)$，坐标图册自身是定向相符合的. 若取式(8.6-3)的“$+$”，则称体积元与坐标图册同向；若取“$-$”，则称体积元与坐标图册反向. 体积元本身就是一个定向.

如无特殊声明，我们约定取同向，也就是取式(8.6-3)的“$+$”.

例 8.45 平直四维闵氏时空（狭义相对论）中的体积元.

由式(3.8-51)（取变换矩阵 $a^j{}_i=\delta^j_i$）可知狭义相对论中体积元为

$$\Omega_{abcd}=+(\mathrm{d}x^0)_a\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^3)_d=+\frac{1}{4!}\delta^{0123}_{\alpha\beta\gamma\delta}(\mathrm{d}x^\alpha)_a\wedge(\mathrm{d}x^\beta)_b\wedge(\mathrm{d}x^\gamma)_c\wedge(\mathrm{d}x^\delta)_d$$

$$=-(\mathrm{d}x_0)_a\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x_3)_d=-\frac{1}{4!}\delta^{\alpha\beta\gamma\delta}_{0123}(\mathrm{d}x_\alpha)_a\wedge(\mathrm{d}x_\beta)_b\wedge(\mathrm{d}x_\gamma)_c\wedge(\mathrm{d}x_\delta)_d.$$

可见，我们需要定义

$$\epsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}\overset{def}{=}\delta^{0123}_{\alpha\beta\gamma\delta};\qquad\epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}=-\delta^{\alpha\beta\gamma\delta}_{0123}. \tag{8.6-4}$$

也就是选择 $\epsilon_{0123}=-\epsilon^{0123}=+1$ 才能使体积元是右手系（即式(8.6-3)取正号）. 如果选择 $-\epsilon_{0123}=\epsilon^{0123}=+1$，则等价于选择左手系的体积元，此时(8.6-3)式取负号. 正负号的选取只是习惯，与正确与否无关；但必须前后一致. ■

体积元间的缩并运算 下面给出体积元缩并公式：

$$\boxed{\Omega_{a_1\cdots a_r a_{r+1}\cdots a_m}\Omega^{b_1\cdots b_r a_{r+1}\cdots a_m} = (-)^s\,(m-r)!\,r!\,\delta^{b_1}_{[a_1}\delta^{b_2}_{a_2}\cdots\delta^{b_r}_{a_r]}.} \tag{8.6-5}$$

其中 $\Omega^{b_1\cdots b_r a_{r+1}\cdots a_m} \equiv g^{b_1c_1}\cdots g^{b_rc_r}g^{a_{r+1}c_{r+1}}\cdots g^{a_mc_m}\Omega_{c_1\cdots c_rc_{r+1}\cdots c_m}$，$0\leqslant r\leqslant m$.

直接计算证明式(8.6-5).

$$\begin{aligned}
&\Omega_{a_1\cdots a_r a_{r+1}\cdots a_m}\Omega^{b_1\cdots b_r a_{r+1}\cdots a_m} = g^{b_1c_1}\cdots g^{b_rc_r}g^{a_{r+1}c_{r+1}}\cdots g^{a_mc_m}\times\\
&\quad\times(-)^s g(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}\otimes(\mathrm{d}x^1)_{c_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{c_m}\\
&\overset{3.8-46}{=\!=\!=}(-)^s g\delta^{1\cdots m}_{i_1\cdots i_m}\delta^{1\cdots m}_{j_1\cdots j_m}(\mathrm{d}x^{i_1})_{a_1}\otimes\cdots\otimes(\mathrm{d}x^{i_r})_{a_r}\otimes(\mathrm{d}x^{j_1})_{c_1}\otimes\cdots\otimes(\mathrm{d}x^{j_r})_{c_r}\times\\
&\quad\times g^{b_1c_1}\cdots g^{b_rc_r}\cdot g^{i_{r+1}j_{r+1}}\cdots g^{i_mj_m}\\
&=(-)^s\delta^{1\cdots m}_{i_1\cdots i_m}(\mathrm{d}x^{i_1})_{a_1}\cdots(\mathrm{d}x^{i_r})_{a_r}\left(\frac{\partial}{\partial x^{\mu_1}}\right)^{b_1}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial x^{\mu_r}}\right)^{b_r}\times g\times\\
&\quad\times\delta^{1\cdots m}_{j_1\cdots j_m}g^{\mu_1j_1}\cdots g^{\mu_rj_r}g^{i_{r+1}j_{r+1}}\cdots g^{i_mj_m}.
\end{aligned}$$

上面最后一个等号的第二行（即 $\delta^{1\cdots m}_{j_1\cdots j_m}g^{\mu_1j_1}\cdots g^{\mu_rj_r}g^{i_{r+1}j_{r+1}}\cdots g^{i_mj_m}$）是行列式

$$\begin{vmatrix}
g^{\mu_1 1} & \cdots & g^{\mu_r 1} & g^{i_{r+1}1} & \cdots & g^{i_m 1}\\
g^{\mu_1 2} & \cdots & g^{\mu_r 2} & g^{i_{r+1}2} & \cdots & g^{i_m 2}\\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\
g^{\mu_1 m} & \cdots & g^{\mu_r m} & g^{i_{r+1}m} & \cdots & g^{i_m m}
\end{vmatrix} = g^{-1}\delta^{\mu_1\cdots\mu_r i_{r+1}\cdots i_m}_{1\cdots m}. \tag{8.6-6}$$

代入上上式后继续计算，得

$$\begin{aligned}
&\Omega_{a_1\cdots a_r a_{r+1}\cdots a_m}\Omega^{b_1\cdots b_r a_{r+1}\cdots a_m}\\
&=(-)^s\delta^{1\cdots m}_{i_1\cdots i_m}(\mathrm{d}x^{i_1})_{a_1}\cdots(\mathrm{d}x^{i_r})_{a_r}\left(\frac{\partial}{\partial x^{\mu_1}}\right)^{b_1}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial x^{\mu_r}}\right)^{b_r}g\cdot g^{-1}\delta^{\mu_1\cdots\mu_r i_{r+1}\cdots i_m}_{1\cdots m}\\
&\overset{3.8-31}{=\!=\!=}(-)^s\delta^{\mu_1\cdots\mu_r i_{r+1}\cdots i_m}_{i_1\cdots i_r i_{r+1}\cdots i_m}(\mathrm{d}x^{i_1})_{a_1}\cdots(\mathrm{d}x^{i_r})_{a_r}\left(\frac{\partial}{\partial x^{\mu_1}}\right)^{b_1}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial x^{\mu_r}}\right)^{b_r}\\
&\overset{3.8-27}{=\!=\!=}(-)^s(m-r)!\delta^{\mu_1\cdots\mu_r}_{i_1\cdots i_r}(\mathrm{d}x^{i_1})_{a_1}\cdots(\mathrm{d}x^{i_r})_{a_r}\left(\frac{\partial}{\partial x^{\mu_1}}\right)^{b_1}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial x^{\mu_r}}\right)^{b_r}\\
&\overset{3.8-18}{=\!=\!=}(-)^s(m-r)!r!\delta^{\mu_1}_{[i_1}\cdots\delta^{\mu_r}_{i_r]}(\mathrm{d}x^{i_1})_{a_1}\cdots(\mathrm{d}x^{i_r})_{a_r}\left(\frac{\partial}{\partial x^{\mu_1}}\right)^{b_1}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial x^{\mu_r}}\right)^{b_r}.
\end{aligned}$$

上式最后一个等号是式(8.6-5)的分量形式. 证毕.

体积元之逆 利用上小节中的计算技巧，可以得到体积元的逆.

$$\begin{aligned}\Omega^{a_1\cdots a_m} \equiv& g^{a_1b_1}\cdots g^{a_mb_m}\Omega_{b_1\cdots b_m} = \sqrt{(-)^s g}\,(e^1)^{a_1}\wedge\cdots\wedge(e^m)^{a_m}\\ =&\sqrt{(-)^s g}\,\frac{1}{m!}\delta^{1\cdots m}_{i_1\cdots i_m}g^{i_1j_1}\cdots g^{i_mj_m}(e_{j_1})^{a_1}\wedge\cdots\wedge(e_{j_m})^{a_m}\\ =&\sqrt{(-)^s g}\frac{1}{m!}g^{-1}\delta^{j_1\cdots j_m}_{1\cdots m}(e_{j_1})^{a_1}\wedge\cdots\wedge(e_{j_m})^{a_m}.\end{aligned}$$

最终有

$$\Omega^{a_1\cdots a_m} = \frac{(-1)^s}{\sqrt{|g|}}(e_1)^{a_1}\wedge\cdots\wedge(e_m)^{a_m}. \tag{8.6-7}$$

体积元导数 $\forall X^a\in\mathfrak{X}(M)$，有 $\nabla_X\Omega_{a_1\cdots a_m}$ 是 m 次外微分型式场. 由于体元已是 m 维流形 M 中的最高次（m 次）外微分型式场，故此空间是一维空间，必然有 $\nabla_X\Omega_{a_1\cdots a_m}=h\cdot\Omega_{a_1\cdots a_m}$，其中 $h\in C^\infty(M)$. 由式(8.6-1)可知

$$0=\Omega^{a_1\cdots a_m}\nabla_X\Omega_{a_1\cdots a_m}=h\cdot\Omega^{a_1\cdots a_m}\Omega_{a_1\cdots a_m}=h\cdot(-)^s m! \quad\Rightarrow\quad h=0.$$

再因 X^a 的任意性，可得到一个常用公式

$$\nabla_X\Omega_{a_1\cdots a_m}=0 \quad\Leftrightarrow\quad \nabla_b\Omega_{a_1\cdots a_m}=0. \tag{8.6-8}$$

虽然体积元的协变导数恒为零，但是它的李导数不是零.

$$\pounds_X\Omega_{a_1\cdots a_m}\xlongequal[8.6-8]{6.1-34}\mathrm{d}_{a_1}\left(X^b\Omega_{ba_2\cdots a_m}\right)=(\nabla_bX^b)\Omega_{a_1\cdots a_m}. \tag{8.6-9}$$

此式的证明过程与体积元协变导数证明过程类似；同样由于体元已是 m 维流形 M 中的最高次外微分型式场，所以有 $\mathrm{d}_{a_1}\left(X^b\Omega_{ba_2\cdots a_m}\right)=h\cdot\Omega_{a_1\cdots a_m}$，其中 $h\in C^\infty(M)$；用 $\Omega^{a_1\cdots a_m}$ 缩并此式的等号两边，可得

$$\begin{aligned}&h\cdot\Omega^{a_1\cdots a_m}\Omega_{a_1\cdots a_m}=\Omega^{a_1\cdots a_m}\mathrm{d}_{a_1}\left(X^b\Omega_{ba_2\cdots a_m}\right)\\ \xRightarrow[8.6-8]{8.6-5}&(-)^s m!\cdot h=m\Omega^{a_1\cdots a_m}\nabla_{a_1}\left(X^b\Omega_{ba_2\cdots a_m}\right)=(-)^s m(m-1)!\delta^{a_1}_b\nabla_{a_1}X^b\\ \Rightarrow\ &h=\nabla_bX^b.\end{aligned}$$

将 $h=\nabla_bX^b$ 带回即可得到体积元的李导数公式.

8.6.2 黎曼流形上的积分

我们用与度规相容的体积元从新表述一下 §5.7的积分.

设 (M,g) 是已定向的 m 维广义黎曼流形（无边的、或带边的），体积元为式(8.6-3). 设 M 有坐标卡集 $(U_\alpha;x^i_\alpha)$；根据单位分解定理5.32，在 M 上有从属于 $\{U_\alpha\}$ 的单位分解 $\{h_\alpha\}$，其中 $\mathrm{supp}h_\alpha\subset U_\alpha$，$h_\alpha\in C^\infty(M)$. 设 f 是定义在 M 上的连续实函数场，若 f 具有紧致支撑集，那么 $f\Omega_{a_1\cdots a_m}$ 便是具有紧致支撑集的 m 维型式场. 此时，我们可以定义标量函数场 f 在 M 上积分为：

$$\int_M f\overset{def}{=}\int_M\sum_\alpha h_\alpha f\Omega_{a_1\cdots a_m}=\sum_\alpha\int_{U_\alpha}h_\alpha f\sqrt{|g|}\,(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}. \tag{8.6-10}$$

为了理论上的完备，积分定义(8.6-10)中使用了单位分解定理. 为了简单起见（物理学不大关心数学上的完备），在具体应用积分时，我们将省略单位分解. 恢复单位分解过程在 Stokes–Cartan 定理5.35的证明中有叙述.

8.6.3 Hodge 星对偶算子

设广义黎曼流形 (M,g) 上有 $\omega_{a_1\cdots a_r}\in A^r(M)$，其局部坐标表示为：

$$\omega_{a_1\cdots a_r}=\frac{1}{r!}\omega_{i_1\cdots i_r}(\mathrm{d}x^{i_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{i_r})_{a_r},\qquad \omega_{i_1\cdots i_r}\in C^\infty(U). \tag{8.6-11}$$

借助体积元（见式(8.6-3)），可定义 M 上的 Hodge 星对偶算子：

$$(\star\omega)_{a_{r+1}\cdots a_m}\overset{def}{=}\frac{1}{r!}\omega^{a_1\cdots a_r}\Omega_{a_1\cdots a_r a_{r+1}\cdots a_m}, \tag{8.6-12a}$$

$$=\frac{\sqrt{|g|}}{r!(m-r)!}\delta^{1\cdots m}_{i_1\cdots i_m}\cdot\omega^{i_1\cdots i_r}\cdot(\mathrm{d}x^{i_{r+1}})_{a_{r+1}}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{i_m})_{a_m}. \tag{8.6-12b}$$

上面两式都能当成定义. 由式(8.6-12a)到(8.6-12b)的推导并不困难；直接计算

$$\begin{aligned}
\star\omega_{a_{r+1}\cdots a_m}&=\frac{\sqrt{|g|}}{r!r!}\omega_{i_1\cdots i_r}g^{a_1b_1}\cdots g^{a_rb_r}(\mathrm{d}x^{i_1})_{b_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{i_r})_{b_r}(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}\\
&\overset{3.8-46}{=\!=}\frac{\sqrt{|g|}}{r!r!}\omega_{i_1\cdots i_r}\delta^{i_1\cdots i_r}_{k_1\cdots k_r}\delta^{1\cdots m}_{j_1\cdots j_m}g^{k_1j_1}\cdots g^{k_rj_r}(\mathrm{d}x^{j_{r+1}})_{a_{r+1}}\otimes\cdots\otimes(\mathrm{d}x^{j_m})_{a_m}\\
&\overset{3.8-20}{=\!=}\frac{\sqrt{|g|}}{r!}\omega^{j_1\cdots j_r}\delta^{1\cdots m}_{j_1\cdots j_m}(\mathrm{d}x^{j_{r+1}})_{a_{r+1}}\otimes\cdots\otimes(\mathrm{d}x^{j_m})_{a_m}\\
&\overset{3.8-33}{=\!=}\frac{\sqrt{|g|}}{r!(m-r)!}\omega^{j_1\cdots j_r}\delta^{1\cdots rr+1\cdots m}_{j_1\cdots j_rk_{r+1}\cdots k_m}\cdot\delta^{k_{r+1}\cdots k_m}_{j_{r+1}\cdots j_m}(\mathrm{d}x^{j_{r+1}})_{a_{r+1}}\otimes\cdots\otimes(\mathrm{d}x^{j_m})_{a_m}
\end{aligned}$$

$$=\frac{\sqrt{|g|}}{r!(m-r)!}\omega^{j_1\cdots j_r}\delta^{1\cdots rr+1\cdots m}_{j_1\cdots j_r k_{r+1}\cdots k_m}(\mathrm{d}x^{k_{r+1}})_{a_{r+1}}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{k_m})_{a_m}.$$

这便证明了(8.6-12)．大致重复上面推导过程（令 $\omega_{i_1\cdots i_r}=1$）可得：

$$\star\left((\mathrm{d}x^{i_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{i_r})_{a_r}\right)=$$

$$\sqrt{|g|}\sum_{\substack{j_1<\cdots<j_r\\ j_{r+1}<\cdots<j_m}}\delta^{1\cdots m}_{j_1\cdots j_m}(\mathrm{d}x^{j_{r+1}})_{a_{r+1}}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{j_m})_{a_m}\begin{vmatrix} g^{i_1j_1} & \cdots & g^{i_1j_r}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ g^{i_rj_1} & \cdots & g^{i_rj_r}\end{vmatrix}. \tag{8.6-13}$$

式(8.6-13)中的指标 $i_1,\cdots,i_r$ 是自由指标，不参与求和．

双对偶 下面给出两次 Hodge 星算子的公式，直接对(8.6-12a)取星算子，得

$$\begin{aligned}\star(\star\omega)_{b_1\cdots b_r}=&\frac{(-)^{r(m-r)}}{r!(m-r)!}\omega_{a_1\cdots a_r}\Omega^{a_1\cdots a_r a_{r+1}\cdots a_m}\Omega_{b_1\cdots b_r a_{r+1}\cdots a_m}\\ \overset{8.6-5}{=\!=\!=}&(-)^{s+r(m-r)}\delta^{[a_1}_{b_1}\cdots\delta^{a_r]}_{b_r}\omega_{a_1\cdots a_r}=(-)^{s+r(m-r)}\omega_{b_1\cdots b_r}.\end{aligned} \tag{8.6-14}$$

内积 设 m 维流形 M 上有 r 阶全反对称协变张量场 A 和 B，则

$$\begin{aligned}A\wedge(\star B)=&A_{a_1\cdots a_r}\wedge\left(\frac{1}{r!}B^{b_1\cdots b_r}\Omega_{b_1\cdots b_r a_{r+1}\cdots a_m}\right)\\ =&\frac{\sqrt{|g|}}{r!r!(m-r)!}\delta^{1\cdots m}_{i_1\cdots i_m}A_{j_1\cdots j_r}B^{i_1\cdots i_r}\times\\ &\times(\mathrm{d}x^{j_1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{j_r})_{a_r}\wedge(\mathrm{d}x^{i_{r+1}})_{a_{r+1}}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{i_m})_{a_m}\\ =&\frac{\sqrt{|g|}}{r!r!(m-r)!}\delta^{1\cdots m}_{i_1\cdots i_m}A_{j_1\cdots j_r}B^{i_1\cdots i_r}\times\delta^{j_1\cdots j_r i_{r+1}\cdots i_m}_{1\cdots m}\times\\ &\times(\mathrm{d}x^{1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{r})_{a_r}\wedge(\mathrm{d}x^{r+1})_{a_{r+1}}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{m})_{a_m}\\ =&\frac{\sqrt{|g|}}{r!r!(m-r)!}\delta^{j_1\cdots j_r i_{r+1}\cdots i_m}_{i_1\cdots i_m}A_{j_1\cdots j_r}B^{i_1\cdots i_r}(\mathrm{d}x^{1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{m})_{a_m}\\ =&\frac{\sqrt{|g|}}{r!r!(m-r)!}(m-r)!\delta^{j_1\cdots j_r}_{i_1\cdots i_r}A_{j_1\cdots j_r}B^{i_1\cdots i_r}(\mathrm{d}x^{1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{m})_{a_m}\\ =&\frac{\sqrt{|g|}}{r!}A_{i_1\cdots i_r}B^{i_1\cdots i_r}(\mathrm{d}x^{1})_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^{m})_{a_m}.\end{aligned}$$

即可以得到 r 阶全反对称协变张量场 A 和 B 外积表述：

$$A\wedge(\star B)=\left(\frac{1}{r!}A_{i_1\cdots i_r}B^{i_1\cdots i_r}\right)\Omega_{a_1\cdots a_m}=(\star A)\wedge B. \tag{8.6-15}$$

式(8.6-15)中第二个等号的证明留给读者当练习．由此可定义 M 上的内积：

$$\langle A,B\rangle \overset{def}{=} \int_M A\wedge(\star B)=\int_M(\star A)\wedge B. \tag{8.6-16}$$

余微分算子 设 m 维流形 M 上有 r 阶全反对称协变张量场 F，直接计算

$$\begin{aligned}\star\mathrm{d}\star F=&\star\left[\frac{1}{r!}(m-r+1)\nabla_{[b}\left(F^{a_1\cdots a_r}\Omega_{|a_1\cdots a_r|a_{r+1}\cdots a_m]}\right)\right]\\=&\frac{(m-r+1)}{r!(m-r+1)!}\left[\nabla^{[b}\left(F_{a_1\cdots a_r}\Omega^{|a_1\cdots a_r|a_{r+1}\cdots a_m]}\right)\right]\Omega_{ba_{r+1}\cdots a_mc_1\cdots c_{r-1}}\\=&\frac{(-)^{(m-r)(r-1)}}{r!(m-r)!}\nabla^b\left(F_{a_1\cdots a_r}\Omega^{a_1\cdots a_ra_{r+1}\cdots a_m}\Omega_{bc_1\cdots c_{r-1}a_{r+1}\cdots a_m}\right)\\=&\frac{(-)^{(m-r)(r-1)+s}}{r!(m-r)!}\nabla^b\left(F_{a_1\cdots a_r}(m-r)!r!\delta^{a_1}_{[b}\delta^{a_2}_{c_1}\cdots\delta^{a_r}_{c_{r-1}]}\right)\\=&(-)^{mr-m-r(r-1)+s}\nabla^b\left(F_{bc_1\cdots c_{r-1}}\right)=(-)^{mr+m+s}\nabla^b\left(F_{bc_1\cdots c_{r-1}}\right).\end{aligned}$$

由此可定义余微分算子 $\mathrm{d}^\dagger$ 为：

$$\mathrm{d}^\dagger F\equiv(-)^{mr+m+s+1}(\star\mathrm{d}\star F)=-\nabla^bF_{bc_1\cdots c_{r-1}}. \tag{8.6-17}$$

当 F 是余矢量场时，由式(8.6-17)可得它的散度：

$$\nabla^bF_b=(-)^s\star\mathrm{d}\star F. \tag{8.6-18}$$

对于任意的 $F\in A^r(M)$，我们定义 Hodge–Laplace 公式 ∇^2_H 为：

$$\nabla^2_HF\overset{def}{=}\left(\mathrm{d}\circ\mathrm{d}^\dagger+\mathrm{d}^\dagger\circ\mathrm{d}\right)F. \tag{8.6-19}$$

共轭 紧致可定向广义黎曼流形 (M,g) 上有 $\phi\in A^r(M)$、$\psi\in A^{r+1}(M)$，则

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\left(\phi\wedge\star\psi\right)=&(\mathrm{d}\phi)\wedge\star\psi+(-)^r\phi\wedge\mathrm{d}(\star\psi)\\=&(\mathrm{d}\phi)\wedge\star\psi+(-)^r\phi\wedge(-)^{s+(m-r)(m-m+r)}\star\star\mathrm{d}(\star\psi)\\=&(\mathrm{d}\phi)\wedge\star\psi+(-)^{r+s+(m-r)r+m(r+1)+m+s+1}\phi\wedge\star\mathrm{d}^\dagger\psi\\=&(\mathrm{d}\phi)\wedge\star\psi-\phi\wedge\star\mathrm{d}^\dagger\psi.\end{aligned}$$

由内积定义(8.6-16)和 Stokes–Cartan 定理5.35，有

$$\langle\mathrm{d}\phi,\psi\rangle-\langle\phi,\mathrm{d}^\dagger\psi\rangle=\int_{\partial M}\phi\wedge\star\psi. \tag{8.6-20}$$

当 M 是无边流形，或者 ϕ、$\star\psi$ 中任一者在边界处为零时，则有：

$$\langle \mathrm{d}\phi, \psi\rangle = \langle \phi, \mathrm{d}^\dagger \psi\rangle. \tag{8.6-21}$$

上式说明 d 与 $\mathrm{d}^\dagger$ 关于内积(8.6-16)具有共轭属性.

标架上的引力场拉式密度型式 我们给出 m 维流形 (M,g) 上的一个由曲率型式构成的型式场. 先将一般标架 $(e^\beta)_a$ 用自然标架场来展开（参见式(6.3-1)）：

$$(e_\alpha)^a = (\partial_i)^a\, C^i{}_\alpha(x), \qquad (e^\beta)_a = \left(\mathrm{d}x^j\right)_a \left(C^{-T}\right)_j{}^\beta. \tag{6.3-1}$$

参考式(8.6-13)，有

$$\begin{aligned}
&\star\left[(e^\mu)_\circ \wedge (e^\nu)_\circ\right]_{a_3\cdots a_m} = \left(C^{-T}\right)_i{}^\mu \left(C^{-T}\right)_j{}^\nu \star\left[\left(\mathrm{d}x^i\right)_\circ \wedge \left(\mathrm{d}x^j\right)_\circ\right]_{a_3\cdots a_m} \\
&= \left(C^{-T}\right)_i{}^\mu \left(C^{-T}\right)_j{}^\nu \sqrt{|g|} \sum_{\substack{k_1<k_2\\ k_3<\cdots<k_m}} \delta^{1\cdots m}_{k_1\cdots k_m} (\mathrm{d}x^{k_3})_{a_3} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}x^{k_m})_{a_m} \begin{vmatrix} g^{ik_1} & g^{ik_2} \\ g^{jk_1} & g^{jk_2} \end{vmatrix}.
\end{aligned}$$

为了令等号两端的抽象指标匹配，上式等号左端 Hodge 星对偶中的抽象指标记号被“$\circ$”代替. 有了上述准备，有（其中 $(\Omega_{\mu\nu})_{a_1a_2} = \frac{1}{2} R_{\mu\nu\rho\sigma} (e^\rho)_{a_1} \wedge (e^\sigma)_{a_2}$）

$$\begin{aligned}
\kappa\mathscr{L}_G \equiv& (\Omega_{\mu\nu})_{a_1a_2} \wedge \star\left[(e^\mu)_\circ \wedge (e^\nu)_\circ\right]_{a_3\cdots a_m} \\
=& \frac{1}{2} R_{\mu\nu\rho\sigma} \left(C^{-T}\right)_i{}^\mu \left(C^{-T}\right)_j{}^\nu \left(C^{-T}\right)_l{}^\rho \left(C^{-T}\right)_n{}^\sigma \sqrt{|g|} \times \\
& \times \sum_{\substack{k_1<k_2\\ k_3<\cdots<k_m}} \delta^{1\cdots m}_{k_1\cdots k_m} (\mathrm{d}x^l)_{a_1} \wedge (\mathrm{d}x^n)_{a_2} \wedge (\mathrm{d}x^{k_3})_{a_3} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}x^{k_m})_{a_m} \begin{vmatrix} g^{ik_1} & g^{ik_2} \\ g^{jk_1} & g^{jk_2} \end{vmatrix} \\
=& \sqrt{|g|} \sum_{\substack{k_1<k_2\\ k_3<\cdots<k_m}} \delta^{1\cdots m}_{k_1\cdots k_m} (\mathrm{d}x^l)_{a_1} \wedge (\mathrm{d}x^n)_{a_2} \wedge (\mathrm{d}x^{k_3})_{a_3} \wedge \cdots \wedge (\mathrm{d}x^{k_m})_{a_m} \overset{x}{R}{}^{k_1k_2}{}_{ln}.
\end{aligned}$$

κ 是引力系数. 上式中，我们已令

$$\overset{x}{R}_{ijln} \equiv R_{\mu\nu\rho\sigma} \left(C^{-T}\right)_i{}^\mu \left(C^{-T}\right)_j{}^\nu \left(C^{-T}\right)_l{}^\rho \left(C^{-T}\right)_n{}^\sigma. \tag{8.6-22}$$

上上式中最后的求和过程较为繁琐. 因求和中存在 $\delta^{1\cdots m}_{k_1\cdots k_m}$ 项，故 $\{k_1\cdots k_m\}$ 必是两两不同的整数，否则为零. 我们先选定 k_1、k_2，那么 $\{k_3\cdots k_m\}$ 也随之确定；外积中的元素 $(\mathrm{d}x^k)_a$ 的上指标“$\{k\}$”须两两不同，所以必然有：$l=k_1$、$n=k_2$

或者 $l=k_2$、$n=k_1$. k_1、k_2 共有 $\frac{1}{2}m(m-1)$ 种选择，比如 $k_1=1$、$k_2=2$，$k_1=2$、$k_2=3$，……. 我们以 $k_1=2$、$k_2=3$ 为例展示一下具体表达式

$$\delta^{1234\cdots m}_{2314\cdots m}\left((\mathrm{d}x^2)_{a_1}\wedge(\mathrm{d}x^3)_{a_2}\overset{x}{R}{}^{23}{}_{23}+(\mathrm{d}x^3)_{a_1}\wedge(\mathrm{d}x^2)_{a_2}\overset{x}{R}{}^{23}{}_{32}\right)\wedge(\mathrm{d}x^1)_{a_3}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}$$
$$=\left(\overset{x}{R}{}^{23}{}_{23}+\overset{x}{R}{}^{32}{}_{32}\right)\delta^{1234\cdots m}_{1234\cdots m}(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge(\mathrm{d}x^2)_{a_2}\wedge(\mathrm{d}x^3)_{a_3}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}.$$

这样的项共有 $\frac{1}{2}m(m-1)$ 个，求和结果是：

$$\kappa\mathscr{L}_G=\left(\sum\nolimits_{l,n=1}^{m}\overset{x}{R}{}^{ln}{}_{ln}\right)\sqrt{|g|}\,(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge(\mathrm{d}x^2)_{a_2}\wedge(\mathrm{d}x^3)_{a_3}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}.$$

而 $\sum_{l,n=1}^{m}\overset{x}{R}{}^{ln}{}_{ln}$ 等于 $\overset{x}{R}{}_{ijln}$ 的标量曲率 $\overset{x}{R}$，故有：

$$\kappa\mathscr{L}_G\equiv(\Omega_{\mu\nu})_{a_1a_2}\wedge\star[(e^\mu)_\circ\wedge(e^\nu)_\circ]_{a_3\cdots a_m} \tag{8.6-23a}$$
$$=\overset{x}{R}\sqrt{|g|}\,(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}. \tag{8.6-23b}$$

式(8.6-23)中的 $(\Omega_{\mu\nu})_{a_1a_2}\wedge\star[(e^\mu)_\circ\wedge(e^\nu)_\circ]_{a_3\cdots a_m}$ 可以当作引力场的拉式密度场（四维空间），它对广义相对论很重要. 式(8.6-23a)为一般标架场上引力拉式密度的表述形式；经过一些计算，我们证明了式(8.6-23a)可以化成式(8.6-23b)的形式. 需要强调的是：式(8.6-23)中曲率可以由一般仿射联络生成，不一定由度量生成.

标量函数场对偶 $\forall f\in C^\infty(M)$，由定义容易得到：

$$(\star f)_{a_1\cdots a_m}=\frac{1}{0!}f\Omega_{a_1\cdots a_m}=f\Omega_{a_1\cdots a_m}, \tag{8.6-24}$$
$$\star(f\Omega_{\circ\cdots\circ})=\frac{1}{m!}f\Omega^{a_1\cdots a_m}\Omega_{a_1\cdots a_m}=(-)^sf. \tag{8.6-25}$$

闵氏空间对偶 闵氏时空 $(\mathbb{R}^4,\eta)$ 的坐标系为 $\{t,x,y,z\}$；因标架场正交归一，度规 $\eta=\mathrm{diag}(-1,1,1,1)$，式(8.6-13)的形式简单；表示如下（省略抽象指标）

$$\star\mathrm{d}t=-\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z,\qquad\star\mathrm{d}x=-\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z,$$
$$\star\mathrm{d}y=+\,\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z,\qquad\star\mathrm{d}z=-\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.$$
$$\star(\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x)=-\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z,\quad\star(\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}y)=+\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z,\quad\star(\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}z)=-\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.$$
$$\star(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y)=+\,\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}z,\quad\star(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z)=-\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}y,\quad\star(\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z)=+\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x.$$

三维欧氏空间的对偶 三维笛卡尔空间 $(\mathbb{R}^3,\delta)$ 的坐标系为 $\{x,y,z\}$；因标架场正交归一，$\delta=\mathrm{diag}(1,1,1)$，我们给出式(8.6-13)的具体表示（省略抽象指标）

$$\star\mathrm{d}x=\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z,\quad \star\mathrm{d}y=\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x,\quad \star\mathrm{d}z=\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y. \tag{8.6-26}$$

甲 由双对偶公式(8.6-14)和式(8.6-26)易得：欧式空间叉乘 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 同构于 $\star(\boldsymbol{a}\wedge\boldsymbol{b})$. 乙 因三维欧氏空间的度规场是正定的单位矩阵，故此时无需区分切矢量和余切矢量，也无需区分上下标. 由式(8.6-26)和式(8.6-25)可知三维欧氏空间只需引入标量函数场和矢量场即可，无需引入 $\boldsymbol{a}\wedge\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{a}\wedge\boldsymbol{b}\wedge\boldsymbol{c}$. 丙 不过需要提醒读者的是：$\star(\boldsymbol{a}\wedge\boldsymbol{b})$ 是赝矢量，$\star(\boldsymbol{a}\wedge\boldsymbol{b}\wedge\boldsymbol{c})$ 是赝标量.

注 8.46 Hodge 星对偶这节中没有完全贯彻抽象指标记号，其原因无非是不想令公式显得过于笨重. 但通过上下文以及公式的先后表述可以脑补出这些指标.

8.6.4 散度及相关

先计算克氏符 Γ^k_{kj}；为此，需用到一个行列式中的公式，设 $g=\det(g_{ij})$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial x^k}&=\frac{\partial}{\partial x^k}\left(\sum_{j_1\cdots j_n}(-)^{\tau(j_1\cdots j_n)}g_{1j_1}g_{2j_2}\cdots g_{nj_n}\right)\\&=\left(\sum_{j_1\cdots j_n}(-)^{\tau(j_1\cdots j_n)}\frac{\partial g_{1j_1}}{\partial x^k}g_{2j_2}\cdots g_{nj_n}\right)+\cdots+\left(\sum_{j_1\cdots j_n}(-)^{\tau(j_1\cdots j_n)}g_{1j_1}\cdots g_{n-1,j_{n-1}}\frac{\partial g_{nj_n}}{\partial x^k}\right)\\&=\sum_{i=1}^{n}\begin{vmatrix}g_{11}&\cdots&g_{1j}&\cdots&g_{1n}\\\vdots&\ddots&\vdots&\ddots&\vdots\\\frac{\partial g_{i1}}{\partial x^k}&\cdots&\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k}&\cdots&\frac{\partial g_{in}}{\partial x^k}\\\vdots&\ddots&\vdots&\ddots&\vdots\\g_{n1}&\cdots&g_{nj}&\cdots&g_{nn}\end{vmatrix}.\end{aligned}$$

这是行列式的求导公式，将上式按有导数那一行展开，有

$$\frac{\partial g}{\partial x^k}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k}A^{ij},\qquad \text{其中}A^{ij}\text{是}\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k}\text{或}g_{ij}\text{的代数余子式.} \tag{8.6-27}$$

在行列式理论中，元素 g_{il} 与代数余子式 A^{lj} 有正交关系，即

$$\sum\nolimits_{l=1}^{n}g_{il}A^{lj}=\delta^j_i\cdot g. \tag{8.6-28}$$

又因度规 g_{il} 及其共轭量 g^{lj} 互逆，即 $g_{il}g^{lj}=\delta_i^j$；由此不难得出

$$A^{ij}=g\cdot g^{ij}. \tag{8.6-29}$$

将上式代入式(8.6-27)，并整理得（考虑到 g 可正可负，故加上绝对值）

$$\frac{1}{g}\frac{\partial g}{\partial x^k}=g^{ij}\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k}\quad\Rightarrow\quad\frac{1}{\sqrt{|g|}}\frac{\partial\sqrt{|g|}}{\partial x^k}=\frac{1}{2}g^{ij}\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k}. \tag{8.6-30}$$

利用上式容易得到**收缩第二类克氏符**为

$$\Gamma^k_{kj}=\frac{1}{2}g^{kl}\left(\frac{\partial g_{kl}}{\partial x^j}+\frac{\partial g_{lj}}{\partial x^k}-\frac{\partial g_{kj}}{\partial x^l}\right)=\frac{1}{2}g^{kl}\frac{\partial g_{kl}}{\partial x^j}=\frac{1}{\sqrt{|g|}}\frac{\partial\sqrt{|g|}}{\partial x^j}. \tag{8.6-31}$$

我们已知切矢量场 $v^a\in\mathfrak{X}(M)$ 的协变导数，将两者缩并可得**散度算子**：

$$\nabla_a v^a=\frac{\partial v^j}{\partial x^j}+v^k\Gamma^j_{kj}(x)=\frac{\partial v^j}{\partial x^j}+v^k\frac{1}{\sqrt{|g|}}\frac{\partial\sqrt{|g|}}{\partial x^k}=\frac{1}{\sqrt{|g|}}\frac{\partial\left(v^k\sqrt{|g|}\right)}{\partial x^k}. \tag{8.6-32}$$

微积分中的 Laplace 算子，在微分流形中已被推广为 **Beltrami–Laplace 算子**，只需将式(8.6-32)中 v^k 换成 $g^{kj}\frac{\partial f}{\partial x^j}$（$\forall f\in C^\infty(M)$）即可

$$\Box f\equiv g^{ab}\nabla_a\nabla_b f=\nabla_a\nabla^a f=\frac{1}{\sqrt{|g|}}\frac{\partial}{\partial x^k}\left(\sqrt{|g|}g^{kj}\frac{\partial f}{\partial x^j}\right). \tag{8.6-33}$$

纯数学上更习惯使用“Δ”来替换上式中的“$\Box$”；但在物理学的四维闵氏时空中都使用这个方块算符来代表 d'Alembert 算符，所以在此我们使用方块算符.

8.6.5 应用一例：麦克斯韦方程组

这小节叙述麦氏方程组的外微分表述. 四维闵氏时空中麦氏方程组为：

$$\nabla^a F_{ab}=-J_b,\qquad\nabla_{[a}F_{bc]}=0.$$

由式(8.6-17)和式(6.1-38)可将上两式化为麦氏方程组的外微分表示：

$$\mathrm{d}_a\big((\star F)_{bc}\big)=(\star J)_{abc}\quad\Leftrightarrow\quad(\mathrm{d}^\dagger F)_a=\big(\star\mathrm{d}(\star F)\big)_a=J_a, \tag{8.6-34a}$$

$$(\mathrm{d}F)_{abc}=0. \tag{8.6-34b}$$

陈强顺、冯承天[7,69]证明了一个有用的定理；十几年后，文献[24]也（极大概率）独立阐述了类似工作. 陈、冯二人试图从电荷守恒定律推出麦克斯韦方程组，这多少有些不合理（见后面评论）；我们先叙述陈、冯文中的定理.

定理 8.47 若四维广义黎曼流形 (M,g) 的单连通星状开集 U 上有切矢量场 J^a，其四维散度为零，即 $\nabla_a J^a=0$；则必存在二次外微分型式场 G_{bc} 满足下式

$$\star J_{abc}=\mathrm{d}_a G_{bc} \quad \Leftrightarrow \quad J_a=(-)^{s+1}(\star \mathrm{d}G)_a. \tag{8.6-35}$$

其中 s 是度规 g 的惯性指数中 -1 个数.

证明 . 四维逆变矢量 J^a，可以通过度规对其指标升降，其对偶矢量 $J_a=g_{ab}J^b$. 这个对偶矢量的 Hodge 星对偶是：$\star J_{abc}=J^e\Omega_{eabc}$；对此式取外微分，有

$$\mathrm{d}_f(\star J_{abc})=\mathrm{d}_f\left(J^e\Omega_{eabc}\right)=4\nabla_{[f}\left(J^e\Omega_{|e|abc]}\right)=-4\left(\nabla_{[f}J^e\right)\Omega_{abc]e}.$$

对上式两边用体元 Ω^{fabc} 缩并得

$$\begin{aligned}\Omega^{fabc}\mathrm{d}_f(\star J_{abc})&=-4\left(\nabla_{[f}J^e\right)\Omega_{abc]e}\Omega^{fabc}=4\left(\nabla_f J^e\right)\Omega_{eabc}\Omega^{[fabc]}\\&=4\left(\nabla_f J^e\right)(-)^s 3!1!\delta^f_e=4!(-)^s\nabla_e J^e.\end{aligned}$$

由于我们是在四维流形上讨论问题，$\mathrm{d}_f(\star J_{abc})$ 已是最高次的外微分型式场，它同构于一个标量场；可以假设 $\mathrm{d}_f(\star J_{abc})=\kappa\Omega_{fabc}$，其中 κ 是一个待定标量函数. 代入式上左端，有

$$\Omega^{fabc}\mathrm{d}_f(\star J_{abc})=\Omega^{fabc}\kappa\Omega_{fabc}=\kappa 4!(-)^s.$$

结合上两式可以得到 $\kappa=\nabla_e J^e$；那么，我们就得到

$$\mathrm{d}_f(\star J_{abc})=\left(\nabla_e J^e\right)\Omega_{fabc}. \tag{8.6-36}$$

从上式以及定理已知条件（$\nabla_e J^e=0$）可得 $\mathrm{d}_f(\star J_{abc})=0$，即 3 次微分型式场 $\star J_{abc}$ 是闭的；那么从 §5.2的 Poincaré 引理5.12可知：在星状开集 U 内（局部开集，不是整个流形）式(8.6-35)必然成立. ■

注 8.48 上述定理是从纯数学角度得到的结论，没有涉及任何物理过程，只对四维流形成立，无论度规是正定还是不定.

注 8.49 在四维闵氏时空（即定理中指标 $s=1$），矢量 J^a 可以理解成电流四矢量，那么它自然满足电荷守恒定律，即 $\nabla_a J^a=0$，因此存在 2 次微分型式场 $\star F_{bc}$（一般将 G_{bc} 记成 $\star F_{bc}$ 以便和麦克斯韦方程组相匹配）满足式(8.6-35). 对

比麦克斯韦外微分形式，可知此式就是半个麦氏方程组．依照陈、冯[69]所述，如果还有磁荷守恒，即 $\partial_a J^a_{mag}=0$，那么还可知存在另外一个 2 次微分型式场 H_{bc} 满足 $J_{mag}=\star \mathrm{d}H$．然而，仅从纯数学角度，我们无法确定两个 2 次微分型式场 $\star F_{bc}$ 和 H_{bc} 间的关系；也就是我们无法从纯数学角度给出麦氏方程组．

注 8.50 把 §5.2的注解5.13翻译成陈冯定理中的语言便是，若数学上 $\star J_{abc}=0$（也就是电流四矢量 J_a 为零），那么必然有 $F_{ab}=0$．这在物理上显然是不正确的，电流和电磁场是可以相互解耦的；电流四矢量为零的地方电磁场未必为零．所以虽然陈冯定理给出了一个数学结构，但无法与物理完全对应；也就是我们无法从纯数学角度给出麦氏方程组．

注 8.51 物理上的粒子数守恒、能动四矢量守恒也都可表示为 $\nabla_e J^e=0$ 的形式；从陈冯定理可知（纯数学角度），它们也都有对应的二阶反对称张量场；但是物理上没有与这些二阶反对称张量场相对应的物理量．电磁场中的反对称张量 F_{ab} 恰好与电荷守恒有对应而已！

练习 8-10 证明式(8.6-3)在坐标变换下形式不变．

练习 8-11 证：(1) $\langle A,B\rangle=\langle B,A\rangle$；(2) $(-)^s\langle A,B\rangle=\langle \star A,\star B\rangle$；(3) $\mathrm{d}^\dagger\circ\mathrm{d}^\dagger\equiv 0$．

练习 8-12 证明：当式(8.6-19)中 F 为标量函数场时，式(8.6-19)与式(8.6-33)关系是：$\nabla_H^2 F=(-)^{s+1}\Box F$．$\nabla_H^2$ 与 $\Box$ 更一般的差异可参见[80]式 (1.6.19)．

8.7 黎曼曲率型式

读者需先参考 §6.3、§8.3中的理论，本节将联络限定为无挠的、且与度规相容的 Levi-Civita 联络 ∇_a；这会给型式理论带来一些新的内容．

8.7.1 黎曼度规下的型式理论

Cartan 结构方程 原形式的 Cartan 结构方程见式(6.3-30)；应用式(8.3-7)易得内指标降下来后的结构方程(8.7-1)（为比对，给出了式(6.3-30)）：

$$\mathrm{d}_a(e^\mu)_b=+(e^\sigma)_a\wedge(\omega^\mu{}_\sigma)_b+(\Theta^\mu)_{ab}, \tag{6.3-30a}$$

$$\mathrm{d}_a(e_\mu)_b=-(e^\sigma)_a\wedge(\omega_{\sigma\mu})_b; \tag{8.7-1a}$$

$$\mathrm{d}_a(\omega_{\mu\nu})_b=-(\omega^\sigma{}_\nu)_a\wedge(\omega_{\sigma\mu})_b+(\Omega_{\mu\nu})_{ab}, \tag{8.7-1b}$$

$$\mathrm{d}_a(\omega^{\mu\nu})_b = -(\omega^{\nu\sigma})_a \wedge (\omega^{\mu}{}_{\sigma})_b + (\Omega^{\mu\nu})_{ab}, \tag{8.7-1c}$$

$$\mathrm{d}_a(\omega^{\mu}{}_{\nu})_b = +(\omega^{\sigma}{}_{\nu})_a \wedge (\omega^{\mu}{}_{\sigma})_b + (\Omega^{\mu}{}_{\nu})_{ab}. \tag{6.3-30b}$$

Bianchi 恒等式 内指标降下来后的第一 Bianchi 恒等式(6.3-31a)变为

$$(e^{\sigma})_c \wedge (\Omega^{\mu}{}_{\sigma})_{ab} = 0 = (e^{\sigma})_c \wedge (\Omega_{\mu\sigma})_{ab}. \tag{8.7-2}$$

应用式(8.3-7)，由式(6.3-31b)容易得到内指标降下来后的第二 Bianchi 恒等式

$$\mathrm{d}_c(\Omega_{\mu\nu})_{ab} = (\omega^{\sigma}{}_{\nu})_c \wedge (\Omega_{\mu\sigma})_{ab} + (\Omega^{\sigma}{}_{\nu})_{ca} \wedge (\omega_{\sigma\mu})_b. \tag{8.7-3}$$

$$\mathrm{d}_c(\Omega^{\mu}{}_{\nu})_{ab} = (\omega^{\sigma}{}_{\nu})_c \wedge (\Omega^{\mu}{}_{\sigma})_{ab} - (\Omega^{\sigma}{}_{\nu})_{ca} \wedge (\omega^{\mu}{}_{\sigma})_b. \tag{6.3-31b}$$

8.7.2 局部广义欧几里得空间

定义 8.52 设有 m 维广义黎曼流形 (M, g)，若 $\forall p \in M$ 都存在局部坐标系使得

$$g_{ab}|_U = \eta_{\alpha\beta}(\mathrm{d}x^{\alpha})_a(\mathrm{d}x^{\beta})_b, \quad \text{在整个局部坐标系 } (U; x^{\alpha}) \text{ 内成立} \tag{8.7-4}$$

其中 $p \in U \subset M$，$\eta_{\alpha\beta} = \mathrm{diag}(-1, \cdots, -1, +1, \cdots, +1)$，且 ± 1 个数总和是 m；则广义黎曼流形 (M, g) 称为**局部广义欧几里得空间**.

若 M 是局部广义欧氏空间，则其黎曼曲率恒为零. 下面证明其逆命题.

本小节余下内容继 §6.4知识阐述，故请先阅读该节内容.

我们继续讨论 Pfaff 方程组(6.4-6). 首先给它设立初始条件；将点 $p \in U$ 初始条件设为（下式包括正定、不定度规情形）：

$$A^i{}_{\alpha}(p)\, A^j{}_{\beta}(p)\, g_{ij}(p) = \eta_{\alpha\beta}. \quad \eta_{\alpha\beta}\text{表达式见定义8.52中描述} \tag{8.7-5}$$

此时的 $g_{ij}(x)$ 是一般的度规，非对角元可能非零. 现在可假设满足 Pfaff 方程组(6.4-6)和其初始条件(8.7-5)的解为 $a^i{}_{\alpha}(x)$，令

$$f_{\alpha\beta}(x) \equiv a^i{}_{\alpha}(x) a^j{}_{\beta}(x) g_{ij}(x) - \eta_{\alpha\beta}, \tag{8.7-6}$$

那么在 p 点有 $f_{\alpha\beta}(p) = 0$（初始条件）；对式(8.7-6)求外微分，得（需注意，当 $a^i{}_{\alpha}(x)$ 是解时，由式(6.4-6)可知 $\mathrm{d}_b a^{\sigma}{}_j = -(\omega^{\sigma}{}_{\nu})_b a^{\nu}{}_j$）

$$\mathrm{d}_b f_{\alpha\beta}(x) = (\mathrm{d}_b a^i{}_{\alpha}) a^j{}_{\beta} g_{ij} + a^i{}_{\alpha} (\mathrm{d}_b a^j{}_{\beta}) g_{ij} + a^i{}_{\alpha} a^j{}_{\beta} \mathrm{d}_b g_{ij}$$

$$
\begin{aligned}
&= -(\omega^i{}_k)_b a^k{}_\alpha a^j{}_\beta g_{ij} - a^i{}_\alpha(\omega^j{}_k)_b a^k{}_\beta g_{ij} + a^i{}_\alpha a^j{}_\beta \mathrm{d}_b g_{ij} \\
&= a^k{}_\alpha a^j{}_\beta \left(-(\omega^i{}_k)_b g_{ij} - (\omega^l{}_j)_b g_{kl} + \mathrm{d}_b g_{kj}\right) \overset{8.3-7}{=\!=\!=} 0.
\end{aligned}
$$

既然在整个邻域 U 内都有 $\mathrm{d}_b f_{\alpha\beta}(x) = 0$，那么必然可以得出 $f_{\alpha\beta}(x)$ 在整个邻域 U 内为常数，所以有 $f_{\alpha\beta}(x) = f_{\alpha\beta}(p) = 0$. 由此可见在邻域 U 内，有

$$
a^i{}_\alpha(x) a^j{}_\beta(x) g_{ij}(x) \overset{8.7-6}{=\!=\!=} \eta_{\alpha\beta}, \tag{8.7-7}
$$

而度规 g_{ab} 在新标架场 $(\tilde{e}_i)^a$ 的分量为（要用上式）

$$
\tilde{g}_{ij}(x) = g_{bc}(\tilde{e}_i)^b(\tilde{e}_j)^c = g_{bc}(e_\mu)^b a^\mu{}_i (e_\nu)^c a^\nu{}_j = g_{\mu\nu}(x) a^\mu{}_i(x) a^\nu{}_j(x) = \eta_{ij}. \tag{8.7-8}
$$

此式在整个邻域 U 上成立. 这便证明了：

定理 8.53 设有 m 维广义黎曼流形 (M, g)，其黎曼曲率张量为零的充分必要条件是 (M, g) 为局部广义欧几里得空间.

8.7.3 刚性标架

标架场 $\{(e^\mu)_a\}$ 下的度规分量 $g_{\mu\nu}$ 是流形上的标量场，一般不是常数.

定义 8.54 若标架场 $\{(e^\mu)_a\}$ 下度规分量 $g_{\mu\nu}$ 是常数（即 $\nabla_a g_{\mu\nu} = \mathrm{d}_a g_{\mu\nu} = 0$），则我们称标架场 $\{(e^\mu)_a\}$ 为**刚性标架**（rigid frame）.

注意，对于一般标架场，虽然度规和联络相容，即 $\nabla_a g_{bc} \equiv 0$；但 $\nabla_a g_{\mu\nu}$ 未必等于零. 对于刚性标架可以得到联络型式场 $(\omega_{\mu\nu})_a$ 对指标反对称性：

$$
\mathrm{d}_a g_{\mu\nu} = 0 \quad \overset{8.3-7}{\Longrightarrow} \quad (\omega_{\mu\nu})_a = -(\omega_{\nu\mu})_a. \tag{8.7-9}
$$

对于非刚性标架，因 $\nabla_a g_{\mu\nu} \neq 0$，故 $(\omega_{\mu\nu})_a$ 不具有上述的反对称性.

定义 Ricci **旋转系数**（Ricci rotation coefficient）为（类似第一类克氏符）

$$
\omega_{\mu\nu\rho} \overset{def}{=} (\omega_{\mu\nu})_a (e_\rho)^a = g_{\mu\sigma}\Gamma^\sigma_{\nu\rho} \quad \Leftrightarrow \quad (\omega_{\mu\nu})_a = \omega_{\mu\nu\rho}(e^\rho)_a. \tag{8.7-10}
$$

将联络系数公式(6.3-6)中的联络系数换成 Ricci 旋转系数

$$
(e_\rho)^b \nabla_b (e_\mu)^a = \Gamma^\sigma_{\mu\rho}(e_\sigma)^a = g^{\nu\sigma}\omega_{\nu\mu\rho}(e_\sigma)^a = -\omega_{\mu\nu\rho}(e^\nu)^a \qquad \Leftrightarrow \tag{8.7-11}
$$

$$
\nabla_b (e_\mu)^a = -\omega_{\mu\nu\rho}(e^\rho)_b (e^\nu)^a \qquad \Leftrightarrow \tag{8.7-12}
$$

$$\nabla_b(e_\mu)_a = -\omega_{\mu\nu\rho}(e^\rho)_b(e^\nu)_a \quad \Leftrightarrow \tag{8.7-13}$$

$$\nabla_b(e^\mu)_a = -g^{\mu\sigma}\omega_{\sigma\nu\rho}(e^\rho)_b(e^\nu)_a \quad \Leftrightarrow \tag{8.7-14}$$

$$\omega_{\mu\nu\rho} = -(e_\nu)_a(e_\rho)^b\nabla_b(e_\mu)^a = (e_\mu)^a(e_\rho)^b\nabla_b(e_\nu)_a. \tag{8.7-15}$$

只有在刚性标架下，Ricci 旋转系数才能简便计算，内外指标才能方便升降.

由式(6.1-29)及(8.7-11)可得如下对易关系：

$$[X,\,Y]^a = \left(e_\nu(Y^\sigma)X^\nu - e_\nu(X^\sigma)Y^\nu + X^\mu Y^\nu(\Gamma^\sigma_{\nu\mu} - \Gamma^\sigma_{\mu\nu})\right)(e_\sigma)^a. \tag{8.7-16}$$

$$\left[(e_\mu),\,(e_\nu)\right]^a = \left(\Gamma^\sigma_{\nu\mu} - \Gamma^\sigma_{\mu\nu}\right)(e_\sigma)^a = \left(-\omega_{\nu\sigma\mu} + \omega_{\mu\sigma\nu}\right)(e^\sigma)^a. \tag{8.7-17}$$

式(8.7-17)第一个等号适用于一般标架，第二个等号只适用于刚性标架.

8.7.4 黎曼曲率张量的计算

广义黎曼流形中，挠率为零，曲率张量计算可分三个步骤[6]§1.7：①选一刚性标架，②计算 Ricci 旋转系数，③利用 Cartan 第二结构方程计算曲率张量.

8.7.4.1 计算 Ricci 旋转系数

需要先选定一局部坐标系 $\{U; x^\mu\}$ [2]，刚性标架基矢场 $(e_\mu)_a$、$(e_\mu)^a$ 在自然坐标基矢场 $(\frac{\partial}{\partial x^k})^a$、$(\mathrm{d}x^k)_a$ 下的分量是

$$(e_\nu)_k \equiv (e_\nu)_a\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right)^a, \quad (e_\mu)^k \equiv (e_\mu)^a(\mathrm{d}x^k)_a. \tag{8.7-18}$$

计算 Ricci 旋转系数并不需要基矢场 $(e^\nu)_a$，所以上式中未给出其分量表达式. 从 Ricci 旋转系数定义可得

$$\begin{aligned}\omega_{\mu\nu\rho} &= (e_\mu)^a(e_\rho)^b\nabla_b(e_\nu)_a = (e_\mu)^k\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right)^a(e_\rho)^l\left(\frac{\partial}{\partial x^l}\right)^b\nabla_b\left[(e_\nu)_n(\mathrm{d}x^n)_a\right]\\ &= (e_\mu)^k(e_\rho)^l\frac{\partial(e_\nu)_k}{\partial x^l} - (e_\mu)^k(e_\rho)^l(e_\nu)_n\overset{x}{\Gamma}{}^n_{kl}.\end{aligned}$$

交换指标 ρ 和 μ，有 $\omega_{\rho\nu\mu} = (e_\rho)^k(e_\mu)^l(e_\nu)_{k,l} - (e_\rho)^k(e_\mu)^l(e_\nu)_n\overset{x}{\Gamma}{}^n_{kl}$；将这两式相减，并利用自然坐标基底克氏符 $\overset{x}{\Gamma}{}^n_{kl}$ 关于下标的对称性，得

$$\omega_{\mu\nu\rho} - \omega_{\rho\nu\mu} = \left[(e_\mu)^k(e_\rho)^l - (e_\rho)^k(e_\mu)^l\right]\frac{\partial(e_\nu)_k}{\partial x^l} \overset{def}{=} \Lambda_{\mu\nu\rho}. \tag{8.7-19}$$

[2]读者需要认识到，微分流形局部上同胚于 $\mathbb{R}^m$ 开子集，所以任何流形自然存在局部坐标系.

上式最后一步定义了一个中间步符号 $\Lambda_{\mu\nu\rho}$，它还可以表示为

$$\Lambda_{\mu\nu\rho}\equiv\sum_{k,l}\left[\frac{\partial(e_\nu)_k}{\partial x^l}-\frac{\partial(e_\nu)_l}{\partial x^k}\right](e_\mu)^k(e_\rho)^l. \tag{8.7-20}$$

易见 Λ 具有反对称性 $\Lambda_{\mu\nu\rho}=-\Lambda_{\rho\nu\mu}$. 由式(8.7-19)出发，进行指标轮换后相加减，不难证明 Ricci 旋转系数可由这个中间步符号 $\Lambda_{\mu\nu\rho}$ 表示为

$$\omega_{\mu\nu\rho}=\left(\Lambda_{\mu\nu\rho}+\Lambda_{\rho\mu\nu}-\Lambda_{\nu\rho\mu}\right)/2. \tag{8.7-21}$$

这样，先选定局部自然坐标基底场 $(\frac{\partial}{\partial x^k})^a$，再选择一个刚性标架场 $(e_\mu)^a$，通过式(8.7-19)或者(8.7-20)算出中间步符号 $\Lambda_{\mu\nu\rho}$，利用上式便可计算 $\omega_{\mu\nu\rho}$ 了.

注 8.55 注解6.12指出无挠联络系数 $\overset{x}{\Gamma}{}^i_{jk}$ 有 $\frac{1}{2}m^2(m+1)$ 个. 因 Ricci 旋转系数 $\omega_{\mu\nu\rho}$ 关于前两个指标反对称，故共有 $\frac{1}{2}m^2(m-1)$ 个；比联络系数少 m^2 个.

8.7.4.2 黎曼张量的分量表示之一

现在可以导出 Cartan 第二结构方程的具体表达式. 由于这里采用的是刚性标架，度规分量为常数，所以式(6.3-24)可重写为

$$\begin{aligned}
R_{\rho\sigma\mu\nu}&=g_{\rho\pi}\Gamma^\tau_{\sigma\nu}\Gamma^\pi_{\tau\mu}-g_{\rho\pi}\Gamma^\tau_{\sigma\mu}\Gamma^\pi_{\tau\nu}+\left[\mathrm{d}_a(\omega_{\rho\sigma})_b\right](e_\mu)^a(e_\nu)^b\\
&\overset{8.7-10}{=\!=\!=}(e_\mu)^a(e_\nu)^b\nabla_a\left(\omega_{\rho\sigma\pi}(e^\pi)_b\right)-(e_\mu)^a(e_\nu)^b\nabla_b\left(\omega_{\rho\sigma\pi}(e^\pi)_a\right)+\omega^\xi{}_{\sigma\nu}\omega_{\rho\xi\mu}-\omega^\xi{}_{\sigma\mu}\omega_{\rho\xi\nu}\\
&\overset{8.7-14}{=\!=\!=}g^{\xi\zeta}\omega_{\nu\xi\mu}\omega_{\rho\sigma\zeta}+(e_\mu)^a\nabla_a\left(\omega_{\rho\sigma\nu}\right)-g^{\xi\zeta}\omega_{\mu\xi\nu}\omega_{\rho\sigma\zeta}-(e_\nu)^b\nabla_b\left(\omega_{\rho\sigma\mu}\right)\\
&\quad+g^{\xi\zeta}(\omega_{\zeta\sigma\nu}\omega_{\rho\xi\mu}-\omega_{\zeta\sigma\mu}\omega_{\rho\xi\nu}).
\end{aligned}$$

由式(6.3-1)（$(e_\mu)^a=(\frac{\partial}{\partial x^\pi})^aC^\pi{}_\mu$）可得刚性标架$(e_\mu)^a$ 下黎曼曲率分量表达式：

$$\begin{aligned}
R_{\rho\sigma\mu\nu}=&C^\pi{}_\mu(x)\frac{\partial\omega_{\rho\sigma\nu}}{\partial x^\pi}-C^\pi{}_\nu(x)\frac{\partial\omega_{\rho\sigma\mu}}{\partial x^\pi}\\
&+g^{\xi\zeta}\left[\omega_{\rho\sigma\zeta}(\omega_{\nu\xi\mu}-\omega_{\mu\xi\nu})+\omega_{\zeta\sigma\nu}\omega_{\rho\xi\mu}-\omega_{\zeta\sigma\mu}\omega_{\rho\xi\nu}\right].
\end{aligned} \tag{8.7-22}$$

可以看出在刚性标架场 $(e_\mu)^a$ 中计算黎曼张量，不需要计算自然坐标基矢场的克氏符 $\overset{x}{\Gamma}{}^n_{kl}$. 标架法中的 Ricci 旋转系数 $\omega_{\mu\zeta\sigma}$ 与自然坐标基底法中的克氏符 $\overset{x}{\Gamma}{}^n_{kl}$ 地位相当，但 Ricci 旋转系数计算量较小.

表面上来看，式(8.7-22)不具有对称性 $R_{\rho\sigma\mu\nu}=R_{\mu\nu\rho\sigma}$；然而，我们可以证明一般标架场下的黎曼曲率分量也具有这种对称性：

$$R_{\rho\sigma\mu\nu}=R_{abcd}(e_\rho)^a(e_\sigma)^b(e_\mu)^c(e_\nu)^d\overset{\text{交换抽象}\atop\text{指标记号}}{=\!=\!=}R_{cdab}(e_\rho)^c(e_\sigma)^d(e_\mu)^a(e_\nu)^b$$

$$\xlongequal{8.2\text{–}3} R_{abcd}(e_\rho)^c(e_\sigma)^d(e_\mu)^a(e_\nu)^b = R_{\mu\nu\rho\sigma}.$$

8.7.4.3 黎曼张量的分量表示之二

本小节叙述黎曼曲率的另外一种表述. 由式(8.7-17)和式(8.7-19)可以看出:

$$\big[(e_\mu),\ (e_\nu)\big]^a = \big(-\omega_{\nu\sigma\mu} + \omega_{\mu\sigma\nu}\big)(e^\sigma)^a = \Lambda_{\mu\sigma\nu}(e^\sigma)^a = \Lambda_{\mu\ \nu}^{\ \sigma}(e_\sigma)^a. \tag{8.7-23}$$

其中 $\Lambda_{\mu\ \nu}^{\ \sigma} = g^{\sigma\pi}\Lambda_{\mu\pi\nu} = \omega_{\mu\ \nu}^{\ \sigma} - \omega_{\nu\ \mu}^{\ \sigma}$. 中间变量 Λ（具有反对称性 $\Lambda_{\mu\nu\rho} = -\Lambda_{\rho\nu\mu}$）可以看作描述基矢对易关系的系数（可能是常数、也可能是标量场）.

把式(8.7-21)代入式(8.7-22)可得:

$$\begin{aligned}
R_{\rho\sigma\mu\nu} =& + \frac{1}{2}C^\pi{}_\mu(x)\frac{\partial}{\partial x^\pi}\left(g_{\sigma\tau}\Lambda_{\rho\ \nu}^{\ \tau} + g_{\rho\tau}\Lambda_{\nu\ \sigma}^{\ \tau} - g_{\nu\tau}\Lambda_{\sigma\ \rho}^{\ \tau}\right)\\
& - \frac{1}{2}C^\pi{}_\nu(x)\frac{\partial}{\partial x^\pi}\left(g_{\sigma\tau}\Lambda_{\rho\ \mu}^{\ \tau} + g_{\rho\tau}\Lambda_{\mu\ \sigma}^{\ \tau} - g_{\mu\tau}\Lambda_{\sigma\ \rho}^{\ \tau}\right)\\
& + \frac{1}{4}\Big[\Big(\Lambda_{\zeta\ \nu}^{\ \beta}g_{\beta\sigma} + \Lambda_{\nu\ \sigma}^{\ \beta}g_{\beta\zeta} - \Lambda_{\sigma\ \zeta}^{\ \beta}g_{\beta\nu}\Big)\left(\Lambda_{\rho\ \mu}^{\ \zeta} + \Lambda_{\mu\ \alpha}^{\ \tau}g^{\alpha\zeta}g_{\tau\rho} - \Lambda_{\alpha\ \rho}^{\ \tau}g^{\alpha\zeta}g_{\tau\mu}\right)\\
& - \Big(\Lambda_{\zeta\ \mu}^{\ \beta}g_{\beta\sigma} + \Lambda_{\mu\ \sigma}^{\ \beta}g_{\beta\zeta} - \Lambda_{\sigma\ \zeta}^{\ \beta}g_{\beta\mu}\Big)\left(\Lambda_{\rho\ \nu}^{\ \zeta} + \Lambda_{\nu\ \alpha}^{\ \tau}g^{\alpha\zeta}g_{\tau\rho} - \Lambda_{\alpha\ \rho}^{\ \tau}g^{\alpha\zeta}g_{\tau\nu}\right)\\
& + \Lambda_{\nu\ \mu}^{\ \zeta}\Big(\Lambda_{\rho\ \zeta}^{\ \beta}g_{\beta\sigma} + \Lambda_{\zeta\ \sigma}^{\ \beta}g_{\beta\rho} - \Lambda_{\sigma\ \rho}^{\ \beta}g_{\beta\zeta}\Big)\Big].
\end{aligned} \tag{8.7-24}$$

在李群李代数中，对易关系(8.7-23)的系数 $\Lambda_{\mu\ \nu}^{\ \sigma}$ 是其结构常数；此时，在李群李代数的黎曼曲率计算中会用到式(8.7-24).

8.7.4.4 例题

在这里给出几个例题，以便读者更好地理解标架理论.

例 8.56 计算度规 $\mathrm{d}s^2 = \Omega^2(t,x)\big(-\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}x^2\big)$ 的黎曼曲率.

甲 由于 $\Omega^2(t,x)$ 是自然坐标 $\{t,x\}$ 的函数，所以自然坐标基矢不是刚性标架，需另选基矢. 我们选成如下正交归一的切基矢及对偶基矢

$$(e^0)_a = \Omega(\mathrm{d}t)_a,\quad (e^1)_a = \Omega(\mathrm{d}x)_a;\quad (e_0)^a = \Omega^{-1}(\partial_t)^a,\quad (e_1)^a = \Omega^{-1}(\partial_x)^a.$$

由此容易写出度规张量

$$g_{ab} = -\Omega^2(\mathrm{d}t)_a(\mathrm{d}t)_b + \Omega^2(\mathrm{d}x)_a(\mathrm{d}x)_b = -(e^0)_a(e^0)_b + (e^1)_a(e^1)_b$$

显然，在新选的标架场 $(e_\mu)^a$ 下，度规系数为常数，此标架是刚性的．由上式容易得到将指标升降后的基矢表达式

$$(e_0)_a = -\Omega(\mathrm{d}t)_a, \qquad (e_1)_a = \Omega(\mathrm{d}x)_a.$$

由式(8.7-18)可得全部坐标分量

$$\begin{aligned} &(e_0)_0 = -\Omega, && (e_0)_1 = 0; && (e_1)_0 = 0, && (e_1)_1 = \Omega. \\ &(e_0)^0 = \Omega^{-1}, && (e_0)^1 = 0; && (e_1)^0 = 0, && (e_1)^1 = \Omega^{-1}. \end{aligned}$$

协变基矢导数不为零的分量为，“点”代表对 t 求导，“撇”代表对 x 求导．

$$(e_0)_{0,0} = -\dot{\Omega}, \quad (e_0)_{0,1} = -\Omega', \quad (e_1)_{1,0} = \dot{\Omega}, \quad (e_1)_{1,1} = \Omega'.$$

乙 由式(8.7-19)或(8.7-20)计算中间步符号 Λ，全部不为零的式子为

$$\begin{aligned} \Lambda_{001} = -\Lambda_{100} &= \big((e_0)_{0,1} - (e_0)_{1,0}\big)(e_0)^0(e_1)^1 = -\Omega^{-2}\Omega', \\ \Lambda_{011} = -\Lambda_{110} &= \big((e_1)_{0,1} - (e_1)_{1,0}\big)(e_0)^0(e_1)^1 = -\Omega^{-2}\dot{\Omega}. \end{aligned}$$

由式(8.7-21)可得两个独立的 Ricci 旋转系数 $\omega_{\mu\nu\rho}$，分别是

$$\begin{aligned} \omega_{010} &= \frac{1}{2}\left(\Lambda_{010} + \Lambda_{001} - \Lambda_{100}\right) = \Lambda_{001} = -\Omega^{-2}\Omega' = -\omega_{100} \\ \omega_{011} &= \frac{1}{2}\left(\Lambda_{011} + \Lambda_{101} - \Lambda_{110}\right) = \Lambda_{011} = -\Omega^{-2}\dot{\Omega} = -\omega_{101} \end{aligned}$$

丙 由(8.7-22)式可得唯一独立的黎曼分量

$$\begin{aligned} R_{0101} &= (e_0)^a\nabla_a\omega_{011} - (e_1)^a\nabla_a\omega_{010} \\ &\quad + g^{\xi\zeta}\left(\omega_{01\zeta}(\omega_{1\xi0} - \omega_{0\xi1}) + \omega_{\zeta11}\omega_{0\xi0} - \omega_{\zeta10}\omega_{0\xi1}\right) \\ &= \Omega^{-1}\partial_t\left(-\Omega^{-2}\dot{\Omega}\right) - \Omega^{-1}\partial_x\left(-\Omega^{-2}\Omega'\right) \\ &\quad + g^{00}(\omega_{010}(\omega_{100} - \omega_{001}) + \omega_{011}\omega_{000} - \omega_{010}\omega_{001}) \\ &\quad + g^{11}(\omega_{011}(\omega_{110} - \omega_{011}) + \omega_{111}\omega_{010} - \omega_{110}\omega_{011}) \\ &= -\Omega^{-3}\ddot{\Omega} + 2\Omega^{-4}\big(\dot{\Omega}\big)^2 + \Omega^{-3}\Omega'' - 2\Omega^{-4}(\Omega')^2 + \big(\Omega^{-2}\Omega'\big)^2 - \Big(\Omega^{-2}\dot{\Omega}\Big)^2 \\ &= \Omega^{-3}\big(\Omega'' - \ddot{\Omega}\big) + \Omega^{-4}\big(\dot{\Omega}^2 - \Omega'^2\big). \end{aligned}$$

这是在基矢 $\{(e^\mu)_a\}$ 下的黎曼曲率分量．计算过程中注意 $g^{00} = -1$、$g^{11} = +1$，其它度规分量为零；全部系数为常数是刚性标架的体现． ■

例 8.57 给定 Kruskal 度规

$$\mathrm{d}s^2 = -4e^{2A}\mathrm{d}u\mathrm{d}v + Z^2(\mathrm{d}\theta^2 + (\sin\theta\,\mathrm{d}\phi)^2) \tag{8.7-25}$$

局部坐标是 $\{u, v, \theta, \phi\}$，系数 A, Z 只是 u, v 的函数.

甲 局部坐标基矢不是刚性标架，另选如下正交归一协变基矢

$$(e^1)_a = \sqrt{2}e^A(\mathrm{d}u)_a,\ (e^2)_a = \sqrt{2}e^A(\mathrm{d}v)_a,\ (e^3)_a = Z(\mathrm{d}\theta)_a,\ (e^4)_a = Z\sin\theta(\mathrm{d}\phi)_a.$$

由此容易写出度规张量

$$g_{ab} = -(e^1)_a(e^2)_b - (e^2)_a(e^1)_b + (e^3)_a(e^3)_b + (e^4)_a(e^4)_b$$

显然，在新选的标架场 $(e^\mu)_a$ 下，度规系数为常数，即非零分量是 $g_{12} = g_{21} = -1,\ g_{33} = g_{44} = 1$；此标架是刚性的. 用上式容易得到逆变基矢

$$(e_1)^a = \frac{e^{-A}}{\sqrt{2}}(\partial_u)^a,\ (e_2)^a = \frac{e^{-A}}{\sqrt{2}}(\partial_v)^a,\ (e_3)^a = Z^{-1}(\partial_\theta)^a,\ (e_4)^a = (Z\sin\theta)^{-1}(\partial_\phi)^a.$$

将外指标降下来，有

$$\begin{aligned}
(e_1)_a &= g_{ab}(e_1)^b = -(e^2)_a = -\sqrt{2}e^A(\mathrm{d}v)_a\\
(e_2)_a &= g_{ab}(e_2)^b = -(e^1)_a = -\sqrt{2}e^A(\mathrm{d}u)_a\\
(e_3)_a &= g_{ab}(e_3)^b = +(e^3)_a = +Z(\mathrm{d}\theta)_a\\
(e_4)_a &= g_{ab}(e_4)^b = +(e^4)_a = +Z\sin\theta(\mathrm{d}\phi)_a
\end{aligned}$$

乙 矢量 $(e_\mu)_a$ 在自然坐标基矢 $(\mathrm{d}x^j)_a$ 上的非零分量为

$$(e_1)_v = -\sqrt{2}e^A,\quad (e_2)_u = -\sqrt{2}e^A,\quad (e_3)_\theta = Z,\quad (e_4)_\phi = Z\sin\theta$$

刚性标架基矢 $(e_\mu)^a$ 在自然坐标基矢 $(\partial_j)^a$ 上的非零分量为

$$(e_1)^u = \frac{e^{-A}}{\sqrt{2}},\quad (e_2)^v = \frac{e^{-A}}{\sqrt{2}},\quad (e_3)^\theta = Z^{-1},\quad (e_4)^\phi = (Z\sin\theta)^{-1}$$

基矢非零分量 $(e_\mu)_k$ 的非零导数是

$$(e_1)_{v,u} = -\sqrt{2}e^A\partial_u A,\qquad (e_1)_{v,v} = -\sqrt{2}e^A\partial_v A$$

$$(e_2)_{u,u}=-\sqrt{2}e^{A}\partial_u A,\qquad (e_2)_{u,v}=-\sqrt{2}e^{A}\partial_v A$$
$$(e_3)_{\theta,u}=\partial_u Z,\qquad (e_3)_{\theta,v}=\partial_v Z$$
$$(e_4)_{\phi,u}=\sin\theta\,\partial_u Z,\qquad (e_4)_{\phi,v}=\sin\theta\,\partial_v Z,\qquad (e_4)_{\phi,\theta}=Z\cos\theta$$

利用式(8.7-19)或(8.7-20)，可得独立非零中间步符号

$$\Lambda_{112}=\frac{e^{-A}}{\sqrt{2}}\partial_u A,\qquad \Lambda_{221}=\frac{e^{-A}}{\sqrt{2}}\partial_v A,$$
$$\Lambda_{331}=\frac{e^{-A}}{\sqrt{2}\,Z}\partial_u Z,\qquad \Lambda_{332}=\frac{e^{-A}}{\sqrt{2}\,Z}\partial_v Z,$$
$$\Lambda_{441}=\frac{e^{-A}}{\sqrt{2}\,Z}\partial_u Z,\qquad \Lambda_{442}=\frac{e^{-A}}{\sqrt{2}\,Z}\partial_v Z,\qquad \Lambda_{443}=\frac{\cot\theta}{Z}$$

进而利用式(8.7-21)，可得独立非零 Ricci 旋转系数

$$\omega_{121}=\frac{e^{-A}}{\sqrt{2}}\partial_u A,\qquad \omega_{212}=\frac{e^{-A}}{\sqrt{2}}\partial_v A,$$
$$\omega_{313}=\frac{e^{-A}}{\sqrt{2}\,Z}\partial_u Z,\qquad \omega_{323}=\frac{e^{-A}}{\sqrt{2}\,Z}\partial_v Z,$$
$$\omega_{414}=\frac{e^{-A}}{\sqrt{2}\,Z}\partial_u Z,\qquad \omega_{424}=\frac{e^{-A}}{\sqrt{2}\,Z}\partial_v Z,\qquad \omega_{434}=\frac{\cot\theta}{Z}$$

丙 由(8.7-22)式可得在基矢 $(e^{\mu})_a$ 下独立非零黎曼张量分量（注意求和过程中应用刚性标架的度规系数，见甲部分）

$$R_{1221}=-\,e^{-2A}\partial_u\partial_v A,\qquad R_{1332}=R_{1442}=\frac{e^{-2A}\partial_u\partial_v Z}{2\,Z},$$
$$R_{1313}=R_{1414}=\frac{e^{-2A}}{2\,Z}(2\,\partial_u A\,\partial_u Z-\partial_u\partial_u Z),$$
$$R_{2323}=R_{2424}=\frac{e^{-2A}}{2\,Z}(2\,\partial_v A\,\partial_v Z-\partial_v\partial_v Z),$$
$$R_{3434}=Z^{-2}(1+e^{-2A}\partial_u Z\,\partial_v Z)$$

进而易得在基矢 $(e^{\mu})_a$ 下独立非零 Ricci 张量分量

$$R_{11}=e^{-2A}Z^{-1}(2\,\partial_u A\,\partial_u Z-\partial_u\partial_u Z)$$
$$R_{12}=-e^{-2A}Z^{-1}(Z\partial_u\partial_v A+\partial_u\partial_v Z)$$
$$R_{22}=e^{-2A}Z^{-1}(2\,\partial_v A\,\partial_v Z-\partial_v\partial_v Z)$$

$$R_{33}=R_{44}=e^{-2A}Z^{-2}(e^{2A}+\partial_u Z\,\partial_v Z+Z\partial_u\partial_v Z)$$

需要注意，以上给出的分量是在 $(e^\mu)_a$ 下的分量，不是在 $(\mathrm{d}x^\mu)_a$ 下的分量． ■

例 8.58 平面引力波（Sachs–Wu）．

设有局部坐标系 $\{t,x,y,z\}$；令 $u\equiv t-z$，$f(u)$ 和 $g(u)$ 是 u 的两个任意的光滑函数，并且 f^2+g^2 不恒为零．设 F 是坐标 x,y 和 u 的如下函数：

$$F(x,y,u)=\frac{1}{2}f(u)\left(x^2-y^2\right)+g(u)xy. \tag{8.7-26}$$

度规为

$$\mathrm{d}s^2=\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2+(2F-1)\mathrm{d}t^2+(2F+1)\mathrm{d}z^2-2F\mathrm{d}t\mathrm{d}z-2F\mathrm{d}z\mathrm{d}t. \tag{8.7-27}$$

很明显，式(8.7-27)是对称的．我们先验证它是 Lorentz 型的．取

$$\begin{aligned}(e^1)_a=&(\mathrm{d}x)_a,\quad (e^2)_a=(\mathrm{d}y)_a,\quad (e^4)_a=(\mathrm{d}t)_a-(\mathrm{d}z)_a,\\ (e^3)_a=&\left(\frac{1}{2}-F(x,y,u)\right)(\mathrm{d}t)_a+\left(\frac{1}{2}+F(x,y,u)\right)(\mathrm{d}z)_a.\end{aligned} \tag{8.7-28}$$

则在上述基矢 $\{(e^1)_a,(e^2)_a,(e^3)_a,(e^4)_a\}$ 下，式(8.7-27)的分量为

$$g_{\mu\nu}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&-1\\0&0&-1&0\end{pmatrix}=g^{\mu\nu}. \tag{8.7-29}$$

上式中 $(g_{\mu\nu})$ 的逆矩阵等于自身．容易看出它是 Lorentz 型的，并且非退化．上式同时表明它是刚性标架．容易得到式(8.7-28)的对偶基矢：

$$\begin{aligned}(e_1)^a=&(\partial_x)^a,\quad (e_2)^a=(\partial_y)^a,\quad (e_3)^a=(\partial_t)^a+(\partial_z)^a,\\ (e_4)^a=&\left(\frac{1}{2}+F(x,y,u)\right)(\partial_t)^a+\left(-\frac{1}{2}+F(x,y,u)\right)(\partial_z)^a.\end{aligned}$$

将外指标降下来，有

$$\begin{aligned}(e_1)_a=&(\mathrm{d}x)_a,\quad (e_2)_a=(\mathrm{d}y)_a,\quad (e_3)_a=-(\mathrm{d}t)_a+(\mathrm{d}z)_a,\\ (e_4)_a=&\left(F(x,y,u)-\frac{1}{2}\right)(\mathrm{d}t)_a-\left(F(x,y,u)+\frac{1}{2}\right)(\mathrm{d}z)_a.\end{aligned}$$

直接计算得非零量为（注意 $\partial_t F(x,y,t-z) = -\partial_z F(x,y,t-z)$）：

$$\Lambda_{144} = -\partial_x F, \quad \Lambda_{244} = -\partial_y F. \quad \omega_{144} = -\partial_x F, \quad \omega_{244} = -\partial_y F.$$
$$R_{1414} = -\partial_{xx}^2 F, \quad R_{1424} = -\partial_{xy}^2 F, \quad R_{2424} = -\partial_{yy}^2 F. \quad R_{44} = -\partial_{xx}^2 F - \partial_{yy}^2 F.$$

将 F 的表达式(8.7-26)代入，便可给出基矢 $\{(e^\mu)_a\}$ 下的黎曼曲率非零分量：

$$R_{1441} = f(u) = R_{2424}, \quad R_{1442} = g(u). \qquad R_{\mu\nu} \equiv 0.$$

由于我们要求 $f^2 + g^2 \neq 0$，故可知黎曼曲率分量不全为零；故此时空为弯曲的. 进而，可得 Ricci 曲率所有分量都为零（符合真空爱氏场方程）! ■

例 8.59 平面引力波（Bondi–Ehlers–Kundt）.

设有局部坐标系 $\{u,v,x,y\}$. $L(u)$、$\beta(u)$ 是 u 的两个任意的光滑函数. 我们直接使用 $\{u,v,x,y\}$ 的切标架场，不再另选. 度规场为

$$\mathrm{d}s^2 = L^2\left(e^{2\beta}\mathrm{d}x^2 + e^{-2\beta}\mathrm{d}y^2\right) - \frac{1}{2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v - \frac{1}{2}\mathrm{d}v\mathrm{d}u.$$

由此可得非零克氏符：

$$\Gamma^v_{xx} = 2Le^{2\beta}\left(L' + L\beta'\right), \quad \Gamma^v_{yy} = -2Le^{-2\beta}\left(L\beta' - L'\right),$$
$$\Gamma^x_{ux} = \Gamma^x_{xu} = \frac{L'}{L} + \beta', \qquad \Gamma^y_{uy} = \Gamma^y_{yu} = \frac{L'}{L} - \beta'.$$

非零黎曼曲率：

$$R_{uxux} = -e^{2\beta}L\left(L'' + L\beta'^2 + L\beta'' + 2L'\beta'\right),$$
$$R_{uyuy} = -e^{-2\beta}L\left(L'' + L\beta'^2 - L\beta'' - 2L'\beta'\right).$$

非零 Ricci 曲率：

$$R_{uu} = -\frac{2}{L}\left(L'' + L\beta'^2\right).$$

由 Ricci 曲率可见只要 $L(u)$、$\beta(u)$ 满足方程 $L'' + L\beta'^2 = 0$，那么上面给出的度规场便是真空爱氏场方程的解；并且黎曼曲率可以非零. ■

练习 8-13 证明式(8.7-1a)、(8.7-1b)、(8.7-3).

练习 8-14 请自己编写符号演算程序来计算式(8.7-22)、(8.7-24).

练习 8-15 补全例题8.58、8.59中遗漏步骤.

8.8 E^3 中的活动标架法

§6.3和 §8.7的工作起源于 E^3 中的活动标架法（参见[70]§6.3）；我们沿着历史发展的时间顺序，补充介绍 E^3 中的活动标架法．我们把 §1.1中的活动标架用抽象指标重新表述一遍．E^3 中的坐标原点是 O，再任意指定一点 $P\in E^3$ 和其伴随矢量空间 $\mathbb{R}^3$ 中的一组基底 $\{(e_1)^a,(e_2)^a,(e_3)^a\}$．度规是正定的单位矩阵．

在 E^3 中先选定固定的、正交归一的切标架场 $\{O;(\delta_i)^a\}$, $1\leqslant i\leqslant 3$；对应坐标直线是 $\{x^i\}$，即 $(\delta_i)^a=(\frac{\partial}{\partial x^i})^a$；这套基矢在 E^3 中每点都相同．则任意活动标架场 $\{P;(e_\alpha)^a\}$（标架可能非正交归一，可能逐点不同）可表示为：

$$(OP)^a=x^i(\delta_i)^a,\qquad (e_\beta)^a=(\delta_j)^aA^j{}_\beta. \tag{8.8-1}$$

上式中为了让抽象指标匹配，已令 $(OP)^a=\overrightarrow{OP}$．需要注意切矢量场的外微分运算是没有定义的；由正定欧几里得度规场 $g_{ab}=\delta_{ij}(\delta^i)_a(\delta^j)_b=g_{\alpha\beta}(e^\alpha)_a(e^\beta)_b$ 可以很简单地把切矢量变成余切矢量：

$$(OP)_a=x^i(\delta_i)_a,\qquad (e_\alpha)_a=(\delta_j)_aA^j{}_\alpha. \tag{8.8-2}$$

有了余切矢量场，便可以用外微分算符了（注意常矢量 $(\delta_i)_a$ 的微分恒为零）．

$$\mathrm{d}_b(OP)_a=(\mathrm{d}_bx^i)\wedge(\delta_i)_a,\quad \mathrm{d}_b(e_\beta)_a=(\mathrm{d}_bA^j{}_\beta)\wedge(\delta_j)_a. \tag{8.8-3}$$

把上式中的固定基矢场 $(\delta_i)_a$ 消去，换为活动基矢场 $(e_\alpha)_a$，有

$$\mathrm{d}_b(OP)_a=B^\alpha{}_i\mathrm{d}_bx^i\wedge(e_\alpha)_a,\quad \mathrm{d}_b(e_\beta)_a=B^\alpha{}_j\mathrm{d}_bA^j{}_\beta\wedge(e_\alpha)_a. \tag{8.8-4}$$

其中，变换矩阵 A 和 B 是互逆关系，即 $B^{-1}=A$．令

$$(\omega^\alpha)_b=B^\alpha{}_i\mathrm{d}_bx^i,\qquad (\omega^\alpha{}_\beta)_b=B^\alpha{}_j\mathrm{d}_bA^j{}_\beta. \tag{8.8-5}$$

将上式带回(8.8-4)，并对该式再次求取外微分，利用 $\mathrm{d}\circ\mathrm{d}=0$ 可得结构方程：

$$0=\big(\mathrm{d}(\omega^\alpha)\big)_{cb}\wedge(e_\alpha)_a-(\omega^\alpha)_c\wedge\mathrm{d}_b(e_\alpha)_a\Rightarrow \mathrm{d}_c(\omega^\alpha)_b=(\omega^\sigma)_c\wedge(\omega^\alpha{}_\sigma)_b. \tag{8.8-6}$$

$$0=\big(\mathrm{d}(\omega^\alpha{}_\beta)\big)_{cb}\wedge(e_\alpha)_a-(\omega^\alpha{}_\beta)_c\wedge\mathrm{d}_b(e_\alpha)_a\Rightarrow \mathrm{d}_c(\omega^\alpha{}_\beta)_b=(\omega^\sigma{}_\beta)_c\wedge(\omega^\alpha{}_\sigma)_b. \tag{8.8-7}$$

我们取活动标架场为 P 点的自然切标架，令 $(e_\alpha)^a=(\frac{\partial}{\partial u^\alpha})^a$，$\{u^\alpha\}$ 是活动标架（例如球坐标）所对应的坐标曲线．此时（下式的记号略有些乱，省略了位矢 $\boldsymbol{r}$ 的抽象指标）

$$\boldsymbol{r}=\overrightarrow{OP}=(OP)^a=x^i(\delta_i)^a=x^i(u^1,u^2,u^3)\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a. \tag{8.8-8}$$

点 P 的活动标架场是该点的自然标架 $\{P;(e_\alpha)^a\}$：

$$(e_\alpha)^a=\left(\frac{\partial}{\partial u^\alpha}\right)^a\Big|_P=\frac{\partial x^j}{\partial u^\alpha}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a\Big|_P=A^j{}_\alpha\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a\Big|_P. \tag{8.8-9}$$

在 E^3（$g_{ab}=\delta_{ij}(\mathrm{d}x^i)_a(\mathrm{d}x^j)_b$）中，活动标架场 $\{P;(e_\alpha)^a\}$ 下的度规分量是：

$$g_{\alpha\beta}=g_{ab}(e_\alpha)^a(e_\beta)^b=g_{ab}\frac{\partial x^i}{\partial u^\alpha}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a\frac{\partial x^j}{\partial u^\beta}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^b=\sum_{i=1}^3\frac{\partial x^i}{\partial u^\alpha}\frac{\partial x^i}{\partial u^\beta}. \tag{8.8-10}$$

在欧几里得空间中，任一点切空间仍是欧氏空间，与自身完全重合；这使得欧氏空间的基矢的导数可以在自身展开，即

$$\frac{\partial(e_\alpha)^a}{\partial u^\beta}=\Gamma^\sigma_{\alpha\beta}(e_\sigma)^a\quad\Leftrightarrow\quad\frac{\partial}{\partial u^\beta}\left(\frac{\partial}{\partial u^\alpha}\right)^a\Big|_P=\Gamma^\sigma_{\alpha\beta}\left(\frac{\partial}{\partial u^\sigma}\right)^a\Big|_P. \tag{8.8-11}$$

欧氏联络（即 ∂）自然与欧氏度规相互容许，故联络系数满足 $\Gamma^\sigma_{\alpha\beta}=\Gamma^\sigma_{\beta\alpha}$；由偏导数求导次序无关也可得到这个对称性，即

$$\frac{\partial(e_\alpha)^a}{\partial u^\beta}=\frac{\partial^2\boldsymbol{r}}{\partial u^\alpha\partial u^\beta}=\frac{\partial(e_\beta)^a}{\partial u^\alpha}=\frac{\partial^2x^j}{\partial u^\alpha\partial u^\beta}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^a\Big|_P. \tag{8.8-12}$$

将式(8.8-11)与 $(e_\nu)^a$ 作内积，得

$$g_{ab}\left[\frac{\partial}{\partial u^\beta}\left(\frac{\partial}{\partial u^\alpha}\right)^a\right]_P\left(\frac{\partial}{\partial u^\nu}\right)^b\Big|_P=\sum_{j=1}^3\frac{\partial^2x^j}{\partial u^\alpha\partial u^\beta}\frac{\partial x^j}{\partial u^\nu}=\Gamma^\sigma_{\alpha\beta}g_{\sigma\nu}. \tag{8.8-13}$$

对式(8.8-10)求偏导数，有（结合上式）

$$\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\mu}=\sum_{i=1}^3\left[\frac{\partial^2x^i}{\partial u^\alpha\partial u^\mu}\frac{\partial x^i}{\partial u^\beta}+\frac{\partial x^i}{\partial u^\alpha}\frac{\partial^2x^i}{\partial u^\beta\partial u^\mu}\right]=\Gamma^\sigma_{\alpha\mu}g_{\sigma\beta}+\Gamma^\sigma_{\beta\mu}g_{\sigma\alpha}. \tag{8.8-14}$$

由上式不难得到联络系数表达式：

$$\Gamma^\mu_{\alpha\beta}=\frac{1}{2}g^{\mu\sigma}\left(\frac{\partial g_{\alpha\sigma}}{\partial u^\beta}+\frac{\partial g_{\beta\sigma}}{\partial u^\alpha}-\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\sigma}\right). \tag{8.8-15}$$

很明显，与式(8.1-3)相同；不相同才奇怪！虽然欧氏空间是平直的，当选用活动标架时，其克氏符(8.8-15)未必是零；但由这组克氏符得到的黎曼曲率为零.

继续讨论结构方程(8.8-6)、(8.8-7). 在标架场 $\{P;(\frac{\partial}{\partial u^\alpha})^a\}$ 下计算式(8.8-5)：

$$(\omega^\alpha)_a = B^\alpha{}_i \mathrm{d}_a x^i = \frac{\partial u^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial x^i}{\partial u^\sigma}(\mathrm{d}u^\sigma)_a = (\mathrm{d}u^\alpha)_a, \tag{8.8-16}$$

$$(\omega^\alpha{}_\beta)_a = B^\alpha{}_j \mathrm{d}_a A^j{}_\beta = \frac{\partial u^\alpha}{\partial x^j}\frac{\partial^2 x^j}{\partial u^\sigma \partial u^\beta}(\mathrm{d}u^\sigma)_a \overset{\substack{8.8-11\\8.8-12}}{=\!=} \Gamma^\alpha_{\beta\sigma}(\mathrm{d}u^\sigma)_a. \tag{8.8-17}$$

由式(8.8-16)可知 $(\omega^\alpha)_a$ 就是自然坐标基矢 $(e_\alpha)^a = (\frac{\partial}{\partial u^\alpha})^a$ 的对偶基矢，可以把它记为 $(\omega^\alpha)_a = (e^\alpha)_a$. 由式(8.8-17)可知它与式(6.3-7)完全相同. 故可得结论：结构方程(8.8-6)、(8.8-7)与结构方程(6.3-30)（欧氏空间黎曼曲率恒为零）本质相同；不相同就奇怪了. 历史上，Cartan 先在欧氏空间发展了活动标架法，得到了结构方程(8.8-6)、(8.8-7)；之后把它们推广成为式(6.3-30)的形式.

陈省身（[70]附录二）说（大意）：(1) 现在，活动标架法（§6.3、§8.7、§11.3和§11.4内容）是微分几何中极为重要的方法. (2) 张量分析法（利用局部坐标切矢量作为标架）弊多利少，但简单明了，在微分几何的初等问题中功不可没.

8.8.1 正交归一标架场

本小节重复抽象指标求和；重复分量指标不求和，求和指标将显示标识.

我们总可以将一个标架场正交化（参见53页定理3.44中论证）. 故可以假设活动标架场 $(\frac{\partial}{\partial u^\alpha})^a$ 是相互正交的，但未必归一；归一化关系为：

$$(E_\alpha)^a = L_\alpha^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial u^\alpha}\right)^a, \quad \text{重复指标 } \alpha \text{ 不求和，} L_\alpha \text{ 是 Lamé 系数} \tag{8.8-18}$$

$(E_\alpha)^a$ 是归一化后的矢量. 代入欧式度规，有

$$\begin{aligned}\delta_{\alpha\beta} =& g_{ab}(E_\alpha)^a(E_\beta)^b = g_{ab}L_\alpha^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial u^\alpha}\right)^a L_\beta^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial u^\beta}\right)^b = g_{\alpha\beta}L_\alpha^{-1}L_\beta^{-1}\\ \overset{8.8-10}{=\!=}& L_\alpha^{-1}L_\beta^{-1}\sum\nolimits_{l=1}^{3}\frac{\partial x^l}{\partial u^\alpha}\frac{\partial x^l}{\partial u^\beta}, \qquad \text{重复指标}\alpha,\beta\text{不求和}\end{aligned}$$

因此可得 Lamé 系数为：

$$L_\alpha = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial u^\alpha}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial u^\alpha}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial u^\alpha}\right)^2}; \qquad \alpha = 1,2,3 \tag{8.8-19}$$

不难得到（下式重复指标不求和）

$$(E^\alpha)_a = L_\alpha (\mathrm{d}u^\alpha)_a, \qquad \alpha = 1,2,3 \tag{8.8-20}$$

进而，度规可以表示为

$$g_{ab} = \sum_{\alpha=1}^{3} (L_\alpha)^2 (\mathrm{d}u^\alpha)_a (\mathrm{d}u^\alpha)_b = \sum_{\alpha=1}^{3} (E^\alpha)_a (E^\alpha)_b; \tag{8.8-21a}$$

$$g^{ab} = \sum_{\alpha=1}^{3} (L_\alpha)^{-2} \left(\frac{\partial}{\partial u^\alpha}\right)^a \left(\frac{\partial}{\partial u^\alpha}\right)^b = \sum_{\alpha=1}^{3} (E_\alpha)^a (E_\alpha)^b. \tag{8.8-21b}$$

不难看出，在标架 $\{(E_\alpha)^a, (E^\alpha)_a\}$ 下，度规分量 $\{g^{\alpha\beta}, g_{\alpha\beta}\}$ 是单位矩阵；故有

$$(E^\alpha)^a = \sum_{\beta=1}^{3} g^{\alpha\beta}(E_\beta)^a = (E_\alpha)^a; \quad (E_\alpha)_a = \sum_{\beta=1}^{3} g_{\alpha\beta}(E^\beta)_a = (E^\alpha)_a. \tag{8.8-22}$$

也就是说，对于正定的、正交标架场，可以不必严格区分内指标在上还是在下.

由式(8.8-15)可得坐标 $\{u^\alpha\}$ 的联络系数 $\overset{u}{\Gamma}$（下式重复指标不求和）：

$$\overset{u}{\Gamma}{}^\mu_{\alpha\beta} = 0, \ (\alpha \neq \beta \neq \mu); \quad \overset{u}{\Gamma}{}^\mu_{\alpha\alpha} = -\frac{L_\alpha}{L_\mu^2}\frac{\partial L_\alpha}{\partial u^\mu}, \ (\alpha \neq \mu); \quad \overset{u}{\Gamma}{}^\mu_{\mu\beta} = \frac{1}{L_\mu}\frac{\partial L_\mu}{\partial u^\beta}. \tag{8.8-23}$$

式(8.8-23)中最后一式中的 β 可以等于 μ、也可以不等于 μ.

对于上述正交归一标架场可通过如下直接计算方式求得基矢导数.

$$\begin{aligned}\nabla_{\frac{\partial}{\partial u^\beta}}(E_\sigma)^b =& \nabla_{\frac{\partial}{\partial u^\beta}}\left[L_\sigma^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial u^\sigma}\right)^b\right] = -L_\sigma^{-2}\frac{\partial L_\sigma}{\partial u^\beta}\left(\frac{\partial}{\partial u^\sigma}\right)^b + L_\sigma^{-1}\nabla_{\frac{\partial}{\partial u^\beta}}\left(\frac{\partial}{\partial u^\sigma}\right)^b \\ =& -L_\sigma^{-1}\frac{\partial L_\sigma}{\partial u^\beta}(E_\sigma)^b + L_\sigma^{-1}\sum_{\rho=1}^{3}\overset{u}{\Gamma}{}^\rho_{\sigma\beta}L_\rho(E_\rho)^b.\end{aligned}$$

利用式(8.8-23)，可将上式分成如下两种形式（下式中重复指标不求和）：

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial u^\beta}}(E_\sigma)^b = \frac{1}{L_\sigma}\frac{\partial L_\beta}{\partial u^\sigma}(E_\beta)^b, \qquad \sigma \neq \beta; \tag{8.8-24a}$$

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial u^\beta}}(E_\beta)^b = -(E_\sigma)^b\frac{1}{L_\sigma}\frac{\partial L_\beta}{\partial u^\sigma} - (E_\alpha)^b\frac{1}{L_\alpha}\frac{\partial L_\beta}{\partial u^\alpha}, \qquad \beta \neq \sigma \neq \alpha. \tag{8.8-24b}$$

式(8.8-24b)中 $1 \leqslant \alpha, \beta, \sigma \leqslant 3$，且互不相等. 共有三组，分别是：$\beta = 1$、$\sigma = 2$、$\alpha = 3$；$\beta = 2$、$\sigma = 3$、$\alpha = 1$；$\beta = 3$、$\sigma = 1$、$\alpha = 2$.

式(8.8-24)是力学张量分析中的常用公式，由该式可以得到球坐标等正交归一基矢量的偏导数关系. 因 $\{u^\alpha\}$ 是活动标架，故不建议把这两式中的协变导数 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial u^\alpha}}(E_\beta)^b$ 记成偏导数 $\frac{\partial}{\partial u^\alpha}(E_\beta)^b$. 需要强调的是：$\{u^\alpha\}$ 不是正交归一基矢 $\{(E_\alpha)^a\}$ 的坐标线，$\{u^\alpha\}$ 是正交、可能非归一基矢 $(\frac{\partial}{\partial u^\alpha})^a$ 的坐标线.

练习 8-16 将式(8.8-24)写成分量形式.

8.9 截面曲率

截面曲率是二维曲面论中高斯曲率在高维空间的推广，本节来讨论这个概念以及与之有关的一些定理．设有 $m(\geqslant 2)$ 维广义黎曼流形 (M,g)，在 $p\in M$ 点切空间 T_pM 中有两个不共线的、非零模、非零切矢量 u^a 和 v^a，将它们进行非退化线性变换

$$\tilde{u}^a=C_1^1u^a+C_1^2v^a,\ \tilde{v}^a=C_2^1u^a+C_2^2v^a;\ \det(C)=C_1^1C_2^2-C_1^2C_2^1\neq 0. \tag{8.9-1}$$

得到的 $\tilde{u}^a$ 和 $\tilde{v}^a$ 同样是 T_pM 中两个不共线切矢量．令

$$Q(u,v)\equiv u_au^a\cdot v_bv^b-(u_av^a)^2. \tag{8.9-2}$$

通过直接计算可证明，在非退化变换(8.9-1)下，有

$$Q(\tilde{u},\tilde{v})=\big(\det(C)\big)^2Q(u,v). \tag{8.9-3}$$

计算过程只是繁琐但不困难，请读者补齐．因 u^a,v^a 不共线，它们共同确定了一个平面，这个二维子空间称为切空间 T_pM 的**二维截面**，记作 $[u\wedge v]$．当度规正定时，恒为正的 $Q(u,v)$ 恰好是两个矢量所张成平行四边形的面积平方；当度规不定时，$Q(u,v)$ 可能为负，此时取绝对值以保证 $Q(u,v)>0$．

同样通过直接计算可证明下式（给出计算过程）

$$\begin{aligned}R_{abcd}\tilde{u}^a\tilde{v}^b\tilde{u}^c\tilde{v}^d=&R_{abcd}(C_1^1u^a+C_1^2v^a)(C_2^1u^b+C_2^2v^b)(C_1^1u^c+C_1^2v^c)(C_2^1u^d+C_2^2v^d)\\=&R_{abcd}(C_1^1C_2^1u^au^b-C_1^2C_2^1v^bu^a+C_1^1C_2^2u^av^b+C_1^2C_2^2v^av^b)\\&\times(C_1^1C_2^1u^cu^d-C_1^2C_2^1v^du^c+C_1^1C_2^2u^cv^d+C_1^2C_2^2v^cv^d)\end{aligned}$$

考虑到黎曼曲率关于下标的反对称性（$R_{abcd}=-R_{bacd}=-R_{abdc}$），上式最终为

$$R_{abcd}\tilde{u}^a\tilde{v}^b\tilde{u}^c\tilde{v}^d=\big(\det(C)\big)^2R_{abcd}u^av^bu^cv^d. \tag{8.9-4}$$

由此可以定义二维截面 $[u\wedge v]$ 的**截面曲率**为

$$K([u\wedge v])\overset{def}{=}\frac{R_{abcd}u^av^bu^cv^d}{Q(u,v)}=\frac{R_{abcd}u^av^bu^cv^d}{u_au^a\cdot v_bv^b-(u_av^a)^2}. \tag{8.9-5}$$

其中 K 的参数是由 u^a,v^a 所确定的截面；曲率 K 与 u^a,v^a 本身没有关系，这由式(8.9-3)以及(8.9-4)一望而知．由定义可以看出 K 是一个实数．

例 8.60 当 $m=2$ 时，来计算一下 K 值．设 $u^a=(\frac{\partial}{\partial x})^a$ 及 $v^a=(\frac{\partial}{\partial y})^a$，有

$$K([u\wedge v])=\frac{R_{abcd}(\frac{\partial}{\partial x})^a(\frac{\partial}{\partial y})^b(\frac{\partial}{\partial x})^c(\frac{\partial}{\partial y})^d}{Q((\frac{\partial}{\partial x}),(\frac{\partial}{\partial y}))}=\frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22}-g_{12}g_{21}}. \tag{8.9-6}$$

这正是二维曲面 p 点高斯曲率，见式(1.5-11)．

8.9.1 常曲率空间

定义 8.61 若广义黎曼流形 (M,g) 上所有点的二维截面曲率都是同一常数，则称 M 为**常曲率空间**.

定理 8.62 M 是常曲率空间的充要条件是：$\forall p\in M,\ \forall u^a,v^a,w^a,z^a\in T_pM$，有

$$R_{abcd}u^av^bw^cz^d=K_0(u_aw^a\cdot v_bz^b-u_az^a\cdot v_bw^b). \tag{8.9-7}$$

证明 .“$\Leftarrow$”部分是显然的.

下面证明“$\Rightarrow$”．点 p 所有二维截面的截面曲率都是实常数 K_0，即

$$\begin{aligned}
0=&R_{abcd}u^av^bu^cv^d-K_0(u_au^a\cdot v_bv^b-u_av^au^bv_b)\\
\xRightarrow{v\to v+z}\ 0=&R_{abcd}u^av^bu^cv^d+R_{abcd}u^av^bu^cz^d+R_{abcd}u^az^bu^cv^d+R_{abcd}u^az^bu^cz^d\\
&-K_0\big(u_au^a(v_bv^b+v_bz^b+z_bv^b+z_bz^b)-u_au^b(v^av_b+v^az_b+z^av_b+z^az_b)\big)\\
\xRightarrow[\text{恒零项}]{\text{约去}}\ 0=&R_{abcd}u^az^bu^cv^d-K_0\big(u_au^az_bv^b-u_au^bv^az_b\big)\\
\xRightarrow{u\to u+w}\ 0=&R_{abcd}(u^au^c+w^au^c+u^aw^c+w^aw^c)z^bv^d\\
&-K_0\big((u^au_a+w^au_a+u^aw_a+w^aw_a)z_bv^b-(u^bu_a+w^bu_a+u^bw_a+w^bw_a)v^az_b\big)\\
\xRightarrow[\text{恒零项}]{\text{约去}}\ 0=&R_{abcd}(w^au^c+u^aw^c)z^bv^d-K_0\big((w^au_a+u^aw_a)z_bv^b-(w^bu_a+u^bw_a)v^az_b\big)\\
\Rightarrow\ 0=&R_{abcd}u^av^bw^cz^d-K_0\big(w^au_az_bv^b-u^bz_bw_av^a\big)\\
&+R_{abcd}u^az^bw^cv^d-K_0\big(u^aw_az_bv^b-u_av^az_bw^b\big)
\end{aligned}$$

上式倒数第一行中的 $T(u,z,w,v)\equiv -K_0(u^aw_az_bv^b-u_av^az_bw^b)$ 满足第一 Bianchi 恒等式（循环恒等式），即在代换 $v\to w,w\to z,z\to v$ 作用下有 $T(u,v,w,z)+T(u,w,z,v)+T(u,z,v,w)=0$；直接计算便可验证这个恒等式．同时不难验证它还满足 $T(u,z,w,v)=-T(u,z,v,w)=-T(z,u,w,v)$ 和 $T(u,z,w,v)=$

$T(w,v,u,z)$；黎曼曲率本身当然也满足上述这些对称性．上式最后一步表明，当所有二维截面曲率为常数时，具有如下对称性：

$$R_{abcd}u^a v^b w^c z^d + T(u,v,w,z) = R_{abcd}u^a z^b v^c w^d + T(u,z,v,w). \tag{8.9-8}$$

这相当于进行如下轮换时具有不变性，即 $v \to z, w \to v, z \to w$；很显然，上式再次轮换后，还有下述等式

$$R_{abcd}u^a v^b w^c z^d + T(u,v,w,z) = R_{abcd}u^a w^b z^c v^d + T(u,w,z,v). \tag{8.9-9}$$

将式(8.9-8)和(8.9-9)中三个不同项加在一起，有

$$\begin{aligned}&\big(R_{abcd}u^a v^b w^c z^d + T(u,v,w,z)\big) + \big(R_{abcd}u^a z^b v^c w^d + T(u,z,v,w)\big)\\ &+\big(R_{abcd}u^a w^b z^c v^d + T(u,w,z,v)\big).\end{aligned} \tag{8.9-10}$$

因 T 和曲率 R 都满足第一 Bianchi 恒等式，故式(8.9-10)恒为零．而(8.9-10)式本身等于 $3\big(R_{abcd}u^a v^b w^c z^d + T(u,v,w,z)\big)$，最终有

$$3\cdot\big(R_{abcd}u^a v^b w^c z^d - K_0(u_a w^a \cdot z_b v^b - u^b z_b \cdot w_a v^a)\big) = 0. \tag{8.9-11}$$

这便是定理中的式(8.9-7)． ■

推论 8.63 设 (M,g) 是常曲率空间（K_0 是曲率），则在局部标架场 $\{(e_i)^a\}$ 下有

$$R_{ijkl} = R_{abcd}(e_i)^a(e_j)^b(e_k)^c(e_l)^d = K_0(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk}). \tag{8.9-12}$$

在常曲率空间中，曲率型式有较为简洁的表达式，由表达式(8.3-6)得

$$(\Omega_{ij})_{ab} = \frac{1}{2}R_{ijkl}(e^k)_a \wedge (e^l)_b \overset{8.9-12}{=\!=\!=} K_0(e_i)_a \wedge (e_j)_b. \tag{8.9-13}$$

需注意，上式所有指标都在下面．利用上式，F. Schur 证明了如下重要定理：

定理 8.64 设有 $m(\geqslant 3)$ 维连通广义黎曼流形 (M,g)，若 $\forall p \in M$，此点的任意二维截面曲率是常数 $K(p)$．那么，$K(p)$ 必为常数，即 M 是常曲率空间．

证明 . 定理中 $K(p)$ 可能是逐点不同的，也就是 $K(p)$ 是 M 上光滑函数场；我们要证明的是：在整个流形 M 上，$K(p)$ 只能取常数值，不能逐点不同．

由式(8.9-13)可知：$(\Omega_{ij})_{ab}(p)=K(p)(e_i)_a\wedge(e_j)_b,\quad 1\leqslant i,j\leqslant m$．对此式求外微分（注意 $K(p)\in C^\infty(M)$），得

$$\begin{aligned}\mathrm{d}_c(\Omega_{ij})_{ab}&=\mathrm{d}_c(K)\wedge(e_i)_a\wedge(e_j)_b+K\big(\mathrm{d}_c(e_i)_a\big)\wedge(e_j)_b-K(e_i)_c\wedge\big(\mathrm{d}_a(e_j)_b\big)\\&\xlongequal{8.7-1a}\mathrm{d}_c(K)\wedge(e_i)_a\wedge(e_j)_b-K(e^k)_c\wedge(\omega_{ki})_a\wedge(e_j)_b+K(e_i)_c\wedge(e^k)_a\wedge(\omega_{kj})_b.\end{aligned}$$

同时，由式(8.7-3)可知联络型式还可以表示为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}_c(\Omega_{ij})_{ab}=&(\omega^k{}_j)_c\wedge(\Omega_{ik})_{ab}+(\omega^k{}_i)_c\wedge(\Omega_{kj})_{ab}\\\xlongequal{8.9-13}&K(\omega^k{}_j)_c\wedge(e_i)_a\wedge(e_k)_b+K(\omega^k{}_i)_c\wedge(e_k)_a\wedge(e_j)_b.\end{aligned}$$

对比以上两式可知，有

$$\mathrm{d}_c(K)\wedge(e_i)_a\wedge(e_j)_b=0.\tag{8.9-14}$$

在标架场 $\{(e^i)_a\}$ 中，可令 $\mathrm{d}_c(K)=K_l(e^l)_c$；代入上式，有

$$\sum_l K_l(e^l)_c\wedge(e_i)_a\wedge(e_j)_b=0,\qquad\forall i,j.\tag{8.9-15}$$

取 $i=1,j=2$，由上式得 $K_l=0(l\geqslant 3)$．再取 $i=3,j=1$ 和 $i=3,j=2$，由式(8.9-15)可得 $K_1=K_2=0$．因此有 $\mathrm{d}_c(K)=0$，进而可知 $K(p)$ 对于整个流形只能取常数，不能是逐点变化的． ■

8.10 共形变换

有 m 维广义黎曼流形 (M,g)、$(N,\tilde g)$，两者之间存在微分同胚 $M\xrightarrow{\phi}N$．如果存在处处恒正函数场 $\Omega\in C^\infty(M)$ 使得

$$\phi^*\tilde g_{ab}=\Omega^2 g_{ab}\quad\Leftrightarrow\quad\phi_*^{-1}\tilde g^{ab}=\Omega^{-2}g^{ab}\quad\text{成立},\tag{8.10-1}$$

则称 ϕ 为流形 M、N 间的**共形映射**．若 $N=M$，则称之为**共形变换**；进一步，若 Ω 为实常数，则称之为**相似变换**．本节只讨论共形变换，且 $\phi\equiv\mathrm{id}$．

在引力论中，很多学者称满足式(8.10-1)的映射为*共形等距映射*（conformally isometric map）．笔者觉得“等距”有蛇足之嫌，故不用．

与 g_{ab} 相容的联络记为 ∇_a，克氏符记为 Γ^k_{ij}．与 $\tilde g_{ab}$ 相容的联络记为 $\tilde\nabla_a$，克氏符记为 $\tilde\Gamma^k_{ij}$．一般说来，带波纹的量与不带波纹的量不再相同，本节主要来计

算它们间的差异. 需要注意的是，带波纹张量需要用带波纹度规 $\tilde{g}$ 升降指标；不带波纹张量需要用不带波纹度规 g 升降指标. 为了避免不必要的误解，我们将显示写出这些度规.

克氏符差异 设有局部坐标系 $\{x^i\}$，仿照式(8.1-3a)可知

$$\begin{aligned}\tilde{\Gamma}^k_{ij} =&\frac{1}{2}\tilde{g}^{kl}\left(\frac{\partial\tilde{g}_{il}}{\partial x^j}+\frac{\partial\tilde{g}_{lj}}{\partial x^i}-\frac{\partial\tilde{g}_{ij}}{\partial x^l}\right)=\frac{1}{2}\Omega^{-2}g^{kl}\left(\frac{\partial\Omega^2 g_{il}}{\partial x^j}+\frac{\partial\Omega^2 g_{lj}}{\partial x^i}-\frac{\partial\Omega^2 g_{ij}}{\partial x^l}\right)\\ =&\Gamma^k_{ij}+\delta^k_i\frac{\partial\ln\Omega}{\partial x^j}+\delta^k_j\frac{\partial\ln\Omega}{\partial x^i}-g_{ij}g^{kl}\frac{\partial\ln\Omega}{\partial x^l}\equiv\Gamma^k_{ij}+\Xi^k_{ij}.\end{aligned}\tag{8.10-2}$$

上式最后一步定义了

$$\Xi^k_{ij}\equiv\delta^k_i\frac{\partial\ln\Omega}{\partial x^j}+\delta^k_j\frac{\partial\ln\Omega}{\partial x^i}-g_{ij}g^{kl}\frac{\partial\ln\Omega}{\partial x^l}.\tag{8.10-3}$$

虽然克氏符不是张量，但两者的差 $\Xi^c_{ab}\equiv\Xi^k_{ij}(\mathrm{d}x^i)_a(\mathrm{d}x^j)_b(\frac{\partial}{\partial x^k})^c$ 是张量；很明显有 $\Xi^c_{ab}=\Xi^c_{ba}$. 因 $\ln\Omega$ 是标量函数场，在局部上可以将偏导数换成协变导数，即 $\partial_a\ln\Omega=\nabla_a\ln\Omega$；所以上式还可以表示成

$$\Xi^c_{ab}=\delta^c_a\nabla_b\ln\Omega+\delta^c_b\nabla_a\ln\Omega-g_{ab}g^{ce}\nabla_e\ln\Omega.\tag{8.10-4}$$

有了克氏符的差异，那联络差异便容易求得了，$\forall X^a\in\mathfrak{X}(M)$, $\omega_a\in\mathfrak{X}^*(M)$

$$(\tilde{\nabla}_a-\nabla_a)X^b=\Xi^b_{ca}X^c,\tag{8.10-5}$$

$$(\tilde{\nabla}_a-\nabla_a)\omega_b=-\Xi^c_{ba}\omega_c.\tag{8.10-6}$$

由上两式容易求得高阶张量场的协变导数差异.

曲率差异 首先计算黎曼曲率. 从式(6.2-2)出发，先计算下式（$\forall Z^a\in\mathfrak{X}(M)$）

$$\begin{aligned}\tilde{\nabla}_a\tilde{\nabla}_bZ^d=&\nabla_a(\nabla_bZ^d+\Xi^d_{fb}Z^f)+\Xi^d_{ea}(\nabla_bZ^e+\Xi^e_{fb}Z^f)-\Xi^e_{ba}(\nabla_eZ^d+\Xi^d_{fe}Z^f)\\ =&\nabla_a\nabla_bZ^d+Z^f\nabla_a\Xi^d_{fb}+\Xi^d_{fb}\nabla_aZ^f+\Xi^d_{ea}(\nabla_bZ^e+\Xi^e_{fb}Z^f)-\Xi^e_{ba}\tilde{\nabla}_eZ^d\end{aligned}$$

对上式中的下标 ab 取反对称（注意利用 $\Xi^c_{ab}=\Xi^c_{ba}$），有

$$\begin{aligned}\tilde{R}^d_{cab}Z^c=&2\tilde{\nabla}_{[a}\tilde{\nabla}_{b]}Z^d=2\nabla_{[a}\nabla_{b]}Z^d+2Z^f\nabla_{[a}\Xi^d_{b]f}+2\Xi^d_{f[b}\nabla_{a]}Z^f\\ &+2\Xi^d_{e[a}\nabla_{b]}Z^e+2\Xi^d_{e[a}\Xi^e_{b]f}Z^f\ =R^d_{cab}Z^c+2Z^f\nabla_{[a}\Xi^d_{b]f}+2\Xi^d_{e[a}\Xi^e_{b]f}Z^f.\end{aligned}$$

因 $\forall Z^a \in \mathfrak{X}(M)$，故有

$$\begin{aligned}\tilde{R}^d_{cab} =& R^d_{cab} + 2\nabla_{[a}\Xi^d_{b]c} + 2\Xi^d_{e[a}\Xi^e_{b]c} && \text{(8.10-7a)}\\ \overset{8.10-4}{=\!=\!=} & R^d_{cab} - 2\delta^d_{[a}\nabla_{b]}\nabla_c \ln\Omega + 2g^{df}g_{c[a}\nabla_{b]}\nabla_f \ln\Omega + 2(\nabla_c \ln\Omega)\delta^d_{[a}\nabla_{b]}\ln\Omega \\ & - 2g_{c[a}(\nabla_{b]}\ln\Omega)g^{df}\nabla_f \ln\Omega - 2\delta^d_{[a}g_{b]c}g^{ef}(\nabla_e \ln\Omega)\nabla_f \ln\Omega. && \text{(8.10-7b)}\end{aligned}$$

上式计算过程并不复杂，请读者补齐计算.

式(8.10-7b)收缩后得 Ricci 曲率间的差异是：

$$\begin{aligned}\tilde{R}_{bc} =& R_{bc} - g_{bc}g^{ef}\nabla_e\nabla_f \ln\Omega - (m-2)\nabla_b\nabla_c \ln\Omega \\ & + (m-2)(\nabla_b \ln\Omega)\nabla_c \ln\Omega - (m-2)g_{bc}g^{ef}(\nabla_e \ln\Omega)\nabla_f \ln\Omega.\end{aligned} \tag{8.10-8}$$

再次收缩得标量曲率间的差异是（需用度规，所以有系数 Ω^2）

$$\Omega^2\tilde{R} = R - 2(m-1)g^{bc}\nabla_b\nabla_c \ln\Omega - (m-1)(m-2)g^{bc}(\nabla_b \ln\Omega)\nabla_c \ln\Omega. \tag{8.10-9}$$

$\binom{1}{3}$ 型 Weyl 张量（可由式(8.2-14)将指标升上来得到）间的差异是

$$\tilde{C}^a{}_{bcd} = C^a{}_{bcd}. \tag{8.10-10}$$

上式计算较为繁琐，但无需任何技巧，直接把式(8.10-7)、(8.10-8)和(8.10-9)代入式(8.2-14)硬算便是；注意利用：因联络无挠，故 $\nabla_b\nabla_c \ln\Omega = \nabla_c\nabla_b \ln\Omega$. 在共形映射下，$\binom{1}{3}$ 型 Weyl 张量是不变的，故它也被称为**共形张量**. 需要注意其它类型 Weyl 张量未必是共形不变的，比如 $\binom{0}{4}$ 型的就不是（$\tilde{C}_{abcd} = \Omega^2 C_{abcd}$）.

定义 8.65 如果 m 维广义黎曼流形 (M, g) 上对于每一点 p，都存在包含 p 的开邻域 U 以及 U 上的平坦度量 $\tilde{g}$（即它的黎曼曲率 $\tilde{R}^a_{bcd}$ 恒为零），使得在 U 上 g 和 $\tilde{g}$ 是共形的，则称 (M, g) 是局部**共形平坦**的广义黎曼流形.

定理 8.66 $m(>3)$ 维广义黎曼流形局部共形平坦的充要条件是 $C^a{}_{bcd}$ 恒为零.

证明 . 参见文献[16]§28；$m = 3$ 的情形也可参见上述文献. ■

二维情形 二维流形则一定局部共形平坦，我们将其分为两个定理.

命题 8.67 对于度规正定的、可嵌入 E^3 中的二维黎曼流形来说，一定存在局部坐标系 $\{x, y\}$ 使得度规满足 $\mathrm{d}s^2 = \Omega(x, y)(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$，其中 $\Omega(x, y)$ 恒正.

证明 . 这是古典微分几何中的一个经典定理，在很多文献中都有证明. 这里给出一个物理类文献[6]§11. 需注意：此定理只在局部成立. ■

命题 8.68 对于度规场是 Lorentz 型的二维广义黎曼流形来说，一定存在局部坐标系 $\{t,x\}$ 使得度规满足 $\mathrm{d}s^2=\Omega(t,x)(-\mathrm{d}t^2+\mathrm{d}x^2)$，其中 $\Omega(t,x)$ 恒正.

证明 . 因流形是二维的，设其局部坐标为 $\{u^1,u^2\}$，在此坐标系下度规场为

$$\mathrm{d}s^2=g_{11}(\mathrm{d}u^1)^2+g_{12}\mathrm{d}u^1\mathrm{d}u^2+g_{21}\mathrm{d}u^2\mathrm{d}u^1+g_{22}(\mathrm{d}u^2)^2.$$

又因度规是 Lorentz 型的，故流形上一定存在两组类光测地线，我们设它们的仿射参数分别为 λ^1、λ^2；则有

$$\begin{aligned}0=&g_{ab}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda^1}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial\lambda^1}\right)^b=g_{ab}\left(\frac{\partial}{\partial u^i}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial u^j}\right)^b\frac{\partial u^i}{\partial\lambda^1}\frac{\partial u^j}{\partial\lambda^1}=g_{ij}\frac{\partial u^i}{\partial\lambda^1}\frac{\partial u^j}{\partial\lambda^1},\\0=&g_{ab}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda^2}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial\lambda^2}\right)^b=g_{ab}\left(\frac{\partial}{\partial u^i}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial u^j}\right)^b\frac{\partial u^i}{\partial\lambda^2}\frac{\partial u^j}{\partial\lambda^2}=g_{ij}\frac{\partial u^i}{\partial\lambda^2}\frac{\partial u^j}{\partial\lambda^2}.\end{aligned}$$

由上式可知，在参数 $\{\lambda^1,\lambda^2\}$ 下，新的度规系数 $g'_{11}=0=g'_{22}$，g'_{12} 非零，即

$$g'_{11}=g_{ij}\frac{\partial u^i}{\partial\lambda^1}\frac{\partial u^j}{\partial\lambda^1}=0,\qquad g'_{22}=g_{ij}\frac{\partial u^i}{\partial\lambda^2}\frac{\partial u^j}{\partial\lambda^2}=0.$$

在新参数 $\{\lambda^1,\lambda^2\}$ 下的度规线元为

$$\mathrm{d}s^2=g'_{12}\mathrm{d}\lambda^1\mathrm{d}\lambda^2+g'_{21}\mathrm{d}\lambda^2\mathrm{d}\lambda^1,\qquad \text{且 } g'_{12}=g'_{21}.$$

在任意一点 p，我们可以认为 g'_{12} 是正的，否则我们取 $\lambda'^1=-\lambda^1$ 即可变其为正. 由于度规是连续的，一定存在 p 点的一个小邻域 $p\in U$ 使得 g'_{12} 恒正. 既然在邻域 U 中 g'_{12} 恒正，可令 $\mu=\frac{1}{2}\ln(2g'_{12})$，则有 $\mathrm{d}s^2=e^{2\mu}\mathrm{d}\lambda^1\mathrm{d}\lambda^2$. 再作变换

$$t=\frac{1}{2}\left(\lambda^1-\lambda^2\right),\ x=\frac{1}{2}\left(\lambda^1+\lambda^2\right);\quad\Leftrightarrow\quad\lambda^1=x+t,\ \lambda^2=x-t.$$

最终线元变为 $\mathrm{d}s^2=e^{2\mu}(-\mathrm{d}t^2+\mathrm{d}x^2)$. ■

例 8.69 二维单位球面 S^2 共形于二维欧式平面.

二维单位球面 $S^2(1)$ 度规以及坐标变换见例8.9. 由例4.11中式(4.2-11)得

$$(\xi^1,\xi^2)=\left(\frac{\sin\theta\cos\phi}{1+\cos\theta},\ \frac{\sin\theta\sin\phi}{1+\cos\theta}\right)=\tan\frac{\theta}{2}\left(\cos\phi,\ \sin\phi\right).\qquad(8.10\text{-}11)$$

上式最后一步本质上是二维平面的极坐标，只需令

$$\rho=\tan(\theta/2);\quad x=\rho\cos\phi,\quad y=\rho\sin\phi. \tag{8.10-12}$$

需要注意：由 $0\leqslant\theta\leqslant\pi$ 得 $0\leqslant\rho\leqslant+\infty$；当 $\theta\to\pi$ 时，$\rho\to+\infty$；下面会看到这正是共形无限远．则上上式变为

$$(\xi^1,\xi^2)=\rho\,(\cos\phi,\sin\phi)=(x,y). \tag{8.10-13}$$

经过上述变换，我们将二维单位球面坐标 $\{\theta,\phi\}$ 变成了二维欧式平面坐标 $\{\rho,\phi\}$；此变换不是等距的，而是共形的．二维单位球面线元变成

$$\begin{aligned}\mathrm{d}s^2=&\mathrm{d}\theta^2+\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2=\left(2\cos^2(\theta/2)\right)^2\left((\mathrm{d}\rho)^2+\frac{\sin^2\theta}{4\cos^4(\theta/2)}\mathrm{d}\phi^2\right)\\=&\left(2\cos^2(\theta/2)\right)^2\left(\mathrm{d}\rho^2+(\rho\mathrm{d}\phi)^2\right)=\left(2\cos^2(\theta/2)\right)^2\left(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2\right).\end{aligned} \tag{8.10-14}$$

由此可见：二维单位球面线元经变换得到了二维欧式平面线元，共形因子是

$$\Omega\equiv2\cos^2(\theta/2). \tag{8.10-15}$$

式(8.10-14)第二行为平面度规（极坐标形式、笛卡尔坐标形式）乘以 Ω^2．若记二维单位球面度规为 g_{ab}，二维欧式平面度规为 δ_{ab}，则由式(8.10-14)可得

$$g_{ab}=\Omega^2\delta_{ab}. \tag{8.10-16}$$

在二维欧式平面上，从 $\rho=0$ 点出发的射线（$\phi=$ 常数）都对应于单位球面上从 $\theta=0$ 点（北极点）出发的经线．需注意，二维欧式平面是非紧致的，二维单位球面是紧致的闭曲面．$\theta\to\pi$ 意味着 $\rho\to+\infty$，这不是欧式平面上的点；即在欧式平面上不存在与 $\theta=\pi$ 对应 ρ 值；因此单位球面上 $\theta=\pi$ 的点（南极点）不对应于二维欧式平面中的任一点．如果我们把 $\rho\to+\infty$ 的点当成二维欧式平面的无穷远点；那么在共形映射(8.10-14)下，欧式平面上所有的无穷远点经无限压缩（此时 $\Omega=0$ ）对应到二维单位球面的南极点（$\theta=\pi$）. ■

常曲率空间 设 $m(>3)$ 维广义黎曼流形 (M,g) 是曲率为 K_0 的常曲率空间，那么，由式(8.9-12)可得其各种曲率分量表达式

$$R_{ijkl}=K_0(g_{ik}g_{jl}-g_{il}g_{jk}), \tag{8.10-17}$$

$$R_{jl} = K_0(m-1)g_{jl}, \tag{8.10-18}$$

$$R = K_0(m-1)m, \tag{8.10-19}$$

$$C_{ijkl} = 0. \tag{8.10-20}$$

上面已算出常曲率空间的 Weyl 张量恒为零，由定理8.66可得如下推论：

推论 8.70 常曲率广义黎曼流形（维数大于 3）必是局部共形平坦的.

练习 8-17 证明式(8.10-10).

小结

音乐同构 为了读者能更好地阅读其它文献，这里给出大多数文献中使用的同构表示；因这种表示使用了五线谱中的升号“♯”与降号“♭”，故称之为**音乐同构**（Musical isomorphism，也称为典范同构 Canonical isomorphism）.

降号“♭”是将 TM 中的切矢量场映射成 T^*M 中余切矢量场；升号“♯”是将 T^*M 中的余切矢量场映射成 TM 中切矢量场. 基矢的具体表示为：

$$\flat : TM \to T^*M, \quad \flat(\boldsymbol{e}_\mu) = \boldsymbol{e}^*_\mu = g_{\mu\sigma}\boldsymbol{e}^{*\sigma}; \quad \text{对应} \quad g_{ab}(e_\mu)^b = (e_\mu)_a = g_{\mu\sigma}(e^\sigma)_a.$$
$$\sharp : T^*M \to TM, \quad \sharp(\boldsymbol{e}^{*\mu}) = \boldsymbol{e}^\mu = g^{\mu\sigma}\boldsymbol{e}_\sigma; \quad \text{对应} \quad g^{ab}(e^\mu)_b = (e^\mu)^a = g^{\mu\sigma}(e_\sigma)^a.$$

由此易得（下式中 $X \in \mathfrak{X}(M)$，$\omega \in \mathfrak{X}^*(M)$）：

$$X^\flat \equiv X_\flat \equiv \flat(X) = \flat(X^\mu \boldsymbol{e}_\mu) = X^\mu \flat(\boldsymbol{e}_\mu) = X^\mu g_{\mu\sigma}\boldsymbol{e}^{*\sigma} = X_\sigma \boldsymbol{e}^{*\sigma}.$$
$$\omega^\sharp \equiv \sharp(\omega) = \sharp(\omega_\mu \boldsymbol{e}^{*\mu}) = \omega_\mu \sharp(\boldsymbol{e}^{*\mu}) = \omega_\mu g^{\mu\sigma}\boldsymbol{e}_\sigma = \omega^\sigma \boldsymbol{e}_\sigma.$$

高阶张量的音乐升降需要显示指定升降哪个指标，表示起来略繁琐；不再赘述.

上面给出的音乐同构使用了 §3.7记号（与[70]同），其实在 §3.7记号以及抽象指标中没有必要引入音乐同构. 但是在绝大多数相关文献中（比如[34, 59, 72]）并不引入记号 $\{\boldsymbol{e}^*_\mu\}$，这些文献中绝大多数时候只用记号 $\{e_\mu\}$ 和 $\{e^\mu\}$，这些文献中的 $\{e_\mu\}$ 就是 §3.7中的 $\{\boldsymbol{e}_\mu\} \cong \{(e_\mu)^a\}$，而这些文献中的 $\{e^\mu\}$ 是指 §3.7中的 $\{\boldsymbol{e}^{*\mu}\} \cong \{(e^\mu)_a\}$. 在这些文献中为了表示抽象指标中的 $(e_\mu)_a$、$(e^\mu)^a$，便引入了上述音乐同构，通常表示为 $\flat(e_\mu) \equiv e^\flat_\mu \equiv e_{\flat\mu} \cong (e_\mu)_a$ 以及 $\sharp(e^\mu) \equiv e^{\sharp\mu} \cong (e^\mu)^a$.

表8.2对比了不同文献中基矢的表示方式，每列上下相互对应.

表 8.2: 不同文献的基矢表示

	切基矢甲	切基矢乙	对偶基矢甲	对偶基矢乙
抽象指标	$(e_\mu)^a$	$(e^\mu)^a$	$(e^\mu)_a$	$(e_\mu)_a$
§3.7记号	$\boldsymbol{e}_\mu$	$\boldsymbol{e}^\mu$	$\boldsymbol{e}^{*\mu}$	$\boldsymbol{e}^*_\mu$
纯数学几何书	e_μ	$e^{\sharp\mu}$	e^μ	$e_{\flat\mu}$

文献总结 本章主要参考了[45]、[70]、[72]相应章节.

本章内容（除 §8.8外）适用于正定、不定度规.

第九章　测地线

我们先讨论了测地线的一般属性；借助测地线可以定义指数映射，由指数映射自然地引入黎曼法坐标的概念，法坐标系对于简化计算有特别的帮助．我们还简要介绍了测地完备性以及弧长变分公式．本章最后介绍了 Jacobi 切矢量场，这是描述引力论中测地偏离方程的工具．

9.1　测地线概念

欧几里得空间 $\mathbb{R}^m$ 的直线在几何图像上是“直”的，但这种感官性质的“直”是无法向流形上推广的．然而 $\mathbb{R}^m$ 直线方程的两次导数恒为零的微积分属性是可以推广到流形上的，流形上测地线定义就是依据这个属性进行推广的．流形上的测地线感官上来看，一般不是“直”的．测地线是沿自身平行的曲线，可以看作是欧氏空间中直线方向不变的推广．

§6.1.6节中，已经给出仿射空间测地线 $\gamma(t)$ 定义6.14；这个定义也适用于 m 维广义黎曼流形 (M,g)，此时有度规，内容更丰富．该定义中称满足 $T^b\nabla_b T^a=0$ 的参数为仿射参数；有时也把满足 $T^b\nabla_b T^a=fT^a$（f 为非零标量场）的曲线称为测地线；不过，最好称之为非仿射参数化的测地线（non-affinely parametrized geodesic），或者准测地线（pre-geodesic）．

为了更精准的讨论测地线嵌入问题，需要诱导联络概念，可参考 §7.4.3．在平行移动定义6.13中所用的联络便是诱导联络的特例，即一条曲线上的诱导联络．有了诱导联络和度规，可以有如下定理：平行移动保内积不变．

定理 9.1 设有 m 维广义黎曼流形 (M,g)，其上存在光滑曲线 $\gamma(t)$．如果有沿 $\gamma(t)$ 平行的切矢量场 X^a,Y^a，那么 $g_{ab}X^aY^b$ 沿 $\gamma(t)$ 是常数．

证明 . 沿 $\gamma(t)$ 平行是指：$\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} X^a = 0, \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} Y^a = 0$；其中 $(\frac{\partial}{\partial t})^a$ 是 $\gamma(t)$ 的切线.

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}\left(g_{ab}X^aY^b\right) = \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}(g_{ab})X^aY^b + g_{ab}\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}(X^a)Y^b + g_{ab}X^a\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}(Y^b) = 0.$$

为零原因：度规、联络相互容许，切矢量场 X^a, Y^a 沿 $\gamma(t)$ 平行. 这说明，沿曲线 $\gamma(t)$ 平行移动保持切矢量长度和夹角不变；换句话说：平行移动是线性、局部等距同构映射. ■

9.1.1 测地线的存在唯一性

设广义黎曼流形 M 的局部坐标系为 $(U; x^i)$；曲线 $\gamma(t)$ 的局部坐标表达式为 $x^i \circ \gamma(t)$，由式(6.1-42)可得：曲线 $\gamma(t)$ 是测地线的充分必要条件是其分量 $x^i \circ \gamma(t)$（为简洁起见，省掉后缀“$\circ\gamma$”）满足如下方程组：

$$\frac{\mathrm{d}^2 x^i(t)}{\mathrm{d}t^2} + \Gamma^i_{jk}(t)\frac{\mathrm{d}x^j(t)}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}x^k(t)}{\mathrm{d}t} = 0, \qquad 1 \leqslant i \leqslant m, \quad t \in (-\delta, \delta). \tag{9.1-1}$$

上式中所有量均沿曲线 $\gamma(t)$ 取值，并且当 t 变动时，$\gamma(t)$ 没有跑出开子集 U. 式(9.1-1)中的第二项（即 $\Gamma^i_{jk}(t)\frac{\mathrm{d}x^j(t)}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}x^k(t)}{\mathrm{d}t}$）中存在“$\frac{\mathrm{d}x^j(t)}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}x^k(t)}{\mathrm{d}t}$”，故在缩并过程对指标“$jk$”而言是对称的；由此可以看出：联络系数 $\Gamma^i_{jk}(t)$ 的反对称部分（若存在）在测地线中根本不起作用，起作用的只有对称部分.

式(9.1-1)是常微分方程（不论线性与否），根据常微分方程解存在唯一性以及初值依赖性，当给定初值时（点 $p \in U$ 的坐标 x_p 以及此点的一个切矢量 v^a）

$$x^i(0) = x^i_p, \quad \frac{\mathrm{d}x^i(0)}{\mathrm{d}t} = v^i; \qquad 1 \leqslant i \leqslant m. \tag{9.1-2}$$

常微分方程式(9.1-1)在局部开集 U 内存在满足上述初始条件的唯一解；也就是说开集 U 内存在唯一一条测地线$\gamma(t; p, v^a)$ 满足初始条件(9.1-2)，即 $\gamma(0; p, v) = p$ 及 $(\frac{\partial}{\partial t})^a|_{\gamma(0)} = v^a$. 但大范围内测地线未必唯一.

测地线存在唯一性定理与度规场没有本质联系.

定义 9.2 设 $\gamma(t)$ 是广义黎曼流形 (M, g) 上的一条测地线，用 $T^a = (\frac{\partial}{\partial t})^a$ 表示其切线切矢量；若 T^a 处处非零，则称其为**正则测地线**；若 $T_aT^a = 1$ 处处成立，则称其为**正规测地线**.

9.1.2 仿射变换

设有映射 $t(u)$ 将正则测地线 $\gamma(t)$ 实参数 t 变成了 u（这称为重参数化），曲线也变成了 $\tilde{\gamma}(u)$；对重参数化后的曲线作如下计算（注：对单参量 t（或 u）的偏导数相当于普通导数，即 $\partial \to \mathrm{d}$）

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial u}}\left(\frac{\partial}{\partial u}\right)^a = \nabla_{\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}u}\frac{\partial}{\partial t}}\left(\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}u}\frac{\partial}{\partial t}\right)^a = \big(t'(u)\big)^2\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a + t'(u)\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}\left(\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}u}\right)$$
$$\xlongequal[\text{测地线}]{\gamma(t)\text{是}} \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}u}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}u}\right) = t''(u)\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a. \tag{9.1-3}$$

由此式可以看出当变换 $t(u)$ 是仿射变换时，即

$$t(u) = au + b, \qquad a, b\text{是实常数，并且}a \neq 0. \tag{9.1-4}$$

此时 $t''(u) = 0$，所以变换后的曲线 $\tilde{\gamma}(u)$ 仍是测地线，即满足 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial u}}(\frac{\partial}{\partial u})^a = 0$.

反之，若要求变换后曲线 $\tilde{\gamma}(u)$ 是测地线，则由式(9.1-3)可知必有 $t''(u) = 0$（因 $\gamma(t)$ 正则，故在任意点都有 $(\frac{\partial}{\partial t})^a \neq 0$），所以 $t(u)$ 必是变换(9.1-4).

下面开始讨论一类特殊的仿射变换：缩放变换. 对于测地线 $\gamma(t; p, v^a)$，我们来作参数变换 $t = \lambda u$（其中 λ 是正的实常数）. 这显然是仿射变换，变换后的曲线 $\tilde{\gamma}(u) \equiv \gamma(\lambda u; p, v^a)$ 仍是测地线，并且有

$$\tilde{\gamma}(0) = \gamma(0) = p; \qquad \left(\frac{\partial}{\partial u}\right)^a\Big|_{\tilde{\gamma}(0)} = \lambda\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a\Big|_{\gamma(0)} = \lambda v^a. \tag{9.1-5}$$

这说明 $\tilde{\gamma}(u)$ 是经过 p 点以 $\lambda \cdot v^a$ 为初始切矢量的测地线，由测地线唯一性得：

$$\tilde{\gamma}(u) = \gamma(\lambda u; p, v^a) = \gamma(u; p, \lambda v^a) \quad \Leftrightarrow \quad \gamma(u; p, v^a) = \gamma(\lambda u; p, \frac{v^a}{\lambda}). \tag{9.1-6}$$

仿射变换、缩放变换与度规场没有本质联系.

9.1.3 弧长参数

下面来看测地线 $\gamma(t)$ 的线元长度，计算下式

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}\left(g_{ab}\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^b\right) = 2g_{ab}\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}\left(\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a\right)\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^b = 0. \tag{9.1-7}$$

可见测地线弧长平方求导之后恒为零，这说明测地线线元长度是实常数，因此必然有（也就是把上式换成下式）

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\sqrt{g_{ab}\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^b}=a\ >0. \tag{9.1-8}$$

于是有常数 b 使得仿射变换 $s=at+b$ 成立，这说明弧长参数 s 是仿射参数；以线长为参数的测地线，其切矢量恒为 1（见式(8.1-12)），是正规测地线.

9.1.4 例

寻找测地线的通用方法是求解测地线方程(9.1-1)，见下例.

例 9.3 $\mathbb{R}^m_\nu$ 中测地线是直线或其一部分.

$\mathbb{R}^m_\nu$ 是平直空间，所有克氏符都为零. 由测地线方程(9.1-1)可知：

$$\frac{\mathrm{d}^2x^i(t)}{\mathrm{d}t^2}=0\ \Rightarrow\ x^i(t)=a^it+b^i,\quad a^i,b^i\in\mathbb{R},\quad t\in(-\delta,\delta). \tag{9.1-9}$$

很明显这是直线（段），且参数 t 可以延拓至无穷远，故 $\mathbb{R}^m_\nu$ 是测地完备的（完备性的定义见9.13）. ■

然而，一般情形下测地线方程(9.1-1)难于求解，故这种方法虽然通用但不好用. 我们可借助流形自身的某些对称性来寻找测地线，为此先介绍一个命题.

命题 9.4 *设有广义黎曼流形 (M,g)，其上有非零模、光滑曲线 $\gamma(s)$，s 是弧长参数. 如果存在 M 到自身的等距映射 σ 使得 σ 的不动点集恰好是曲线 γ 上的点构成的集合，那么 $\gamma(s)$ 是 M 上一条正规测地线.*

证明 . 由命题已知条件得：对于定义域内任意 s 有 $\sigma\circ\gamma(s)=\gamma(s)$，则由式(4.5-8)可知

$$\sigma_*\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\Big|_{\gamma(s)}\right)^a=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\Big|_{\sigma\circ\gamma(s)}\right)^a=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\Big|_{\gamma(s)}\right)^a. \tag{9.1-10}$$

对于 γ 上任意一点 s_0，设 $\beta(s)$ 是一条测地线，它满足的初始条件是：

$$\beta(s_0)=\gamma(s_0),\qquad \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\Big|_{\beta(s_0)}\right)^a=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\Big|_{\gamma(s_0)}\right)^a. \tag{9.1-11}$$

由定理8.36（需用 σ 是等距）可知：$\sigma\circ\beta(s)$ 也是测地线，且满足初条件

$$\sigma\circ\beta(s_0)=\beta(s_0)=\gamma(s_0),\quad \sigma_*\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\Big|_{\beta(s_0)}\right)^a=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\Big|_{\beta(s_0)}\right)^a=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\Big|_{\gamma(s_0)}\right)^a.$$

根据测地线唯一性，由上式可知：$\sigma\circ\beta(s)=\beta(s)$，即 β 是 σ 的不动点集合．命题已知条件中已假设 σ 不动点集合都在 γ 上，故 $\beta(s)$ 与 $\gamma(s)$ 是重合的，只是参数化有所不同．由于 s 是 $\beta(s)$ 与 $\gamma(s)$ 的弧长，且有式(9.1-11)成立，那么 $\gamma(s)\equiv\beta(s)$ 是测地线． ■

除了上述命题外，§10.3命题10.5也是寻找测地线常用工具．

例 9.5 二维球面 S^2 上测地线是大圆或其一部分．

大圆是指过球心的二维平面与二维球面的交线．假设 σ 是 $\mathbb{R}^3$ 上关于原点（即 S^2 球心）的反射变换，它在 S^2 上的限制是 S^2 到其自身的等距映射；σ 的不动点集合是 S^1．由命题9.4可知 S^1 是 S^2 的测地线．另一方面，在 S^2 上任一点 p 沿任意切方向 v^a 都有一个大圆通过 p 点并以 v^a 为切线切矢量；根据测地线唯一性，S^2 上的测地线只能是大圆或大圆的一部分． ■

例 9.6 共形映射下的测地线．

设光滑流形 M 上有度规场 g_{ab}、$\tilde{g}_{ab}$，且两者满足式(8.10-1)（$\tilde{g}_{ab}=\Omega^2 g_{ab}$）．$\gamma(t)$ 用度规 g_{ab} 衡量是测地线，t 是仿射参数，则其切线切矢量 $T^a=(\partial/\partial t)^a$ 满足 $T^a\nabla_a T^b=0$．由式(8.10-4)、(8.10-5)（$\widetilde{\nabla}_a T^b=\nabla_a T^b+\Xi^b_{ca}T^c$）可知：

$$\begin{aligned}T^a\widetilde{\nabla}_a T^b=&T^a\nabla_a T^b+\Xi^b_{ca}T^aT^c=\Xi^b_{ca}T^aT^c\\=&2T^bT^c\nabla_c\ln\Omega-\left(g_{ac}T^aT^c\right)g^{be}\nabla_e\ln\Omega.\end{aligned}\tag{9.1-12}$$

由式(9.1-12)可知，当 Ω 为常数时，$T^a\widetilde{\nabla}_a T^b=0$；故在度规 $\tilde{g}_{ab}$ 衡量下 $\gamma(t)$ 是测地线，t 是仿射参数．下面讨论 Ω 不是常数情形．

设 $\gamma(t)$ 是零模测地线（用 g_{ab} 衡量），则 $g_{ac}T^aT^c=0$；故式(9.1-12)变为 $T^a\widetilde{\nabla}_a T^b=(2T^c\nabla_c\ln\Omega)T^b$．上式表明，用 $\tilde{g}_{ab}$ 衡量，$\gamma(t)$ 是非仿射参数化的测地线，我们可以选择适当参数 $\tilde{t}$ 使其成为仿射参数化的测地线．寻找仿射参数过程留给读者当练习．

当 $\gamma(t)$ 是类时或类空测地线时（用 g_{ab} 衡量），由式(9.1-12)可知：用 $\tilde{g}_{ab}$ 衡量时，$\gamma(t)$ 一般不是测地线． ■

9.2 指数映射与法坐标系

我们先引入指数映射定义，然后借用指数映射介绍黎曼法坐标系（Riemanian Normal Coordinates，也翻译为黎曼简正坐标系）.

9.2.1 指数映射

现有满足初始条件(9.1-2)的广义黎曼流形 (M,g) 上的测地线 $\gamma(t;p,v)$，当参数 $t=1$ 时，赋予它一个新的名称：**指数映射**，它是从 TM 上开子集到流形 M 开子集的映射：

$$\exp_p(v^a)\equiv \exp(p,v^a)\overset{def}{=}\gamma(1;p,v^a)\overset{9.1-6}{=\!=\!=}\gamma\left(|v|;p,\frac{v^a}{|v|}\right). \tag{9.2-1}$$

指数映射的几何意义是沿测地线 $\gamma(t)$ 由点 $p\equiv\gamma(0)$ 到点 $\gamma(1)$ 的测地线弧长等于 $|v|$. 需要注意，如果切矢量 v^a 过大，指数映射可能没有定义；但只要有定义则必然唯一. 同理有

$$\exp_p(tv^a)=\gamma(1;p,tv^a)=\gamma(t;p,v^a). \tag{9.2-2}$$

指数映射(9.2-1)只是借助测地线将 T_pM 中矢量映射到流形 M 中，此时参数 $t\equiv 1$；式(9.2-2)则是测地线本身，参数 t 是变量.

定理 9.7 设有 m 维广义黎曼流形 (M,g). $\forall p\in M$，在 T_pM 中存在原点的开邻域 V，使得指数映射 $\exp_p$ 是从 V 到 M 中 $U=\exp_p(V)$ 上的微分同胚.

证明 . 原点是指矢量空间 T_pM 中矢量为零的点，令

$$B_p(\epsilon)\equiv\{v^a\in T_pM\mid |v|<\epsilon\}. \tag{9.2-3}$$

显然 $B_p(\epsilon)$ 是 T_pM 中以原点为中心，半径为 ϵ 的开球. $\forall v\in B_p(\epsilon)\subset T_pM=T_0(T_pM)$ [1]，令 $|t|\leqslant 1$，则式(9.2-2)肯定有定义；参考式(4.5-8)

$$\phi_*\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\gamma(0)}\right)^a=\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\phi\circ\gamma(0)}\right)^a. \tag{4.5-8}$$

[1] T_pM 自然可看作流形；原点 0 是此流形上一点，$T_0(T_pM)$ 是指流形 T_pM 中原点处切空间.

可得

$$(\exp_p)_{*0}(v^a) = \left(\left. \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \right|_{\gamma(0;p,v^a)} \right)^a = v^a. \tag{9.2-4}$$

此处的 $(\exp_p)_*$ 相当于式(4.5-8)的 ϕ_*，式(4.5-8)中的 $\gamma(t)$ 就是此处的测地线 $\gamma(t;p,v^a)$；而 $(\exp_p)_*$ 本质上是测地线的推前映射，所以才有最终上式的结果. 这说明 $(\exp_p)_{*0}$ 是恒等映射，那它自然是非退化的（Jacobi 矩阵满秩），由定理4.40可知映射 $\exp_p$ 在原点 $\mathbf{0} \in T_pM$ 处是局部微分同胚. ■

例 9.8 欧几里得空间 $\mathbb{R}^m$ 上的指数映射.

欧氏空间测地线就是所谓的“直线”. 原点处的切空间 $T_0(\mathbb{R}^m)$ 就是 $\mathbb{R}^m$ 自身. 指数映射 $\exp_0$ 则是恒等映射. 一般的，$\forall p \in \mathbb{R}^m$，不难得到

$$\exp_p = p + v, \qquad \forall v^a \in T_p(\mathbb{R}^m) = \mathbb{R}^m. \tag{9.2-5}$$

我们借用这道例题来解释一下上面提到的指数映射“有无定义”这件事情. 在本例中，我们把定义域和值域都取成了 $\mathbb{R}^m$；如果我们把指数映射的定义域取成半径为 1 的开球，那么当 $|v| > 1$ 时就会出现所谓的“无定义”情形，当 $|v| < 1$ 时属于“有定义”情形.

9.2.2 黎曼法坐标系

在几何学中，为了能够简单明了的描述问题，选择适当坐标系非常重要；如果选择不当会使计算或证明异常困难. 对于黎曼流形来说，“黎曼法坐标系”是非常合适的坐标系，它是借助指数映射建立起来的.

要严格叙述黎曼法坐标系需要测地凸邻域等概念，请参阅[72]§3.4-3.5；我们只给出描述性的说明. 只要在 T_pM 原点足够小的邻域内，指数映射之后的值域 $W \subset M$ 也足够小，那么在映射后的（M 中）开集 W 内连接任意点 $q \in W$ 和 p 的测地线全部位于 W 中，并且在 W 内连接 p 和 q 的测地线是唯一的；满足这些条件的 W 被称为测地凸邻域，注解9.23给出了测地球概念，这便是一个测地凸邻域. 可以证明 $\forall p \in M$ 都存在包含 p 点的测地凸邻域. 如果测地线不能完全落在 W 中，那么我们无法建立 T_pM 与 W 间的双射，也就无法建立坐标. 如果测地线不唯一，建立后的坐标将是多值的，不符要求.

指数映射将原点附近足够小的开邻域 $V\subset T_pM$ 映射为

$$\exp_p: V\to U\equiv \exp_p(V)\subset M. \tag{9.2-6}$$

设 U 是 $\exp_p(0)$ 点（即 p 点）测地凸邻域．由定理9.7可知指数映射是局部微分同胚的．因 $T_pM\cong\mathbb{R}^m$，其上天然存在正交归一的笛卡尔坐标系；那么局部恒等映射 $\varphi=\exp_p^{-1}: U\to V$ 便将 $V\subset\mathbb{R}^m$ 中笛卡尔坐标携带到 U 中，从而 U 有一个局部坐标系 $(U,\varphi;y^i)$，称为广义黎曼流形 (M,g) 在 p 点的**黎曼法坐标系**，相应开集 U 称为**黎曼法坐标邻域**；简称为**法坐标系（邻域）**.

定理 9.9 设 $(U,\varphi;y^i)$ 是 m 维广义黎曼流形 (M,g) 上任意点 p 的法坐标系，那么在 p 点有 $\bar g_{ij}(p)=\eta_{ij}$，$\bar\Gamma^k_{ij}(p)=0$，$\frac{\partial\bar g_{ij}}{\partial y^k}(p)=0$.

证明 . 我们把法坐标系下的诸多分量上加了一道横杠以区别，比如 $\bar g_{ij},\bar\Gamma^k_{ij}$.

因点 p 切空间 T_pM 同构于 $\mathbb{R}^m$ 中开子集，故我们可以在 T_pM 中取正交归一的标架场 $(e_i)^a$；即 $g_{ab}(e_i)^a(e_j)^a=\eta_{ij}$，其中 η_{ij} 是指对角元为 ±1，非对角元全为零的矩阵．再任取 V 中一个矢量 v^a，在这个正交归一的标架场 $(e_i)^a$ 上分量为 $v=(v^1,\cdots,v^m)\in V$，其中 v^i 是实常数．依据法坐标系定义，局部恒等映射映射 $\varphi=\exp_p^{-1}$ 会把这个坐标带到 U 中，矢量 v^a 在 $(U;y^i)$ 中的坐标是

$$y^i\circ\exp_p(v^a)\equiv v^i,\qquad \left(\frac{\partial}{\partial y^i}\right)^a\Big|_p\equiv(e_i)^a;\qquad 1\leqslant i\leqslant m. \tag{9.2-7}$$

故 $\bar g_{ij}(p)=g_{ab}(\frac{\partial}{\partial y^i})^a|_p(\frac{\partial}{\partial y^j})^b|_p=g_{ab}(e_i)^a(e_j)^b=\eta_{ij}$.

在 V 中测地线是真正的“直线”；局部恒等映射 $\varphi=\exp_p^{-1}$ 也会把它代入到 U 中的法坐标系，因此从 p 点出发的相应测地线方程 $\exp_p(sv^a)$ 的分量表达是

$$y^i(s)=y^i\circ\exp_p(sv^a)=sv^i,\quad s\text{是弧长},\qquad 1\leqslant i\leqslant m. \tag{9.2-8}$$

把式(9.2-8)代入测地线方程式(9.1-1)，立即可得

$$v^iv^j\bar\Gamma^k_{ij}(sv^a)=0,\qquad 1\leqslant i,j,k\leqslant m. \tag{9.2-9}$$

特别地，当 $s=0$ 时，利用 v^a 的任意性以及 $\bar\Gamma^k_{ij}$ 关于下标 i,j 的对称性（如果不对称则没有以下结果），可得 $\bar\Gamma^k_{ij}(0)=0,\ 1\leqslant i,j,k\leqslant m$．如果 $s\neq0$，那么 $\bar\Gamma^k_{ij}(sv^a)$ 将与 v^a 相关，则式(9.2-9)不是二次型，未必能得到 $\bar\Gamma^k_{ij}(sv^a)=0$.

由 $\bar g_{ij}(p)=\eta_{ij},\bar\Gamma^k_{ij}(p)=0$，再从式(8.1-2)易得 $\frac{\partial\bar g_{ij}}{\partial y^k}(p)=0$.

定理中给出的关系式仅在 p 点成立，哪怕离开一点点也未必再成立． ■

上面用抽象的映射定义了法坐标系，下面我们用分量语言再次看一下此问题，并且给出法坐标系下诸多几何量的展开式；这需要分成几部分来叙述.

9.2.2.1 广义克氏符号

对广义黎曼流形 (M,g) 上任意点 p，在 T_pM 中取定理9.9中所述的正交归一标架 $(e_i)^a$. 再取 p 点局部坐标系为 $(U;x^i)$，原点就是 p；在局部坐标系中取标架场 $\{(\frac{\partial}{\partial x^i})^a\}$，我们要求这个标架场在 p 点有 $(\frac{\partial}{\partial x^i})^a|_p=(e_i)^a=(\frac{\partial}{\partial y^i})^a|_p$；但离开 p 点后 $\{x\}$、$\{y\}$ 可能不同.

令任意给定 p 点的切矢量 $v^a|_p$，那么点 p 和 $v^a|_p$ 的局部坐标表达式为

$$x^i_p\equiv x^i_0,\qquad v^a|_p=v^i\big|_p\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a\bigg|_p. \tag{9.2-10}$$

则可设满足上式的测地线坐标分量的 Taylor 展开为（即满足(9.1-1)）：

$$x^i=x^i_0+sv^i+\frac{s^2}{2!}\left(\frac{\mathrm{d}^2x^i}{\mathrm{d}s^2}\right)_p+\frac{s^3}{3!}\left(\frac{\mathrm{d}^3x^i}{\mathrm{d}s^3}\right)_p+\frac{s^4}{4!}\left(\frac{\mathrm{d}^4x^i}{\mathrm{d}s^4}\right)_p+\cdots \tag{9.2-11}$$

由于我们不晓得测地线解的确切表达式，我们假设上述多项式（假设收敛）是测地线方程式(9.1-1)的解（为叙述简单起见，需要把式(9.1-1)中的仿射参数 t 取为测地线弧长 s）.

我们通过对式(9.1-1)再次取 s 的导数来求得 $\frac{\mathrm{d}^3x^i}{\mathrm{d}s^3}$ 及更高阶导数，

$$\frac{\mathrm{d}^3x^i}{\mathrm{d}s^3}+\Gamma^i_{jkl}\frac{\mathrm{d}x^j}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}x^k}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}x^l}{\mathrm{d}s}=0,\quad \frac{\mathrm{d}^4x^i}{\mathrm{d}s^4}+\Gamma^i_{jkln}\frac{\mathrm{d}x^j}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}x^k}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}x^l}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}x^n}{\mathrm{d}s}=0,\cdots \tag{9.2-12}$$

其中 $\Gamma^i_{jkl},\Gamma^i_{jkln}$ 等是广义克氏符号（参见文献[16]§17式 (17.13)-(17.15)）：

$$\Gamma^j_{i_1i_2i_3\cdots i_n}=\Gamma^j_{(i_1i_2i_3\cdots i_{n-1},\ i_n)}-(n-1)\Gamma^j_{k(i_2i_3\cdots i_{n-1}}\Gamma^k_{i_1i_n)},\qquad n>2. \tag{9.2-13}$$

先由普通的克氏符定义三阶广义克氏符，然后四阶，……，递归定义到 n 阶. 与三、四阶方程类似，可求得其它高阶方程. 求完之后，代入式(9.2-11)得

$$x^i=x^i_0+sv^i-\frac{s^2}{2!}\Gamma^i_{jk}(p)v^jv^k-\frac{s^3}{3!}\Gamma^i_{jkl}(p)v^jv^kv^l-\cdots \tag{9.2-14}$$

上式所有 v^i 均在 p 点取值，为使表达式简洁一些省略了角标 p. 假设(9.2-14)式是收敛的；即便如此，s 也不能太大，因为在离 p 点非常远的地方（比如 $q\in M$）测地线可能相交，这相当于坐标线相交于两点 p 和 q.

继续式(9.2-14)的讨论. 黎曼本人引入了坐标(9.2-7)和测地线方程(9.2-8)式，即 $y^i = s\cdot v^i$. 我们把它代入式(9.2-14)得

$$x^i = x_0^i + y^i - \frac{1}{2!}\Gamma^i_{jk}(p)y^jy^k - \frac{1}{3!}\Gamma^i_{jkl}(p)y^jy^ky^l + \cdots \tag{9.2-15}$$

这样，在上式中就不再显示出现 $v^a|_p$ 的信息了. 很明显在 p 点处 Jacobi 矩阵 $\frac{\partial x^i}{\partial y^j}$ 是非退化的，而且上式对经过 p 点的所有测地线都成立；因此 $\{y^i\}$ 可以看作一组新的坐标（即法坐标），上式可以看作是两组坐标 $\{x\}$ 和 $\{y\}$ 的变换公式.

我们已约定坐标系 $\{y\}$ 中，度规取为 $g_{ab} = \bar{g}_{ij}(\mathrm{d}y^i)_a(\mathrm{d}y^j)_b$，相应的克氏符号取为 $\bar{\Gamma}^k_{ij}$. 那么对应的测地线方程变为

$$\frac{\mathrm{d}^2y^i(s)}{\mathrm{d}s^2} + \bar{\Gamma}^i_{jk}(s)\frac{\mathrm{d}y^j(s)}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}y^k(s)}{\mathrm{d}s} = 0, \qquad 1\leqslant i\leqslant m, \quad s\in(-\delta,\delta). \tag{9.2-16}$$

很明显，我们可以重复上面的过程，得到类似于式(9.2-14)的方程式

$$y^i = sv^i - \frac{s^2}{2!}\bar{\Gamma}^i_{jk}(p)v^jv^k - \frac{s^3}{3!}\bar{\Gamma}^i_{jkl}(p)v^jv^kv^l + \cdots \tag{9.2-17}$$

又因已知 $y^i = sv^i$，故可得所有法坐标系（广义）克氏符在 p 点为零，即

$$\bar{\Gamma}^i_{jk}(p) = 0, \quad \bar{\Gamma}^i_{jkl}(p) = 0, \quad \bar{\Gamma}^i_{jkln}(p) = 0, \quad \cdots \tag{9.2-18}$$

叙述到此，需要作一个声明：定理9.9中所描述的点 p 处切空间 T_pM 中正交归一基矢 $(e_i)^a$ 是任取的；如果我们另取一套正交归一基矢 $(e'_i)^a = C^j_i(e_j)^a$，其中 C^j_i 是常数正交矩阵；那么由 $(e'_i)^a$ 也会诱导出一套法坐标 $\{y'\}$，它与法坐标 $\{y\}$ 相差一个常系数正交变换.

9.2.2.2 法坐标展开

由黎曼曲率的分量公式(6.2-8) （$R^i_{\cdot jln} = \partial_l\Gamma^i_{jn} - \partial_n\Gamma^i_{jl} + \Gamma^k_{jn}\Gamma^i_{kl} - \Gamma^k_{jl}\Gamma^i_{kn}$）出发；在法坐标系下，在 p 点所有的（广义）克氏符都是零，故有

$$\bar{R}^i_{\cdot jln}(p) = \partial_l\bar{\Gamma}^i_{jn}(p) - \partial_n\bar{\Gamma}^i_{jl}(p). \tag{9.2-19}$$

由 p 点 $\bar{\Gamma}^i_{jkl}(p) = 0$ 得 $\bar{\Gamma}^i_{jk,l}(p) + \bar{\Gamma}^i_{lj,k}(p) + \bar{\Gamma}^i_{kl,j}(p) = 0$；再由上式可得

$$\partial_n\bar{\Gamma}^i_{jl}(p) = -\frac{1}{3}\left(\bar{R}^i_{\cdot jln}(p) + \bar{R}^i_{\cdot ljn}(p)\right). \tag{9.2-20}$$

利用式(9.2-20)，由式(8.1-2)（$\partial_a g_{bc}=\Gamma^e_{ba}g_{ec}+\Gamma^e_{ca}g_{be}$）得

$$\frac{\partial^2\bar{g}_{ij}(p)}{\partial y^n\partial y^l}=-\frac{1}{3}\left(\bar{R}_{iljn}(p)+\bar{R}_{injl}(p)\right). \tag{9.2-21}$$

根据式(9.2-21)和(9.2-20)，我们可以得到度规和联络系数的 Taylor 展开式

$$\bar{g}_{ij}(y)=\eta_{ij}-\frac{1}{3}\bar{R}_{iljn}(p)y^l y^n+\cdots \tag{9.2-22}$$

$$\bar{g}^{ij}(y)=\eta^{ij}+\frac{1}{3}\bar{R}^{i\cdot j}_{\cdot l\cdot n}(p)y^l y^n+\cdots \tag{9.2-23}$$

$$\bar{\Gamma}^i_{jl}(y)=-\frac{1}{3}\left(\bar{R}^i_{\cdot jln}(p)+\bar{R}^i_{\cdot ljn}(p)\right)y^n+\cdots \tag{9.2-24}$$

只需知道 p 点黎曼曲率 $\bar{R}_{iljn}(p)$ 值就可以计算二阶微扰了.

例 9.10 二维半球面的法坐标系.

通过这道例题向大家初步展示如何建立法坐标系，以及初步验证上面几个微扰展开式. 设有三维欧氏空间 $(\mathbb{R}^3,\delta_{ij})$，半径为 1 的二维球面切于原点 O，切平面是 $x-y$ 平面，球心位于 z 轴上 $(0,0,1)$ 点；我们只取 $0\leqslant z<1$ 的半个球面. 此半球面 S 方程是

$$x^2+y^2+(z-1)^2=1,\qquad -1<x,y<1,\quad 0\leqslant z<1. \tag{9.2-25}$$

二维球面的测地线是过球心平面所截取的大圆. 切空间是 $x-y$ 平面，此空间上有坐标系 $\{x,y\}$；半球面 S 上的指数映射 $\exp_O$ 将坐标 $\{x,y\}$ 带到 S 上；为了有显示的区分，我们用 ξ,η 两个参量来描述半球面 S 的法坐标系坐标参量. 在 $x-y$ 平面上显然有 $\xi=x,\eta=y$，在半球面 S 上对应的点需要求出. 点 (ξ,η) 在 $x-y$ 平面上的弧长是 $\sqrt{\xi^2+\eta^2}$，指数映射 $\exp_O$ 将它映射到大圆上弧长相等的点 p，p 点在 $\mathbb{R}^3$ 中的坐标投影是

$$\phi(\xi,\eta)=\left(\frac{\sin\theta}{\theta}\xi,\ \frac{\sin\theta}{\theta}\eta,\ 1-\cos\theta\right);\quad \text{其中 } \theta=\sqrt{\xi^2+\eta^2}. \tag{9.2-26}$$

到此，已建立好法坐标系，我们开始验证式(9.2-22)–(9.2-24)的正确性. 可借助计算机符号软件完成下面繁琐的计算. 用式(10.0-1)来求取半球面上的诱导度规

$$h_{11}=\frac{-\eta^2\cos 2\theta+\eta^2+2\xi^2\left(\eta^2+\xi^2\right)}{2\left(\eta^2+\xi^2\right)^2}\approx 1-\frac{\eta^2}{3}+\cdots \tag{9.2-27}$$

$$h_{12}=\frac{\eta\xi\left(\cos 2\theta-1+2(\eta^2+\xi^2)\right)}{2\left(\eta^2+\xi^2\right)^2}\approx\frac{\eta\xi}{3}+\cdots \tag{9.2-28}$$

$$h_{22}=\frac{-\xi^2\cos 2\theta+\xi^2+2\eta^4+2\eta^2\xi^2}{2\left(\eta^2+\xi^2\right)^2}\approx 1-\frac{\xi^2}{3}+\cdots \tag{9.2-29}$$

由上面诱导度规 h_{ab} 可求得半球面的克氏符（表达式十分复杂），只给一个.

$$\Gamma^1_{12}=\frac{\eta\left(\left(\xi^2+4\eta^4-4\xi^4\right)\cot\theta-\xi^2\cos 3\theta\csc\theta-4\eta^2\sqrt{\eta^2+\xi^2}\right)}{4\left(\eta^2+\xi^2\right)^{5/2}}\approx-\frac{\eta}{3}+\cdots$$

由克氏符号可求得非零黎曼曲率

$$R_{1212}=\left(\frac{\sin\theta}{\theta}\right)^2\approx 1-\frac{\eta^2+\xi^2}{3}+\cdots \tag{9.2-30}$$

容易看出在二维半球面的法坐标系 $\{\xi,\eta\}$ 下：度规、克氏符等符合定理9.9中叙述；首项非零微扰（二阶）展开式也符合式(9.2-22)–(9.2-24).

9.3 测地完备性

定义 9.11 设 (M,g) 是 m 维、连通、正定黎曼流形，$\forall p,q\in M$，令 $\gamma\in M$ 是连接 p、q 的分段光滑曲线，$L(\gamma)$ 是两点间的线长；我们将 p、q 两点间**距离** $d(p,q)$ 定义为 $L(\gamma)$ 的下确界.

可以证明[72]§3.6距离 d 满足正定性、对称性和三角关系不等式.

可以证明[72]§3.6M 上由上述距离 d 诱导的拓扑与微分拓扑是同胚的.

定义 9.12 设正定黎曼流形 (M,g) 是连通的，如果作为度量空间 (M,d) 是完备的（见定义2.78），那么称 M 是**度量完备**的，一般简称**完备**.

因不定度规下存在零模曲线，其线长恒为零；故定义(9.11)并不适合不定度规情形；同理，定义(9.12)也不大适合不定度规情形.

定义 9.13 设广义黎曼流形 (M,g) 是连通的，如果任何一条测地线的仿射参数定义域都可延拓至整个实数轴，那么称 M 是**测地完备**的.

注意：上述定义中必须是仿射参数. 测地完备还可以叙述成：$\forall p\in M$ 或 $\forall v^a\in T_pM$ 或者两者都任意，指数映射 $\exp_p(v^a)$ 都有定义.

定理 9.14 （Hopf–Rinow 定理）对于连通、正定黎曼流形 (M,g) 下面几个命题等价：**(1)** M 是度量完备的；**(2)** M 是测地完备的；**(3)** (M,d) 的有界闭子集都是 M 的紧致子集.（证明请参考[72]§3.6或类似文献）

可以证明[72]§3.6完备正定黎曼流形上任意两点都可以用最短测地线相互连接.

等距同胚保紧致性、保子集的（开）闭属性、保子集的有界性，所以由 Hopf–Rinow 定理中的 (3) 可知：等距同胚保持正定黎曼流形完备性不变.

定义 9.15 设有连通广义黎曼流形 (M,g) 和 (N,h)，$(\widetilde{M},g)$ 是 M 的一个真开子流形；若存在等距同胚映射 $\phi:N\to\widetilde{M}$，则称 (N,h) 是**可延拓的**；否则称 (N,h) 是**不可延拓的**.

测地完备的正定黎曼流形 M 中已将测地线定义域延拓至最大了，没法再延拓了，所以完备正定黎曼流形是不可延拓的.

Hopf–Rinow 定理貌似还没有推广到不定度规情形.

9.4 弧长变分公式

9.4.1 变分概念

定义 9.16 设 $C:[r_1,r_2]\to M$ 是广义黎曼流形 (M,g) 中的一条光滑曲线段，若有 $\epsilon>0$ 以及光滑映射 $\sigma:[r_1,r_2]\times(-\epsilon,\epsilon)\to M$ 使得 $\sigma(s,0)=C(s)$, $\forall s\in[r_1,r_2]$，则称映射 σ 是曲线 C 的一个**变分**（variation）；$C(s)$ 称为变分的**基准曲线**（base curve）. 对于任意固定的 $\tau\in(-\epsilon,\epsilon)$，由 $\gamma_\tau(s)\equiv\sigma(s,\tau)$ 定义的参数曲线 $\gamma_\tau:[r_1,r_2]\to M$ 称为**变分曲线**（curve in the variation；s-曲线）. 若固定 s，由 $\phi_s(\tau)\equiv\sigma(s,\tau)$ 定义的参数曲线称为**横截曲线**（transversal curve；τ-曲线）.

对于任意固定的 τ，若变分曲线 γ_τ 都是 M 上测地线，则称其为**测地变分**.

注 9.17 我们取基准曲线 $C(s)$ 的参数 s 为曲线的弧长. 同一个 τ 值下，变分曲线 $\gamma_\tau(s)$ 的参数 s 和基准曲线的 s 数值是相同的，但变分曲线 $\gamma_\tau(s)$ 的参数 s 一般不再是弧长，所以 $\gamma_\tau(s)$ 的切线切矢量一般不是单位长.

如果 $C(s)$ 的变分 σ 满足

$$\sigma(r_1,\tau)=C(r_1),\quad \sigma(r_2,\tau)=C(r_2),\qquad \forall\tau\in(-\epsilon,\epsilon),$$

则称 σ 是基准曲线 $C(s)$ 的一个**具有固定端点的变分**.

对于 C 的每一个变分 σ 可以引入沿 σ 定义的光滑矢量场

$$\tilde{S}^a = \sigma_{*(s,\tau)}\left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^a, \qquad \tilde{T}^a = \sigma_{*(s,\tau)}\left(\frac{\partial}{\partial \tau}\right)^a. \tag{9.4-1}$$

那么 $\tilde{S}^a$ 是变分曲线族 $\{\gamma_\tau\}$ 的切矢场；$\tilde{T}^a$ 是横截曲线族 $\{\phi_s\}$ 的切矢场．当端点固定时，有 $\tilde{T}^a(r_1,\tau)=0=\tilde{T}^a(r_2,\tau),\ \forall\tau\in(-\epsilon,\epsilon)$.

由二维区域 $[r_1,r_2]\times(-\epsilon,\epsilon)$ 在 M 上构成的二维子流形上，s 和 τ 是两个相互独立的坐标，故它们的自然基矢是对易的，即诱导联络无挠（见(7.4-18)）

$$\sigma_{*(s,\tau)}\left[\frac{\partial}{\partial s},\frac{\partial}{\partial \tau}\right]^a = 0 \Rightarrow \nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\left(\sigma_{*(s,\tau)}\frac{\partial}{\partial \tau}\right)^a - \nabla_{\frac{\partial}{\partial \tau}}\left(\sigma_{*(s,\tau)}\frac{\partial}{\partial s}\right)^a = 0. \tag{9.4-2}$$

为简单起见，令 $S^a(s)\equiv\tilde{S}^a(s,0)$ 和 $T^a(s)\equiv\tilde{T}^a(s,0)$．$T^a(s)$ 是沿曲线 $C(s)$ 定义的光滑切矢量场，称为变分 σ 的**变分切矢量场**.

9.4.2 第一、二变分公式

下面来计算变分曲线 $\gamma_\tau(s)$ 弧长，由曲线弧长(8.1-7)有：

$$L(\tau)=\int_{r_1}^{r_2}\sqrt{g_{ab}\tilde{S}^a\tilde{S}^b}\mathrm{d}s, \qquad \forall\tau\in(-\epsilon,\epsilon). \tag{9.4-3}$$

很明显 $L(\tau)$ 是一个标量函数，对其取 τ 的导数（需把联络理解成诱导联络）.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}L(\tau) &= \left(\frac{\partial}{\partial\tau}\right)^c\nabla_c\int_{r_1}^{r_2}\sqrt{g_{ab}\tilde{S}^a\tilde{S}^b}\mathrm{d}s = \int_{r_1}^{r_2}\frac{1}{\sqrt{\tilde{S}_a\tilde{S}^a}}g_{ab}\tilde{S}^a\nabla_{\frac{\partial}{\partial\tau}}\tilde{S}^b\mathrm{d}s \\ &\overset{9.4-2}{=\!=\!=} \int_{r_1}^{r_2}\frac{1}{\sqrt{\tilde{S}_a\tilde{S}^a}}\tilde{S}_b\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\tilde{T}^b\mathrm{d}s = \int_{r_1}^{r_2}\frac{1}{\sqrt{\tilde{S}_a\tilde{S}^a}}\left\{\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}(\tilde{S}_b\tilde{T}^b)-\tilde{T}^b\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\tilde{S}_b\right\}\mathrm{d}s.\end{aligned} \tag{9.4-4}$$

需要注意上式中的曲线 $\gamma_\tau(s)$ 的参数一般不是弧长；当 $\tau=0$ 时，依约定 $\gamma_0(s)$ 的参数 s 是弧长，即 $S_aS^a=1$；由此可以得到**弧长第一变分公式**：

$$L'(0)=\left(S_bT^b\right)\Big|_{r_1}^{r_2}-\int_{r_1}^{r_2}T_b\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}S^b\mathrm{d}s. \tag{9.4-5}$$

上式中的 $S_b(s)=\tilde{S}_b(s,0)$，是曲线 $\gamma_0(s)$ 的切矢量；而 $T^a(s)=\tilde{T}^a(s,0)$．如果所有变分曲线有相同的端点，上式还可以化简（注 $\tilde{T}^a(r_1,\tau)=0=\tilde{T}^a(r_2,\tau)$）.

$$L'(0)=-\int_{r_1}^{r_2}T_b\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}S^b\mathrm{d}s. \tag{9.4-6}$$

当第一变分公式为零时，又因 $T_b=\sigma_{*(s,0)}\left(\frac{\partial}{\partial\tau}\right)^a$ 不恒为零，故必有 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}S^b=0$；这是测地线方程，所以曲线 $C(s)$ 是测地线．最终，由式(9.4-6)可得定理：

定理 9.18 光滑曲线 $C(s)$ 为测地线的充要条件是：在固定端点情形下，曲线 $C(s)$ 是弧长泛函变分的临界点，也就是第一变分公式恒为零.

如果 $C(s)$ 是分段光滑的，除了讨论会麻烦一些，所有结果都与上述相同.

继续求弧长泛函的二阶导数，则可得第二变分公式. 需要在 $L'(0)=0$（即 $C(s)$ 是测地线）的前提下计算 $L''(0)$. 继续式(9.4-4)的计算，有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\tau^2}L(\tau)=&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\int_{r_1}^{r_2}\frac{1}{\sqrt{\tilde{S}_a\tilde{S}^a}}\tilde{S}_b\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\tilde{T}^b\mathrm{d}s=\nabla_{\frac{\partial}{\partial\tau}}\int_{r_1}^{r_2}\frac{1}{\sqrt{\tilde{S}_a\tilde{S}^a}}\tilde{S}_b\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\tilde{T}^b\mathrm{d}s\\ =&\int_{r_1}^{r_2}\left\{\frac{(\nabla_{\frac{\partial}{\partial\tau}}\tilde{S}_b)(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\tilde{T}^b)+\tilde{S}_b(\nabla_{\frac{\partial}{\partial\tau}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\tilde{T}^b)}{\sqrt{\tilde{S}_a\tilde{S}^a}}-\frac{(\tilde{S}_a\nabla_{\frac{\partial}{\partial\tau}}\tilde{S}^a)(\tilde{S}_b\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\tilde{T}^b)}{(\tilde{S}_a\tilde{S}^a)^{3/2}}\right\}\mathrm{d}s\\ \xlongequal{6.2-1}&\int_{r_1}^{r_2}\left\{\frac{(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\tilde{T}_b)(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\tilde{T}^b)}{\sqrt{\tilde{S}_a\tilde{S}^a}}-\frac{(\tilde{S}_b\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\tilde{T}^b)^2}{(\tilde{S}_a\tilde{S}^a)^{3/2}}\right.\\ &\left.+\frac{\tilde{S}_b}{\sqrt{\tilde{S}_a\tilde{S}^a}}\left[\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial\tau}}\tilde{T}^b+R^b_{cad}\left(\frac{\partial}{\partial\tau}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^d\tilde{T}^c\right]\right\}\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

在 $\tau=0$ 处取值，此时 $\tilde{S}_a\tilde{S}^a=1$；继续计算，有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\tau^2}L(0)=&\int_{r_1}^{r_2}\left\{(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}T_b)(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}T^b)-(S_b\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}T^b)^2+S_bR^b_{cad}\left(\frac{\partial}{\partial\tau}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^dT^c\right\}\mathrm{d}s\\ &+\int_{r_1}^{r_2}\frac{\partial}{\partial s}\left(S_b\nabla_{\frac{\partial}{\partial\tau}}T^b\right)\mathrm{d}s-\int_{r_1}^{r_2}(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}S_b)(\nabla_{\frac{\partial}{\partial\tau}}T^b)\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

因 $C(s)$ 是测地线，故 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}S_b=0$，继续计算得到**弧长第二变分公式**：

$$\begin{aligned}L''(0)=&\left(S_b\nabla_{\frac{\partial}{\partial\tau}}T^b\right)\Big|_{r_1}^{r_2}\\ &+\int_{r_1}^{r_2}\left((\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}T_b)(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}T^b)-(S_b\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}T^b)^2+R^b_{cad}T^aS^dT^cS_b\right)\mathrm{d}s.\end{aligned}\tag{9.4-7}$$

上面所有计算都需按诱导联络理解.

9.4.3 Gauss 引理

定理 9.19 设有 m 维广义黎曼流形 (M,g)，$\forall p\in M$，$v^a\in T_pM$. 如果指数映射 $\exp_p$ 在 v^a 有定义，那么 $\forall w^a\in T_pM=T_v(T_pM)$，有

$$g_{ab}\left[(\exp_p)_{*v}(v^a)\right]\left[(\exp_p)_{*v}(w^b)\right]=v_bw^b.\tag{9.4-8}$$

证明 . T_pM 是线性空间，自然可以看成流形；$v \in T_pM$ 是这个流形上一点，$T_v(T_pM)$ 是指流形 T_pM 中点 v 处的切空间. 定理中已假设 $\exp_p$ 在 v^a 处有定义；我们任取 $w^a \in T_pM$，存在充分小的 $\epsilon > 0$ 使得下面的映射有定义：

$$\sigma(s,\tau) = \exp_p\big(s(v^a + \tau w^a)\big), \qquad \forall (s,\tau) \in [0,1] \times (-\epsilon, \epsilon). \tag{9.4-9}$$

显然，对于每一个固定的 $\tau \in (-\epsilon,\epsilon)$，$\gamma_\tau(s) = \sigma(s,\tau)$ 是测地线；依定义9.16，$\sigma(s,\tau)$ 是测地线 $\gamma_0(s)$ 的一个测地变分. 容易求得 $\gamma_0(s)$ 的切线切矢量场为

$$S^a(s) = \sigma_{*(s,0)} \left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^a = (\exp_p)_{*sv} v^a. \tag{9.4-10}$$

由于式(9.4-9)是指数映射，所以得到的曲线是测地线；当 s 固定、τ 变化时，将其记为 $\alpha(\tau; q, sw^a)$，其中 $q = \exp_p(sv^a)$. 很明显 $\alpha(\tau; q, sw^a)$ 是横截曲线，它的切线切矢量 $T^a(s)$ 为

$$T^a(s) = \sigma_{*(s,0)} \left(\frac{\partial}{\partial \tau}\right)^a = s \cdot (\exp_p)_{*sv} w^a. \tag{9.4-11}$$

将以上两式代入弧长第一变分公式(9.4-5)，并注意 $\gamma_\tau(s)$ 是测地线，有

$$L'(0) = \big(S_b T^b\big)\big|_0^1 = g_{ab}\,(\exp_p)_{*v}(v^a)\,(\exp_p)_{*v}(w^b). \tag{9.4-12}$$

上式中的 g_{ab} 自然是在推前后（$(\exp_p)_{*v}(v^a)$）的点取值.

我们再以另外一种方法来求 $L'(0)$. 对于任意固定的 τ，$\gamma_\tau(s)$ 的弧长为

$$L(\tau) = \int_0^1 \left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\gamma_\tau(s; p, v^a + \tau w^a)\right| \mathrm{d}s = \int_0^1 |v + \tau w| \mathrm{d}s = |v + \tau w|. \tag{9.4-13}$$

对上式求 τ 的导数，

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}L(\tau)}{\mathrm{d}\tau}\bigg|_{\tau=0} &= \frac{\mathrm{d}(v_a v^a + 2\tau v_a w^a + \tau^2 w_a w^a)^{1/2}}{\mathrm{d}\tau}\bigg|_{\tau=0} \\ &= \frac{v_a w^a + \tau w_a w^a}{(v_a v^a + 2\tau v_a w^a + \tau^2 w_a w^a)^{1/2}}\bigg|_{\tau=0} = \frac{v_a w^a}{|v|}. \end{aligned}$$

因我们采用的是弧长参数，故 $|v| = 1$. 结合上式与式(9.4-12)便可得(9.4-8)式. 上式中的 $v_a w^a$ 是切空间 T_pM 上的内积，在 p 点取值. ■

引理 9.20 $\exp_p$ 把 T_pM 中正交切矢量 v^a 和 w^a 映射到 M 中正交切矢量.

证明 . 只需将 $v_a w^a = 0$ 代入定理9.19即可得到本引理. 本引理才是最早由 Gauss 证明的“Gauss lemma”，定理9.19是推广的“Gauss lemma”. ■

命题 9.21 指数映射 $\exp_p$ 沿射线 tv^a 的切方向是保长的，即对于任意的、平行于 v^a 的切矢量 $w^a \in T_pM$，都有 $|(\exp_p)_{*tv}(w)| = |w|$.

证明 . 设 $w^a = \lambda v^a$，其中 λ 是非零实常数，则由高斯引理可得

$$|(\exp_p)_{*tv}(w)| = g_{ab}(\exp_p)_{*tv}(\lambda v^a)(\exp_p)_{*tv}(w^b) = \lambda v_a w^a = w_a w^a.$$

需要提醒读者 v^a 是测地线的切线方向. ■

注 9.22 由此可见指数映射既保长又保角，故它是沿径向测地线局部等距同构.

注 9.23 设 $p \in M$，假定 $\delta > 0$ 使得指数映射 $\exp_p$ 在

$$B_p(\delta) = \{v^a \in T_pM \mid |v| < \delta\} \tag{9.4-14}$$

上有定义. 根据 Gauss 引理，

$$\mathscr{B}_p(\delta) = \exp_p\big(B_p(\delta)\big). \tag{9.4-15}$$

$\mathscr{B}_p(\delta)$ 的几何含义是：它由这样的 q 点组成，q 和 p 间存在测地线 γ 连接它们，并且两点间测地线长度 $L(\gamma) < \delta$. $\mathscr{B}_p(\delta)$ 称为在 M 中以 p 为中心、以 δ 为半径的**测地球**；其边界 $\partial\mathscr{B}_p(\delta)$ 记为 $\mathscr{S}_p(\delta)$，称为在 M 中以 p 为中心、以 δ 为半径的**测地球面**. 很明显，测地球 $\mathscr{B}_p(\delta)$ 和开球 $B_p(\delta) \subset T_pM$ 未必是同胚的. 但从定理9.7可知：当 δ 充分小时，指数映射是从 $B_p(\delta)$ 到 $\mathscr{B}_p(\delta)$ 的光滑同胚；此时，$\mathscr{S}_p(\delta)$ 与球面 S^{m-1} 是同胚的. 根据 Gauss 引理9.20可知：从点 p 出发的测地线与 $\mathscr{S}_p(\delta)$ 是正交的，所以通常把这样的测地线称为**径向测地线**.

9.5 Jacobi 场

采用 §9.4.1记号. 需提醒读者，在考虑曲线时，一般使用的是诱导联络. 设曲线 $C(s)$ 是测地线，它的每一个变分 $\sigma(s,\tau)$ 也是测地线，即只考虑测地变分情形. $\tilde{S}^a$ 是测地变分曲线族 $\{\gamma_\tau(s)\}$ 的切矢场；$\tilde{T}^a$ 是横截曲线族 $\{\phi_s(\tau)\}$ 的切矢场. 因是测地变分，则 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\tilde{S}^a = 0$；再由(9.4-2)（$\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\tilde{T}^a - \nabla_{\frac{\partial}{\partial \tau}}\tilde{S}^a = 0$）可得

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\tilde{T}^a = \nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial \tau}}\tilde{S}^a = \nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial \tau}}\tilde{S}^a - \nabla_{\frac{\partial}{\partial \tau}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\tilde{S}^a = R^a{}_{bcd}\tilde{S}^c\tilde{T}^d\tilde{S}^b. \tag{9.5-1}$$

上式最后一步再次利用式(9.4-2)（$\left[\frac{\partial}{\partial s},\frac{\partial}{\partial \tau}\right]^a=0$）以及黎曼曲率定义式(6.2-1)．令上式中的 $\tau=0$，那么依照 §9.4.1中约定（即 $S^a(s)\equiv\tilde{S}^a(s,0)$ 和 $T^a(s)\equiv\tilde{T}^a(s,0)$），去掉符号上面的波浪线；上面方程变为（同时令 $T\to J$）

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}J^a=R^a{}_{bcd}S^cJ^dS^b. \tag{9.5-2}$$

此式称为 **Jacobi 方程**；自然是因为 Jacobi 的原因才将 T 变 J．

定义 9.24 设 $C:[r_1,r_2]\to M$ 是 m 维广义黎曼流形 (M,g) 上的一条测地线，$J^a(s)$ 是 M 上沿 $C(s)$ 定义的一个光滑矢量场．若 $J^a(s)$ 满足式(9.5-2)，则称 $J^a(s)$ 是沿测地线 $C(s)$ 定义的一个 **Jacobi 切矢量场**，简称为 **Jacobi 场**.

$J^a(s)$ 是定义在 $C(s)$ 上的切矢量场；S^a 是 $C(s)$ 的切线切矢量．则有

命题 9.25 设 $C:[r_1,r_2]\to M$ 是 m 维广义黎曼流形 (M,g) 上的一条测地线，则 $C(s)$ 测地变分的变分矢量场是沿测地线 $C(s)$ 的 Jacobi 切矢量场．

此定理之逆也成立，见9.28．$C(s)$ 的变分矢量场的方向一般不平行于 $C(s)$ 的切线切矢量（称为纵向），直观感觉它沿横向拉着 $C(s)$ 偏离原来的位置，所以 Jacobi 方程也被称为**测地偏离方程**（geodesic deviation）.

下面给出 Jacobi 方程的分量表达式．我们取一个沿测地线 $C(s)$ 平行移动的正交归一活动标架场 $\{(e_i)^a\}$，并取 $(e_1)^a=(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s})^a|_{C(s)}$ （如果指标 i 是从 0 开始记号的，则取 $(e_0)^a=(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s})^a|_{C(s)}$）．因标架场是平行移动的，所以有

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}(e_i)^a=0,\qquad 1\leqslant i\leqslant m. \tag{9.5-3}$$

因 J^a 是沿 $C(s)$ 定义的光滑切矢量场，可以把它表示为

$$J^a(s)=J^i(s)(e_i)^a. \tag{9.5-4}$$

于是有（我们已约定 $(e_1)^a=(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s})^a|_{C(s)}=S^a$）

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}J^a(s)=\frac{\partial J^i(s)}{\partial s}(e_i)^a,\qquad \nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}J^a(s)=\frac{\partial^2J^i(s)}{\partial s^2}(e_i)^a. \tag{9.5-5}$$

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}J^a(s)-R^a{}_{bcd}S^cJ^dS^b=\left(\frac{\partial^2J^i(s)}{\partial s^2}-R^i{}_{11j}\big(C(s)\big)J^j(s)\right)(e_i)^a. \tag{9.5-6}$$

由此可得 Jacobi 方程的在活动标架场 $\{(e_i)^a(s)\}$ 的分量方程式

$$\frac{\mathrm{d}^2J_i(s)}{\mathrm{d}s^2}=R_{i11j}\big(C(s)\big)J^j(s),\qquad 1\leqslant i\leqslant m. \tag{9.5-7}$$

因标架场 $\{(e_i)^a(s)\}$ 是正交归一的，所以 $g_{ij}=g_{ab}(e_i)^a(e_j)^b=\eta_{ij}$，其中 η_{ij} 非对角元都是零，对角元是 $+1$ 或 -1．我们已用 η_{ij} 把上式中的指标降下来了，$J_i=\eta_{ij}J^j$．同时考虑到方程只是在测地线 $C(s)$ 上取值，是单参数的，所以作了 $\partial\to\mathrm{d}$ 的替换．从式(9.5-7)可看出 Jacobi 方程是线性、齐次常微分方程组．

命题 9.26 设 $C:[r_1,r_2]\to M$ 是广义黎曼流形 (M,g) 上一条测地线，那么 $\forall v^a,w^a\in T_{C(r_1)}M$，存在唯一的一个沿 $C(s)$ 的 Jacobi 切矢量场 $J^a(s)$ 满足 $J^a(r_1)=v^a$、$\frac{\mathrm{d}J^a}{\mathrm{d}s}|_{r_1}=w^a$.

证明 . 我们先把方程式(9.5-7)化成一阶常微分方程组，令 $W_i=\frac{\mathrm{d}J_i}{\mathrm{d}s}$，有

$$\begin{cases}\frac{\mathrm{d}J_i}{\mathrm{d}s}=W_i(s)\\ \frac{\mathrm{d}W_i}{\mathrm{d}s}=R_{i11j}\big(C(s)\big)J^j(s)\end{cases},\qquad \text{初条件}\ \begin{cases}J_i(r_1)=\eta_{ij}v^j\\ W_i(r_1)=\eta_{ij}w^j\end{cases}. \tag{9.5-8}$$

依据常微分方程组解存在唯一性定理可知上述方程式解存在、唯一． ■

我们知道 $T_{C(r_1)}M$ 是 m 维的线性空间，而 Jacobi 场方程(9.5-8)的解由初始条件 $(v^a,w^a)\in T_{C(r_1)}M\oplus T_{C(r_1)}M$ 唯一确定；由上述命题可知这个关系是一个双射．因 Jacobi 方程是线性的，所有解的集合构成线性空间，故有如下命题：

命题 9.27 线性 Jacobi 场方程(9.5-7)或(9.5-8)的解空间是 $2m$ 维线性空间.

有了这些准备，现在可以证明命题9.25的逆命题了.

命题 9.28 设 $C:[r_1,r_2]\to M$ 是 m 维广义黎曼流形 (M,g) 上的测地线，$J^a(s)$ 是一沿测地线 $C(s)$ 的 Jacobi 切矢量场．则 $J^a(s)$ 必是 $C(s)$ 的某个测地变分曲线的变分切矢量场.

证明 . 为了叙述简单，令 $r_1=0$，并记 $p=C(0)$．在流形 M 上任取一条光滑曲线 $\beta(\tau)$，其中 $\tau\in(-\epsilon,\epsilon)$，使得

$$\beta(0)=p,\qquad \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\right)^a\Big|_{\beta(0)}=v^a;\qquad \text{对任意固定的 } v^a\in T_pM. \tag{9.5-9}$$

再取对于任意固定的 $w^a\in T_pM$，把 w^a 和 $S^a(0)=(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s})^a|_{C(0)}$（测地线端点的切线切矢量）沿曲线 $\beta(\tau)$ 作平行移动，得到两个沿 $\beta(\tau)$ 平行的矢量场 $W^a(\tau)$ 和 $S^a(\tau)$，它们满足

$$\nabla_{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}}W^a(\tau)=0,\qquad \nabla_{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}}S^a(\tau)=0. \tag{9.5-10}$$

由此可以构造映射 $\sigma(s,\tau)$ 如下

$$\sigma(s,\tau)=\exp_{\beta(\tau)}\Big[s\big(S^a(\tau)+\tau W^a(\tau)\big)\Big],\qquad (s,\tau)\in[0,r_2]\times(-\epsilon,\epsilon). \tag{9.5-11}$$

对于每一个固定的 τ，曲线 $\alpha_\tau(\cdot)\equiv\sigma(\cdot,\tau)$ 是测地线，并且 $C(s)=\alpha_0(s)$；所以 $\sigma(s,\tau)$ 是测地线 $C(s)$ 的**测地变分**．其变分曲线和横截曲线的切矢量场分别是

$$\tilde S^a=\sigma_{*(s,\tau)}\left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^a,\quad \tilde T^a=\sigma_{*(s,\tau)}\left(\frac{\partial}{\partial \tau}\right)^a. \tag{9.5-12}$$

其中变分曲线的切矢量场是

$$\tilde S^a\Big|_{s=0}=\sigma_{*(0,\tau)}\left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^a=\big(\exp_{\beta(\tau)}\big)_{*0}\big(S^a(\tau)+\tau W^a(\tau)\big)=S^a(\tau)+\tau W^a(\tau).$$

根据命题9.25可知 $T^a=\tilde T|_{\tau=0}$ 是沿 $C(s)$ 的 Jacobi 场，并且有

$$T^a(0)=\sigma_{*(0,0)}\left(\frac{\partial}{\partial\tau}\right)^a=\left(\frac{\partial}{\partial\tau}\right)^a\Big|_{s=0,\tau=0}\big(\sigma(0,\tau)\big)=\left(\frac{\partial}{\partial\tau}\right)^a\Big|_{\tau=0}\big(\beta(\tau)\big)=v^a.$$

再由式(9.4-2)（$\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\tilde T^a-\nabla_{\frac{\partial}{\partial\tau}}\tilde S^a=0$）可得

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\,\tilde T^a\Big|_{\substack{s=0\\ \tau=0}}=\nabla_{\frac{\partial}{\partial\tau}}\,\tilde S^a\Big|_{\substack{s=0\\ \tau=0}}=\nabla_{\frac{\partial}{\partial\tau}}\big(S^a(\tau)+\tau W^a(\tau)\big)\Big|_{\substack{s=0\\ \tau=0}}\overset{9.5-10}{=\!=\!=}W^a(0)=w^a.$$

上面讨论说明 $T(s)$ 是 $C(s)$ 上满足初始条件(9.5-9)的 Jacobi 场．

现在取 $v^a=J^a(0)$，$w^a=\frac{\mathrm{d}J^a(0)}{\mathrm{d}s}$．那么 T^a 和 J^a 都是定义在 $C(s)$ 上的由 $v^a,w^a\in T_pM$ 确定的 Jacobi 场，从定理9.26的唯一性可知 $J^a(s)=T^a(s)$，故 $J^a(s)$ 是测地线 $C(s)$ 的测地变分的变分矢量场． ■

上述定理证明过程给出了定理9.26存在性部分的几何证明．同时可得：

推论 9.29 设 $C:[0,b]\to M$ 是 m 维广义黎曼流形 (M,g) 上测地线；$J^a(s)$ 是一沿 $C(s)$ 的 Jacobi 场，它满足 $J^a(0)=0$ 和 $J^a(s)$ 是测地变分（式中 $p\equiv C(0)$）

$$\sigma(s,\tau)=\exp_p\Big[s\big(v^a+\tau w^a\big)\Big],\quad v^a=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^a\Big|_p,\quad \forall w^a\in T_pM \tag{9.5-13}$$

的变分矢量场．根据变分矢量场定义和式(9.5-13)可知

$$J^a(s)=\sigma_{*(s,0)}\left(\frac{\partial}{\partial\tau}\right)^a=(\exp_p)_{*sv}(sw^a)=s\cdot(\exp_p)_{*sv}(w^a). \tag{9.5-14}$$

证明 ．式(9.5-13)只不过是(9.5-11)的变种，其中 w^a 是任取的．经计算有 $\frac{\mathrm{d}J^a(0)}{\mathrm{d}s}=(\exp_p)_{*0}(w^a)=w^a$；$v^a$ 是测地线 $C(s)$ 在初始点 $s=0$ 处的切线切矢量．由式(9.5-14)可见 $J^a(0)=0$． ■

9.5.1 法 Jacobi 场

定义 9.30 设 $C(s)$ 是广义黎曼流形 (M,g) 上测地线，$J^a(s)$ 是沿 $C(s)$ 的 Jacobi 场．若 $J^a(s)$ 与 $C(s)$ 处处正交，则称 $J^a(s)$ 是沿测地线 $C(s)$ 的**法 Jacobi 场**.

命题 9.31 法 Jacobi 场 $J^a_\perp = J^a \pm S^a(J^bS_b)$ 符合 Jacobi 方程(9.5-2).

证明 . 如果 J^b 与 S^b 正交（即 $J^bS_b=0$），那么 $J^a_\perp = J^a$ 自然符合 Jacobi 方程(9.5-2)．下面假设它们不正交．因度规不同，$C(s)$ 的单位切线切矢量 S^b 的归一化可取 $+1$ 或 -1；当 $S^bS_b=+1$ 时，令 $J^a_\perp = J^a - S^a(J^bS_b)$；当 $S^bS_b=-1$ 时，令 $J^a_\perp = J^a + S^a(J^bS_b)$．在这样约定下，必然有

$$S_aJ^a_\perp = S_aJ^a \pm S_aS^a(J^bS_b) = S_aJ^a - J^bS_b = 0.$$

即 $J^a_\perp$ 与 S^a 正交.

因 S^a 是测地线 $C(s)$ 的切线切矢量，故必有 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}S^a=0$．直接计算，有

$$\begin{aligned}\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}J^a_\perp =&\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\left(J^a \pm S^a(J^bS_b)\right) = R^a{}_{bcd}S^bS^cJ^d \pm S^aS_b\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}J^b\\ \overset{*}{=}&R^a{}_{bcd}S^bS^cJ^d \pm \cancel{S^a\left(R_{[bc]cd}S^{(b}S^{e)}\right)S^cJ^d}\\ \overset{\bullet}{=}&R^a{}_{bcd}S^bS^cJ^d \pm R^a{}_{bcd}S^bS^c\left(S^d(J^eS_e)\right).\end{aligned}$$

上式中的 $\overset{*}{=}$ 步中，由黎曼曲率反对称性和 $S^{(b}S^{e)}$ 的对称性可知它们的缩并为零．在 $\overset{\bullet}{=}$ 步中，同样因黎曼曲率反对称性和 $S^{(c}S^{d)}$ 的对称性可知这个附加项恒为零．但增加这个恒零项后，便有

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}J^a_\perp = R^a{}_{bcd}S^bS^c\left(J^d \pm S^d(J^eS_e)\right) = R^a{}_{bcd}S^bS^cJ^d_\perp.$$

证毕. ■

取 Jacobi 方程(9.5-7)中指标 $i=1$，由黎曼曲率的反对称性可知 $\frac{\mathrm{d}^2J_1(s)}{\mathrm{d}s^2}=0$，所以 $J_1(s)$ 是个线性函数，即

$$J_1(s) = k\cdot s + c_0. \qquad k,c_0\in\mathbb{R}. \tag{9.5-15}$$

由此，易得

$$g_{ab}(e_1)^b\frac{\mathrm{d}J^a}{\mathrm{d}s} = g_{ab}(e_1)^b(e_i)^a\frac{\mathrm{d}J^i}{\mathrm{d}s} = \eta_{11}\frac{\mathrm{d}J^1}{\mathrm{d}s} = k. \tag{9.5-16}$$

令上两式中的 $s=r_1$，有

$$k=g_{ab}(e_1)^b|_{r_1}\frac{\mathrm{d}J^a(r_1)}{\mathrm{d}s},\qquad k\cdot r_1+c_0=J_1(r_1)=g_{ab}(e_1)^b|_{r_1}J^a(r_1). \tag{9.5-17}$$

由此可得 c_0 为

$$c_0=g_{ab}(e_1)^b|_{r_1}\left(J^a(r_1)-r_1\cdot\frac{\mathrm{d}J^a(r_1)}{\mathrm{d}s}\right). \tag{9.5-18}$$

将 k,c_0 带回式(9.5-15)，有

$$J_1(s)=(s-r_1)\cdot g_{ab}(e_1)^b|_{r_1}\frac{\mathrm{d}J^a(r_1)}{\mathrm{d}s}+g_{ab}(e_1)^b|_{r_1}J^a(r_1). \tag{9.5-19}$$

我们注意到 $(e_1)^a=(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s})^a|_{C(s)}$ 是测地线 $C(s)$ 的切线切矢量，故上式可改写为

$$g_{ab}J^a(s)\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^b\bigg|_{C(s)}=J_1(s)=\left((s-r_1)\cdot\frac{\mathrm{d}J^a(r_1)}{\mathrm{d}s}+J^a(r_1)\right)g_{ab}(e_1)^b|_{r_1}.$$

进而可得如下命题

命题 9.32 设 $C:[r_1,r_2]\to M$ 是广义黎曼流形 (M,g) 上一条测地线，$J^a(s)$ 是沿测地线 $C(s)$ 的 Jacobi 场，则 $J^a(s)$ 与测地线 $C(s)$ 处处正交的充要条件是

$$g_{ab}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^b\bigg|_{C(r_1)}\frac{\mathrm{d}J^a(r_1)}{\mathrm{d}s}=0,\quad \text{且}\quad g_{ab}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^b\bigg|_{C(r_1)}J^a(r_1)=0. \tag{9.5-20}$$

命题 9.33 设 $C:[r_1,r_2]\to M$ 是 m 维广义黎曼流形 (M,g) 上的一条测地线，设 $J^a(s)$ 沿 $C(s)$ 的 Jacobi 切矢量场．若存在两个不同点 $s_1,s_2\in[r_1,r_2]$ 使得

$$g_{ab}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^b\bigg|_{C(s_1)}J^a(s_1)=0,\quad \text{且}\quad g_{ab}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^b\bigg|_{C(s_2)}J^a(s_2)=0. \tag{9.5-21}$$

那么 $J^a(s)$ 是法 Jacobi 场．

证明 . 将式(9.5-19)代入(9.5-21)，有

$$\begin{aligned}0=&(s_1-r_1)\cdot g_{ab}(e_1)^b|_{r_1}\frac{\mathrm{d}J^a(r_1)}{\mathrm{d}s}+g_{ab}(e_1)^b|_{r_1}J^a(r_1),\\ 0=&(s_2-r_1)\cdot g_{ab}(e_1)^b|_{r_1}\frac{\mathrm{d}J^a(r_1)}{\mathrm{d}s}+g_{ab}(e_1)^b|_{r_1}J^a(r_1).\end{aligned}$$

因 $s_1\neq s_2$，由上式必然可以得到式(9.5-20)；故 $J^a(s)$ 是法 Jacobi 场． ■

命题 9.34 设 $C(s)$ 是 m 维广义黎曼流形 (M,g) 上一条测地线. 用 $\mathfrak{J}^{\perp}(C)$ 表示 M 上沿测地线 $C(s)$ 法 Jacobi 场集合，则 $\mathfrak{J}^{\perp}(C)$ 是一个 $2m-2$ 维线性空间.

证明 . 由命题9.27可知 M 上全体沿测地线 $C(s)$ 的 Jacobi 场集合是 $2m$ 维线性空间. 从命题9.27证明过程知，初始条件 $(v^a,w^a)\in T_{C(r_1)}M\oplus T_{C(r_1)}M$ 使下式

$$g_{ab}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^b\Big|_{C(s_1)}v^a=0=g_{ab}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^b\Big|_{C(s_1)}w^a \tag{9.5-22}$$

成立的子空间是 $2m-2$ 维的；而这个子空间线性同构于 $\mathfrak{J}^{\perp}(C)$，故 $\mathfrak{J}^{\perp}(C)$ 是 $2m-2$ 维的线性空间. ■

因黎曼曲率的反对称性，有

$$R^a_{\cdot bcd}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^c\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^d\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^b=0,\quad R^a_{\cdot bcd}s\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^c s\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^d s\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^b=0.$$

很明显测地线 $C(s)$ 的切线切矢量 $(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s})^a$ 满足

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^a=0,\qquad \nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\left[s\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^a\right]=0.$$

由上两式可知集合

$$\mathfrak{J}^{\top}(C)\equiv\mathrm{Span}_{\mathbb{R}}\left\{\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^a,\quad s\cdot\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right)^a\right\}. \tag{9.5-23}$$

满足 Jacobi 方程(9.5-2)，因此两维空间 $\mathfrak{J}^{\top}(C)$ 也是 Jacobi 场；称它们为切 Jacobi 场. 很明显 $\mathfrak{J}^{\top}(C)\cap\mathfrak{J}^{\perp}(C)=\{\mathbf{0}\}$，故切 Jacobi 场与法 Jacobi 场交集为零.

9.5.2 常曲率空间

本节讨论常曲率空间（见 §8.9.1）的 Jacobi 场. 设 $C:[r_1,r_2]\to M$ 是 m 维广义黎曼流形 (M,g) 上的一条测地线，测地线参数取弧长 s；我们取一个沿测地线 $C(s)$ 平行移动的正交归一活动标架场 $\{(e_i)^a\}$，并取 $(e_1)^a=(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s})^a|_{C(s)}$.

设常曲率空间 M 的曲率为：c. 利用 $\{(e_i)^a\}$ 正交归一性，由式(8.9-7)知

$$R_{abcd}(e_i)^a(e_1)^b(e_1)^c(e_j)^d=c(g_{af}(e_i)^f(e_1)^ag_{bh}(e_1)^h(e_j)^b-g_{bf}(e_i)^f(e_j)^ag_{bh}(e_1)^h(e_1)^b)$$
$$\Rightarrow\quad R_{i11j}=c(\eta_{i1}\eta_{1j}-\eta_{ij}\eta_{11})=-c\eta_{ij}\eta_{11}.$$

设 $J^a(s)$ 是沿 $C(s)$ 定义的法 Jacobi 场，其展开式为 $J^a = J^i(e_i)^a$. 结合上式，由 Jacobi 方程(9.5-7)得（注：下式中 $2 \leqslant i \leqslant m$）

$$\frac{\mathrm{d}^2 J_i(s)}{\mathrm{d}s^2} = R_{i11j}\big(C(s)\big)J^j(s) = -c\eta_{ij}\eta_{11}J^j(s) = -c\eta_{11}J_i(s). \tag{9.5-24}$$

其中 η_{11} 是 $+1$ 或 -1. 考虑到我们使用的是沿 $C(s)$ 平行移动的标架场，故法场 J^a 的第一分量恒为零，即 $J_1(s) \equiv 0$；故上式中的指标 i 从 2 记起；其通解是

$$J_i(s) = \begin{cases} \lambda_i \sin(\sqrt{c\eta_{11}}s) + \mu_i \cos(\sqrt{c\eta_{11}}s), & \text{若 } c\eta_{11} > 0; \\ \lambda_i s + \mu_i, & \text{若 } c\eta_{11} = 0; \\ \lambda_i \sinh(\sqrt{-c\eta_{11}}s) + \mu_i \cosh(\sqrt{-c\eta_{11}}s), & \text{若 } c\eta_{11} < 0. \end{cases} \tag{9.5-25}$$

其中 λ_i, μ_i 是积分常数.

小结

本章主要参考了[72]Ch.3, Ch.5, Ch.6.

本章除了 §9.3外，所有内容适用于正定、不定度规.

第十章　子流形

§4.6已经初步讨论了子流形概念；在引入度规后，可研究的子流形内容更加丰富．我们先给出子流形的一般理论，然后再把这些理论应用到超曲面上；超曲面在广义相对论中有重要应用．需要声明的是：除非显示标注“零模”，否则所有内容只适用于非零模理论，包括曲线、曲面、子流形等等．

设有两个广义黎曼流形 M 和 N，维数分别为 m 和 $n(<m)$，假设存在光滑浸入映射$\phi: N \to M$，即切映射 ϕ_* 处处非退化；M 和 N 的局部坐标分别为 $(V; x^\alpha)$ 和 $(U; y^i)$，且 $\phi(U) \subset V$．指定 g_{ab} 是流形 M 的广义黎曼度规．第133页的定义4.61指出拉回张量 $h_{ab} \equiv \phi^* g_{ab}$ 也是流形 N 上的张量场，容易验证 h_{ab} 也是对称的；下面证明它还是非退化的．与式(8.4-7)推导过程完全相同，可得

$$h_{ij} = h_{ab}\left(\frac{\partial}{\partial y^i}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial y^j}\right)^b = \frac{\partial x^\alpha}{\partial y^i}\frac{\partial x^\beta}{\partial y^j} g_{\alpha\beta}. \tag{10.0-1}$$

注意，此时的 Jacobi 矩阵 $\frac{\partial x^\alpha}{\partial y^i}$ 不是方阵．上式等号最右端是三个矩阵相乘，它们都是非退化矩阵，所以乘积之后的秩是 $\min(m,n)$，即矩阵 h_{ij} 的秩是 n；因此 h_{ij} 是非退化的．虽然上面是从分量角度来论证的，但是基矢是任选的，而且矩阵的秩不随基矢改变而改变；最终可知二阶对称张量场 h_{ab} 是非退化的．

此时，把二阶、对称、非退化张量场 $h_{ab} \equiv \phi^* g_{ab}$ 称为广义黎曼流形 M 中度规 g_{ab} 通过映射 ϕ 拉回到流形 N 上的**诱导度规**．在古典微分几何中，称度规为第一基本形式；我们称诱导度规 h_{ab} 为子流形 N 的**第一基本形式**．

需要强调的是流形 N 中原来可能存在另外一个度规场，但我们只用诱导度规(10.0-1)；也就是我们只考虑等距浸入，不考虑非等距情形．

当 $m = n+1$ 时，流形 N 称为 M 的浸入超曲面．

10.1 子流形基本理论

设 (M,g,∇_a) 是 m 维广义黎曼流形，(N,h,D_a) 是 $n(<m)$ 维广义黎曼流形．假设两个流形间存在光滑局部等距浸入映射 $\phi:N\to M$，局部等距即是 $h_{ab}=\phi^*g_{ab}$．$\forall p\in N$，存在该点开邻域 $p\in U\subset N$ 使得 $\phi|_U:U\to V\subset M$ 是等距、正则嵌入映射；因此，在局部上 (ϕ,N) 是正则嵌入的；正因为如此，在局部上通常用包含映射 $\imath$ 来代替前面给出的浸入映射 ϕ，即 $\imath:U\to V$ 或 $\imath:N\to M$（应理解成只在局部成立）．我们常常把 N 和 $\imath(N)$ 等同起来，把 T_pN 和 $\imath_*(T_pN)$ 也看作认同，等等．同时，很多时候会忽略 ϕ_*,ϕ^*，$\imath_*,\imath^*$ 等记号；绝大部分文献皆如此，我们也无意改变这种记号习惯，读者小心理解、区分便是，只是在笔者认为需要强调的时候会恢复省略的记号．

$\forall p\in N$，切空间 $T_{\imath(p)}M$ 关于广义黎曼度规 g_{ab} 可以分解为正交直和

$$T_{\imath(p)}M=T_pN\oplus T_p^\perp N, \tag{10.1-1}$$

其中 T_pN 是 N 在 p 点的切空间（等同于 $\imath_*(T_pN)\subset T_{\imath(p)}M$），因此可把 T_pN 看作 $T_{\imath(p)}M$ 的子空间；$T_p^\perp N$ 是 T_pN 在 $T_{\imath(p)}M$ 中的正交补空间，即

$$T_p^\perp N=\big\{\xi^a\in T_{\imath(p)}M\mid g_{ab}\xi^av^b=0,\ \forall v^b\in T_pN\big\}, \tag{10.1-2}$$

称为子流形 $\imath:N\to M$ 在点 $\imath(p)$ 的**法空间**（Normal）；法空间的维数 $m-n$ 称为**余维数**．这样，$\forall v^a\in T_pM$ 可唯一分解为

$$v^a={}^\top v^a+{}^\perp v^a, \tag{10.1-3}$$

其中 ${}^\top v^a\in T_pN$ 称为切分量（Tangent），${}^\perp v^a\in T_p^\perp N$ 称为法分量．令

$$T^\perp N=\bigcup_{p\in N}T_p^\perp N, \tag{10.1-4}$$

可以证明 $T^\perp N$ 是流形 M 上的一个矢量丛，称为子流形 $\imath:N\to M$ 的**法丛**．需注意，法空间、法丛中所有矢量属于 $T_{\imath(p)}M$，并且不属于 T_pN（$\equiv\imath_*(T_pN)$）的矢量．用 $\mathfrak{X}^\perp(N)$表示法丛 $T^\perp(N)$ 中的可微截面集合，即法向矢量场集合．

上述分类不涉及零模矢量；在第十一章会初步涉及零模法矢量的内容．

10.1.1 子流形联络

设 ∇_a 是广义黎曼流形 (M,g) 的 Levi-Civita 联络．$\forall X^a,Y^a\in\mathfrak{X}(N)$，切矢量 $\imath_*X^a$、$\imath_*Y^a$ 是 M 中沿 $\imath$ 的切矢量；为使意义清晰，我们将多次写出“$\imath_*$”等记号．显然 $\nabla_{\imath_*X}(\imath_*Y^a)\in\mathfrak{X}(M)$，但它未必只包含 $\imath_*(\mathfrak{X}(N))\subset\mathfrak{X}(M)$ 中切矢量，还可能包含法向矢量；利用式(10.1-3)，可以假设

$$\nabla_{\imath_*X}(\imath_*Y^a)=\mathrm{D}_{\imath_*X}(\imath_*Y^a)+K^a_{bc}(\imath_*X^b,\imath_*Y^c),\tag{10.1-5}$$

其中 $\mathrm{D}_{\imath_*X}(\imath_*Y^a)=\top(\nabla_{\imath_*X}(\imath_*Y^a))$，那么 $\mathrm{D}_{\imath_*X}(\imath_*Y^a)\in\imath_*(\mathfrak{X}(N))\equiv\mathfrak{X}(N)$，所以通常会把 $\mathrm{D}_{\imath_*X}(\imath_*Y^a)$ 简记为 D_XY^a；另一部分 $K^a_{bc}(\imath_*X^b,\imath_*Y^c)=\perp(\nabla_{\imath_*X}(\imath_*Y^a))$，是法丛 $T^\perp N$ 中的矢量，在不引起误解的前提下也简记为 $K^a_{bc}(X^b,Y^c)$．(10.1-5)式通常称为 **Gauss 公式**；K^a_{bc} 称为等距浸入 $\imath$ 的**第二基本形式**，或称为子流形 N 在流形 M 中的第二基本形式．

我们需要证明上式中给出 D_a 是流形 (N,h) 中的 Levi-Civita 联络．

定理 10.1 设 $\imath:N\to M$ 为局部等距浸入，(M,g) 上有 Levi-Civita 联络 ∇_a；则式(10.1-5)中的 D_a 是流形 (N,h) 中的 Levi-Civita 联络．

证明 ．$\forall f\in C^\infty(N)$、$\forall X^a,Y^a,Z^a\in TN$，取 $\nabla_X(Y^a+fZ^a)$ 的切向和法向：

$$\begin{aligned}
&\mathrm{D}_X(Y^a+fZ^a)=\top\big(\nabla_X(Y^a+fZ^a)\big)=\top\big(\nabla_X(Y^a)+X(f)Z^a+f\nabla_X(Z^a)\big)\\
&=\top\big(\nabla_X(Y^a)\big)+\top\big(X(f)Z^a+f\nabla_X(Z^a)\big)=\mathrm{D}_X(Y^a)+X(f)Z^a+f\mathrm{D}_X(Z^a).\\
&K^a_{bc}(X^b,Y^c+fZ^c)=\perp\big(\nabla_X(Y^a+fZ^a)\big)=\perp\big(\nabla_X(Y^a)+X(f)Z^a+f\nabla_X(Z^a)\big)\\
&=\perp\big(\nabla_X(Y^a)\big)+\perp\big(f\nabla_X(Z^a)\big)=K^a_{bc}(X^b,Y^c)+fK^a_{bc}(X^b,Z^c).
\end{aligned}$$

上面验证了线性属性以及 Leibniz 律．下面验证加法：

$$\begin{aligned}
\mathrm{D}_{X+fY}Z^a=&\top\big(\nabla_{X+fY}Z^a\big)=\top\big(\nabla_XZ^a+\nabla_{fY}Z^a\big)\\
=&\top\big(\nabla_XZ^a\big)+f\left(\top\big(\nabla_YZ^a\big)\right)=\mathrm{D}_XZ^a+f\mathrm{D}_YZ^a.\\
K^a_{bc}(X^b+fY^b,Z^c)=&\perp\big(\nabla_{X+fY}Z^a\big)=\perp\big(\nabla_XZ^a+\nabla_{fY}Z^a\big)\\
=&\perp\big(\nabla_XZ^a\big)+f\left(\perp\big(\nabla_YZ^a\big)\right)=K^a_{bc}(X^b,Z^c)+fK^a_{bc}(Y^b,Z^c).
\end{aligned}$$

上面几个式子说明 D_X 符合 N 上仿射联络定义；同时，验证了 $K^a_{bc}(\cdot,\cdot)$ 对每个位置均是 $C^\infty(N)$-线性．

此外，仍需证明它的无挠性、相容性．我们已知联络 ∇_a 是无挠的，即有

$$\begin{aligned} 0 =&\nabla_X Y^a - \nabla_Y X^a - [X,Y]^a \\ =&\mathrm{D}_X Y^a - \mathrm{D}_Y X^a - [X,Y]^a + K^a_{bc}(X^b,Y^c) - K^a_{bc}(X^c,Y^b). \end{aligned} \tag{10.1-6}$$

需注意 $[X,Y]^a = [\imath_* X, \imath_* Y]^a = \imath_*([X,Y]^a)$，显然已把 $\imath_*([X,Y]^a)$ 和 $[X,Y]^a$ 作认同；读者需注意 $[X,Y]^a \in \mathfrak{X}(N)$，推前之后的 $\imath_*([X,Y]^a) \in \imath_*\mathfrak{X}(N)$，推前映射是不会把切矢量“推出”法空间分量的．对上式分别取切向部分和法向部分，有

$$0 = \mathrm{D}_X Y^a - \mathrm{D}_Y X^a - [X,Y]^a, \tag{10.1-7}$$

$$0 = K^a_{bc}(X^b,Y^c) - K^a_{bc}(X^c,Y^b). \tag{10.1-8}$$

由式(10.1-7)可知，仿射联络 D_a 是无挠的．

将 $X^a \in \mathfrak{X}(N)$ 作用在标量场上，有（其中 $Y^a, Z^a \in \mathfrak{X}(N)$）

$$X(h_{bc}Y^bZ^c) = X\big((\imath^* g_{bc})Y^bZ^c\big) = X\big(g_{bc}(\imath_* Y^b)(\imath_* Z^c)\big) = X(g_{bc}Y^bZ^c) \tag{10.1-9}$$

我们已知联络 ∇_a 是与 g_{ab} 相容的，即有

$$\begin{aligned} X(g_{bc}Y^bZ^c) =&g_{bc}(\nabla_X Y^b)Z^c + g_{bc}Y^b\nabla_X Z^c \\ =&g_{bc}Z^c\mathrm{D}_X Y^b + g_{bc}Z^cK^b_{ad}(X^a,Y^d) + g_{bc}Y^b\mathrm{D}_X Z^c + g_{bc}Y^bK^c_{ad}(X^a,Z^d). \end{aligned}$$

注意到 Y^b、Z^c 是切矢量部分，而 $K^b_{ad}(X^a,Y^d)$ 是法矢量部分，故两者内积必然为零．继续计算，有（注意 $\imath_*(\mathrm{D}_X Y^b) = \mathrm{D}_X Y^b$）

$$\begin{aligned} X(h_{bc}Y^bZ^c) \overset{10.1-9}{=\!=\!=} X(g_{bc}Y^bZ^c) = g_{bc}\imath_*(Z^c\mathrm{D}_X Y^b) + g_{bc}\imath_*(Y^b\mathrm{D}_X Z^c) \\ =\imath^*(g_{bc})(Z^c\mathrm{D}_X Y^b) + \imath^*(g_{bc})(Y^b\mathrm{D}_X Z^c) = h_{bc}Z^c\mathrm{D}_X Y^b + h_{bc}Y^b\mathrm{D}_X Z^c. \end{aligned}$$

因此联络与度规相容，所以 D_a 是流形 N 的 Levi-Civita 联络． ■

不难得到对偶矢量场的协变导数公式，与式(10.1-5)相对应：

$$\nabla_X \omega_a = \mathrm{D}_X \omega_a - K^c_{ba}X^b\omega_c; \quad \text{其中 } \forall \omega_a \in \mathfrak{X}^*(N), \quad \forall X \in \mathfrak{X}(N). \tag{10.1-10}$$

此后，当不引起混淆时，把 $K^b_{ad}(X^a,Y^d)$ 记成 $K^b_{ad}X^aY^d$．由上面定理的证明过程（例如式(10.1-8)）可得关于 $K : \mathfrak{X}(N)\times\mathfrak{X}(N) \to \mathfrak{X}^\perp(N)$ 的如下命题：

命题 10.2 映射 K 是对称的（$K^a_{bc} = K^a_{cb}$）、$C^\infty(N)$-双线性的．

10.1.2 法联络

设 $X^a\in\mathfrak{X}(N)$, $\xi^a\in\mathfrak{X}^\perp(N)$，可把 $\nabla_X\xi^a$ 分成切向、法向两部分

$$\nabla_X\xi^a=-S^a_{\xi b}X^b+\mathrm{D}^\perp_X\xi^a. \tag{10.1-11}$$

其中 $S^a_{\xi b}X^b$ 和 $\mathrm{D}^\perp_X\xi^a$ 分别表示 $\nabla_X\xi^a$ 的切向和法向部分．公式(10.1-11)一般称为**Weingarten 公式**，它和 Gauss 公式合称为**子流形基本公式**.

参考定理10.1的证明过程，可知式(10.1-11)中定义的 $\mathrm{D}^\perp_X$ 是一个仿射联络，称为流形 N 上的**法联络**；此映射是 $\mathrm{D}^\perp_a:\mathfrak{X}^\perp(N)\times\mathfrak{X}(N)\to\mathfrak{X}^\perp(N)$.

$\forall\xi^a,\eta^a\in\mathfrak{X}^\perp(N)$，考虑到法向矢量与切向矢量内积恒为零，有

$$g_{ab}(\mathrm{D}^\perp_X\xi^a)\eta^b+g_{ab}\xi^a\mathrm{D}^\perp_X\eta^b\overset{10.1-11}{=\!=\!=}g_{ab}(\nabla_X\xi^a)\eta^b+g_{ab}\xi^a\nabla_X\eta^b=X(g_{ab}\xi^a\eta^b).$$

上式说明法联络 $\mathrm{D}^\perp_X$ 与 g 在法空间的诱导度规是相容的．因为 $\mathrm{D}^\perp_X\xi^a$ 中的 X^a 和 ξ^a 分别属于切空间和法空间，所以不好探讨法联络 $\mathrm{D}^\perp_a$ 的无挠性.

参考定理10.1的证明过程，可得如下命题：

命题 10.3 由 $(X,\xi)\xrightarrow{S}-S^a_{\xi b}(X^b)$ 定义的映射 $S:\mathfrak{X}^\perp(N)\times\mathfrak{X}(N)\to\mathfrak{X}(N)$ 是 $C^\infty(N)$-双线性的．一般称映射 S 为**形状因子**.

因 $S^a_{\xi b}:\mathfrak{X}(N)\to\mathfrak{X}(N)$，故从张量场特征引理4.70可知 $S^a_{\xi b}$ 是 N 上的 $\binom{1}{1}$ 型光滑张量场；但因 $\xi^a\in\mathfrak{X}^\perp(N)$，故 S（及 K）不是流形 N 上的 $\binom{1}{2}$ 型张量场.

$\forall\xi^a\in\mathfrak{X}^\perp(N)$, $\forall X^a,Y^a\in\mathfrak{X}(N)$，注意 $g_{ab}Y^a\xi^b=0$，有

$$0=\nabla_X(g_{ab}Y^a\xi^b)=g_{ab}Y^a\nabla_X\xi^b+g_{ab}(\nabla_XY^a)\xi^b=g_{ab}K^a_{cd}X^cY^d\xi^b-g_{ab}Y^aS^b_{\xi c}X^c.$$

由上式及命题10.2可得

$$\begin{aligned}g_{ab}Y^aS^b_{\xi c}X^c=&g_{ab}K^a_{cd}X^cY^d\xi^b=g_{ab}K^a_{dc}Y^dX^c\xi^b=g_{ab}X^aS^b_{\xi c}Y^c,\\ \langle S_\xi(X),Y\rangle=&\langle K(X,Y),\xi\rangle=\langle K(Y,X),\xi\rangle=\langle S_\xi(Y),X\rangle.\end{aligned} \tag{10.1-12}$$

故，映射 $S^a_{\xi b}:T_pN\to T_pN$ 关于内积 g_{ab} 是对称线性变换．上式第二行我们给出了此对称性用 §3.7记号的表示方法，但没有给方程式标号.

10.1.3 子流形基本方程

令 ${}^mR^d_{cab}$ 表示 m 维流形 M 中黎曼张量.

$${}^mR^d_{cab}X^aY^bZ^c=\nabla_X\nabla_YZ^d-\nabla_Y\nabla_XZ^d-\nabla_{[X,Y]}Z^d, \tag{10.1-13a}$$

$$ {}^{n}_{\top}R^{d}_{cab}X^{a}Y^{b}Z^{c} = \mathrm{D}_X\mathrm{D}_Y Z^d - \mathrm{D}_Y\mathrm{D}_X Z^d - \mathrm{D}_{[X,Y]}Z^d, \tag{10.1-13b} $$

$$ {}^{n}_{\perp}R^{d}_{cab}X^{a}Y^{b}\xi^{c} = \mathrm{D}^{\perp}_X\mathrm{D}^{\perp}_Y\xi^d - \mathrm{D}^{\perp}_Y\mathrm{D}^{\perp}_X\xi^d - \mathrm{D}^{\perp}_{[X,Y]}\xi^d. \tag{10.1-13c} $$

其中 $X^a, Y^a, Z^a \in \mathfrak{X}(N)$, $\xi^a \in \mathfrak{X}^{\perp}(N)$. 式(10.1-13a)中的辅助切矢量场 X^a、Y^a、Z^a 可随意换成法空间的矢量场 $\xi^a \in \mathfrak{X}^{\perp}(N)$，并仍有意义；其它两个式子则不可以. ${}^{n}_{\top}R^{d}_{cab}$ 表示 n 维流形 N切丛TN 的黎曼张量，并在公式中显示标记了“$\top$”，为了给指标升降留下空间，“$\top$”标在了左下角. ${}^{n}_{\perp}R^{d}_{cab}$ 是法丛$T^{\perp}N$ 的黎曼张量. 式(10.1-13b)给出的定义本就是流形 N 中的黎曼曲率，本来无需在左下角增加记号“$\top$”，但是为了与式(10.1-13c)形成对比才附加此记号；在其他章节中，当只有 ${}^{n}_{\top}R^{d}_{cab}$ 出现时，我们将其记成 ${}^{n}R^{d}_{cab}$.

对 Gauss 公式(10.1-5)再次求协变导数，经简单计算有

$$ \nabla_X\nabla_Y Z^a = \mathrm{D}_X\mathrm{D}_Y Z^a + K^a_{bc}X^b\mathrm{D}_Y Z^c + \nabla_X(K^a_{bc}Y^bZ^c) \tag{10.1-14} $$

交换(10.1-14)中 X, Y 位置并相减，有（下式中 $\zeta^a \equiv K^a_{bc}Y^bZ^c$、$\eta^a \equiv K^a_{bc}X^bZ^c$）

$$ \begin{aligned} {}^{m}R^{a}_{bcd}X^cY^dZ^b = {}&{}^{n}_{\top}R^{a}_{bcd}X^cY^dZ^b - S^a_{\zeta b}X^b + S^a_{\eta b}Y^b - K^a_{ef}Z^f\mathrm{D}_X Y^e \\ &+K^a_{ef}Z^f\mathrm{D}_Y X^e + \mathrm{D}^{\perp}_X\zeta^a - \mathrm{D}^{\perp}_Y\eta^a + K^a_{bc}X^b\mathrm{D}_Y Z^c - K^a_{bc}Y^b\mathrm{D}_X Z^c. \end{aligned} \tag{10.1-15} $$

用 g 将式(10.1-15)的上指标“a”降下来，再与 $W^a \in \mathfrak{X}(N)$ 缩并，有

$$ \begin{aligned} {}^{m}R_{abcd}W^aX^cY^dZ^b &= {}^{n}_{\top}R_{abcd}W^aX^cY^dZ^b - S^a_{\zeta b}X^bg_{af}W^f + S^a_{\eta b}Y^bg_{af}W^f \\ &= {}^{n}_{\top}R_{abcd}W^aZ^bX^cY^d + g_{af}\big((K^f_{bc}X^bZ^c)(K^a_{ed}Y^eW^d) - (K^f_{bc}Y^bZ^c)(K^a_{ed}X^eW^d)\big). \end{aligned} \tag{10.1-16} $$

因 $W^a, Z^b, X^c, Y^d \in \mathfrak{X}(N)$ 的任意性，上式等价于

$$ {}^{n}_{\top}R_{abcd} = {}^{m}R_{abcd} + g_{ef}K^e_{ac}K^f_{bd} - g_{ef}K^e_{ad}K^f_{bc}. \tag{10.1-17} $$

式(10.1-16)或(10.1-17)称为流形 M 与流形 N 之间的黎曼曲率 **Gauss 方程**. 需要强调的是：K^{α}_{ij} 上指标的取值范围是 $n+1 \leqslant \alpha \leqslant m$；下指标的取值范围是 $1 \leqslant i, j \leqslant n$. 由于是在法空间作内积，故需用度规 g，而不能用诱导度规 h.

以上考虑了式(10.1-15)的切向部分；下面取式(10.1-15)等号两侧的法向部分，有（下述方程一般称为 **Codazzi 方程**）：

$$ \begin{aligned} ({}^{m}R^{a}_{bcd}Z^bX^cY^d)^{\perp} = {}&+\mathrm{D}^{\perp}_X(K^a_{bc}Y^bZ^c) - K^a_{bc}Y^b\mathrm{D}_X Z^c - K^a_{bc}Z^c\mathrm{D}_X Y^b \\ &-\mathrm{D}^{\perp}_Y(K^a_{bc}X^bZ^c) + K^a_{bc}X^b\mathrm{D}_Y Z^c + K^a_{bc}Z^c\mathrm{D}_Y X^b. \end{aligned} \tag{10.1-18} $$

为计算法丛中的黎曼曲率，对式(10.1-11)再次求协变微分，有

$$\nabla_X\nabla_Y\xi^a=\mathrm{D}_X^\perp\mathrm{D}_Y^\perp\xi^a-S^a_{(\mathrm{D}_Y^\perp\xi)f}X^f-\mathrm{D}_X\left(S^a_{\xi e}Y^e\right)-K^a_{bc}X^bS^c_{\xi e}Y^e. \tag{10.1-19}$$

交换(10.1-19)中 X,Y 位置得到新式，用旧式减掉新式，参考黎曼曲率(10.1-13)；并计算式 ${}^mR_{abcd}X^cY^d\xi^b\theta^a$（其中 $\theta^a\in\mathfrak{X}^\perp(N)$），有（**Ricci 方程**）

$${}^mR^a_{bcd}X^cY^d\xi^b\theta_a={}^n_\perp R^a_{bcd}X^cY^d\xi^b\theta_a-\theta_aK^a_{bc}X^bS^c_{\xi e}Y^e+\theta_aK^a_{bc}Y^bS^c_{\xi e}X^e \tag{10.1-20a}$$

$$\Leftrightarrow\qquad {}^n_\perp R^a_{bcd}={}^mR^a_{bcd}+K^a_{ce}S^e_{bd}-K^a_{de}S^e_{bc}. \tag{10.1-20b}$$

式(10.1-17)、(10.1-18)和(10.1-20)是子流形理论中的基本方程式.

参考式(8.9-5)，由式(10.1-16)可得到截面曲率间的关系式：

$$\begin{aligned}{}^mK([u\wedge v])={}&{}^nK([u\wedge v])+\\&+\frac{g_{af}\big((K^f_{bc}u^bv^c)(K^a_{ed}v^eu^d)-(K^f_{bc}v^bv^c)(K^a_{ed}u^eu^d)\big)}{u_au^a\cdot v_bv^b-(u_av^a)^2}.\end{aligned} \tag{10.1-21}$$

10.2 活动标架法

取流形 (M,g) 切空间的局部基矢场为 $\{(E_i)^a\}$，其对偶基矢场为 $\{(E^i)_a\}$；（因包含映射）可规定前 n（即 $1\leqslant i\leqslant n$）个基矢场是切空间 $\mathfrak{X}(N)$ 的基矢场，后面 $m-n$（即 $n+1\leqslant A\leqslant m$）个基矢场是法空间 $\mathfrak{X}^\perp(N)$ 的基矢场；很明显两者加起来构成了 TM 的基矢场. 再规定这些基矢场是刚性标架场.

本节约定：小写拉丁字母 $1\leqslant i,j,\cdots\leqslant n$；希腊字母 $1\leqslant\alpha,\beta,\cdots\leqslant m$；大写拉丁字母 $n+1\leqslant A,B,\cdots\leqslant m$；注意 $m>n$.

流形 M 上联络 ∇_a 是无挠的，Cartan 结构方程(6.3-30)变为

$$\mathrm{d}_a(E^\alpha)_b=\sum_{\beta=1}^m(E^\beta)_a\wedge(\omega^\alpha_{\cdot\beta})_b,\quad(\omega^\alpha_{\cdot\beta})_b=-(\omega^{\cdot\alpha}_\beta)_b;\quad 1\leqslant\alpha,\beta\leqslant m; \tag{10.2-1a}$$

$$\mathrm{d}_a(\omega^\alpha_{\cdot\beta})_b=\sum_{\mu=1}^m(\omega^\mu_{\cdot\beta})_a\wedge(\omega^\alpha_{\cdot\mu})_b+\frac12\sum_{\mu,\nu=1}^m R^\alpha_{\cdot\beta\mu\nu}(E^\mu)_a\wedge(E^\nu)_b. \tag{10.2-1b}$$

它们是流形 M 上的结构方程.

10.2.1 子流形联络型式

包含映射将 TM 基矢场拉回到 TN 中

$$(e^i)_a = \imath^*(E^i)_a, \qquad (e_i)^a = \imath_*^{-1}(E_i)^a; \qquad 1 \leqslant i \leqslant n. \tag{10.2-2a}$$

$$(e^A)_a = \imath^*(E^A)_a = 0, \qquad (e_A)^a = \imath_*^{-1}(E_A)^a = 0; \qquad n+1 \leqslant A \leqslant m. \tag{10.2-2b}$$

我们用小写的 $(e^i)_a$ 表示 TN 中的基矢场；因 N 是 n 维的，当角标 $A > n$ 时，所拉回的基矢场自然是零．对于流形 N 中 1 型式场 $(\omega^A_{\cdot i})_a$，我们不再引入新的记号，而是沿用上述结构方程中的记号，用角标的取值范围来区分它们．

我们先化简联络型式场 $(\omega^A_{\cdot i})_a$．因 $\mathrm{d}\circ\imath^* = \imath^*\circ\mathrm{d}$（即拉回映射与外微分可交换），由 M 上 Cartan 第一结构方程得

$$0 = \mathrm{d}_a(e^A)_b = \sum_{i=1}^{n}(e^i)_a \wedge (\omega^A_{\cdot i})_b, \qquad n+1 \leqslant A \leqslant m. \tag{10.2-3}$$

由 Cartan 引理3.94可知

$$(\omega^A_{\cdot i})_a = \sum_{j=1}^{n} K^A_{ij}(e^j)_a, \quad K^A_{ij} = K^A_{ji}; \quad 1 \leqslant i \leqslant n, \quad n+1 \leqslant A \leqslant m. \tag{10.2-4}$$

上式中的系数用“K”，而没有用其它字符的原因见后．利用反对称性 $(\omega^\alpha_{\cdot\beta})_b = -(\omega^{\cdot\alpha}_{\beta})_b$，作如下计算（由正交分解的定义式(10.1-2)可知 $g_{Ai} \equiv 0$）

$$(\omega^i_{\cdot A})_a = -\sum_{B=n+1}^{m}\sum_{l=1}^{n} g_{AB}g^{il}(\omega^B_{\cdot l})_a = -\sum_{B=n+1}^{m}\sum_{j,l=1}^{n} g_{AB}g^{il}K^B_{lj}(e^j)_a. \tag{10.2-5}$$

式(10.2-5)适用于正定或不定度规的刚性标架场．当基矢正交归一、且度规正定时，度规的非对角元全部为零，对角元为“+1”，上式还能进一步化简为

$$(\omega^i_{\cdot A})_a = -(\omega^A_{\cdot i})_a = -K^A_{ij}(e^j)_a. \tag{10.2-6}$$

只有在正交归一基矢、正定度规下才允许上式中指标的上下位置不匹配．

Gauss 公式(10.1-5)和 Weingarten 公式(10.1-11)在基矢场 $\{(e_i)^a\}$ 下变成：

$$\nabla_{e_i}(e_j)^a = \mathrm{D}_{e_i}(e_j)^a + K^a_{bc}(e_j)^b(e_i)^c, \tag{10.2-7a}$$

$$\nabla_{e_i}(E_B)^a = -S^a_{E_B b}(e_i)^b + \mathrm{D}^\perp_{e_i}(E_B)^a. \tag{10.2-7b}$$

由第197页的式(6.3-8)可得流形 M 上的联络型式为

$$\nabla_{e_i}(e_j)^a = (e_i)^c(\omega^k_{\cdot j})_c(e_k)^a + (e_i)^c(\omega^A_{\cdot j})_c(E_A)^a, \tag{10.2-8a}$$

$$\nabla_{e_i}(E_B)^a = (e_i)^c(\omega^k_{\cdot B})_c(e_k)^a + (e_i)^c(\omega^A_{\cdot B})_c(E_A)^a. \tag{10.2-8b}$$

取(10.2-8a)的切向部分，再取(10.2-8b)的法向部分；再结合式(10.2-7)，可得 TN 及 $T^\perp N$ 在局部标架场上的联络型式如下（即 D 和 $\mathrm{D}^\perp$ 的联络型式）：

$$\mathrm{D}_{e_i}(e_j)^a = (e_i)^c(\omega^k_{\cdot j})_c(e_k)^a = e_i(\omega^k_{\cdot j})(e_k)^a = \Gamma^k_{ji}(e_k)^a, \tag{10.2-9a}$$

$$\mathrm{D}^\perp_{e_i}(E_B)^a = (e_i)^c(\omega^A_{\cdot B})_c(E_A)^a = e_i(\omega^A_{\cdot B})(E_A)^a = \Gamma^A_{Bi}(E_A)^a. \tag{10.2-9b}$$

其中 Γ^i_{jk} 等定义见 §6.3．剩余部分是

$$K^a_{bc}(e_j)^b(e_i)^c = (e_i)^c(\omega^A_{\cdot j})_c(E_A)^a \xRightarrow{10.2-4} K^a_{bc} = K^A_{jl}(e^l)_c(e^j)_b(E_A)^a, \tag{10.2-10}$$

$$S^a_{E_Bc}(e_i)^c = -(e_i)^c(\omega^k_{\cdot B})_c(e_k)^a \xRightarrow{10.2-5} S^a_{bc} = g_{BC}g^{kl}K^C_{lj}(e^j)_c(E^B)_b(e_k)^a. \tag{10.2-11}$$

需要再次强调：虽然 K, S 不是 TN 上的张量场但它们是 TM 上的张量场．

10.2.2 Gauss-Codazzi-Ricci 方程的型式表示

由式(10.2-10)和(10.2-11)可以用联络型式来表示 Gauss、Codazzi、Ricci 方程；计算过程并不是十分复杂，请读者补齐．

Gauss 方程(10.1-17)在刚性活动标架下的表达式为

$${}^n_\top R_{abcd} \xRightarrow{10.2-10} \left({}^mR_{ijkl} + g_{AB}(K^A_{ik}K^B_{jl} - K^A_{il}K^B_{jk})\right)(e^i)_a(e^j)_b(e^k)_c(e^l)_d. \tag{10.2-12}$$

上式中的“K”是式(10.2-4)中的“K”．比对式(10.1-17)可知此“K”几何意义便是第二基本形式．这正是我们在式(10.2-4)中用“K”的原因；如果在(10.2-4)式中没有用“K”而用其它字符，反而有违和感．同时也可看到需注意 ${}^mR_{ijkl}$ 只取切空间分量，不取法空间分量．

Codazzi 方程(10.1-18)在刚性标架下的表达式为，（取式(10.1-18)中的 $Z^a = (e_j)^a$、$X^a = (e_k)^a$、$Y^a = (e_l)^a$、$\theta^a = (E_A)^a$，注意内指标 j,k,l,A；参考式(6.3-8)、(10.2-9a)和(10.2-9b)）

$$\begin{aligned} {}^mR^A_{jkl} = &+ e_k(K^A_{lj}) + K^B_{lj}\Gamma^A_{Bk} - K^A_{lr}\Gamma^r_{jk} - K^A_{rj}\Gamma^r_{lk} \\ &- e_l(K^A_{kj}) - K^B_{kj}\Gamma^A_{Bl} + K^A_{kr}\Gamma^r_{jl} + K^A_{rj}\Gamma^r_{kl}. \end{aligned} \tag{10.2-13}$$

由 §6.3.1可知上式是第二基本形式的协变导数之差，即 ${}^{m}R^{A}_{jkl} = K^{A}_{jl;k} - K^{A}_{jk;l}$.

Ricci 方程(10.1-20)在刚性活动标架下的表达式为，

$$ {}^{n}_{\perp}R^{a}_{bcd} = \left({}^{m}R^{B}_{Ckl} + g_{CA}g^{pq}(K^{B}_{kq}K^{A}_{pl} - K^{B}_{lq}K^{A}_{pk})\right)(E_B)^{a}(E^{C})_{b}(e^{k})_{c}(e^{l})_{d}. \tag{10.2-14} $$

Gauss 方程(10.2-12)、Codazzi 方程(10.2-13) 和 Ricci 方程(10.2-14)对度规是否正定没有要求，只需刚性标架即可；度规信息已体现在 g_{BC} 或 g^{pq} 等项中.

10.2.3 子流形结构方程

因此，把流形 M 上的结构方程(10.2-1)用 $\imath^*$ 拉回到流形 N 上，可得子流形 N 上的 Cartan 结构方程为：

$$ \mathrm{d}_a(e^i)_b = (e^j)_a \wedge (\omega^{i}_{\cdot j})_b, \qquad (\omega^{i}_{\cdot j})_b = -(\omega^{\cdot i}_{j})_b; \tag{10.2-15a} $$

$$ \begin{aligned} \mathrm{d}_a(\omega^{i}_{\cdot j})_b =& (\omega^{k}_{\cdot j})_a \wedge (\omega^{i}_{\cdot k})_b + \frac{1}{2}\Big[{}^{m}R^{i}_{jkl} \\ &+ g_{AB}g^{ip}\left(K^{A}_{pk}K^{B}_{jl} - K^{A}_{pl}K^{B}_{jk}\right)\Big](e^{k})_a \wedge (e^{l})_b; \end{aligned} \tag{10.2-15b} $$

$$ \begin{aligned} \mathrm{d}_a(\omega^{B}_{\cdot C})_b =& (\omega^{A}_{\cdot C})_a \wedge (\omega^{B}_{\cdot A})_b + \frac{1}{2}\Big[{}^{m}R^{B}_{Ckl} \\ &+ g_{CA}g^{qp}\left(K^{B}_{qk}K^{A}_{pl} - K^{B}_{ql}K^{A}_{pk}\right)\Big](e^{k})_a \wedge (e^{l})_b; \end{aligned} \tag{10.2-15c} $$

$$ \begin{aligned} \mathrm{d}_a(\omega^{B}_{\cdot j})_b =& (\omega^{k}_{\cdot j})_a \wedge \left(K^{B}_{kr}(e^{r})_b\right) + \left(K^{A}_{js}(e^{s})_a\right) \wedge (\omega^{B}_{\cdot A})_b \\ &+ \frac{1}{2}{}^{m}R^{B}_{jkl}(e^{k})_a \wedge (e^{l})_b. \end{aligned} \tag{10.2-15d} $$

通过对比不难发现，式(10.2-15b)中“$[\cdots]$”里面的式子与 Gauss 方程(10.2-12)相同. 式(10.2-15c)中“$[\cdots]$”里面的式子与 Ricci 方程(10.2-14)相同. 式(10.2-15d)对应 Codazzi 方程(10.2-13).

请读者补齐所有计算过程，Gauss 方程和 Ricci 方程的计算较为简单. Codazzi 方程略显繁琐，计算中需注意外微分定义并不需要联络，但通过包含映射 $\imath^*$ 拉回后，使用流形 N 中的无挠联络 D_a 来代替外微分可简化计算.

例 10.4 常曲率空间子流形.

设广义黎曼流形 (M, g) 是曲率为 $\bar{c}$ 的常曲率空间，则在刚性标架场 $\{(E_A)^a\}$ 下，由式(8.9-12)可知 M 的黎曼曲率为

$$ {}^{m}R_{\alpha\beta\mu\nu} = \bar{c}(g_{\alpha\mu}g_{\beta\nu} - g_{\alpha\nu}g_{\beta\mu}). \tag{10.2-16} $$

将上式代入式(10.2-12)、(10.2-13)和(10.2-14)，可得相应的曲率公式：

$$
\begin{aligned}
{}^{n}_{\top}R_{ijkl} =& \bar{c}(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk}) + g_{AB}\big(K^A_{ik}K^B_{jl} - K^A_{il}K^B_{jk}\big), && (10.2\text{-}17)\\
0 =& K^A_{jl;k} - K^A_{jk;l}, && (10.2\text{-}18)\\
{}^{n}_{\perp}R^B_{Ckl} =& g_{CD}g^{pq}(K^B_{kq}K^D_{pl} - K^B_{lq}K^D_{pk}). && (10.2\text{-}19)
\end{aligned}
$$

计算中需注意度规的切空间与法空间分量是零，即 g_{Bi} 等项恒为零. ■

10.3 子流形测地线

设 (M, g, ∇_a) 是 m 维光滑广义黎曼流形，(N, h, D_a) 是 $n(<m)$ 维光滑广义黎曼流形. 设两个流形间存在等距映射 $\imath : N \to M$，$h_{ab} = \imath^* g_{ab}$ 是诱导度规.

设子流形 N 有切矢量场 $Y^a \in \mathfrak{X}(N)$，N 上还有光滑曲线 $\alpha(s)$. 那么从式(10.1-5)可得

$$
\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}} Y^a = \mathrm{D}_{\frac{\partial}{\partial s}} Y^a + K^a_{bc}\left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^b Y^c. \tag{10.3-1}
$$

其中 $\left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^b$ 是曲线 $\alpha(s) \in N$ 的切线切矢量. 令式(10.3-1)中 $Y^a = \left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^a$，则有

$$
\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^a = \mathrm{D}_{\frac{\partial}{\partial s}}\left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^a + K^a_{bc}\left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^b\left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^c. \tag{10.3-2}
$$

我们已知第二基本形式 K^a_{bc} 是法于子流形 N 的，故有

命题 10.5 *N 中曲线 $\alpha(s)$ 是测地线的充要条件是：$\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^a$ 处处法于 N.*

证明 . 很明显，若上述命题中的条件成立，则切于 N 的 $\mathrm{D}_{\frac{\partial}{\partial s}}\left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^a$ 必定处处为零，故 $\alpha(s)$ 是 N 上测地线. 反之，若 $\alpha(s)$ 是测地线，则必有 $\mathrm{D}_{\frac{\partial}{\partial s}}\left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^a = 0$，则由式(10.3-2)可得 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^a = K^a_{bc}\left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^b\left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^c$，故 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}\left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^a$ 处处法于 N. ■

定义 10.6 *若 N 的第二基本形式 K^a_{bc} 恒为零，则称 N 是 M 的**全测地子流形**.*

在全测地子流形（totally geodesic）中，由式(10.3-2)可知子流形 N 中测地线必定是 M 中测地线. 反之，若 $\alpha : [a, b] \to M$ 是 M 中测地线，并且有 $\alpha(a) \in N$，$\frac{\partial}{\partial s}\big|_{\alpha(a)} \in T_{\alpha(a)}N$，那么 α 必落在子流形 N 中，从而也是 N 的测地线.

10.4 超曲面一：基本概念

设有两个光滑流形 M 和 Σ（超曲面理论中一般用 Σ 来代替前几节常用的字符 N），维数分别为 $m+1$ 和 m，[1] 设存在光滑等距浸入映射 $\phi:\Sigma\to M$，流形 Σ 称为 M 的**浸入超曲面**．指定 g_{ab} 是流形 M 的广义黎曼度规，$h_{ab}\equiv\phi^*g_{ab}$ 是流形 Σ 上的诱导度规．

设 M 和 Σ 局部坐标分别为 $(V;x^\alpha)$ 和 $(U;y^i)$，且 $\phi(U)\subset V$．因浸入映射在局部上就是包含映射，故可认为 V 中的第 $1\leqslant i\leqslant m$ 个坐标与 U 中的第 $1\leqslant i\leqslant m$ 个坐标是相同的，即 $x^i\equiv y^i$；只有 V 中第零坐标 x^0 是 U 中没有的．

在超曲面几节中我们使用如下约定：小写拉丁字母 $1\leqslant i,j,\cdots\leqslant m$，希腊字母 $0\leqslant\alpha,\beta,\cdots\leqslant m$；法空间一般用指标“0”来标记．这种约定是为了匹配广义相对论部分．用求和符号显示写出求和范围的除外．

在超曲面几节中，只考虑正定或广义 Lorentz 度规．因为超曲面的法空间是一维的，可从法空间任选一个非零矢量 $\xi^a\in\mathfrak{X}^\perp\Sigma$ 作为基矢．

定义 10.7 若 $g_{ab}\xi^a\xi^b<0$ 处处成立，则称 Σ 为**类空超曲面**；若 $g_{ab}\xi^a\xi^b>0$ 处处成立，则称 Σ 为**类时超曲面**；若 $g_{ab}\xi^a\xi^b=0$ 处处成立，则称 Σ 为**零模超曲面**．

若度规正定，则必有 $g_{ab}\xi^a\xi^b>0$，那么便没必要作定义10.7式的划分．

对比第239页定义8.11可知类空超曲面的法矢量 ξ^a 自身是类时矢量，类时超曲面的法矢量 ξ^a 自身是类空矢量．

我们只考虑可定向的超曲面，比如不考虑类似于 Möbius 带的超曲面．

在广义相对论中，超曲面占有较为重要的位置，为此我们分几节来讨论这个议题．在第十一章专门讨论零模超曲面；除此之外，假定 $g_{ab}\xi^a\xi^b\neq0$．

10.4.1 归一化法矢量

在 $m+1$ 维广义黎曼流形 (M,g) 中，有局部坐标系 $(U;x^i)$．我们可以通过对坐标施加限制来描述一个特定的超曲面 Σ．

$$\Phi(x^0,x^1,\cdots,x^m)=const. \tag{10.4-1}$$

[1] 超曲面几节用 m 来代替前几节常用的维数 n，是为了避免与法矢量 n^a 的冲突；而且超曲面中法矢量记为第〇维．请读者注意与前几节的区别．

超曲面 Σ 是浸入流形 M 中的，由定理4.41可知：在局部上，我们可假设在超曲面 Σ 中局部坐标 $x^0\equiv 0$，它仅由 $\{x^1,\cdots,x^m\}$ 来描述．比如嵌入到 $\mathbb{R}^2$ 中的圆 $x^2+y^2=1$，虽然 x 或 y 等于常数不能描述此圆，但当我们改用极坐标时，半径 r 为常数便可描述此圆．并没有通用方法找到定理4.41中的局部坐标系．我们只考虑能由式(10.4-1)描述的超曲面，不考虑不能由上式描述的超曲面．

依照 §4.10理论可知 Σ 上点 p 处的任意切矢量 $v^a\in T_p\Sigma$ 在局部都会对应一条积分曲线 $\gamma(t)$，曲线 $\gamma(t)$ 在 p 点的切矢恰好是 v^a．我们任取 u^a 是切于超曲面 Σ 的切矢量，它必然可以看成某条曲线 $\gamma(t)\in\Sigma$ 的切矢，即可以表示成 $u^a=(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t})^a|_\gamma$．那么有 $u^a\nabla_a\Phi=\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}|_\gamma=0$，上式最后一步是因为沿 $\gamma(t)$ 标量函数 Φ 为常数．因为 u^a 是任取的，这说明 $\nabla^a\Phi$ 与 Σ 上所有切矢量都正交，故它一定是超曲面 Σ 的法矢量．定义10.7中所用的 ξ^a 一定正比于 $\nabla^a\Phi$，不妨取 $\xi^a=\nabla^a\Phi$．我们用 n^a 来表示 ξ^a 归一化后的法矢量，即有

$$g_{ab}n^an^b=n_an^a=\epsilon,\ \text{其中}\epsilon=\begin{cases}+1, & \xi_a\xi^a>0,\ \text{类时或正定度规;}\\ -1, & \xi_a\xi^a<0,\ \text{类空超曲面.}\end{cases}\tag{10.4-2}$$

不难求得

$$n_a=\frac{\pm\nabla_a\Phi}{\sqrt{|g^{ab}\nabla_a\Phi\nabla_b\Phi|}},\qquad n^a=\frac{\pm g^{ab}\nabla_b\Phi}{\sqrt{|g^{ab}\nabla_a\Phi\nabla_b\Phi|}}.\tag{10.4-3}$$

超曲面的定向请参考 §10.5.2.

我们用 $(e_i)^a(1\leqslant i\leqslant m)$ 表示 $T\Sigma$ 中的基矢场，如有必要将 $(e_i)^a$ 选为正交归一的，但暂不做这样要求．将归一化法矢量记为 $(e_0)^a\equiv n^a$．在这样约定下，标架场 $(e_\mu)^a(0\leqslant\mu\leqslant m)$ 便构成了 TM 中的局部基矢场．

10.4.2 超曲面之诱导度规

依式(10.1-2) 有 $g_{0i}=g_{ab}(e_0)^a(e_i)^b=0$；故度规 g 在基矢场 $(e_\mu)^a$ 下，有

$$g_{ab}=g_{00}(e^0)_a(e^0)_b+g_{ij}(e^i)_a(e^j)_b=\epsilon n_an_b+g_{ij}(e^i)_a(e^j)_b.\tag{10.4-4}$$

其中 $(e^\mu)_a$ 是 $(e_\mu)^a$ 的对偶基矢场．因为我们已经规定法矢量 n^a 是归一化的，所以有 $g_{00}=g_{ab}n^an^b=\epsilon=\pm1$．由式(10.4-4)可以定义超曲面 Σ 上的度规

$$h_{ab}\overset{def}{=}g_{ab}-\epsilon n_an_b=g_{ij}(e^i)_a(e^j)_b.\tag{10.4-5}$$

我们来验证一下上述定义的 h_{ab} 便是诱导度量 $\phi^* g_{ab}$. $\forall u^a, v^a \in T\Sigma$，有（注意因正交性，有 $n_a u^a = 0$）

$$h_{ab}u^a v^b = (g_{ab} - \epsilon n_a n_b)u^a v^b = g_{ab}u^a v^b - \epsilon n_a u^a\, n_b v^b = g_{ab}u^a v^b. \tag{10.4-6}$$

因浸入映射在局部上就是包含映射，所以有 $u^a = \phi_* u^a \in TM$，即在 TM 中 u^a 和 $\phi_* u^a$ 是同一个矢量；故继续计算上式得

$$h_{ab}u^a v^b = g_{ab}u^a v^b = g_{ab}(\phi_* u^a)(\phi_* v^b) = (\phi^* g_{ab})u^a v^b. \tag{10.4-7}$$

这便证明了：$\forall u^a, v^a \in T\Sigma$，$h_{ab} = \phi^* g_{ab}$ 成立；所以式(10.4-5)是诱导度规，很明显 h_{ab} 是对称的，即 $h_{ab} = h_{ba}$.

几条属性 叙述几条关于诱导度规 h_{ab} 的属性. 首先

$$h_{ab}n^a = 0 = h_{ab}n^b. \tag{10.4-8}$$

证明极易，直接代入即完成. 其次 $\forall v^a \in T\Sigma$，有 $n_b v^b = 0$，进而有

$$h_{ab}v^b = (g_{ab} - \epsilon n_a n_b)v^b = g_{ab}v^b. \tag{10.4-9}$$

这说明 $\forall v^a \in T\Sigma$，用 h_{ab} 或 g_{ab} 升降指标是等价的. 继续进行相似计算：

$$h^b_a \overset{def}{=} h_{ac}g^{cb} = (g_{ac} - \epsilon n_a n_c)g^{cb} = \delta^b_a - \epsilon n_a n^b, \tag{10.4-10}$$

$$h^{ab} \overset{def}{=} g^{ac}h_{cd}g^{db} = g^{ac}(g_{cd} - \epsilon n_c n_d)g^{bc} = g^{ab} - \epsilon n^a n^b, \tag{10.4-11}$$

$$h_{ac}h^{cb} = \delta^b_a - \epsilon n_a n^b - \epsilon n_a n^b + n_a n_c n^c n^b = h^b_a. \tag{10.4-12}$$

由式(10.4-12)可见对于 h_{ab} 自身指标的升降来说，用 h_{ab} 或 g_{ab} 是等价的.

投影算符 从诱导度规的定义式(10.4-5)可以看出，h_{ab} 除了可以作用 $\mathfrak{X}(\Sigma)$ 中矢量场，还能与 $\mathfrak{X}(M)$ 中矢量相互作用，比如法空间矢量 n^a（见式(10.4-8)）. 以 $\binom{1}{1}$ 型张量场 $T^c_{\cdot d} \in \mathfrak{T}^p_q(M)$ 为例来说明 h_{ab} 还可以看成一种**投影算符**：它将 $\mathfrak{T}^p_q(M)$ 中张量场变成 $\mathfrak{T}^p_q(\Sigma)$ 中张量场.

$$\widetilde{T}^a_{\cdot b} = h^a_c h^d_b T^c_{\cdot d}. \tag{10.4-13}$$

一般说来把上式等号左端记成 $\widetilde{T}^a_{\cdot b}$ 便能与原来的 $T^a_{\cdot b}$ 区分开来，但超曲面（以及广义相对论）中通常会去掉那个波浪线，直接用原来的符号；在不引起误解的前提下，我们也采用省略记号，读者需熟悉这种记号方式．经过 h_{ab} 投影的张量场不再有法空间分量，比如

$$n_a\widetilde{T}^a_{\cdot b}=n_a h^a_c h^d_b T^c_{\cdot d}=0,\qquad n^b\widetilde{T}^a_{\cdot b}=n^b h^a_c h^d_b T^c_{\cdot d}=0. \tag{10.4-14}$$

虽然通过 Gauss 公式(10.1-5)可以得到超曲面 Σ 上的 Levi-Civita 联络 D_a，但这多少有些不便；用投影算符 h_{ab} 可以直接由 M 上的 Levi-Civita 联络 ∇_a 得到 D_a；仅以 $\binom{1}{1}$ 型张量场 $T^b_c\in\mathfrak{T}^p_q(\Sigma)$ 为例来说明．

$$\begin{aligned}\mathrm{D}_{a'}T^{b'}_{c'}=&h^a_{a'}h^{b'}_b h^c_{c'}\nabla_a T^b_c\\ =&h^a_{a'}h^{b'}_b h^c_{c'}(\mathrm{D}_a T^b_c+K^b_{ad}T^d_c-K^d_{ac}T^b_d)=h^a_{a'}h^{b'}_b h^c_{c'}\mathrm{D}_a T^b_c.\end{aligned} \tag{10.4-15}$$

这是因为 K^a_{bc} 是法空间部分，与投影算符缩并后恒为零．

从上面数个公式，可以得到：对于 TM 中张量必须用 g_{ab} 进行升降指标．对于 $T\Sigma$ 中张量可以用 g_{ab} 或 h_{ab} 进行升降指标，两者效果相同．

我们已经证明了诱导度规 h_{ab} 是与联络 D_a 相容的（见定理10.1）；在超曲面中可通过式(10.4-15)再次证明它们相容．

$$\begin{aligned}\mathrm{D}_{a'}h_{b'c'}=&h^a_{a'}h^b_{b'}h^c_{c'}\nabla_a h_{bc}=h^a_{a'}h^b_{b'}h^c_{c'}\nabla_a(g_{bc}-\epsilon n_b n_c)\\ =&-\epsilon n_b h^a_{a'}h^b_{b'}h^c_{c'}\nabla_a(n_c)-\epsilon n_c h^a_{a'}h^b_{b'}h^c_{c'}\nabla_a(n_b)\overset{10.4-8}{=\!=\!=}0.\end{aligned} \tag{10.4-16}$$

上式说明了 D_a 与 h_{bc} 相互容许；但是 ∇_a 与 h_{bc} 并不相互容许；当然 D_a 与 g_{bc} 也是相互容许的．下面证明 D_a 是无挠的，$\forall f\in C^\infty(\Sigma)$ 有

$$(\mathrm{D}_a\mathrm{D}_b-\mathrm{D}_b\mathrm{D}_a)f=h^{a'}_a h^{b'}_b\left(\nabla_{a'}\nabla_{b'}-\nabla_{b'}\nabla_{a'}\right)f=0. \tag{10.4-17}$$

我们也可以把式(10.4-15)当成 D_a 的定义式，即通过 h_{ab} 把联络 ∇_a 从流形 M 投影到超曲面 Σ （即 $\mathrm{D}_{a'}T^{b'}_{c'}\overset{def}{=}h^a_{a'}h^{b'}_b h^c_{c'}\nabla_a T^b_c$）．

10.4.3 超曲面之外曲率

对式(10.4-2)（$n_a n^a=\epsilon$）求流形 M 上的协变导数，有（$\forall X^a\in\mathfrak{X}(\Sigma)$）

$$0\equiv\frac{1}{2}\nabla_X(g_{bc}n^b n^c)=g_{bc}n^b\nabla_X n^c\overset{10.1-11}{=\!=\!=}n_c\mathrm{D}^\perp_X n^c-n_c S^c_{ne}X^e=n_c\mathrm{D}^\perp_X n^c.$$

因为法空间是一维的，并且已知 $\mathrm{D}^{\perp}_{X} n^c \in \mathfrak{X}^{\perp}\Sigma$；所以由上式必然有

$$\mathrm{D}^{\perp}_{X} n^c = 0, \qquad \forall X^a \in \mathfrak{X}(\Sigma). \tag{10.4-18}$$

在微分几何中，只涉及度规 g_{ab}（也就是第一基本形式）的内容称为内蕴几何学，比如黎曼曲率只需度规本身，常被称为内曲率；还涉及第二基本形式 K^c_{ab} 的内容称为外蕴几何学，所以 K^c_{ab} 也被称为外曲率.

设 $X^a, Y^a \in \mathfrak{X}(\Sigma)$，Gauss 公式(10.1-5) 和 Weingarten 公式(10.1-11)变为

$$\nabla_X Y^a = \mathrm{D}_X Y^a + K^a_{bc} X^b Y^c = \mathrm{D}_X Y^a + \epsilon (K_{bc} X^b Y^c) n^a, \tag{10.4-19}$$

$$\nabla_X n^a = - S^a_{cb} n^c X^b. \tag{10.4-20}$$

Gauss 方程(10.4-19)的第二个等号是这样得到的：因超曲面 Σ 的法空间是一维的，则必有 $K^a_{bc} X^b Y^c \propto n^a$；既然是正比关系，我们可直接假设

$$(K_{bc} X^b Y^c) n^a \overset{def}{=} \epsilon K^a_{bc} X^b Y^c. \tag{10.4-21}$$

这样定义的 K_{bc} 是对称的（即 $K_{bc} = K_{cb}$，见命题10.2）. 既然法空间是一维空间，我们把基矢（即 n^a）单拿出来，其前面系数更容易处理.

下面通过一个变换来导出 K_{bc} 的常用表达式；$\forall X^a, Y^a \in \mathfrak{X}(\Sigma)$，我们把式(10.4-19)最左端进行一下角标替换，并计算（参考(10.4-10)）

$$\nabla_X Y^a = g^a_c \nabla_X Y^c = h^a_c \nabla_X Y^c + \epsilon n_c n^a \nabla_X Y^c = h^a_c \nabla_X Y^c - \epsilon Y^c n^a \nabla_X n_c.$$

上式最后一步利用了：因为 $Y^a \in \mathfrak{X}(\Sigma)$、$n^a \in \mathfrak{X}^{\perp}(\Sigma)$，所以有 $n_c Y^c = 0$. 同时，前面已经叙述过 h^a_c 的作用之一便是投影，所以 $h^a_c \nabla_X Y^c = \mathrm{D}_X Y^a$. 将上式和式(10.4-19)比对后，可得

$$\epsilon K^a_{bc} X^b Y^c = (K_{bc} X^b Y^c) n^a = - Y^c n^a \nabla_X n_c = - (Y^c X^b \nabla_b n_c) n^a. \tag{10.4-22}$$

$X^a, Y^a \in \mathfrak{X}(\Sigma)$ 的主要作用就是将 K_{bc} 限制在超曲面 Σ 的切空间取值，这相当于增加了两次投影，那么便有第一种表述方式（最重要的）.

K_{ab} 表达式之一 同样称投影之后的 K_{bc} 为超曲面 Σ 第二基本形式或外曲率.

$$K_{ab} = - h^c_a h^d_b \nabla_c n_d = - \mathrm{D}_a n_b = - \nabla_a n_b + \epsilon n_a n^c \nabla_c n_b. \tag{10.4-23}$$

增加投影算符 $h^c_a h^d_b$ 后，即使对于单张超曲面，导数 $h^c_a h^d_b \nabla_c n_d$ 也有意义；否则（对单张超曲面而言）$\nabla_c n_d$ 的定义可能有缺陷.

K_{ab} 表达式之二 由式(6.1-31)易得流形 M 度规场 g_{ab} 沿法矢量 n^a 的李导数

$$\pounds_n g_{ab} = g_{ac}\nabla_b n^c + g_{cb}\nabla_a n^c = \nabla_b n_a + \nabla_a n_b. \tag{10.4-24}$$

利用 $K_{ab} = K_{ba}$，由上式以及式(10.4-23)易得

$$K_{ab} = -\frac{1}{2}\pounds_n g_{ab} + \frac{\epsilon}{2}\left(n_a n^c \nabla_c n_b + n_b n^c \nabla_c n_a\right) = -\frac{1}{2}\pounds_n h_{ab}. \tag{10.4-25}$$

第二个等号的推导如下，

$$\begin{aligned}\pounds_n h_{ab} =& \pounds_n g_{ab} - \epsilon\pounds_n(n_a n_b) = \pounds_n g_{ab} - \epsilon n^c\nabla_c(n_a n_b) - \cancel{\epsilon n_c n_b \nabla_a n^c} - \cancel{\epsilon n_a n_c \nabla_b n^c} \\ =& -2K_{ab} + \epsilon\left(n_a n^c\nabla_c n_b + n_b n^c \nabla_c n_a\right) - \epsilon n_b n^c \nabla_c n_a - \epsilon n_a n^c \nabla_c n_b = -2K_{ab}.\end{aligned}$$

K_{ab} 表达式之三 结合式(10.4-19)，对比如下导数

$$\nabla_X Y^a = X^b\partial_b Y^a + X^b Y^c \Gamma^a_{bc}(g), \quad \mathrm{D}_X Y^a = X^b\partial_b Y^a + X^b Y^c\Gamma^a_{bc}(h).$$

由于 $\mathrm{D}_X Y^a \in \mathfrak{X}(\Sigma)$、$n_a \in \mathfrak{X}^\perp(\Sigma)$，所以 $n_a\Gamma^a_{bc}(h) = 0$ 一定成立．由上式经简单比对，可得 $\Gamma^a_{bc}(g) = \Gamma^a_{bc}(h) + \epsilon K_{bc} n^a$；故有

$$K_{bc} = n_a \Gamma^a_{bc}(g). \tag{10.4-26}$$

标量外曲率 我们还需定义第二基本形式的缩并，它是一个标量场

$$K \overset{def}{=} h^{ab}K_{ab} = g^{ab}K_{ab} = -\nabla_a n^a = -\frac{1}{2}h^{ab}\pounds_n h_{ab}. \tag{10.4-27}$$

形状因子 由式(10.4-23)和(10.4-20)可得形状因子 S^a_{nb} 的表达式（依形状因子定义，可以看出它本身带有双重投影）

$$S^a_{nb} = -h^a_c h^d_b \nabla_d n^c = K^a_b. \tag{10.4-28}$$

10.5 超曲面二：应用

10.5.1 超曲面正交性与 Frobenius 可积性

定义 10.8 设广义黎曼流形 (M, g) 上有超曲面 Σ，它可用 $\Phi = c$（即式(10.4-1)）来描述．若存在非零 $\xi^a \in \mathfrak{X}(M)$（类时、类空或零模）使得 $\xi^a = f\cdot\nabla^a\Phi$（非零 $f \in C^\infty(M)$）成立，则称 ξ^a 与 Σ 是**超曲面正交**的．

超曲面正交就是指且存在 ξ^a 正比于超曲面法矢量 $\nabla^a\Phi$．由此易得

$$\nabla_a\xi_b=\nabla_a(f\nabla_b\Phi)=(\nabla_a f)\nabla_b\Phi+f\nabla_a\nabla_b\Phi.\quad \text{其中 } \xi_a=g_{ab}\xi^b \tag{10.5-1}$$

虽然这是正确的，在这种形式下，它不是一个特别方便的超曲面正交性特征表述．我们把它变成一个更方便、更有用的可积性条件；继续计算（对下标取反对称运算；注意 Levi-Civita 联络是无挠的；以及 $\xi_{[c}\xi_{b]}=0$）

$$\nabla_{[a}\xi_{b]}=(\nabla_{[a}\ln f)\xi_{b]}\quad\Rightarrow\quad \xi_{[c}\nabla_a\xi_{b]}=0. \tag{10.5-2}$$

反之，如果 ξ^a 满足 $\xi_{[c}\nabla_a\xi_{b]}=0$，那么由 Frobenius 定理5.24可以证明存在与 ξ^a 正交的超曲面 Σ．下面论证之．

设有 $m+1$ 维广义黎曼流形 (M,g)，其上有非零切矢量场 $\xi^a\in\mathfrak{X}(M)$，M 上有局部坐标系 $(U;x^\alpha)$，$0\leqslant\alpha\leqslant m$．由定理5.24可知：存在 m 维积分子流形 Σ（即存在局部坐标是 $(V;x^i)$，$1\leqslant i\leqslant m$），且 $\forall p\in V\subset\Sigma\subset U$ 使得

$$TV=\mathrm{Span}_\infty\left\{\left(\frac{\partial}{\partial x^1}\right)^a,\cdots,\left(\frac{\partial}{\partial x^m}\right)^a\right\}, \tag{5.3-11}$$

的充分必要条件是：ξ^a 满足 Frobenius 条件(10.5-3)，即

$$(\mathrm{d}\xi)_{ab}=\phi_a\wedge\xi_b,\quad \text{存在 } \phi_a\in\mathfrak{X}^*(V^\perp),\quad \xi_a=g_{ab}\xi^b; \tag{10.5-3a}$$

$$0=(\mathrm{d}\xi)_{ab}\wedge\xi_c; \tag{10.5-3b}$$

$$\xi_a=f(x^0)(\mathrm{d}x^0)_a=f(x^0)\nabla_a x^0,\quad \text{存在 } f(x^0)\in C^\infty(V^\perp); \tag{10.5-3c}$$

$$0=\xi_{[a}\nabla_b\xi_{c]}. \tag{10.5-3d}$$

其中式(10.5-3d)是一个新的条件，它与式(10.5-3b)等价，

$$0=(\mathrm{d}\xi)_{ab}\wedge\xi_c=3\big((\mathrm{d}\xi)_{[ab}\big)\xi_{c]}=3\big(2\nabla_{[[a}\xi_{b]}\big)\xi_{c]}=6\,\xi_{[c}\nabla_a\xi_{b]}. \tag{10.5-4}$$

对于非零切矢量场 $\xi^a\in\mathfrak{X}(M)$ 而言，如果它满足 Frobenius 条件(10.5-3d)，那么存在 m 维积分流形 Σ（M 的超曲面）使得在局部上 Σ 仅由 $\{x^1,\cdots,x^m\}$ 描述（见式(5.3-11)），而 $\xi_a=f(x^0)(\mathrm{d}x^0)_a$（见式(10.5-3c)）仅由第〇坐标描述．此时，ξ^a 与 Σ 是超曲面正交的．

因此式(10.5-3)（尤其是(10.5-3d)）是 ξ^a 与 Σ 是超曲面正交的充要条件．

Frobenius 定理只是说存在这样的坐标系 $\{x^0;x^1,\cdots,x^m\}$，但未必容易找到．

最后，我们讨论一下超曲面正交下的度规．由于超曲面 Σ 由 $\{x^1,\cdots,x^m\}$ 描述，而 ξ^a 正比于超曲面法矢量 $\nabla^a(x^0)$，故必然有

$$g_{0i}\propto g_{ab}\xi^a\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b=0;\quad 1\leqslant i\leqslant m. \tag{10.5-5}$$

反之．若流形 M 的某开子集上存在局部坐标系 $\{x^0,x^1,\cdots,x^m\}$ 使得 $g_{0i}=0$ 且 $g_{00}\neq 0$（否则度规退化）；这说明局部标架 $\{(\frac{\partial}{\partial x^0})^a\}$ 正交于局部标架场 $\{(\frac{\partial}{\partial x^i})^a\}$．令 $\xi^a=(\frac{\partial}{\partial x^0})^a$，则易得 $\xi_a=g_{ab}\xi^b=g_{00}(\mathrm{d}x^0)_a$；由条件(10.5-3)可知在局部上 ξ^a 正交于由 $\{x^1,\cdots,x^m\}$ 描述的超曲面．这也解释了定义10.8就是三维欧氏空间中法线（比如 z 轴）垂直于平面（比如 $x-y$ 平面）的推广．

例 10.9 二维流形一定超曲面正交．

设二维流形有局部坐标系 $\{x,y\}$，其法矢为 $\xi_a=\xi_1(\mathrm{d}x)_a+\xi_2(\mathrm{d}y)_a$．则有

$$\mathrm{d}_b\xi_a=\frac{\partial\xi_1}{\partial y}(\mathrm{d}y)_b\wedge(\mathrm{d}x)_a+\frac{\partial\xi_2}{\partial x}(\mathrm{d}x)_b\wedge(\mathrm{d}y)_a.$$

很明显 $\mathrm{d}_b\xi_a\wedge\xi_c=0$，符合条件(10.5-3b)；故超曲面正交． ■

10.5.2 诱导体积元

本小节只处理非零模超曲面的诱导体积元．我们知道超曲面 Σ 有单位法矢量 n^a，满足 $n^an_a=\epsilon$，超曲面的诱导度规为式(10.4-5)（h_{ab}=$g_{ab}-\epsilon n_an_b$）．n^a 按照式(10.4-3)中方式来选取方向．

作为 $m+1$ 维流形 M 的超曲面 Σ 自然是 m 维流形．由于体积元本身就体现了流形定向，我们从体积元角度再次表述超曲面诱导定向问题．已知 M 的定向为（取局部坐标系为 $(U;x^\alpha)$，参见式(8.6-3)）

$$\Omega_{a_0a_1\cdots a_m}=\sqrt{(-)^sg}\,(\mathrm{d}x^0)_{a_0}\wedge(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m},\ g\equiv\det(g_{\alpha\beta}). \tag{10.5-6}$$

设超曲面 Σ 单位法矢量 n^a 的局部坐标表示为：

$$n^a=\sum_{\alpha=0}^m n^\alpha\left(\frac{\partial}{\partial x^\alpha}\right)^a. \tag{10.5-7}$$

根据假设，有（为避免误解，显示写出求和范围）

$$g_{ab}n^a\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b=\sum_{\alpha=0}^m g_{\alpha i}n^\alpha=0,\qquad 1\leqslant i\leqslant m. \tag{10.5-8}$$

又因它是正交归一的，利用上式，有（ϵ 见(10.4-2)）

$$\epsilon = g_{\alpha\beta}n^\alpha n^\beta = \sum_{\alpha=0}^{m} g_{\alpha 0}n^\alpha n^0 + \sum_{i=1}^{m} n^i \sum_{\alpha=0}^{m} g_{\alpha i}n^\alpha = n^0 \sum_{\alpha=0}^{m} g_{\alpha 0}n^\alpha. \tag{10.5-9}$$

由式(10.5-8)得

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{\alpha=0}^{m} g_{\alpha i}n^\alpha g^{i\beta} = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{\mu=0}^{m}\sum_{\alpha=0}^{m} g_{\alpha\mu}n^\alpha g^{\mu\beta} = \sum_{\alpha=0}^{m} g_{\alpha 0}n^\alpha g^{0\beta} \overset{10.5-9}{=\!=\!=} g^{0\beta}\frac{\epsilon}{n^0}.$$

而上式左端是：$\sum_{\mu=0}^{m}\sum_{\alpha=0}^{m} g_{\alpha\mu}n^\alpha g^{\mu\beta} = n^\beta$. 由此式易得

$$n^0 = \pm\sqrt{\epsilon g^{00}}, \qquad n^i = g^{0i}\frac{\epsilon}{n^0}. \tag{10.5-10}$$

由前面的论述可知 $\epsilon g^{00} > 0$. 将式(10.5-10)带回式(10.5-8)得

$$g_{0i} = \frac{1}{n^0}\sum_{j=1}^{m} g_{ji}g^{0j}\frac{-\epsilon}{n^0} = -\frac{1}{g^{00}}\sum_{j=1}^{m} g_{ji}g^{0j}. \tag{10.5-11}$$

在局部坐标系为 $(U; x^\alpha)$ 下，流形 M 的度规行列式为

$$g = \begin{vmatrix} g_{00} & g_{01} & \cdots & g_{0m} \\ g_{10} & g_{11} & \cdots & g_{1m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{m0} & g_{m1} & \cdots & g_{mm} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} g_{00} + \frac{1}{g^{00}}\sum_{j=1}^{m} g_{j0}g^{0j} & 0 & \cdots & 0 \\ g_{10} & g_{11} & \cdots & g_{1m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{m0} & g_{m1} & \cdots & g_{mm} \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{g^{00}}\begin{vmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{m1} & \cdots & g_{mm} \end{vmatrix} \overset{10.5-10}{=\!=\!=} \frac{h}{\epsilon(n^0)^2}; \quad h \equiv \det(g_{ij}), \quad 1 \leqslant i, j \leqslant m.$$

其中 h 是超曲面 Σ 的度规行列式. 由上式得到两个行列式间的关系式为

$$h = g \cdot \epsilon \cdot (n^0)^2, \qquad h \equiv \det(g_{ij}) = \det(h_{ij}), \quad g \equiv \det(g_{\alpha\beta}). \tag{10.5-12}$$

作为流形 M 子空间的超曲面 Σ 的**诱导体积元**$\hat{\Omega}_{a_1\cdots a_m}$ 可表示为

$$\hat{\Omega}_{a_1\cdots a_m} = \phi^*(n^b\Omega_{ba_1\cdots a_m}). \tag{10.5-13}$$

我们分几种情形来证明此式.

首先，对于正定度规，$s=0$、$\epsilon=1$．参考式(3.8-24)、(3.8-46)，由(10.5-6)式出发可计算 $n^b\Omega_{ba_1\cdots a_m}$；然后再把它拉回到超曲面 Σ，得（参考式(10.5-12)）

$$\begin{aligned}\phi^*(n^b\Omega_{ba_1\cdots a_m}) =&\mathrm{sign}(n^0)|n^0|\sqrt{g}\,(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}\\ =&\mathrm{sign}(n^0)\sqrt{h}\,(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}.\end{aligned}\tag{10.5-14}$$

很明显，上式右端是超曲面 Σ 的体积元．

其次，广义闵氏时空中的类时超曲面，此时 $s=1$、$\epsilon=1$．同样由(10.5-6)式出发计算 $n^b\Omega_{ba_1\cdots a_m}$；然后再把它拉回到超曲面 Σ，得

$$\begin{aligned}\phi^*(n^b\Omega_{ba_1\cdots a_m}) =&\mathrm{sign}(n^0)|n^0|\sqrt{-g}\,(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}\\ =&\mathrm{sign}(n^0)\sqrt{-h}\,(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}.\end{aligned}\tag{10.5-15}$$

因为类时超曲面的法矢量是类空的，所以第〇维坐标的切矢量不是类时的；因此超曲面 Σ 的诱导度规仍是广义 Lorentz 度规，其行列式是负的，即 $h<0$．

最后，广义闵氏时空中的类空超曲面，此时 $s=1$、$\epsilon=-1$；此时 $g_{00}<0$ 且 $g^{00}<0$．由(10.5-6)式出发计算 $n^b\Omega_{ba_1\cdots a_m}$；然后再把它拉回到超曲面 Σ，得

$$\begin{aligned}\phi^*(n^b\Omega_{ba_1\cdots a_m}) =&\mathrm{sign}(n^0)|n^0|\sqrt{-g}\,(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}\\ =&\mathrm{sign}(n^0)\sqrt{h}\,(\mathrm{d}x^1)_{a_1}\wedge\cdots\wedge(\mathrm{d}x^m)_{a_m}.\end{aligned}\tag{10.5-16}$$

因为类空超曲面的法矢量是类时的，所以第〇维坐标的切矢量是类时的；此时超曲面 Σ 中的诱导度规是正定的，即 $h>0$．

综上，正定度规、广义 Lorentz 度规下的超曲面 Σ 的诱导体积元都可以用式(10.5-13)来表示．可以验证超曲面 Σ 诱导体积元与诱导度规 h_{ab} 相容（留给读者当练习），即满足 $h^{a_1b_1}\cdots h^{a_mb_m}\hat{\Omega}_{a_1\cdots a_m}\hat{\Omega}_{b_1\cdots b_m}=(-)^{\hat{s}}m!$；其中 $\hat{s}$ 是 h_{ab} 中惯性指数负数的个数；具体来说，类时超曲面 $\hat{s}=1$，正定度规和类空超曲面 $\hat{s}=0$．

为了与 §5.5.2中边界的诱导定向相符合，须令 $n^0\geqslant 0$，即取式(10.5-10)中的正号（$n^0=+\sqrt{\epsilon g^{00}}$）．在这样约定下，法矢量 n^a 是指向带边流形外部的．

10.5.3 散度定理

有了诱导体积元和诱导定向，我们来探讨一下推广的 Gauss 散度定理．

定理 10.10 设有 $m+1$ 维、已定向、广义黎曼流形 (M,g)，$\Omega_{a_0a_1\cdots a_m}$ 是 M 上相容体积元；N 是 M 上带边嵌入子流形，边界是超曲面 Σ. 对于任意非零、至少一阶可微的切矢量场 $\xi^a\in TM$，有

$$\int_{\mathrm{i}(N)}(\nabla_a\xi^a)\Omega_{a_0a_1\cdots a_m}=\int_\Sigma \xi^b\,\Omega_{ba_1\cdots a_m}=\epsilon\int_\Sigma \xi^b n_b\,\hat\Omega_{a_1\cdots a_m}. \tag{10.5-17}$$

其中 n^a 是 Σ 的单位法矢量，$\hat\Omega_{a_1\cdots a_m}$ 是 Σ 的诱导体积元.

证明 . 很明显 $\boldsymbol{\omega}=\xi^b\Omega_{ba_1\cdots a_m}$ 是一个 m 阶外微分型式场，求其外微分得，

$$\mathrm{d}_{a_0}\boldsymbol{\omega}=(m+1)\nabla_{[a_0}\big(\xi^b\Omega_{|b|a_1\cdots a_m]}\big)\overset{8.6-8}{=\!=\!=}(m+1)\big(\nabla_{[a_0}\xi^b\big)\Omega_{|b|a_1\cdots a_m]}. \tag{10.5-18}$$

因 $\mathrm{d}\boldsymbol{\omega}$ 是 $m+1$ 阶外型式，则在 $m+1$ 维的 M 中它必然正比于体积元：

$$\begin{aligned}
&\mathrm{d}_{a_0}(\xi^b\Omega_{ba_1\cdots a_m})=f\cdot\Omega_{a_0\cdots a_m},\qquad \exists f\in C^\infty(M);\quad\Rightarrow\\
&(m+1)\big(\nabla_{[a_0}\xi^b\big)\Omega_{|b|a_1\cdots a_m]}=f\cdot\Omega_{a_0\cdots a_m},\qquad \text{两边同时缩并 }\Omega^{a_0\cdots a_m};\quad\Rightarrow\\
&(m+1)\big(\nabla_{[a_0}\xi^b\big)\Omega_{|b|a_1\cdots a_m]}\Omega^{a_0a_1\cdots a_m}=f\cdot\Omega_{a_0a_1\cdots a_m}\Omega^{a_0a_1\cdots a_m},\ \text{利用(8.6-5)};\ \Rightarrow\\
&(m+1)(-)^s m!\big(\nabla_{a_0}\xi^b\big)\delta^{a_0}_b=f\cdot(-)^s(m+1)!\quad\Rightarrow\quad f=\nabla_b\xi^b.
\end{aligned}$$

带回上式，我们得到

$$\mathrm{d}_{a_0}\boldsymbol{\omega}=\mathrm{d}_{a_0}(\xi^b\Omega_{ba_1\cdots a_m})=\big(\nabla_b\xi^b\big)\Omega_{a_0a_1\cdots a_m}. \tag{10.5-19}$$

依据 Stokes–Cartan 定理5.35，由上式可得

$$\int_{\mathrm{i}(N)}\big(\nabla_b\xi^b\big)\Omega_{a_0a_1\cdots a_m}=\int_{\mathrm{i}(N)}\mathrm{d}_{a_0}(\xi^b\Omega_{ba_1\cdots a_m})=\int_\Sigma\xi^b\Omega_{ba_1\cdots a_m}. \tag{10.5-20}$$

上式中最后一个积分号中的“$\xi^b\Omega_{ba_1\cdots a_m}$”需限制在 Σ 上取值. 定理证明过半，下面证明后半部分. 因 $\xi^b\Omega_{ba_1\cdots a_m}$ 是 Σ 上的微分型式场，故它正比于 Σ 上的诱导体积元 $\hat\Omega_{a_1\cdots a_m}$，即存在 $K\in C^\infty(\Sigma)$ 使得下式成立（利用式(10.5-13)），

$$\xi^b\Omega_{ba_1\cdots a_m}=K\hat\Omega_{a_1\cdots a_m}=Kn^b\Omega_{ba_1\cdots a_m}\overset{\text{缩并}}{\underset{\text{体元}}{\Longrightarrow}}\xi^a=Kn^a\quad\Rightarrow\quad K=\epsilon\xi^a n_a.$$

带回便可证明定理. ■

应用上面的定理可以给出二阶对称张量场 T^{ab} 的散度定理．$\forall \xi^b \in \mathfrak{X}(M)$ 有

$$(\nabla_a T^{ab})\xi_b = \nabla_a(T^{ab}\xi_b) - \frac{1}{2}T^{ab}(\nabla_a\xi_b + \nabla_b\xi_a) = \nabla_a(T^{ab}\xi_b) - \frac{1}{2}T^{ab}\pounds_\xi g_{ab}.$$

配上体积元，取积分，得（其中 $\mathrm{i}(N)$ 上积分体积元是 $\Omega_{a_0\cdots a_m}$，省略未标出）：

$$\int_{\mathrm{i}(N)} \left(\nabla_a T^{ab}\right)\xi_b = \epsilon\int_{\partial N} T^{ab}\xi_b n_a\,\hat{\Omega}_{a_1\cdots a_m} - \frac{1}{2}\int_{\mathrm{i}(N)} T^{ab}\pounds_\xi g_{ab}. \tag{10.5-21}$$

我们没有对闭曲面 Σ 的属性作细致地探讨，尤其没有讨论零模边界．

10.5.4 超曲面之 Gauss-Codazzi-Ricci 方程

我们将式(10.2-12)和(10.2-13)约化到超曲面情形；注意 K^A_{ik} 中的上标 A 只能取○，且 $K^0_{bc} = K^0_{b'c'}h^{b'}_b h^{c'}_c = K_{bc}$，再加上 $\epsilon = g_{00}$（见式(10.4-5)），可得

$$\begin{aligned}
{}^{m}R_{abcd} =& h^{a'}_a h^{b'}_b h^{c'}_c h^{d'}_d\,({}^{m+1}R_{a'b'c'd'}) + \epsilon(K_{ac}K_{bd} - K_{ad}K_{bc}). && (10.5\text{-}22)\\
{}^{m+1}R^0_{jkl} =& K_{jl;k} - K_{jk;l} \quad\Leftrightarrow\quad {}^{m+1}R^a_{bcd}n_a = \mathrm{D}_c K_{bd} - \mathrm{D}_d K_{bc}. && (10.5\text{-}23)
\end{aligned}$$

Gauss 方程(10.5-22)所有分量指标都不能取法空间分量，即分量指标值不能取零；这个原则同样适用于 Codazzi 方程(10.5-23)．总这样声明多有不便，所以在式(10.5-22)中，我们加上了投影算符以保证只取黎曼曲率 R_{abcd} 的切分量；约化后的第二基本形式 K_{ab} 本身就没有法分量，无需再次投影．

由式(10.4-18)和(10.1-13c)可知 Ricci 方程(10.2-14)在超曲面上是恒零的．

截面曲率关系式(10.1-21)在超曲面中变为

$$\begin{aligned}
{}^{m+1}K([u\wedge v]) =& {}^{m}K([u\wedge v]) + \\
&+ \frac{\epsilon\big((K_{bc}u^b v^c)(K_{ed}v^e u^d) - (K_{bc}v^b v^c)(K_{ed}u^e u^d)\big)}{u_a u^a\cdot v_b v^b - (u_a v^a)^2}.
\end{aligned} \tag{10.5-24}$$

需注意：$u^a, v^a \in \mathfrak{X}(M)$ 必须是超曲面上的切矢量，即有 $n_a u^a = 0 = n_a v^a$．

10.5.5 超曲面之爱因斯坦张量

通过缩并 Gauss 和 Codazzi 方程可以得到超曲面中两个常用方程式．先缩并 Gauss 方程(10.5-22)可得超曲面 Σ 上的 Ricci 曲率，

$$\begin{aligned}
{}^{m}R_{ac} =& h^{bd}h^{a'}_a h^{b'}_b h^{c'}_c h^{d'}_d \times {}^{m+1}R_{a'b'c'd'} + \epsilon h^{bd}(K_{ac}K_{bd} - K_{ad}K_{bc})\\
=& {}^{m+1}R_{ac} - {}^{m+1}R_{ec}n_a n^e\epsilon - {}^{m+1}R_{af}n_c n^f\epsilon + {}^{m+1}R_{ef}n_a n_c n^e n^f \\
&- {}^{m+1}R_{aecf}n^e n^f\epsilon + \epsilon(K_{ac}K - K^b_a K_{bc}).
\end{aligned} \tag{10.5-25}$$

继续计算标量曲率

$$ {}^{m}R = h^{ac}({}^{m}R_{ac}) = {}^{m+1}R - {}^{m+1}R_{ac}n^{a}n^{c}2\epsilon + \epsilon(K^{2} - K^{ab}K_{ab}). \tag{10.5-26} $$

从 $m+1$ 维流形 M 上的爱因斯坦张量(8.2-10)出发，利用式(10.5-26)，易得

$$ {}^{m+1}G_{ab}n^{a}n^{b} = {}^{m}R\frac{-\epsilon}{2} + \frac{1}{2}(K^{2} - K^{ab}K_{ab}). \tag{10.5-27} $$

用 g^{bd} 缩并 Codazzi 方程(10.5-23)，有

$$ {}^{m+1}R_{abcd}n^{a}g^{bd} = g^{bd}\mathrm{D}_{c}K_{bd} - g^{bd}\mathrm{D}_{d}K_{bc} \Rightarrow {}^{m+1}R_{ac}n^{a} = \mathrm{D}_{c}K - \mathrm{D}_{b}K^{b}_{c} \tag{10.5-28} $$

由爱因斯坦张量作运算，得

$$ {}^{m+1}G_{ab}n^{a}h^{b}_{c} = {}^{m+1}R_{ab}n^{a}h^{b}_{c} - {}^{m+1}Rg_{ab}n^{a}h^{b}_{c}\frac{1}{2} = {}^{m+1}R_{ab}n^{a}h^{b}_{c}. \tag{10.5-29} $$

结合式(10.5-28)和(10.5-29)可得爱氏张量的另一重要公式，

$$ {}^{m+1}G_{ab}n^{a}h^{b}_{c} = \mathrm{D}_{c}K - \mathrm{D}_{b}K^{b}_{c}. \tag{10.5-30} $$

式(10.5-27)和(10.5-30)的重要性在于：它们构成了超曲面 Σ 上爱因斯坦引力场方程的一部分．爱因斯坦张量的剩余部分不如上述形式简单了．

10.6 超曲面三：二次超曲面

我们讨论几类二次超曲面[45]p.108，本节中实常数 $r>0$，$m>1$，$\nu\geqslant 0$．

嵌入正定欧几里得空间 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中的**超球面**$S^{m}(r)$ 定义为：

$$ S^{m}(r) = \{x\in\mathbb{R}^{m+1} \mid \delta_{ab}x^{a}x^{b} = r^{2}\}. \tag{10.6-1} $$

嵌入 $\mathbb{R}^{m+1}_{\nu}$（$\eta=\mathrm{diag}(\underbrace{-\cdots-}_{\nu}\underbrace{+\cdots+}_{m+1-\nu})$）中的**伪球面**$S^{m}_{\nu}(r)$ 定义为：

$$ S^{m}_{\nu}(r) = \{x\in\mathbb{R}^{m+1}_{\nu} \mid \eta_{ab}x^{a}x^{b} = r^{2}\}. \tag{10.6-2} $$

嵌入 $\mathbb{R}^{m+1}_{\nu+1}$（$\eta=\mathrm{diag}(\underbrace{-\cdots-}_{\nu+1}\underbrace{+\cdots+}_{m-\nu})$）中的**伪双曲空间**$H^{m}_{\nu}(r)$ 定义为：

$$ H^{m}_{\nu}(r) = \{x\in\mathbb{R}^{m+1}_{\nu+1} \mid \eta_{ab}x^{a}x^{b} = -r^{2}\}. \tag{10.6-3} $$

上面给出了常见二次超曲面，其中超球面可以看作伪球面的特例；$H_0^m(r)$ 是双曲空间，此空间度规是正定的．可以把上面定义写成统一形式：

$$q=-\sum_{i=0}^{\nu-1}(x^i)^2+\sum_{j=\nu}^{m}(x^j)^2. \tag{10.6-4}$$

上面定义中，我们把 $\mathbb{R}_\nu^{m+1}$ 中的位置矢量 x^a 的分量写作 $(x^0,\cdots,x^m)$，它们可以统一简记成 $q=\eta_{ab}x^ax^b$．利用式(10.4-3)求出（非单位长）法矢量

$$\begin{aligned}N^a=&\eta^{ab}\nabla_b q=\eta^{\alpha\beta}\left(\frac{\partial}{\partial x^\alpha}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial x^\beta}\right)^b\left(-2\sum_{i=0}^{\nu-1}x^i\left(\mathrm{d}x^i\right)_b+2\sum_{j=\nu}^{m}x^j\left(\mathrm{d}x^j\right)_b\right)\\=&\left(\frac{\partial}{\partial x^\alpha}\right)^a\left(-2\sum_{i=0}^{\nu-1}x^i\eta^{\alpha i}+2\sum_{j=\nu}^{m}x^j\eta^{\alpha j}\right)=2x^a.\end{aligned}$$

单位法矢量是

$$n^a=\frac{N^a}{\sqrt{|N^bN^c\eta_{bc}|}}=\frac{2x^a}{2\sqrt{|x^bx^c\eta_{bc}|}}=\frac{x^a}{\sqrt{|q|}}=\frac{x^a}{r}. \tag{10.6-5}$$

由此不难得到：伪球面上有 $\eta_{ab}n^an^b=1$；伪双曲空间上有 $\eta_{ab}n^an^b=-1$．单位法矢量(10.6-5)的协变导数为：

$$\nabla_a n_b=\nabla_a(\eta_{bc}n^c)=\frac{\eta_{\alpha\beta}}{r}\nabla_a\left((\mathrm{d}x^\alpha)_bx^\beta\right)=\frac{1}{r}\eta_{ab}. \tag{10.6-6}$$

10.6.1 基本属性

命题 10.11 映射 $\sigma:\mathbb{R}_\nu^{m+1}\to\mathbb{R}_{m-\nu+1}^{m+1}$，即度规整体乘个负号，具体表示为

$$\sigma(x^0,\cdots,x^m)=(x^\nu,\cdots,x^m,x^0,\cdots,x^{\nu-1}), \tag{10.6-7}$$

是一个反等距映射，它把 $S_\nu^m(r)$ 反等距映射为 $H_{m-\nu}^m(r)$．反之也正确．

证明 . 因 σ 是线性同构，故从式(10.6-4)有

$$\sigma(q)=\sum_{i=0}^{\nu-1}(x^i)^2-\sum_{j=\nu}^{m}(x^j)^2=-q. \tag{10.6-8}$$

故由 σ 把 $S_\nu^m(r)$ 映射成 $H_{m-\nu}^m(r)$． ■

命题 10.12 伪球面 $S_\nu^m(1)$ 微分同胚于 $\mathbb{R}^\nu \times S^{m-\nu}$；伪双曲面 $H_\nu^m(1)$ 微分同胚于 $S^\nu \times \mathbb{R}^{m-\nu}$.

证明 . 先证 $S_\nu^m(1)$. 设 $x \in \mathbb{R}^\nu$，$p \in S^{m-\nu}(1)$，令

$$\phi(x,p) = \big(x, \sqrt{1+|x|^2}p\big) \in \mathbb{R}_\nu^\nu \times \mathbb{R}^{m+1-\nu} \cong \mathbb{R}_\nu^{m+1}. \tag{10.6-9}$$

上式成立是因为

$$\phi(x,p) \cdot \eta \cdot \big(\phi(x,p)\big)^T = -|x|^2 + (1+|x|^2) = 1. \tag{10.6-10}$$

映射 ϕ 将 $\mathbb{R}^\nu \times S^{m-\nu}$ 映入 S_ν^m. 又因 ϕ 有逆映射 $(x,q) \to \big(x, q/\sqrt{1+|x|^2}\big)$，这些映射都是 C^∞ 的，故 ϕ 是微分同胚映射.

再证 $H_\nu^m(1)$. 设 $p \in S^\nu(1)$，$x \in \mathbb{R}^{m-\nu}$，令

$$\psi(p,x) = \big(\sqrt{1+|x|^2}p, x\big) \in \mathbb{R}_{\nu+1}^{\nu+1} \times \mathbb{R}^{m-\nu} \cong \mathbb{R}_{\nu+1}^{m+1}. \tag{10.6-11}$$

上式成立是因为

$$\psi(p,x) \cdot \eta \cdot \big(\psi(p,x)\big)^T = -(1+|x|^2) + |x|^2 = -1. \tag{10.6-12}$$

映射 ψ 将 $S^\nu \times \mathbb{R}^{m-\nu}$ 映入 H_ν^m. 又因 ψ 有逆映射 $(q,x) \to \big(q/\sqrt{1+|x|^2}, x\big)$，这些映射都是 C^∞ 的，故 ψ 是微分同胚映射. ■

命题 10.13 令 $\alpha(t)$ 是 $S_\nu^m(r) \subset \mathbb{R}_\nu^{m+1}$ 上非常数测地线. **(1)** 如果 α 是类时的，则它是 $\mathbb{R}_\nu^{m+1}$ 中的双曲线. **(2)** 如果 α 是零模的，则它是 $\mathbb{R}_\nu^{m+1}$ 中的直线. **(3)** 如果 α 是类空的，则它是 $\mathbb{R}_\nu^{m+1}$ 中的椭圆.

证明 . 设 p 是伪球面 $S_\nu^m(r)$ 上的点；令 Π 是 $\mathbb{R}_\nu^{m+1}$ 中通过原点 O 和点 p 的平面；令 g 是 $\mathbb{R}_\nu^{m+1}$ 度规场；容易验证 $\overrightarrow{Op}$ 是类空的，则 g 在平面 Π 上的限制 $h \equiv g|_\Pi$ 有三种可能.

甲 h 是正定的. 此时 $\Pi \cap S_\nu^m$ 是 Π 中一个椭圆，且有 $\Pi \cong \mathbb{R}^2$. 实际上，令 $\boldsymbol{e}_1$、$\boldsymbol{e}_2$（证明过程中会用箭头表示矢量，故我们用黑体表示基矢，不用抽象指标）是 Π 上的一组正交基，那么 Π 上的点 $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{e}_1 + b\boldsymbol{e}_2$ 在超曲面 $S_\nu^m = \{\boldsymbol{v} \mid \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}\rangle_h = r^2\}$ 上的充分必要条件是：$a^2 + b^2 = r^2$. 那么曲线 $\alpha(t) = \boldsymbol{e}_1 r\cos t + \boldsymbol{e}_2 r \sin t$ 的切矢量是常数，即

$$\langle \alpha', \alpha' \rangle_h = (-\boldsymbol{e}_1 r\sin t + \boldsymbol{e}_2 r\cos t) \cdot (-\boldsymbol{e}_1 r\sin t + \boldsymbol{e}_2 r\cos t) = r^2.$$

因此 $\alpha(t)$ 是类空的. 进一步求出 $\alpha(t)$ 的二阶导数 $\nabla_{\alpha'}\alpha' = -\alpha(t)$，下面我们说明这个二次导数，即 $-\alpha(t)$，法于伪球面. 设平面 Π 上的点 Q 是 $-\alpha(t) = -\boldsymbol{e}_1 r\cos t - \boldsymbol{e}_2 r\sin t$（也位于伪球面上），故 $\overrightarrow{OQ}$ 是 $\mathbb{R}^{m+1}_\nu$ 中的位置矢量，根据式(10.6-5)可知 $\overrightarrow{OQ}$ 法于伪球面 S^m_ν；由命题10.5可知 $\alpha(t)$ 是伪球面的测地线.

乙 h 非退化，且在 Π 上负惯性指数个数是一. 令 $\boldsymbol{e}_0, \boldsymbol{e}_1$ 是 Π 上的一组正交基，同时有 $p = r\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_0$ 是类时的. Π 上的点 $a\boldsymbol{e}_0 + b\boldsymbol{e}_1$ 在超曲面 S^m_ν 上的充要条件是：$-a^2 + b^2 = r^2$；很明显 $\Pi \cap S^m_\nu$ 是双曲线，它由两个分支组成，同时 $\Pi \cong \mathbb{R}^2_1$. 通过 p 的分支是：$\alpha(t) = \boldsymbol{e}_0 r\sinh t + \boldsymbol{e}_1 r\cosh t$；它的切矢量是常数，即（其中 $\eta = \mathrm{diag}(-1, 1)$）

$$\begin{aligned}\langle \alpha', \alpha' \rangle_h &= (\boldsymbol{e}_0 r\cosh t + \boldsymbol{e}_1 r\sinh t)\cdot\eta\cdot(\boldsymbol{e}_0 r\cosh t + \boldsymbol{e}_1 r\sinh t)\\ &= -r^2\cosh^2 t + r^2\sinh^2 t = -r^2.\end{aligned}$$

因此 $\alpha(t)$ 类时. 它的二次导数 $\nabla_{\alpha'}\alpha' = \alpha(t)$，它法于伪球面，故是测地线.

丙 h 是退化的，并且是一维零模空间. 设此一维零模空间中有非零矢量 $\boldsymbol{v}$，很明显 $\boldsymbol{v}$ 是零模的；$\overrightarrow{Op}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 是 Π 的基矢. Π 上的点 $a\overrightarrow{Op} + b\boldsymbol{v}$ 在 S^m_ν 上的充要条件是 $a^2 = 1$. 此时 $\Pi \cap S^m_\nu$ 由两条平行直线组成. 一条是 $\alpha(t) = \overrightarrow{Op} + t\boldsymbol{v}$. 因 α 是 $\mathbb{R}^m_\nu$ 中测地线，且它全部位于 S^m_ν 中，故它是 S^m_ν 的零模测地线.

S^m_ν 的每个测地线都是上述三种类型之一的重新参数化. ■

参考命题10.11及上面的命题，可以得到伪双曲面的测地线. 因命题10.11中是反等距，故伪双曲面的类时、类空与伪球面是相反的.

命题 10.14 伪球面和伪双曲面是测地完备的.（证明见[68]定理 2.4.4）

10.6.2 超球面

令 M 中度规是 $g_{ab} = \delta_{ab}$，即 M 是通常的欧几里得空间 $\mathbb{R}^{m+1}$. 我们以第104页例4.11（标准球面）来具体说明诱导度规. 在此例中，将标准球面 $S^m(r)$ 正则嵌入到 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中，这当然也是浸入.

从式(4.2-13)和(10.0-1)容易求得如下诱导度规（延用例4.11坐标记号），

$$h^+_{ab} = \sum_{i,j=1}^m \sum_{\alpha=1}^m \frac{\partial x^\alpha}{\partial y^i}\frac{\partial x^\alpha}{\partial y^j}(\mathrm{d}y^i)_a(\mathrm{d}y^j)_b = \frac{4r^4\delta_{ij}}{(r^2 + \sum_{k=1}^m (y^k)^2)^2}(\mathrm{d}y^i)_a(\mathrm{d}y^j)_b, \quad (10.6\text{-}13)$$

$$h^-_{ab}=\sum_{i,j=1}^{m}\sum_{\alpha=1}^{m}\frac{\partial x^\alpha}{\partial z^i}\frac{\partial x^\alpha}{\partial z^j}(\mathrm{d}z^i)_a(\mathrm{d}z^j)_b=\frac{4r^4\delta_{ij}}{(r^2+\sum_{k=1}^m(z^k)^2)^2}(\mathrm{d}z^i)_a(\mathrm{d}z^j)_b. \quad (10.6\text{-}14)$$

其中第二式是由式(4.2-14)和(10.0-1)求得的．上面的计算只涉及求偏导与求和，虽然繁琐但并无困难，请读者补齐．利用式(4.2-15)和(4.2-16)可验证 $h^+_{ab}=h^-_{ab}$，这说明两者是同一个度规；这便是由 $\mathbb{R}^{m+1}$ 诱导得到的度规．

例 10.15 当 $m=2$ 时，诱导度规(10.6-13)与我们所熟悉的二维球面度规相同．

二维球面 $S^2(r)$ 度规以及坐标变换见例8.9．由式(4.2-11)得

$$(y^1,y^2)=\left(\frac{r\sin\theta\cos\phi}{1+\cos\theta},\ \frac{r\sin\theta\sin\phi}{1+\cos\theta}\right). \quad (10.6\text{-}15)$$

将上式代入式(10.6-13)，经计算，得

$$h^+_{ab}=\frac{4r^4\delta_{ij}}{(r^2+\sum_{k=1}^2(y^k)^2)^2}(\mathrm{d}y^i)_a(\mathrm{d}y^j)_b=r^2(\mathrm{d}\theta)_a(\mathrm{d}\theta)_b+r^2\sin^2\theta(\mathrm{d}\phi)_a(\mathrm{d}\phi)_b.$$

可见与式(8.1-5)相同． ■

例 10.16 等距嵌入 $\imath:S^2(1)\to\mathbb{R}^3$，求 $\imath$ 下的切矢量．

二维单位球面 $S^2(1)$ 有切矢量场 $(\frac{\partial}{\partial\theta})^a$ 和 $(\frac{\partial}{\partial\phi})^a$，则有（参见(4.5-5)）

$$\imath_*\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\right)^a=\frac{xz}{\sqrt{1-z^2}}\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^a+\frac{yz}{\sqrt{1-z^2}}\left(\frac{\partial}{\partial y}\right)^a-\sqrt{1-z^2}\left(\frac{\partial}{\partial z}\right)^a, \quad (10.6\text{-}16)$$

$$\imath_*\left(\frac{\partial}{\partial\phi}\right)^a=-y\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^a+x\left(\frac{\partial}{\partial y}\right)^a. \quad (10.6\text{-}17)$$

设 $S^2(1)$ 上的 Levi-Civita 联络是 D_a．则由例8.9可查得非零克氏符

$$\Gamma^\phi_{\theta\phi}=\Gamma^\phi_{\phi\theta}=\cot\theta,\qquad \Gamma^\theta_{\phi\phi}=-\sin\theta\cos\theta. \quad (10.6\text{-}18)$$

则有

$$\mathrm{D}_{\frac{\partial}{\partial\theta}}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\right)^a=\Gamma^\phi_{\theta\theta}\left(\frac{\partial}{\partial\phi}\right)^a+\Gamma^\theta_{\theta\theta}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\right)^a=0. \quad (10.6\text{-}19)$$

设 $\mathbb{R}^3$ 上的 Levi-Civita 联络是 ∇_a，则有

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial\theta}}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\right)^a=-x\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^a-y\left(\frac{\partial}{\partial y}\right)^a-z\left(\frac{\partial}{\partial z}\right)^a=-r\left(\frac{\partial}{\partial r}\right)^a. \quad (10.6\text{-}20)$$

式(10.6-19)和(10.6-20)的差别正是 Gauss 公式(10.1-5)的具体体现．此例还说明了定理8.29只在局部等距的情形下成立，在等距浸入情形下未必成立． ■

10.6.3 伪球空间

令（其中 $(x^0,x^1,\cdots,x^m)\in\mathbb{R}^{m+1}_\nu$）

$$S^m_\nu(r)=\big\{(x^0,x^1,\cdots,x^m)\mid -\sum_{i=0}^{\nu-1}(x^i)^2+\sum_{j=\nu}^{m}(x^j)^2=+r^2\big\}. \tag{10.6-21}$$

因 $S^m_\nu(r)$ 上有 m 个自由度，我们就用 $(x^1,\cdots,x^m)$ 来描述它们，x^0 由这些变量表示；$\mathbb{R}^{m+1}_\nu$ 空间是 Lorentz 度规．从式(10.6-21)和(10.0-1)可求得诱导度规

$$\begin{aligned}h_{ab}=&\sum_{ij=1}^{m}\left(\sum_{\alpha,\beta=1}^{m}\frac{\partial x^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial x^\beta}{\partial x^j}\eta^S_{\alpha\beta}-\frac{\partial x^0}{\partial x^i}\frac{\partial x^0}{\partial x^j}\right)(\mathrm{d}x^i)_a(\mathrm{d}x^j)_b=\sum_{ij=1}^{m}\eta^S_{ij}(\mathrm{d}x^i)_a(\mathrm{d}x^j)_b\\&-\frac{\left(\sum_{ij=1}^{\nu-1}-\sum_{i=1}^{\nu-1}\sum_{j=\nu}^{m}-\sum_{i=\nu}^{m}\sum_{j=1}^{\nu-1}+\sum_{ij=\nu}^{m}\right)x^ix^j(\mathrm{d}x^i)_a(\mathrm{d}x^j)_b}{-\sum_{k=1}^{\nu-1}(x^k)^2+\sum_{l=\nu}^{m}(x^l)^2-r^2}.\end{aligned} \tag{10.6-22}$$

其中 $\eta^S=\mathrm{diag}(\underbrace{-\cdots-}_{\nu-1}\underbrace{+\cdots+}_{m+1-\nu})$；很明显度规(10.6-22)不是正定的．

由式(10.6-6)和(10.4-23)计算伪球面 $S^m_\nu(r)$ 的外曲率 K_{ab}：

$$K_{ab}=-\frac{1}{r}\eta_{ab}+\eta_{ae}\frac{x^ex^c}{r^2}\frac{1}{r}\eta_{cb}=-\frac{1}{r}\eta_{ab}+\frac{x_ax_b}{r^3}. \tag{10.6-23}$$

例 10.17 嵌入正定欧氏空间二维球面的外曲率．

只需取式(10.6-23)中的度规为正定度规即可使它适用于二维球面．经计算可得 $K_{ab}=-r\big((\mathrm{d}\theta)_a(\mathrm{d}\theta)_b+\sin^2\theta(\mathrm{d}\phi)_a(\mathrm{d}\phi)_b\big)$；式中负号是由定义不同所致． ■

例 10.18 $m>1$ 的 $S^m_\nu(r)$ 是常曲率空间，曲率是 $\frac{1}{r^2}$．

$\forall u^a,v^a\in\mathfrak{X}(S^m_\nu(r))$，法线 n^a 与切空间正交，故有 $u^ax_a/r=0=v^ax_a/r$；且 u^a,v^a 构成非退化截面；则由式(10.5-24)可得 $S^m_\nu(r)$ 截面曲率（$\epsilon=n_an^a=1$）：

$${}^mK([u\wedge v])=\frac{1}{r^2}\frac{u_au^a\cdot v_bv^b-(u_av^a)^2}{u_au^a\cdot v_bv^b-(u_av^a)^2}=\frac{1}{r^2}.$$

显然 $S^m_\nu(r)$ 的所有截面曲率都是常数，故它是常曲率空间． ■

注 10.19 只要我们算出了公式 $\epsilon=n_an^a$ 的数值，不必将度规限制在广义 Lorentz 情形，超曲面几节的公式同样适用其它度规．

10.6.4 伪双曲空间

当 $\nu>0$ 时，伪双曲空间诱导度规是不定的．令（$(x^0,x^1,\cdots,x^m)\in\mathbb{R}^{m+1}_{\nu+1}$）

$$H^m_\nu(r)=\big\{(x^0,x^1,\cdots,x^m)\mid -\sum_{i=0}^{\nu}(x^i)^2+\sum_{j=\nu+1}^{m}(x^j)^2=-r^2\big\}. \tag{10.6-24}$$

可以求得 $H^m_\nu(r)$ 中的诱导度规 $h_{ab}=\imath^*g_{ab}$ （假设 $x^1,\cdots,x^m$ 是独立变量，x^0 可由上述量来表示），根据式(10.0-1)经过计算可得

$$h_{ab}=\sum_{ij=1}^{m}\left(\sum_{\alpha,\beta=1}^{m}\frac{\partial x^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial x^\beta}{\partial x^j}\eta^H_{\alpha\beta}-\frac{\partial x^0}{\partial x^i}\frac{\partial x^0}{\partial x^j}\right)(\mathrm{d}x^i)_a(\mathrm{d}x^j)_b=\sum_{ij=1}^{m}\eta^H_{ij}(\mathrm{d}x^i)_a(\mathrm{d}x^j)_b-$$
$$\frac{\left(\sum_{ij=1}^{\nu}-\sum_{i=1}^{\nu}\sum_{j=\nu+1}^{m}-\sum_{i=\nu+1}^{m}\sum_{j=1}^{\nu}+\sum_{ij=\nu+1}^{m}\right)x^ix^j(\mathrm{d}x^i)_a(\mathrm{d}x^j)_b}{-\sum_{k=1}^{\nu}(x^k)^2+\sum_{l=\nu+1}^{m}(x^l)^2+r^2}. \tag{10.6-25}$$

其中 $\eta^H=\mathrm{diag}(\underbrace{-\cdots-}_{\nu}\underbrace{+\cdots+}_{m-\nu})$．与式(10.6-35)不同，式(10.6-25)不是正定度规．

由式(10.6-6)和(10.4-23)计算双曲面 $H^m_\nu(r)$ 的外曲率 K_{ab}：

$$K_{ab}=-\frac{1}{r}\eta_{ab}-\eta_{ae}\frac{x^ex^c}{r^2}\frac{1}{r}\eta_{cb}=-\frac{1}{r}\eta_{ab}-\frac{x_ax_b}{r^3}. \tag{10.6-26}$$

例 10.20 $m>1$ 的 $H^m_\nu(r)$ 是常曲率空间，曲率是 $-\frac{1}{r^2}$．

$\forall u^a,v^a\in\mathfrak{X}(H^m_\nu(r))$，法线 n^a 与切空间正交，故有 $u^ax_a/r=0=v^ax_a/r$；且 u^a,v^a 构成非退化截面；则由(10.5-24)可得 $H^m_\nu(r)$ 截面曲率（$\epsilon=n_an^a=-1$）：

$${}^mK([u\wedge v])=-\frac{1}{r^2}\frac{(u_au^a\cdot v_bv^b-(u_av^a)^2}{u_au^a\cdot v_bv^b-(u_av^a)^2}=-\frac{1}{r^2}.$$

显然 $H^m_\nu(r)$ 的所有截面曲率都是常数，故它是常曲率空间． ■

当 $\nu=0$ 时，我们通常将 $H^m_0(r)$ 称为双曲空间，下节详细讨论之．

10.6.5 双曲空间

令 $S=(-r,0,\cdots,0)\in\mathbb{R}^{m+1}_1$．命（其中 $(x^0,x^1,\cdots,x^m)\in\mathbb{R}^{m+1}_1$）

$$H^m_+(r)=\big\{(x^0,\cdots,x^m)\mid (x^1)^2+\cdots+(x^m)^2-(x^0)^2=-r^2,x^0>0\big\}, \tag{10.6-27}$$
$$H^m_-(r)=\big\{(x^0,\cdots,x^m)\mid (x^1)^2+\cdots+(x^m)^2-(x^0)^2=-r^2,x^0<0\big\}, \tag{10.6-28}$$

$$B^m(r)=\{(0,\xi^1,\cdots,\xi^m)\in\mathbb{R}^m_1\mid(\xi^1)^2+\cdots+(\xi^m)^2<r^2\}. \tag{10.6-29}$$

参见图10.1（抽象成二维平面中的双曲线，图中两条对角虚直线是双曲线的渐近线）．其中式(10.6-27)和(10.6-28)分别是**双曲空间**的上下叶（当 $m=1$ 时，就是两条双曲线）．式(10.6-29)是无边实心球，抽象成图中 $(-r,+r)$ 的粗实线．




图 10.1: 双曲空间

对任意 $p=(x^0,x^1,\cdots,x^m)\in H^m_+(r)$（见图10.1），连接点 p 和 S 的直线 l_{pS} 必定交超平面 $x^0=0$ 于某点 $\psi_+(p)$；很明显交点 $\psi_+(p)$ 位于 $B^m(r)$ 内（不可能不与之相交）；同时 $\psi_+:H^m_+(r)\to B^m(r)$ 是双射．对于任意的点 p，下面我们来求 $\psi_+(p)$ 的坐标 $(\xi^1,\cdots,\xi^m)$．

过两点（此处是 p 和 S 点）直线方程是（直线上点的坐标是 $(\xi^0,\cdots,\xi^m)$）

$$\frac{\xi^1-0}{x^1-0}=\frac{\xi^2-0}{x^2-0}=\cdots=\frac{\xi^m-0}{x^m-0}=\frac{\xi^0+r}{x^0+r} \tag{10.6-30}$$

令上式中的 $\xi^0=0$ 可得 $\psi_+(p)$ 坐标如下

$$(\xi^1,\cdots,\xi^m)=\psi_+(x^0,x^1,\cdots,x^m)=\frac{r}{r+x^0}(x^1,\cdots,x^m). \tag{10.6-31}$$

反之．将上式求平方和，并利用 $\sum_{i=1}^m(x^i)^2-(x^0)^2=-r^2$，可得

$$\sum_{k=1}^m(\xi^k)^2=\frac{r^2}{(r+x^0)^2}\left(\sum_{i=1}^m(x^i)^2\right)=\frac{r^2}{(r+x^0)^2}\left(-r^2+(x^0)^2\right)$$

$$\Rightarrow\quad x^0=\frac{r\left(r^2+\sum_k(\xi^k)^2\right)}{r^2-\sum_k(\xi^k)^2},\quad \text{或}\quad x^0=-r\ (\text{舍弃}).$$

有了 x^0 坐标表达式，其它坐标几乎一望而知，它们是

$$\begin{aligned}(x^0,&x^1,\cdots,x^m)=\psi_+^{-1}(\xi^1,\cdots,\xi^m)\\ &=\frac{r}{r^2-\sum_k(\xi^k)^2}\left(+r^2+\sum_{k=1}^m(\xi^k)^2,\ 2r\xi^1,\cdots,\ 2r\xi^m\right),\end{aligned}\tag{10.6-32}$$

$$\begin{aligned}(x^0,&x^1,\cdots,x^m)=\psi_-^{-1}(\eta^1,\cdots,\eta^m)\\ &=\frac{r}{r^2-\sum_k(\eta^k)^2}\left(-r^2-\sum_{k=1}^m(\eta^k)^2,\ 2r\eta^1,\cdots,\ 2r\eta^m\right).\end{aligned}\tag{10.6-33}$$

上面第二式为双曲空间下叶的坐标（其中 $\eta^i=\frac{rx^i}{r-x^0}$）．不难看出映射 $\psi_\pm$ 及 $\psi_\pm^{-1}$ 都是无穷阶可微函数，所以 $\psi_\pm:H_\pm^m(r)\to B^m(r)$ 是光滑同胚．

$\mathbb{R}_1^{m+1}$ 度规为广义 Lorentz 度规，即

$$g_{ab}X^aY^b=\big(-(\mathrm{d}x^0)_a(\mathrm{d}x^0)_b+\sum_{i=1}^m(\mathrm{d}x^i)_a(\mathrm{d}x^i)_b\big)X^aY^b=-X^0Y^0+\sum_{i=1}^mX^iY^i,$$

其中 $X^a,Y^a\in\mathbb{R}^{m+1}$ 是任意矢量．显然，有

$$g_{ab}X^aY^b=\frac{1}{2}\big(g_{ab}(X+Y)^a(X+Y)^b-g_{ab}X^aX^b-g_{ab}Y^aY^b\big).\tag{10.6-34}$$

从上式可见，只需研究 $g_{ab}X^aX^b$ 就可讨论整个 Lorentz 度规了．在物理学中（见定义8.10和8.11），只讨论类时矢量和零模矢量，而它们正好与双曲空间有一一对应关系；类时矢量对应 $r>0$，零模矢量对应 $r=0$．为简单起见，我们假设所有矢量的第零维分量是正的（指向未来），同时只讨论类时矢量；这样只需讨论双曲空间的上叶即可．从上面的讨论可以看出，类时矢量的 Lorentz 度规内积可以转化为双曲上叶中（这种转换是双射）．

读者需要注意，我们只给 $\mathbb{R}_1^{m+1}$ 选定了度规，还不知道 $H_\pm^m(r)$ 或 $B^m(r)$ 度规；下面我们来计算它们的诱导度规．很明显，包含映射 $\imath:H_+^m(r)\to\mathbb{R}_1^{m+1}$ 是正则嵌入的；令 $\varphi=\imath\circ\psi_+^{-1}$，则由上面的讨论可知：$\varphi:B^m(r)\to\mathbb{R}_1^{m+1}$ 也是光滑、正则嵌入映射；当然它们都是浸入的了．根据式(10.0-1)可以求得 $B^m(r)$ 的诱导度规 $h_{ab}=\varphi^*g_{ab}$，直接计算即可

$$h_{ab}=\left(\sum_{\alpha=1}^m\frac{\partial x^\alpha}{\partial\xi^i}\frac{\partial x^\alpha}{\partial\xi^j}-\frac{\partial x^0}{\partial\xi^i}\frac{\partial x^0}{\partial\xi^j}\right)(\mathrm{d}\xi^i)_a(\mathrm{d}\xi^j)_b=\frac{4r^4\sum_{i=1}^m(\mathrm{d}\xi^i)_a(\mathrm{d}\xi^i)_b}{(r^2-\sum_{k=1}^m(\xi^k)^2)^2}.\tag{10.6-35}$$

可见这个度规是正定的，因而 $B^m(r)$ 是一个正定黎曼流形.

还可以求得 $H^m_+(r)$ 中的诱导度规 $h'_{ab}=\imath^*g_{ab}$（假设 $x^1,\cdots,x^m$ 是独立变量，x^0 可由上述量来表示），根据式(10.0-1)经过计算可得

$$\begin{aligned} h'_{ab}&=\sum_{i,j=1}^m\left(\sum_{\alpha,\beta=1}^m\frac{\partial x^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial x^\beta}{\partial x^j}\delta_{\alpha\beta}-\frac{\partial x^0}{\partial x^i}\frac{\partial x^0}{\partial x^j}\right)(\mathrm{d}x^i)_a(\mathrm{d}x^j)_b\\ &=\sum_{i,j=1}^m\left(\delta_{ij}-\frac{x^ix^j}{r^2+\sum_{k=1}^m(x^k)^2}\right)(\mathrm{d}x^i)_a(\mathrm{d}x^j)_b\\ &\xlongequal{10.6-32}\frac{4r^4\sum_{i=1}^m(\mathrm{d}\xi^i)_a(\mathrm{d}\xi^i)_b}{(r^2-\sum_{k=1}^m(\xi^k)^2)^2}. \end{aligned}\tag{10.6-36}$$

上式最后一步推导较为繁琐，计算冗长，所得结果与式(10.6-35)相同. 这说明 $(H^m_+(r),\imath^*g_{ab})$ 和 $(B^m(r),\varphi^*g_{ab})$ 是等距同胚.

例 10.21 具体计算一例. 当 $m=1$ 时，设 $v^a=v_\xi(\frac{\partial}{\partial\xi})^a\in T_pB^1(r)$，根据式(10.6-35)，有 $h_{ab}v^av^b=\frac{4r^4v_\xi^2}{(r^2-\xi^2)^2}$；这是正定的.

再计算 Lorentz 度规下的数值. 推前 v^a 有

$$\varphi_*(v^a)=\frac{4r^3\xi v_\xi}{(r^2-\xi^2)^2}\left(\frac{\partial}{\partial x^0}\right)^c+\frac{2r^2(r^2+\xi^2)v_\xi}{(r^2-\xi^2)^2}\left(\frac{\partial}{\partial x^1}\right)^c.$$

再来计算矢量长度，$g_{ab}v^av^b=\frac{4r^4v_\xi^2}{(r^2-\xi^2)^2}$；两者相等. ■

统一表示 前面几节中，我们把 $\mathbb{R}^{m+1}_\nu$ 中的某个坐标（比如 x^0）直接用其它坐标（$x^1,\cdots,x^m$）表示出来，然后给出了伪球面、伪双曲面的度规；这种方式最为直接，但所得公式各不相同. 黎曼最早用同一公式表示了超球面和双曲空间的度规，之后被其他人推广到了伪球面、伪双曲面；详见 §14.4 定理14.34.

10.7 超曲面四：相对论时空

本节将光滑流形 (M,g) 的维数限定在四维，则超曲面 Σ 是三维的，度规 g 是 Lorentz 类型的（$(-+++)$）. 为与相对论内容匹配，本小节拉丁字母表示 $1,2,3$，希腊字母表示 $0,1,2,3$.

流形 M 的切丛 TM 上存在一类时矢量场 $(\frac{\partial}{\partial t})^a$，这一类时场将流形 M 分解为一族类空超曲面 $\{\Sigma_t\}$，整张超曲面 Σ_t 上的参数 t 是同一实数. 这族超曲面中

任意两张不同参数的超曲面没有交集，即 $\Sigma_t \cap \Sigma_{t'} = \varnothing,\ \forall t \neq t'$. 流形 M 中任意一点都位于某张（且只在此张）Σ_t 上，即 $\{\Sigma_t\}$ 能覆盖住流形 M，$M = \bigcup_{t\in\mathbb{R}} \Sigma_t$.

从纯粹数学角度来看任意四维闵氏流形 (M, g)，未必存在这样的分解，或者说需要满足一定条件才存在这样的类时矢量场，然后依据这个类时场将空间 M 划分成一族类空超曲面 Σ_t；寻找数学上的这些存在性条件（对物理学工作者来说）太过艰深. 从物理学角度看，这样的分解一定存在，因为我们就生活在这样的一个四维时空中，这个时空然后被 $1+3$ 分解成时间和空间.

10.7.1 ADM 分解

设有类时切矢量场 $(\frac{\partial}{\partial t})^a$，约定它指向未来，即指向参数 t 增大的方向. 一般情形下，$(\frac{\partial}{\partial t})^a$ 未必与超曲面 Σ_t 处处正交；假设 $(\frac{\partial}{\partial t})^a$ 可分解为两个矢量场：

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a = Nn^a + S^a. \tag{10.7-1}$$

其中 n^a 是类空超曲面 Σ_t 的单位法矢量，所以有 $n^a n_a = -1$；标量场 N 称为时移函数（lapse function），矢量场 S^a 称为位移矢量场（shift vector field），S^a 切于类空超曲面 Σ_t. 一般称这种分解方式为 ADM 分解[4]. 很容易得到

$$(\mathrm{d}t)_a = -\frac{1}{N}n_a. \quad \text{因为 } 1 = (\mathrm{d}t)_a\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a = -\frac{1}{N}n_a(Nn^a + S^a) = -n_a n^a = 1.$$

我们需要建立局部坐标系，类时矢量场 $(\frac{\partial}{\partial t})^a$ 自然是坐标基矢之一，它的积分曲线（见 §4.10）是一条坐标线. 依据它分层的每张超曲面 Σ_t 都是三维类空曲面，在每张超曲面上我们都选取三个线性无关的（即不在同一个二平面内）类空矢量场；当然可以选三个正交归一的类空矢量场，但目前暂不做此要求. 这四个坐标构成局部坐标系 $\{x^0 \equiv t, x^i\}$，基矢分别是 $\{(\frac{\partial}{\partial t})^a, (\frac{\partial}{\partial x^i})^a\}$. 类时矢量场 $(\frac{\partial}{\partial t})^a$ 的积分曲线与每一个 Σ_t 都有且只有一个交点，所有交点的三个类空坐标 $\{x^i\}$ 自然取为相同的值；每张 Σ_t 上的参数 t 取同一值.

根据假设矢量场 S^a 是纯类空矢量场，切于 Σ_t；而 n^a 正交于 Σ_t，故有

$$S^0 = S^a(\mathrm{d}t)_a = -\frac{1}{N}S^a n_a = 0. \tag{10.7-2}$$

因此

$$S^a = \sum_{i=1}^{3} S^i \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a. \tag{10.7-3}$$

令 $S_a = g_{ab}S^b$，$S_i = S_a(\frac{\partial}{\partial x^i})^a$.

经计算可得度规场 g_{ab} 在局部坐标系 $\{x^0 \equiv t, x^i\}$ 的分量表达式：

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} S^iS_i - N^2 & S_1 & S_2 & S_3 \\ S_1 & g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ S_2 & g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ S_3 & g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{pmatrix}, \quad g^{\mu\nu} = \frac{1}{N^2}\begin{pmatrix} -1 & S^1 & S^2 & S^3 \\ S^1 & & & \\ S^2 & N^2h_{ij}^{-1} & - & S^iS^j \\ S^3 & & & \end{pmatrix}. \tag{10.7-4}$$

记 $g_{ij} \equiv h_{ij}$，$1 \leqslant i, j \leqslant 3$. 其中共轭度规右下角 3×3 的矩阵元是 $g^{ij} = h_{ij}^{-1} - N^{-2}S^iS^j$，其中 h_{ij}^{-1} 是指度规右下角 3×3 的矩阵 (g_{ij}) 的逆；需要注意的是矩阵外面还有一个因子.

可求得单位法矢量在 $\{t, x^i\}$ 的分量表达式

$$n^a = \frac{1}{N}\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a - \frac{S^i}{N}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a; \qquad n_a = -N(\mathrm{d}t)_a = -N\nabla_a t. \tag{10.7-5}$$

诱导度规 $h_{ab} = g_{ab} + n_an_b$ 在 $\{t, x^i\}$ 的分量表达式为

$$h_a^b = \left((\mathrm{d}x^i)_a + S^i(\mathrm{d}t)_a\right)\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b, \tag{10.7-6a}$$

$$h_{ab} = S_kS^k(\mathrm{d}t)_a(\mathrm{d}t)_b + S_i\left((\mathrm{d}t)_a(\mathrm{d}x^i)_b + (\mathrm{d}t)_b(\mathrm{d}x^i)_a\right) + g_{ij}(\mathrm{d}x^i)_a(\mathrm{d}x^j)_b. \tag{10.7-6b}$$

直接计算便可得到 $\det(h_{\mu\nu}) = 0$，但 $h = \det(h_{ij}) \neq 0$. 且有 $g = \det(g_{\mu\nu}) = -N^2\det(g_{ij}) = -N^2\det(h_{ij})$. 从而可以得到四维流形 M 体积元与三维超曲面 Σ_t 的诱导体积元之间的关系：

$$n^a\left(\sqrt{-g}(\mathrm{d}x^0)_a \wedge (\mathrm{d}x^1)_b \wedge (\mathrm{d}x^2)_c \wedge (\mathrm{d}x^3)_d\right) = N\sqrt{h}(\mathrm{d}x^1)_b \wedge (\mathrm{d}x^2)_c \wedge (\mathrm{d}x^3)_d. \tag{10.7-7}$$

虽然三维流形 Σ_t 上的度规场 $h_{ij} \equiv g_{ij}$，但是，从式(10.7-4)可以看到一般情形下 $h^{ij} = h_{ij}^{-1} \neq g^{ij}$，而是 $g^{ij} = h_{ij}^{-1} - S^iS^j/N^2$.

10.7.2 时间导数

在适配坐标系中（见式(4.11-13)），李导数化为偏导数；ADM 分解后的坐标系就是一个适配坐标系，所有张量分量对参数 t 的偏导数都可以化作李导数. 在 ADM 分解中，参量 t 可以看作“时间”；故张量场对切矢量场 $(\frac{\partial}{\partial t})^a$ 的李导数可以看作对时间 t 的导数.

类空张量场 $T^{a\cdots}_{b\cdots}\in\mathfrak{T}^p_q(\Sigma_t)$ 的李导数未必仍是类空张量场，我们给其增加数次投影，这样的李导数自然仍是类空张量场.

$$\dot{T}^{a\cdots}_{b\cdots}\equiv\widetilde{\pounds}_{\partial_t}T^{a\cdots}_{b\cdots}\overset{def}{=}h^a_{a'}\cdots h^{b'}_b\cdots\pounds_{\partial_t}T^{a'\cdots}_{b'\cdots}. \tag{10.7-8}$$

$\widetilde{\pounds}_X$ 表示增加数次投影的 $\pounds_X$. 可以证明如下重要公式：

$$\widetilde{\pounds}_{\partial_t}T^{a\cdots}_{b\cdots}=\widetilde{\pounds}_{Nn}T^{a\cdots}_{b\cdots}+\widetilde{\pounds}_{\vec{S}}T^{a\cdots}_{b\cdots}=N\widetilde{\pounds}_nT^{a\cdots}_{b\cdots}+\widetilde{\pounds}_{\vec{S}}T^{a\cdots}_{b\cdots},\quad\forall T^{a\cdots}_{b\cdots}\in\mathfrak{T}^p_q(\Sigma_t). \tag{10.7-9}$$

由于 S^a 在 ADM 分解下是纯类空矢量场，在李导数的角标中，将其记为 $\vec{S}$. 式 $\widetilde{\pounds}_{Nn}T^a_{.b}=N\widetilde{\pounds}_nT^{a\cdots}_{b\cdots}$ 的证明较为繁琐，需先后计算 $\widetilde{\pounds}_{Nn}T^{a\cdots}_{b\cdots}$ 和 $\widetilde{\pounds}_nT^{a\cdots}_{b\cdots}$，然后即可验证它们相等. 有了此等式，也就证明了式(10.7-9).

我们来计算超曲面上两个最基本张量的时间导数. 首先是诱导度规 h_{ab}：

$$\dot{h}_{ab}=N\widetilde{\pounds}_nh_{ab}+\widetilde{\pounds}_{\vec{S}}h_{ab}\overset{10.4-25}{=\!=\!=}-2NK_{ab}+\widetilde{\pounds}_{\vec{S}}h_{ab}. \tag{10.7-10}$$

其次是外曲率 K_{ab} 的时间导数为：

$$\dot{K}_{ab}=\widetilde{\pounds}_{\vec{S}}K_{ab}-{}^4R_{cd}Nh^c_ah^d_b+{}^3R_{ab}N-2NK^c_aK_{cb}+NKK_{ab}-\mathrm{D}_a\mathrm{D}_bN. \tag{10.7-11}$$

证明此式需分为两步. 第一步，我们定义**单位法矢量 n^a 的四加速度**：

$$A_a\overset{def}{=}n^b\nabla_bn_a=N^{-1}\mathrm{D}_aN. \tag{10.7-12}$$

注意到明显有：$n^aA_a=0$. 上式最后一步的计算过程是：

$$\begin{aligned}A_a=&n^b\nabla_bn_a=-n^b\nabla_b(N\nabla_at)=-(n^b\nabla_bN)\nabla_at-Nn^b\nabla_b\nabla_at\\=&(n^b\nabla_bN)\frac{n_a}{N}-Nn^b\nabla_a\nabla_bt=n_a\frac{1}{N}n^b\nabla_bN+Nn^b\nabla_a\frac{n_b}{N}\\=&n_a\frac{1}{N}n^b\nabla_bN+Nn^bn_b\nabla_a\frac{1}{N}+\frac{N}{2N}\cancel{\nabla_a(n_bn^b)}\\=&N^{-1}n_an^b\nabla_bN+N^{-1}\nabla_aN=N^{-1}(n_an^b+\delta^b_a)\nabla_bN=N^{-1}\mathrm{D}_aN.\end{aligned}$$

第二步，因 $\dot{K}_{ab}=N\widetilde{\pounds}_nK_{ab}+\widetilde{\pounds}_{\vec{S}}K_{ab}$，故只需计算 $\widetilde{\pounds}_nK_{ab}$ 即可.

$$\begin{aligned}-\widetilde{\pounds}_nK_{ab}=&-h^c_ah^d_b\left(n^e\nabla_eK_{cd}+K_{ed}\nabla_cn^e+K_{ce}\nabla_dn^e\right)\\=&h^c_ah^d_b\big(n^e\nabla_e(\nabla_cn_d+n_cA_d)+K_{ed}(K^e_c+n_cA^e)+K_{ce}(K^e_d+n_dA^e)\big)\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&=h_a^c h_b^d\big(n^e(\nabla_c\nabla_e n_d - {}^4R_{fdec}n^f) + \cancel{n^e n_c \nabla_e A_d} - A_d n^e(\cancel{K_{ec}} + n_e A_c)\\
&\quad + 2K_{ed}K_c^e + \cancel{n_e K_{ed}A^e} + \cancel{n_d K_{ce}A^e}\big) \quad \text{其中} n^e K_{ec}=0,\ h_a^c n_c = 0 = h_b^d n_d\\
&=h_a^c h_b^d\big(\nabla_c(n^e\nabla_e n_d) - (\nabla_c n^e)\nabla_e n_d - {}^4R_{fdec}n^f n^e + A_d A_c + 2K_{ed}K_c^e\big)\\
&=h_a^c h_b^d\big(\nabla_c A_d - {}^4R_{fdec}n^f n^e + A_d A_c + K_{ed}K_c^e\big)\\
\overset{10.5-25}{=\!=\!=}&h_a^c h_b^d\big(\nabla_c A_d + A_d A_c + K_{ed}K_c^e\big) + {}^4R_{ef}h_a^f h_b^e - {}^3R_{ab} - K_{ab}K + K_b^e K_{ea}\\
&=\mathrm{D}_a(N^{-1}\mathrm{D}_b N) + A_a A_b + {}^4R_{ef}h_a^f h_b^e - {}^3R_{ab} - K_{ab}K + 2K_b^e K_{ea}\\
&=N^{-1}\mathrm{D}_a\mathrm{D}_b N + {}^4R_{ef}h_a^f h_b^e - {}^3R_{ab} - K_{ab}K + 2K_b^e K_{ea}.
\end{aligned}
$$

将上式带回，即可证明式(10.7-11).

10.7.3 同步参考系

在 ADM 分解中，当 $N=1$ 且 $S^a\equiv 0$ 时，被称为**同步参考系**；此时情形略显简单. 类空超曲面 Σ_t 的度规分量 h_{ij} 是参数 $\{t,x^i\}$ 的函数，我们记

$$
\dot{h}_{ij}=\frac{\partial h_{ij}}{\partial t},\quad \dot{h}_i^j = g^{jk}\partial_t h_{ki} = h^{jk}\partial_t h_{ki},\quad \dot{h}_i^i = h^{ik}\partial_t h_{ki}. \tag{10.7-13}
$$

容易求得克氏符：

$$
\begin{aligned}
&\Gamma^0_{00}=\Gamma^0_{0i}=\Gamma^0_{i0}=\Gamma^i_{00}=0,\quad \Gamma^0_{ij}=\frac{1}{2}\dot{h}_{ij},\quad \Gamma^i_{j0}=\Gamma^i_{0j}=\frac{1}{2}\dot{h}^i_j. \qquad (10.7\text{-}14)\\
&\Gamma^k_{ij}\quad \text{只由 } h_{ij},h^{ij} \text{ 决定，与}\{g_{00}=-1=g^{00},g_{0i}=0=g^{0i}\}\text{无关}
\end{aligned}
$$

对于同步参考系而言，不难看出：

$$
\pounds_{\partial_t}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a = \left[\frac{\partial}{\partial t},\frac{\partial}{\partial x^i}\right]^a = 0,\qquad \pounds_{\partial_t}\left(\mathrm{d}x^i\right)_a = 0. \tag{10.7-15}
$$

由式(10.7-10)可得 Σ_t 的外曲率为：

$$
K_{ab}=-\frac{1}{2}\dot{h}_{ab}\quad\Leftrightarrow\quad K_{ij}=-\frac{1}{2}\dot{h}_{ij}. \tag{10.7-16}
$$

外曲率 K_{ab} 的时间导数(10.7-11)变为：

$$
-\frac{1}{2}\ddot{h}_{ab}=\dot{K}_{ab}=-{}^4R_{cd}h_a^c h_b^d + {}^3R_{ab} - 2K_a^c K_{cb} + KK_{ab}. \tag{10.7-17}
$$

由式(8.2-2)、(10.5-22) 和(10.5-23)可得同步参考系中的黎曼曲率：

$$
{}^4R_{0i0j} = -\frac{1}{2}\ddot{h}_{ij} + \frac{1}{4}\dot{h}^l_i\dot{h}_{lj}. \tag{10.7-18a}
$$

$$
{}^4R_{0jkl} = +\frac{1}{2}\dot{h}_{jl;k} - \frac{1}{2}\dot{h}_{jk;l}. \tag{10.7-18b}
$$

$$
{}^4R_{ijkl} = {}^3R_{ijkl} + \frac{1}{4}\dot{h}_{ik}\dot{h}_{jl} - \frac{1}{4}\dot{h}_{il}\dot{h}_{jk}. \tag{10.7-18c}
$$

由式(6.2-9)可得同步参考系中的 Ricci 曲率：

$$
{}^4R_{00} = \partial_\nu\Gamma^\nu_{00} - \partial_0\Gamma^\nu_{0\nu} + \Gamma^\pi_{00}\Gamma^\nu_{\pi\nu} - \Gamma^\pi_{0\nu}\Gamma^\nu_{\pi 0} = -\frac{1}{2}\frac{\partial\dot{h}^i_i}{\partial t} - \frac{1}{4}\dot{h}^i_j\dot{h}^j_i. \tag{10.7-19a}
$$

$$
{}^4R_{0i} = \frac{1}{2}\left[\partial_j\dot{h}^j_i + \dot{h}^k_i\Gamma^j_{kj} - \partial_i\dot{h}^j_j - \dot{h}^k_j\Gamma^j_{ki}\right] = \frac{1}{2}\left[\left(\dot{h}^j_i\right)_{;j} - \left(\dot{h}^j_j\right)_{;i}\right]. \tag{10.7-19b}
$$

$$
{}^4R_{ij} = {}^3R_{ij} + \frac{1}{2}\ddot{h}_{ij} - \frac{1}{2}\dot{h}^l_i\dot{h}_{lj} + \frac{1}{4}\dot{h}^l_l\dot{h}_{ij}. \tag{10.7-19c}
$$

其中式(10.7-19c)采用 $(\partial_i)^a$、$(\partial_j)^b$ 缩并式(10.7-17)得到.

小结

本章主要参考了[45, 72]相应章节.

第十一章　零模

在微分几何部分，其它各章节几乎不涉及零模问题；我们单列一章来讨论这个问题．首先，讲述零模线性子空间，以及零模超曲面．其次，介绍了 Newman–Penrose 型式，这是处理零模问题的有效方法．接着，给出了 Weyl 张量的 Petrov 分类，以及类光曲线．最后，证明了 Goldberg–Sachs 定理．

11.1　广义欧氏子空间

与非退化度规定义3.38相反，m 维实线性空间 V 上的退化（degenerate）、对称双线性函数 g 是指：存在非零矢量 $\xi \in V$，使得 $g(\xi, v) = 0$，$\forall v \in V$．与之相随的是退化空间的定义，见3.52.

零模流形主要研究退化对称双线性型式．当度规退化时，我们将尽量避免使用度规这个术语，而使用退化对称双线性型式（degenerate symmetric bilinear form），简称**退型**（这是笔者杜撰的一个名词）.

值得注意的是，$\mathbb{R}^m$ 上的非退化对称度规可以在 $\mathbb{R}^m$ 的子空间上诱导出非退化度规或者退型．我们将会处理这两类子空间，故当不知道度规是否退化时，使用 g；当度规非退化时，则尽量用 η.

定义 11.1 设有 m 维实线性空间 (W, g)，g 可能退化，也可能非退化；令

$$\mathrm{Rad}W = \{\xi^a \in W \mid g_{ab}\xi^a v^b = 0,\ \forall v^b \in W\}. \tag{11.1-1}$$

我们称 $\mathrm{Rad}W$ 是 W 在 g 下的**根空间**（Radical Space）；空间 $\mathrm{Rad}W$ 的维数称为度规 g 的**零度**（nullity degree）.

当空间 W 的零度是〇时，空间 W 是非退化的；当零度大于〇时，空间 W 是退化的；反之亦然．g 是否退化就是看式(3.4-14)中是否有零惯性指数.

设 (W,g) 是一个 m 维实线性空间，Rad$W$ 是它的根空间；那么，W 的子空间可能不退化．为了支持这一论断，我们证明了下面的一般结果．

命题 11.2 设有 m 维实线性空间 (W,g)，W 的零度是 r，并且 $r<m$．那么根空间 Rad$W$ 的正交补空间是非退化的．

证明 . 令 SW 是根空间 Rad$W$ 在 W 中的正交补空间，即作了如下分解：

$$W=\mathrm{Rad}W\dotplus SW. \tag{11.1-2}$$

其中 $\dotplus$ 是正交直和，即有 Rad$W\cap SW=\{0\}$，并且 Rad$W$ 和 SW 中元素相互正交. 用反证法证明 SW 是非退化的. 假设存在非零元素 $\zeta\in SW$ 使得 $g_{ab}\zeta^a v^b=0$，$\forall v^b\in SW$；式(11.1-2)意味着 $g_{ab}\zeta^a\xi^b=0$，$\forall\xi^b\in\mathrm{Rad}W$；因此，$\zeta^a\in\mathrm{Rad}W$．这违背了 Rad$W$、$SW$ 互补关系；最终，SW 是非退化的． ■

定义 11.3 实线性空间 (W,g) 的根空间 Rad$W$ 的正交补空间 SW 称为 W 的**根补空间**（Screen Space）.

由于 SW 对于 g 来说是非退化的，故它是广义欧几里得空间；它的正交基是记为 $\{(e_{r+1})^a,\cdots,(e_m)^a\}$．我们再设 Rad$W$ 的基矢是 $\{(e_1)^a,\cdots,(e_r)^a\}$，则空间 W 的基矢为：$\mathcal{B}=\{(e_1)^a,\cdots,(e_r)^a,(e_{r+1})^a,\cdots,(e_m)^a\}$．考虑到任意的 Rad$W$ 矢量都正交于 W，故可以得出 g 在基矢 $\mathcal{B}$ 下的矩阵是：

$$g=\begin{pmatrix}0_{r,r} & 0_{r,m-r}\\ 0_{m-r,r} & \eta_{ij}\end{pmatrix},\quad \eta_{ij}=\pm\delta_{ij},\quad r<i,j\leqslant m. \tag{11.1-3}$$

命题 11.4 设 (V,g) 是 m 维广义欧几里得空间，W 是 V 的子空间；则有

$$\mathrm{Rad}W=\mathrm{Rad}W^\perp=W\cap W^\perp,\quad W^\perp\text{是垂直子空间3.50}. \tag{11.1-4}$$

证明 . 令 $v^a\in W\cap W^\perp\subset W^\perp$，则有 $g_{ab}(v^a,w^b)=0,\forall w^b\in W$，这就是说 $v^a\in\mathrm{Rad}W$．反之，$\forall v^a\in\mathrm{Rad}W\subset W$，可以得到 $g_{ab}(v^a,w^b)=0,\forall w^b\in W$，这意味着 $v^a\in W\cap W^\perp$．因此 Rad$W=W\cap W^\perp$．应用命题3.51中的 (2) 可得 Rad$W=$Rad$W^\perp=W\cap W^\perp$． ■

写到这里，读者应能看出，只有在退型情形下，Rad$W$ 才能包含非零矢量．若 V 的度规是非退化、正定的，则 V 及其子空间不会有退化情形，根空间是平庸的（只含零矢量）．若空间 V 的度规 g 非退化但不定，则 V 本身的根空间也

是平庸的；但 V 的子空间 W 可能是退化的，一般情形下 W 包含了 V 中的部分零模矢量，不是全部，可参见例11.7.

命题 11.5 设 g 是 m 维实矢量空间 V 上的一个非退化、不定度规，它的负惯性指数个数是 q. 则存在 V 的子空间 W，其维数是 $\min(q, m-q)$，使得 $g|_W = 0$；并且没有维数更大的子空间 W' 使得 $g|_{W'} = 0$.

证明 . 设 V 有正交归一基矢 $\{(e_i)^a\}$，注意 $g = \mathrm{diag}(-\cdots-+\cdots+)$ 在 V 上是非退化的，它的负惯性指数个数是 q，正惯性指数个数是 $m-q$.

先设 $q < m-q$. 我们构建如下空间：

$$\overline{W} \equiv \mathrm{Span}\left\{(u_1)^a = (e_1)^a + (e_{q+1})^a, \cdots, (u_q)^a = (e_q)^a + (e_{2q})^a\right\}. \tag{11.1-5}$$

容易验证 $g|_{\overline{W}} = 0$；很明显 $\overline{W}$ 的维数是 q.

对 V 中满足 $g_{ab}x^a(u_j)^b = 0, j = 1, \cdots, q$ 的零模矢量 $x^a = x^i(e_i)^a$ 而言，它的分量满足 $x^1 = x^{q+1}, \cdots, x^q = x^{2q}$. 因 $\{(e_1)^a, \cdots, (e_q)^a\}$ 和 $\{(e_{q+1})^a, \cdots, (e_m)^a\}$ 分别是类时、类空基矢量，再从 x^a 是零模矢量可以得到 $x^{2q+1} = \cdots = x^m = 0$. 最终 x^a 可以表示成 $\{(u_1)^a, \cdots, (u_q)^a\}$ 的常系数线性组合，故 $x^a \in \overline{W}$. 由此可见不存在维数更大的子空间 $W' \supset \overline{W}$ 使得 $g|_{W'} = 0$.

仿照上述可证：当 $q \geqslant m-q$ 时，命题也成立. ■

例 11.6 给广义欧氏空间 $\mathbb{R}^m_q$ 构建包含零模矢量的基矢组.

设 $\mathbb{R}^m_q$ 有正交归一基矢 $\{(e_i)^a\}$，度规 $g = \mathrm{diag}(-\cdots-+\cdots+)$；我们借用这些矢量构建包含零模矢量的基矢组.

甲 $q < m-q$. 构建如下矢量（其中 $i = 1, \cdots, q$）

$$(l_i)^a \overset{def}{=} \frac{1}{\sqrt{2}}\left[(e_i)^a + (e_{q+i})^a\right], \quad (n_i)^a \overset{def}{=} \frac{1}{\sqrt{2}}\left[(e_i)^a - (e_{q+i})^a\right]. \tag{11.1-6}$$

容易验证 $g_{ab}(l_i)^a(l_j)^b = 0 = g_{ab}(n_i)^a(n_j)^b$ 以及 $g_{ab}(l_i)^a(n_j)^b = -\delta_{ij}$；其中 $i, j = 1, \cdots, q$. 因此可以看出 $\{(l_1)^a, \cdots, (l_q)^a, (n_1)^a, \cdots, (n_q)^a, (e_{2q+1})^a, \cdots, (e_m)^a\}$ 是空间 $\mathbb{R}^m_q$ 的一组基矢量，它包含 $2q$ 个零模矢量，以及 $m-2q$ 个类空矢量. 在这组基矢下，度规矩阵是：

$$g = \begin{pmatrix} 0 & -I_q & 0 \\ -I_q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_{m-2q} \end{pmatrix}. \tag{11.1-7}$$

乙 $q>m-q$. 构建如下矢量

$$(l_j)^a \overset{def}{=} \frac{1}{\sqrt{2}}\big[(e_j)^a+(e_{q+j})^a\big],\quad (n_j)^a \overset{def}{=} \frac{1}{\sqrt{2}}\big[(e_j)^a-(e_{q+j})^a\big];\quad j=1,\cdots,m-q.$$

可验证 $g_{ab}(l_i)^a(l_j)^b=0=g_{ab}(n_i)^a(n_j)^b$ 以及 $g_{ab}(l_i)^a(n_j)^b=-\delta_{ij}$；其中 $i,j=1,\cdots,m-q$. 因此可以看出类光矢量 $(l_1)^a,\cdots,(l_{m-q})^a$、$(n_1)^a,\cdots,(n_{m-q})^a$ 和类空矢量 $(e_{2(m-q)+1})^a,\cdots,(e_m)^a$ 的组合是空间 $\mathbb{R}^m_q$ 的一组基矢量，它包含 $2(m-q)$ 个零模矢量，以及 $2q-m$ 个类时矢量.

丙 $2q=m$. 可为空间 V 构建 $\{(l_1)^a,\cdots,(l_q)^a,(n_1)^a,\cdots,(n_q)^a\}$ 个零模矢量组成的基矢组，可参见式(11.1-6).

虽然上述三类基矢均包含零模矢量，但度规在这些基矢下是非退化的. ■

例 11.7 给定四维闵氏时空 $(\mathbb{R}^4_1,\eta)$，$\eta=(-+++)$. 利用上面三种分类，分情况讨论它的包含类光矢量的子空间 W.

根据甲可设闵氏时空基矢为 $\{l^a,n^a,u^a,v^a\}$，其中 l^a,n^a 是类光基矢，实基矢 u^a,v^a 是类空的. 根据命题11.5可知四维闵氏时空最大退化子空间维数是 1.

(1) 设 W 是 1 维的. 可将 W 的基矢选为 l^a，此时 W 是退化的；$W^\perp=\mathrm{Span}\{l^a,u^a,v^a\}$；可将 l^a 换成 n^a. 此时 $\mathrm{Rad}W=W$，根补空间 $SW=\mathrm{Span}\{0\}$.

(2) 设 W 是 2 维的. 那么 W 的基矢可能是 l^a 和 n^a；也可能是 l^a、n^a 两者之一与 u^a、v^a 两者之一；分情况讨论.

(i) $W=\mathrm{Span}\{l^a,n^a\}$. $W^\perp=\mathrm{Span}\{u^a,v^a\}$. $\mathrm{Rad}W=\mathrm{Span}\{0\}$，$SW=W$.

(ii) $W=\mathrm{Span}\{l^a,u^a\}$. $W^\perp=\mathrm{Span}\{l^a,v^a\}$. $\mathrm{Rad}W=\mathrm{Span}\{l^a\}$，$SW=\mathrm{Span}\{u^a\}$. 可将此种情下的 l^a 换成 n^a；以及 u^a 换成 v^a.

(3) 设 W 是 3 维的. 那么 W 的基矢可能是 l^a、n^a 两者之一，再加上 u^a、v^a；也可能是 l^a 和 n^a，再加上 u^a、v^a 两者之一；分情况讨论.

(i) $W=\mathrm{Span}\{l^a,u^a,v^a\}$. $W^\perp=\mathrm{Span}\{l^a\}$. $\mathrm{Rad}W=\mathrm{Span}\{l^a\}$，$SW=\mathrm{Span}\{u^a,v^a\}$. 可将 l^a 换成 n^a.

(ii) $W=\mathrm{Span}\{l^a,n^a,u^a\}$. $W^\perp=\mathrm{Span}\{v^a\}$. $\mathrm{Rad}W=\mathrm{Span}\{0\}$，$SW=W$. 可将 u^a 换成 v^a.

(4) 设 W 是 4 维的. $W^\perp=\mathrm{Span}\{0\}$. $\mathrm{Rad}W=\mathrm{Span}\{0\}$，$SW=W$. ■

11.2 类光超曲面

设有四维广义黎曼流形 (M,g)，其度规是 Lorentz 型度规（$(-+++)$）；它有类光超曲面 Σ．本节大部分结论可以毫无困难地推广到广义 Lorentz 度规．

首先，类光超曲面的 Σ 法矢量 n^a 自然是法丛 $T^\perp\Sigma$ 中的矢量；其次它还是零模的，即 $n^a n_a=0$，这说明 n^a 还属于切丛 $T\Sigma$．这种双重身份，使得矢量场 n^a 即切于又法于超曲面 Σ；这在非零模情形是不可能的！

11.2.1 法矢量

在 §10.4.1中我们用标量函数 $\Phi=0$ 来描述超曲面，这种方式同样适用于类光超曲面．但此时 $g^{ab}\nabla_a\Phi\nabla_b\Phi=0$，故我们没有类似于式(10.4-3)的描述法矢量的方式．类光超曲面的法矢量自然不能归一化到 ±1，也就是说它没有单位法矢量的概念．我们令

$$n^a\equiv\nabla^a\Phi. \tag{11.2-1}$$

把它当成类光超曲面的法矢量．

11.2.2 诱导退型

我们已经知道在 $\mathbb{R}^m_1$ 中的零模子空间上度规是退化的；在一般流形上，零模子空间上的度规也是退化的，下面验证一下．设四维闵氏流形 (M,g) 上有类光超曲面 Σ，其零模法矢量 n^a 具有双重身份，它既是 Σ 的法矢量又是 Σ 的切矢量．首先，我们把 n^a 看成法矢量，那么 $\forall u^a\in\mathfrak{X}(\Sigma)$，有

$$g_{ab}n^a u^b=0. \tag{11.2-2}$$

根据法矢量与切矢量正交，可得此式为零．然而，n^a 的另一身份是：$n^a\in\mathfrak{X}(\Sigma)$．当用这个身份来看时，诱导度规是（注意 $\imath_* u^a=u^a,\ \forall u^a\in\mathfrak{X}(\Sigma)$）

$$h_{ab}n^a u^b=(\imath^* g_{ab})n^a u^b=g_{ab}(\imath_* n^a)(\imath_* u^b)=g_{ab}n^a u^b\overset{11.2-2}{=\!=\!=}0. \tag{11.2-3}$$

可见诱导退型 h_{ab} 是退化的，它不能称为真正的度规．

下面叙述一下关于退型的一些内容；我们着手在四维闵氏流形 (M,g) 的类光超曲面 (Σ,h) 上建立活动标架场．根据文献[12]$^{\text{p.90-92}}$论述可知，在的 M 的局

部开邻域 U 上一定存在基矢：

$$\mathcal{B} \equiv \{l^a,\ n^a,\ (E_1)^a,\ (E_2)^a\}\,, \qquad l^a, n^a \text{ 类光，} (E_1)^a, (E_2)^a \text{ 类空} \tag{11.2-4}$$

使得类光超曲面 Σ 切丛由

$$T\Sigma = \mathrm{Span}_\infty \{n^a,\ (E_1)^a,\ (E_2)^a\} \tag{11.2-5}$$

张成；其中 n^a 是 Σ 的类光法矢量．四维闵氏流形 M 的切丛由

$$TM = \mathrm{Span}_\infty \{l^a,\ n^a,\ (E_1)^a,\ (E_2)^a\} \tag{11.2-6}$$

张成．除此以外，这四个基矢还可以张成如下子空间

$$T^\perp\Sigma = \mathrm{Span}_\infty \{n^a\}\,,\ S = \mathrm{Span}_\infty \{(E_1)^a, (E_2)^a\}\,,\ S^\perp = \mathrm{Span}_\infty \{n^a, l^a\}\,.$$

$\forall p \in \Sigma \subset M$，每个 $T_p\Sigma$ 都是 T_pM 的类光子空间．不难得到

$$T_p\Sigma \cap T_p^\perp\Sigma = T_p^\perp\Sigma, \quad \dim\big(T^\perp\Sigma\big)_p = 1, \quad \dim\big(T\Sigma\big)_p = 3. \tag{11.2-7}$$

在标架场(11.2-4)下，流形 M 的度规 g 矩阵为

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{11.2-8}$$

式(11.2-4)与 Newman–Penrose 型式(11.3-5)非常相近；这里的基矢全部是实的，NP 型式中有两个是复基矢．

在标架场下(11.2-5)退型 h_{ab} 的表示矩阵为

$$h = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{11.2-9}$$

很明显，上式中矩阵是退化的．

11.2.3 基本方程

(Σ,h) 是 (M,g) 的类光超曲面，∇_a 是 g_{ab} 的 Levi-Civita 联络，Σ 上的联络用 D_a 表示．零模曲面的 Gauss 方程和 Weingarten 方程[12]§4.2是：

$$\nabla_X Y^a = \mathrm{D}_X Y^a + l^a(K_{bc}X^bY^c), \qquad \text{Gauss 方程} \tag{11.2-10}$$

$$\nabla_X l^a = -S^a_{lb}X^b + (\tau_b X^b)l^a. \qquad \text{Weingarten 方程} \tag{11.2-11}$$

其中 $X^a, Y^a, \mathrm{D}_X Y^a, S^a_{lb}X^b \in \mathfrak{X}(\Sigma)$；$l^a \in E$；$\tau_a$ 是 Σ 上的余切场；K_{bc} 是超曲面 Σ 的**第二基本型式**，S^a_{lb} 是超曲面 Σ 的**形状因子**．得到 Gauss 方程(11.2-10)的方式与得到式(10.4-21)过程大体相仿；此时不属于 $T\Sigma$ 的切矢量必然是 l^a，不是 n^a．Weingarten 方程(11.2-11)自然也就对 l^a 求导了；所得结果中形状因子部分属于 $\mathfrak{X}(\Sigma)$；还有一部分属于 l^a，其系数是与超曲面 Σ 相关的标量函数场，此处转化成了余切矢量场 τ_b．

由 Gauss 方程(11.2-10)可得（参见式(11.2-5)）

$$g_{ab}(\nabla_X Y^a)n^b = -K_{bc}X^bY^c. \tag{11.2-12}$$

由上式容易验证第二基本型式是退化的：

$$K_{bc}X^bn^c = -g_{ab}(\nabla_X n^a)n^b = -n_a\nabla_X n^a = -\frac{1}{2}\nabla_X(n_a n^a) = 0. \tag{11.2-13}$$

非退化超曲面上诱导联络是 Levi-Civita 联络，见定理10.1．然而在退化（即类光）超曲面上，联络变得略显复杂；$\forall X^a, Y^a, Z^a \in \mathfrak{X}(\Sigma)$ 有

$$\begin{aligned} 0 =& (\nabla_X g_{ab})Y^aZ^b \overset{8.1-1}{=\!=\!=} \nabla_X(g_{ab}Y^aZ^b) - g_{ab}(\nabla_X Y^a)Z^b - g_{ab}Y^a\nabla_X Z^b \\ =& (\mathrm{D}_X h_{ab})Y^aZ^b - (g_{ab}l^aZ^b)K_{ec}X^eY^c - (g_{ab}Y^al^b)K_{ec}X^eZ^c. \end{aligned} \tag{11.2-14}$$

从上式可见类光超曲面上的诱导联络 D_a 一般不与退型 h_{ab} 相互容许．易得

命题 11.8 设 (Σ,h) 是四维闵氏流形 (M,g) 的类光超曲面．则 Σ 上诱导联络 D_a 与退型 h_{ab} 相互容许充要条件是：Σ 是 M 的全测地类光超曲面（定义见10.6）．

命题 11.9 设 (Σ,h) 是四维闵氏流形 (M,g) 的类光超曲面．则下述陈述相互等价：**(1)** Σ 是全测地超曲面．**(2)** Σ 的第二基本型式恒为零．**(3)** Σ 上存在唯一的由度规 h_{ab} 诱导的无挠联络．**(4)** $T^\perp(\Sigma)$ 是 Σ 上的 Killing 分布．**(5)** $T^\perp(\Sigma)$ 是 D_a 上平行移动不变的分布．

证明 . 证明可参考[12]第 88 页定理 2.2.

仅对于第 (4) 条略作说明. $\forall X^a, Y^a, Z^a \in \mathfrak{X}(\Sigma)$，由式(11.2-14)可得

$$\begin{aligned} 0 &= (\mathrm{D}_X h_{ab}) n^a Z^b - (g_{ab} l^a Z^b) K_{ec} X^e n^c - (g_{ab} n^a l^b) K_{ec} X^e Z^c \\ &\xrightarrow{11.2-13} 0 = -h_{ab} (\mathrm{D}_X n^a) Z^b + K_{ec} X^e Z^c. \end{aligned} \tag{11.2-15}$$

由上式及(8.5-2)可得

$$(\mathrm{D}_a n_b + \mathrm{D}_b n_a) X^a Y^b = Y^b \mathrm{D}_X n_b + X^a \mathrm{D}_Y n_a = 2 K_{ab} X^a Y^b. \tag{11.2-16}$$

由上式即可证明第 (4) 条. ■

类光超曲面的 Gauss 方程和 Codazzi 方程请参见[12]$^{\S 4.3}$. 需要指出的是：在一般情形下，类光超曲面上的 Ricci 张量不再是对称的；满足一些条件后，Ricci 张量再次对称，详见[12]$^{\S 4.3}$定理 3.2.

11.2.4 几条属性

命题 11.10 *在广义 Lorentz 度规下，与类时矢量正交的矢量必定是类空矢量.*

证明 . 设在流形 M 上有类时矢量 t^a，将其选为第零基矢量，即 $(e_0)^a = t^a$；然后将这个基矢扩充为整个流形的基矢组 $(e_\mu)^a (0 \leqslant \mu \leqslant m)$；假设这个基矢组是正交归一的，这一点总是可以做到的. 在此正交归一基矢组 $(e_\mu)^a$ 下，度规是对角矩阵 $g = \mathrm{diag}(-1, 1, \cdots, 1)$.

假设非零矢量 v^a 与 t^a 正交，即 $g_{ab} t^a v^b = 0$. 在基矢组 $(e_\mu)^a$ 下，矢量 v^a 可以展开为 $v^a = v^\mu (e_\mu)^a$，则有

$$0 = g_{ab} t^a v^b = g_{ab} (e_0)^a v^\mu (e_\mu)^b = g_{0\mu} v^\mu = -1 \cdot v^0 \quad \Rightarrow \quad v^0 = 0. \tag{11.2-17}$$

再计算

$$g_{ab} v^a v^b = -(v^0)^2 + \sum_{i=1}^{m} (v^i)^2 = \sum_{i=1}^{m} (v^i)^2 > 0. \tag{11.2-18}$$

上式说明矢量 v^a 是类空矢量. 这个命题只在广义 Lorentz 度规下成立；比如在度规 $g = \mathrm{diag}(-1, -1, +1, +1)$ 下便可举出反例. ■

因广义闵氏空间的矢量只分为类时、类空和零模，故由命题11.10必有推论：

推论 11.11 在广义 Lorentz 度规下，类时矢量与零模矢量不正交！

推论 11.12 切于类光超曲面 Σ 的矢量不能是类时的，只能是类空的或零模的.

令广义 Minkowski 流形 M 的基底是正交归一的；那么必有一基底是类时的（否则 M 的度规就变成正定的了）. 设流形 M 中有类时超曲面 Σ，它的法矢量是类空的；那么这个类时基底必然切于类时超曲面 Σ. 因此可以得到结论：类时超曲面 Σ 每一点都有类时矢量切于它.

命题 11.13 在广义 Lorentz 度规下，超曲面 Σ 每点都有零模切矢量并且没有类时切矢量，那么 Σ 必定是类光超曲面.

证明 . 用反证法. 假设 Σ 是类时的，与上面结论矛盾！

再假设 Σ 是类空的，那么它的法矢量 t^a 是类时的；而切于 Σ 的矢量必定正交于 t^a. 命题11.10告诉我们切于 Σ 的矢量都是类空的，不可能是零模的！这与命题中的条件（每点都有零模切矢量）矛盾！ ■

命题 11.14 在广义 Lorentz 度规下，设有零模矢量 $\xi^a, \eta^a \in \mathfrak{X}(M)$；如果 $g_{ab}\xi^a\eta^b = 0$，那么必有 $\xi^a \propto \eta^a$.

证明 . 选正交归一基矢组 $(e_\mu)^a$，度规是对角矩阵 $g = \mathrm{diag}(-1, 1, \cdots, 1)$. 不失一般性，假设在上述基底下，两个零模矢量的分量表达是为

$$\xi = (\kappa, \kappa, 0 \cdots, 0), \qquad \text{通过旋转基矢，总可以做到此点;} \tag{11.2-19}$$

$$\eta = (\eta^0, \eta^1, \cdots, \eta^m), \qquad \text{其中 } -(\eta^0)^2 + \sum_{i=1}^{m}(\eta^i)^2 = 0. \tag{11.2-20}$$

将 $g_{ab}\xi^a\eta^b = 0$ 用上述分量展开，有

$$g_{ab}\xi^a\eta^b = -\kappa\eta^0 + \kappa\eta^1 \overset{?}{=} 0. \tag{11.2-21}$$

上式只有在 $\xi^a \propto \eta^a$ 情形下才可能等于零. ■

类时矢量与零模矢量不正交；与零模矢量 ξ^a 正交的零模矢量只能是 $f\cdot\xi^a (f \in C^\infty(M))$；类空矢量可以与零模矢量正交，且没有太多限制. 由此可得：

命题 11.15 在广义 Lorentz 度规下，有一类光超曲面 Σ，它的法矢量是 n^a；那么切于 Σ 的矢量场只能是类空矢量场，或者是 $f \cdot n^a (f \in C^\infty(M))$.

11.3 Newman–Penrose 基本结构

在 §11.1末尾引入了包含零模基矢在内的基矢组，本节给出一种全部是零模的基矢组：Newman–Penrose Formalism[44]，简称 NP 型式. NP 型式是一种特定的四维“型式理论”，§6.3和 §8.7中的结果适用于 NP 型式. NP 型式基底是由四个零模矢量来构造的，并非一般的实正交归一基底场. 他们引入零模基矢最重要的目的是讨论旋量在广义相对论中的表示[49-50]. 对于经典（非量子）广义相对论而言，NP 理论更像一种数学技巧来计算黎曼曲率张量，进而求解爱因斯坦方程；这种技巧对于讨论类光测地线十分方便，因为其基矢是类光的；另一个可见的方便之处是列出的方程个数减少近一半，见命题11.17.

NP 理论只针对四维流形（及其子流形）而言，我们将使用类光矢量这一名词，而不用零模矢量这一术语，以显得更物理一点儿. 需要强调的是，需先了解 §6.3和 §8.7中的内容，才能更好理解 NP 理论.

11.3.1 基矢构造

设已有 Lorentz 型的正交归一实标架场 $\{(E_\mu)^a\}$ 及其对偶实标架场 $\{(E^\mu)_a\}$，度规在这个标架场可以表示为

$$g_{ab} = -(E^0)_a(E^0)_b + \sum_{i=1}^{3}(E^i)_a(E^i)_b = -l_a n_b - n_a l_b + m_a\overline{m}_b + \overline{m}_a m_b, \tag{11.3-1a}$$

$$g^{ab} = -(E_0)^a(E_0)^b + \sum_{i=1}^{3}(E_i)^a(E_i)^b = -l^a n^b - n^a l^b + m^a\overline{m}^b + \overline{m}^a m^b. \tag{11.3-1b}$$

其中 $\{l^a, n^a, m^a, \overline{m}^a\}$ 定义如下[49]Ch.3：

$$l^a \equiv (e_1)^a \overset{def}{=} \frac{1}{\sqrt{2}}\big[(E_0)^a + (E_3)^a\big], \tag{11.3-2a}$$

$$n^a \equiv (e_2)^a \overset{def}{=} \frac{1}{\sqrt{2}}\big[(E_0)^a - (E_3)^a\big], \tag{11.3-2b}$$

$$m^a \equiv (e_3)^a \overset{def}{=} \frac{1}{\sqrt{2}}\big[(E_1)^a - \mathbb{i}(E_2)^a\big], \tag{11.3-2c}$$

$$\overline{m}^a \equiv (e_4)^a \overset{def}{=} \frac{1}{\sqrt{2}}\big[(E_1)^a + \mathbb{i}(E_2)^a\big]. \tag{11.3-2d}$$

有了逆变矢量场，自然可以定义其对偶矢量场

$$l_a \equiv (e_1)_a = g_{ab}(e_1)^b = -\frac{1}{\sqrt{2}}\left((E^0)_a - (E^3)_a\right), \tag{11.3-3a}$$

$$n_a \equiv (e_2)_a = g_{ab}(e_2)^b = -\frac{1}{\sqrt{2}}\left((E^0)_a + (E^3)_a\right), \tag{11.3-3b}$$

$$m_a \equiv (e_3)_a = g_{ab}(e_3)^b = \frac{1}{\sqrt{2}}\left((E^1)_a - \mathbb{i}(E^2)_a\right), \tag{11.3-3c}$$

$$\overline{m}_a \equiv (e_4)_a = g_{ab}(e_4)^b = \frac{1}{\sqrt{2}}\left((E^1)_a + \mathbb{i}(E^2)_a\right). \tag{11.3-3d}$$

容易验证，这些基矢有如下关系

$$l_a l^a = n_a n^a = m_a m^a = \overline{m}_a \overline{m}^a = 0, \tag{11.3-4a}$$

$$l_a m^a = l_a \overline{m}^a = n_a m^a = n_a \overline{m}^a = 0, \tag{11.3-4b}$$

$$l_a n^a = -1 = -m_a \overline{m}^a. \tag{11.3-4c}$$

显然，四个基矢是**类光的**．可看出在类光标架场 $\{l^a, n^a, m^a, \overline{m}^a\}$ 下度规分量是

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = g^{\mu\nu}. \tag{11.3-5}$$

这个矩阵的逆是其自身，已标注在上面公式中；显然此标架是**刚性标架**；这样便可用 §8.7中的理论来计算黎曼曲率张量．有了度规分量表达式，便可以将前面基矢的内指标进行升降，

$$(e^1)_a = g^{1\rho}(e_\rho)_a = -(e_2)_a = -n_a, \qquad (e^2)_a = g^{2\rho}(e_\rho)_a = -(e_1)_a = -l_a;$$
$$(e^3)_a = g^{3\rho}(e_\rho)_a = +(e_4)_a = +\overline{m}_a, \qquad (e^4)_a = g^{4\rho}(e_\rho)_a = +(e_3)_a = +m_a.$$

下述对偶关系自然成立

$$(e^\mu)_a (e_\nu)^a = \delta^\mu_\nu, \qquad (e^\mu)_a (e_\mu)^b = \delta^b_a. \tag{11.3-6}$$

需要注意，标架场 $\{(E_\mu)^a\}$ 是实正交归一的；标架场 $\{l^a, n^a\}$ 是实类光的；标架场 $\{m^a, \overline{m}^a\}$ 是复类光的，且互为复共轭．

注 11.16 式(11.3-2)给出了类光基矢量的一种取法，但不一定都按照此种方法选取．NP 基矢只要类光，即满足式(11.3-4)皆可．

依照式(8.7-10)，可以得到 NP 型式的 Ricci 旋转系数

$$\omega_{\mu\nu\rho} = (\omega_{\mu\nu})_a (e_\rho)^a = (e_\mu)^a (e_\rho)^b \nabla_b (e_\nu)_a. \tag{11.3-7}$$

命题 11.17 如果把 Ricci 旋转系数 $\omega_{\mu\nu\rho}$ 下标中的指标 3 和 4 互换（保持 1 和 2 不变），那么得到其共轭复数，例如 $\omega_{123} = \bar{\omega}_{124}$，$\omega_{343} = \bar{\omega}_{434}$，$\omega_{122} = \bar{\omega}_{122}$，等等．其它量，比如黎曼张量，在 NP 标架下的分量也有相同变化规律，例如 $R_{1212} = \bar{R}_{1212}$，$R_{1224} = \bar{R}_{1223}$，$R_{3412} = \bar{R}_{4312}$，等等．

证明 ．只需把类光标架的四个基矢量(11.3-2)代入就可证明，因为其第三、四基矢是互为共轭复数．例如 $R_{1234} = R_{abcd} l^a n^b m^c \overline{m}^d$，那么 $\bar{R}_{1234} = \overline{R_{abcd} l^a n^b m^c \overline{m}^d} = R_{abcd} \overline{l^a n^b m^c \overline{m}^d} = R_{abcd} l^a n^b \overline{m}^c m^d = R_{1243}$．需注意，抽象指标下的曲率 R_{abcd} 是实流形上的张量，其本身是实的，只有其 NP 分量才是复的． ■

注 11.18 Newman–Penrose 型式的底流形仍是实流形，不是复流形．复数共轭不是代数学上的运算，故 z 和其复共轭 $\bar{z}$ 在代数学上是线性独立的；见例题3.7和3.8．因复共轭运算的引入，由命题11.17可知约一半的方程可省略不写出；但需注意，这些方程仍是线性独立的．复流形的初步知识可参考第十二章．

11.3.2 参量定义

本节定义 NP 型式理论中用到的各种参数．黎曼曲率等量会带着较为繁杂的角标，在实际求解方程时略显麻烦；用不带上下标（或较少上下标）的记号来标记这些量，可使方程显得简洁一些．因符号数量有限，而 NP 理论占用了大量符号，在后面章节中同一符号可能代表不同量的事情，需要谨慎区分．

自旋系数 注解8.55指出 Ricci 旋转系数 $\omega_{\mu\nu\rho}$ 有 $\frac{1}{2}m^2(m-1)$ 个；对于四维空间，便是 24 个；由命题11.17知只需 12 个记号便可标记所有 Ricci 旋转系数．Newman 和 Penrose 称之为自旋系数（Spin Coefficients），定义如下

$$-\kappa \equiv \omega_{311} = m^a l^b \nabla_b l_a, \tag{11.3-8a}$$

$$-\tau \equiv \omega_{312} = m^a n^b \nabla_b l_a, \tag{11.3-8b}$$

$$-\sigma \equiv \omega_{313} = m^a m^b \nabla_b l_a, \tag{11.3-8c}$$
$$-\rho \equiv \omega_{314} = m^a \overline{m}^b \nabla_b l_a, \tag{11.3-8d}$$
$$\pi \equiv \omega_{421} = \overline{m}^a l^b \nabla_b n_a, \tag{11.3-8e}$$
$$\nu \equiv \omega_{422} = \overline{m}^a n^b \nabla_b n_a, \tag{11.3-8f}$$
$$\mu \equiv \omega_{423} = \overline{m}^a m^b \nabla_b n_a, \tag{11.3-8g}$$
$$\lambda \equiv \omega_{424} = \overline{m}^a \overline{m}^b \nabla_b n_a, \tag{11.3-8h}$$
$$\epsilon \equiv \frac{1}{2}(\omega_{431} - \omega_{211}) = \frac{1}{2}(\overline{m}^a l^b \nabla_b m_a - n^a l^b \nabla_b l_a), \tag{11.3-8i}$$
$$\gamma \equiv \frac{1}{2}(\omega_{432} - \omega_{212}) = \frac{1}{2}(\overline{m}^a n^b \nabla_b m_a - n^a n^b \nabla_b l_a), \tag{11.3-8j}$$
$$\beta \equiv \frac{1}{2}(\omega_{433} - \omega_{213}) = \frac{1}{2}(\overline{m}^a m^b \nabla_b m_a - n^a m^b \nabla_b l_a), \tag{11.3-8k}$$
$$\alpha \equiv \frac{1}{2}(\omega_{434} - \omega_{214}) = \frac{1}{2}(\overline{m}^a \overline{m}^b \nabla_b m_a - n^a \overline{m}^b \nabla_b l_a). \tag{11.3-8l}$$

还可用自旋系数表示 Ricci 旋转系数

$$\begin{aligned} &\omega_{121} = \epsilon + \bar{\epsilon}, \quad \omega_{431} = \epsilon - \bar{\epsilon}, \quad \omega_{122} = \gamma + \bar{\gamma}, \\ &\omega_{124} = \alpha + \bar{\beta}, \quad \omega_{434} = \alpha - \bar{\beta}, \quad \omega_{432} = \gamma - \bar{\gamma}. \end{aligned} \tag{11.3-9}$$

其它 Ricci 旋转系数直接一望而知，或通过命题11.17一望而知.

Ricci 曲率 Ricci 曲率独立分量个数是 10 个；定义 9 个 Ricci 张量分量，结合标量曲率 R 后，便可描述 10 个 Ricci 曲率

$$\begin{aligned} &\Phi_{00} \equiv \frac{1}{2}R_{11}, \quad \Phi_{01} \equiv \frac{1}{2}R_{13}, && \Phi_{02} \equiv \frac{1}{2}R_{33}, \\ &\Phi_{10} \equiv \frac{1}{2}R_{14}, \quad \Phi_{11} \equiv \frac{1}{4}(R_{12} + R_{34}), && \Phi_{12} \equiv \frac{1}{2}R_{23}, \\ &\Phi_{20} \equiv \frac{1}{2}R_{44}, \quad \Phi_{21} \equiv \frac{1}{2}R_{24}, && \Phi_{22} \equiv \frac{1}{2}R_{22}. \end{aligned} \tag{11.3-10}$$

其中标量曲率可表示为

$$R = g^{ab}R_{ab} = -R_{12} - R_{21} + R_{34} + R_{43} = 2(R_{34} - R_{12}). \tag{11.3-11}$$

Weyl 张量 由式(8.2-14)，可得黎曼曲率与 Weyl 张量、Ricci 曲率关系

$$\begin{aligned} R_{abcd} = & C_{abcd} + \frac{1}{2}(g_{ac}R_{bd} + g_{bd}R_{ac} - g_{ad}R_{bc} - g_{bc}R_{ad}) \\ & - \frac{1}{6}(g_{ac}g_{bd} - g_{ad}g_{bc})R. \end{aligned} \tag{11.3-12}$$

Weyl 张量是无迹的，且遵循循环恒等式

$$0 = g^{ad}C_{abcd} = -C_{1bc2} - C_{2bc1} + C_{3bc4} + C_{4bc3}, \tag{11.3-13}$$

$$0 = C_{1234} + C_{1342} + C_{1423}. \tag{11.3-14}$$

当 $b = c$ 时，式(11.3-13)给出

$$C_{1314} = C_{2324} = C_{1332} = C_{1442} = 0. \tag{11.3-15}$$

当 $b \neq c$ 时，式(11.3-13)和式(11.3-14)一起给出

$$C_{1343} = C_{1213}, \quad C_{1434} = C_{1214}, \quad C_{2343} = C_{1232}, \quad C_{2434} = C_{1242}, \tag{11.3-16}$$

$$C_{3434} = C_{1212} = C_{1342} + C_{1432}, \quad C_{1234} = C_{1432} - C_{1342}. \tag{11.3-17}$$

参考表8.1，再综合上两式，可取独立 10 个分量为

$$\begin{aligned} &C_{1313}, \quad C_{1213}, \quad C_{1224}, \quad C_{1324}, \quad C_{2424}; \\ &C_{1414}, \quad C_{1214}, \quad C_{1223}, \quad C_{1423}, \quad C_{2323}. \end{aligned} \tag{11.3-18}$$

第二行是第一行的复共轭．通常，用如下 5 个复标量来表示 Weyl 张量分量

$$\Psi_0 \equiv C_{abcd}l^a m^b l^c m^d = C_{1313}, \tag{11.3-19a}$$

$$\Psi_1 \equiv C_{abcd}l^a n^b l^c m^d = C_{1213}, \tag{11.3-19b}$$

$$\Psi_2 \equiv C_{abcd}l^a m^b \overline{m}^c n^d = C_{1342}, \tag{11.3-19c}$$

$$\Psi_3 \equiv C_{abcd}l^a n^b \overline{m}^c n^d = C_{1242}, \tag{11.3-19d}$$

$$\Psi_4 \equiv C_{abcd}n^a \overline{m}^b n^c \overline{m}^d = C_{2424}. \tag{11.3-19e}$$

利用上面结果及式(11.3-12)，可将黎曼曲率分量表示成 Ricci 曲率和 Weyl 张量，计算过程略显繁琐，但并不困难，主要是符号代换．以 R_{1212} 为例来说明．

$$\begin{aligned} R_{1212} &= C_{1212} + \frac{1}{2}(g_{11}R_{22} - g_{12}R_{21} + g_{22}R_{11} - g_{21}R_{12}) - \frac{1}{6}(g_{11}g_{22} - g_{12}g_{21})R \\ &= C_{1342} + \bar{C}_{1342} + \frac{1}{2}(R_{21} + R_{12}) + \frac{1}{6}R = \Psi_2 + \bar{\Psi}_2 + 2\Phi_{11} - \frac{1}{12}R. \end{aligned} \tag{11.3-20}$$

其它黎曼曲率分量是

$$\begin{aligned} &R_{1213} = \Psi_1 + \Phi_{01}, \quad R_{1224} = -\Psi_3 - \Phi_{21}, \quad R_{1313} = \Psi_0, \quad R_{1314} = \Phi_{00}, \\ &R_{1323} = -\Phi_{02}, \ R_{1324} = -\Psi_2 - \frac{1}{12}R, \ R_{1334} = \Phi_{01} - \Psi_1, \ R_{2324} = \Phi_{22}, \\ &R_{2334} = -\bar{\Psi}_2 + \Phi_{12}, \quad R_{2424} = \Psi_4, \quad R_{3434} = \Psi_2 + \bar{\Psi}_2 - 2\Phi_{11} - \frac{1}{12}R. \end{aligned} \tag{11.3-21}$$

需要注意，这里的度规与原始论文的度规[44]整体差一负号，为了保证 NP 方程组(11.4-3)、Bianchi 恒等式(11.4-8)、麦克斯韦方程组(11.4-10)、爱因斯坦引力场方程组(11.4-11)等形式不变；我们将式(11.3-4c)、式(11.3-5)、自旋系数(11.3-8)、Weyl 标量(11.3-19)和 Ricci 标量(11.3-10)的定义取得与原论文[44]差一负号.

11.3.3 四基矢协变导数

有了自旋系数定义，直接计算便可得到基矢协变导数. 首先给出

$$\begin{aligned}\nabla_b l_a =&\nabla_b (e_1)_a = \omega_{\nu 1\tau}(e^\tau)_b (e^\nu)_a \\ =&-(\epsilon+\bar\epsilon) n_b l_a - (\gamma+\bar\gamma) l_b l_a + (\bar\alpha+\beta)\overline{m}_b l_a + (\alpha+\bar\beta) m_b l_a \\ &+\kappa n_b \overline{m}_a + \tau l_b \overline{m}_a - \sigma \overline{m}_b \overline{m}_a - \rho m_b \overline{m}_a \\ &+\bar\kappa n_b m_a + \bar\tau l_b m_a - \bar\rho \overline{m}_b m_a - \bar\sigma m_b m_a.\end{aligned} \tag{11.3-22}$$

和

$$\begin{aligned}\nabla_b n_a =&\nabla_b (e_2)_a = \omega_{\nu 2\tau}(e^\tau)_b (e^\nu)_a \\ =&(\epsilon+\bar\epsilon) n_b n_a + (\gamma+\bar\gamma) l_b n_a - (\bar\alpha+\beta)\overline{m}_b n_a - (\alpha+\bar\beta) m_b n_a \\ &-\bar\pi n_b \overline{m}_a - \bar\nu l_b \overline{m}_a + \bar\lambda \overline{m}_b \overline{m}_a + \bar\mu m_b \overline{m}_a \\ &-\pi n_b m_a - \nu l_b m_a + \mu \overline{m}_b m_a + \lambda m_b m_a.\end{aligned} \tag{11.3-23}$$

接着，只需给出一个复类光矢量的协变导数，另一个可以通过取复共轭得到.

$$\begin{aligned}\nabla_b m_a =&\nabla_b (e_3)_a = \omega_{\nu 3\tau}(e^\tau)_b (e^\nu)_a \\ =&\kappa n_b n_a + \tau l_b n_a - \sigma \overline{m}_b n_a - \rho m_b n_a \\ &-\bar\pi n_b l_a - \bar\nu l_b l_a + \bar\lambda \overline{m}_b l_a + \bar\mu m_b l_a - (\epsilon-\bar\epsilon) n_b m_a \\ &-(\gamma-\bar\gamma) l_b m_a + (\beta-\bar\alpha)\overline{m}_b m_a + (\alpha-\bar\beta) m_b m_a.\end{aligned} \tag{11.3-24}$$

11.4 Newman–Penrose 基本方程

基本方程包括如下三组关系式：对易关系、NP 方程和 Bianchi 恒等式.

11.4.1 对易关系

定义如下方向导数：

$$\mathrm{D}\equiv l^a\nabla_a,\quad \Delta\equiv n^a\nabla_a,\quad \delta\equiv m^a\nabla_a,\quad \bar{\delta}\equiv \overline{m}^a\nabla_a. \tag{11.4-1}$$

由式(8.7-17)可得基矢间对易关系，以 n^a 和 l^a 为例，

$$\begin{aligned}[n,l]^a=&\big[(e_2),(e_1)\big]^a=\big(\omega_{\sigma 12}-\omega_{\sigma 21}\big)(e^\sigma)^a=\big(\omega_{112}-\omega_{121}\big)(e^1)^a\\&+\big(\omega_{212}-\omega_{221}\big)(e^2)^a+\big(\omega_{312}-\omega_{321}\big)(e^3)^a+\big(\omega_{412}-\omega_{421}\big)(e^4)^a\\=&(\epsilon+\bar{\epsilon})n^a+(\gamma+\bar{\gamma})l^a+(-\tau-\bar{\pi})\overline{m}^a+(-\bar{\tau}-\pi)m^a\end{aligned}$$

将上式与联络 ∇_a 缩并，便可得到下列第一式，

$$\Delta\mathrm{D}-\mathrm{D}\Delta=(\gamma+\bar{\gamma})\mathrm{D}+(\epsilon+\bar{\epsilon})\Delta-(\bar{\tau}+\pi)\delta-(\tau+\bar{\pi})\bar{\delta}, \tag{11.4-2a}$$

$$\delta\mathrm{D}-\mathrm{D}\delta=(\bar{\alpha}+\beta-\bar{\pi})\mathrm{D}+\kappa\Delta-(\bar{\rho}+\epsilon-\bar{\epsilon})\delta-\sigma\bar{\delta}, \tag{11.4-2b}$$

$$\delta\Delta-\Delta\delta=-\bar{\nu}\mathrm{D}+(\tau-\bar{\alpha}-\beta)\Delta+(\mu-\gamma+\bar{\gamma})\delta+\bar{\lambda}\bar{\delta}, \tag{11.4-2c}$$

$$\bar{\delta}\delta-\delta\bar{\delta}=(\bar{\mu}-\mu)\mathrm{D}+(\bar{\rho}-\rho)\Delta+(\alpha-\bar{\beta})\delta-(\bar{\alpha}-\beta)\bar{\delta}. \tag{11.4-2d}$$

通过类似方法，可以得到剩余三式.

11.4.2 NP 方程

把第二 Cartan 结构方程在类光标架上展开得到 36 个方程（称为 NP 方程），这是 NP 理论的核心. 因命题11.17，只需写出如下 18 个；具体推导见后.

$$\mathrm{D}\tau-\Delta\kappa=\rho(\tau+\bar{\pi})+\sigma(\bar{\tau}+\pi)+\tau(\epsilon-\bar{\epsilon})-\kappa(3\gamma+\bar{\gamma})+\Psi_1+\Phi_{01},\quad [R_{1312}] \tag{11.4-3a}$$

$$\mathrm{D}\sigma-\delta\kappa=\sigma(\rho+\bar{\rho}+3\epsilon-\bar{\epsilon})-\kappa(\tau-\bar{\pi}+\bar{\alpha}+3\beta)+\Psi_0,\quad [R_{1313}] \tag{11.4-3b}$$

$$\mathrm{D}\rho-\bar{\delta}\kappa=\rho^2+\sigma\bar{\sigma}+\rho(\epsilon+\bar{\epsilon})-\bar{\kappa}\tau-\kappa(3\alpha+\bar{\beta}-\pi)+\Phi_{00},\quad [R_{1314}] \tag{11.4-3c}$$

$$\Delta\rho-\bar{\delta}\tau=\tau(\bar{\beta}-\alpha-\bar{\tau})+\rho(\gamma+\bar{\gamma})-(\rho\bar{\mu}+\sigma\lambda)+\kappa\nu-\Psi_2-\tfrac{1}{12}R,\quad [R_{1324}] \tag{11.4-3d}$$

$$\delta\tau-\Delta\sigma=\mu\sigma+\rho\bar{\lambda}+\tau(\tau+\beta-\bar{\alpha})-\sigma(3\gamma-\bar{\gamma})-\kappa\bar{\nu}+\Phi_{02},\quad [R_{1332}] \tag{11.4-3e}$$

$$\mathrm{D}\nu-\Delta\pi=\mu(\bar{\tau}+\pi)+\lambda(\tau+\bar{\pi})+\pi(\gamma-\bar{\gamma})-\nu(3\epsilon+\bar{\epsilon})+\Psi_3+\Phi_{21},\quad [R_{2421}] \tag{11.4-3f}$$

$$\delta\nu-\Delta\mu=\mu^2+\lambda\bar{\lambda}+\mu(\gamma+\bar{\gamma})-\bar{\nu}\pi+\nu(\tau-3\beta-\bar{\alpha})+\Phi_{22},\quad [R_{2423}] \tag{11.4-3g}$$

$$\mathrm{D}\mu-\delta\pi=\bar{\rho}\mu+\sigma\lambda+\pi\bar{\pi}-\mu(\epsilon+\bar{\epsilon})-\pi(\bar{\alpha}-\beta)-\nu\kappa+\Psi_2+\tfrac{1}{12}R,\quad [R_{2431}] \tag{11.4-3h}$$

$$\mathrm{D}\lambda-\bar{\delta}\pi=\rho\lambda+\bar{\sigma}\mu+\pi^2+\pi(\alpha-\bar{\beta})-\nu\bar{\kappa}-\lambda(3\epsilon-\bar{\epsilon})+\Phi_{20},\quad [R_{2441}] \tag{11.4-3i}$$

$$\Delta\lambda-\bar{\delta}\nu=-\lambda(\mu+\bar{\mu}+3\gamma-\bar{\gamma})+\nu(3\alpha+\bar{\beta}+\pi-\bar{\tau})-\Psi_4, \quad [R_{2442}] \quad (11.4\text{-}3j)$$

$$\delta\lambda-\bar{\delta}\mu=\nu(\rho-\bar{\rho})+\pi(\mu-\bar{\mu})+\mu(\alpha+\bar{\beta})+\lambda(\bar{\alpha}-3\beta)-\Psi_3+\Phi_{21}, \quad [R_{2443}] \quad (11.4\text{-}3k)$$

$$\delta\rho-\bar{\delta}\sigma=\rho(\bar{\alpha}+\beta)-\sigma(3\alpha-\bar{\beta})+\tau(\rho-\bar{\rho})+\kappa(\mu-\bar{\mu})-\Psi_1+\Phi_{01}, \quad [R_{3143}] \quad (11.4\text{-}3l)$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{D}\alpha-\bar{\delta}\epsilon=&\alpha(\rho+\bar{\epsilon}-2\epsilon)+\beta\bar{\sigma}-\bar{\beta}\epsilon-\kappa\lambda\\
&-\bar{\kappa}\gamma+\pi(\epsilon+\rho)+\Phi_{10}, && [\tfrac{1}{2}(R_{3414}-R_{1214})] \quad (11.4\text{-}3m)\\
\mathrm{D}\beta-\delta\epsilon=&\sigma(\alpha+\pi)+\beta(\bar{\rho}-\bar{\epsilon})-\kappa(\mu+\gamma)\\
&-\epsilon(\bar{\alpha}-\bar{\pi})+\Psi_1, && [\tfrac{1}{2}(R_{1213}-R_{3413})] \quad (11.4\text{-}3n)\\
\mathrm{D}\gamma-\Delta\epsilon=&\alpha(\tau+\bar{\pi})+\beta(\bar{\tau}+\pi)-\gamma(\epsilon+\bar{\epsilon})-\epsilon(\gamma+\bar{\gamma})\\
&+\tau\pi-\nu\kappa+\Psi_2+\Phi_{11}-\frac{1}{24}R, && [\tfrac{1}{2}(R_{1212}-R_{3412})] \quad (11.4\text{-}3o)\\
\delta\alpha-\bar{\delta}\beta=&\mu\rho-\lambda\sigma+\alpha\bar{\alpha}+\beta\bar{\beta}-2\alpha\beta+\gamma(\rho-\bar{\rho})\\
&+\epsilon(\mu-\bar{\mu})-\Psi_2+\Phi_{11}+\frac{1}{24}R, && [\tfrac{1}{2}(R_{1234}-R_{3434})] \quad (11.4\text{-}3p)\\
\delta\gamma-\Delta\beta=&\gamma(\tau-\bar{\alpha}-\beta)+\mu\tau-\sigma\nu-\epsilon\bar{\nu}\\
&-\beta(\gamma-\bar{\gamma}-\mu)+\alpha\bar{\lambda}+\Phi_{12}, && [\tfrac{1}{2}(R_{1232}-R_{3432})] \quad (11.4\text{-}3q)\\
\Delta\alpha-\bar{\delta}\gamma=&\nu(\rho+\epsilon)-\lambda(\tau+\beta)+\alpha(\bar{\gamma}-\bar{\mu})\\
&+\gamma(\bar{\beta}-\bar{\tau})-\Psi_3. && [\tfrac{1}{2}(R_{1242}-R_{3442})] \quad (11.4\text{-}3r)
\end{aligned}$$

每个公式后面的方括号内已指明此 NP 方程是由哪个黎曼分量所产生的.

NP 方程(11.4-3)并非全部 $\mathbb{C}$-线性独立，具体可参考[80]§4.2.

11.4.2.1 黎曼曲率分量

NP 方程的推导过程是：首先，由 §8.7.4.2节中的第二嘉当结构方程(8.7-22)得到黎曼曲率 $R_{\rho\sigma\mu\nu}$ 的 Ricci 旋转系数表示方式，通过代换变成 NP 自旋系数形式；其次，通过式(11.3-21)得到第二种表示方式，由 Weyl 标量、Ricci 标量等表出. 两者必然相等，合并同类项后得到 18 个 NP 方程.

下面以两个分量为例，给出计算过程.

黎曼曲率分量 R_{1212}： 由式(8.7-22)计算

$$\begin{aligned}
R_{1212}=&\nabla_1\omega_{122}-\nabla_2\omega_{121}+g^{\xi\zeta}\left[\omega_{12\zeta}(\omega_{2\xi1}-\omega_{1\xi2})+\omega_{\zeta22}\omega_{1\xi1}-\omega_{\zeta21}\omega_{1\xi2}\right]\\
=&\mathrm{D}(\gamma+\bar{\gamma})-\Delta(\epsilon+\bar{\epsilon})+g^{12}\left[\omega_{122}(\omega_{211}-\omega_{112})+\omega_{222}\omega_{111}-\omega_{221}\omega_{112}\right]
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&+ g^{21}\left[\omega_{121}(\omega_{221}-\omega_{122})+\omega_{122}\omega_{121}-\omega_{121}\omega_{122}\right]\\
&+ g^{34}\left[\omega_{124}(\omega_{231}-\omega_{132})+\omega_{422}\omega_{131}-\omega_{421}\omega_{132}\right]\\
&+ g^{43}\left[\omega_{123}(\omega_{241}-\omega_{142})+\omega_{322}\omega_{141}-\omega_{321}\omega_{142}\right]\\
=&\mathrm{D}(\gamma+\bar\gamma)-\Delta(\epsilon+\bar\epsilon)+2\omega_{121}\omega_{122}\\
&+\omega_{124}(\omega_{231}-\omega_{132})+\omega_{422}\omega_{131}-\omega_{421}\omega_{132}\\
&+\omega_{123}(\omega_{241}-\omega_{142})+\omega_{322}\omega_{141}-\omega_{321}\omega_{142}\\
=&\mathrm{D}(\gamma+\bar\gamma)-\Delta(\epsilon+\bar\epsilon)+2(\epsilon+\bar\epsilon)(\gamma+\bar\gamma)\\
&+(\alpha+\bar\beta)(-\bar\pi-\tau)+\nu\kappa-\pi\tau+(\bar\alpha+\beta)(-\pi-\bar\tau)+\bar\nu\bar\kappa-\bar\pi\bar\tau
\end{aligned}
$$

其次，还可以表示为式(11.3-20)的形式，两者必然相等，所以有

$$
\begin{aligned}
\Psi_2+\bar\Psi_2+2\Phi_{11}-\frac{1}{12}R=&\mathrm{D}(\gamma+\bar\gamma)-\Delta(\epsilon+\bar\epsilon)+2(\epsilon+\bar\epsilon)(\gamma+\bar\gamma)\\
&-(\alpha+\bar\beta)(\bar\pi+\tau)+\nu\kappa-\pi\tau-(\bar\alpha+\beta)(\pi+\bar\tau)+\bar\nu\bar\kappa-\bar\pi\bar\tau
\end{aligned}
\tag{11.4-4}
$$

黎曼曲率分量 R_{3412}**：** 由式(8.7-22)计算

$$
\begin{aligned}
R_{3412}=&\mathrm{D}(\bar\gamma-\gamma)-\Delta(\bar\epsilon-\epsilon)+(\bar\gamma-\gamma)(\bar\epsilon+\epsilon)-\nu\kappa+\tau\pi+(\bar\epsilon-\epsilon)(\bar\gamma+\gamma)\\
&-\bar\tau\bar\pi+\bar\kappa\bar\nu+(\bar\beta-\alpha)(-\bar\pi-\tau)+(\bar\alpha-\beta)(-\pi-\bar\tau)
\end{aligned}
$$

由(11.3-21)得到另一种表示 $R_{3412}=R_{1432}-R_{1342}=\bar\Psi_2-\Psi_2$，两式必相等.

$$
\begin{aligned}
\bar\Psi_2-\Psi_2=&\mathrm{D}(\bar\gamma-\gamma)-\Delta(\bar\epsilon-\epsilon)+(\bar\gamma-\gamma)(\bar\epsilon+\epsilon)-\nu\kappa+\tau\pi+(\bar\epsilon-\epsilon)(\bar\gamma+\gamma)\\
&-\bar\tau\bar\pi+\bar\kappa\bar\nu+(\bar\beta-\alpha)(-\bar\pi-\tau)+(\bar\alpha-\beta)(-\pi-\bar\tau)
\end{aligned}
\tag{11.4-5}
$$

现在可以计算 $(R_{1212}-R_{3412})/2$，即式(11.4-4)减去(11.4-5)，经计算得(11.4-3o).

11.4.3 Bianchi 恒等式

第8.2.5节指出 Bianchi 恒等式只有 20 个代数上独立的恒等式，它们是

$$
R_{12[12;3]}=0,\quad R_{12[12;4]}=0,\quad R_{12[13;4]}=0,\quad R_{12[23;4]}=0; \tag{11.4-6a}
$$

$$
R_{13[12;3]}=0,\quad R_{13[12;4]}=0,\quad R_{13[13;4]}=0,\quad R_{13[23;4]}=0; \tag{11.4-6b}
$$

$$
R_{34[12;3]}=0,\quad R_{34[12;4]}=0,\quad R_{34[13;4]}=0,\quad R_{34[23;4]}=0; \tag{11.4-6c}
$$

$$R_{24[12;3]}=0,\quad R_{24[12;4]}=0,\quad R_{24[13;4]}=0,\quad R_{24[23;4]}=0. \tag{11.4-6d}$$
$$R_{14[12;3]}=0,\quad R_{14[12;4]}=0,\quad R_{14[13;4]}=0,\quad R_{14[23;4]}=0; \tag{11.4-6e}$$
$$R_{23[12;3]}=0,\quad R_{23[12;4]}=0,\quad R_{23[13;4]}=0,\quad R_{23[23;4]}=0. \tag{11.4-6f}$$

根据命题11.17可不写出(11.4-6e)和(11.4-6f),而用其它式子的复共轭表示;$R_{12[12;4]}=0$ 也可表示为 $\bar{R}_{12[12;3]}=0$. 考虑到 §8.2.5节中的那 4 个代数恒等式，在类光标架下上述方程最终独立的方程是

$$R_{13[12;3]}=0,\quad R_{13[12;4]}=0,\quad R_{13[13;4]}=0,\quad R_{13[23;4]}=0; \tag{11.4-7a}$$
$$R_{24[12;3]}=0,\quad R_{24[12;4]}=0,\quad R_{24[13;4]}=0,\quad R_{24[23;4]}=0; \tag{11.4-7b}$$
$$R_{34[13;4]}=0,\quad R_{34[23;4]}=0,\quad R_{12[12;3]}=0. \tag{11.4-7c}$$

将它们写成分量方程[6]§8e[57]§7.3，为

$$\begin{aligned}\bar{\delta}\Psi_0-\mathrm{D}\Psi_1+\mathrm{D}\Phi_{01}-\delta\Phi_{00}&=(4\alpha-\pi)\Psi_0-2(2\rho+\epsilon)\Psi_1+3\kappa\Psi_2\\&\quad+(\bar{\pi}-2\bar{\alpha}-2\beta)\Phi_{00}+2(\epsilon+\bar{\rho})\Phi_{01}+2\sigma\Phi_{10}-2\kappa\Phi_{11}-\bar{\kappa}\Phi_{02},\end{aligned} \tag{11.4-8a}$$
$$\begin{aligned}\Delta\Psi_0-\delta\Psi_1+\mathrm{D}\Phi_{02}-\delta\Phi_{01}&=(4\gamma-\mu)\Psi_0-2(2\tau+\beta)\Psi_1+3\sigma\Psi_2\\&\quad+(2\epsilon-2\bar{\epsilon}+\bar{\rho})\Phi_{02}+2(\bar{\pi}-\beta)\Phi_{01}+2\sigma\Phi_{11}-2\kappa\Phi_{12}-\bar{\lambda}\Phi_{00},\end{aligned} \tag{11.4-8b}$$
$$\begin{aligned}\Delta\Psi_1-\delta\Psi_2-\Delta\Phi_{01}+\bar{\delta}\Phi_{02}-\frac{1}{12}\delta R&=\nu\Psi_0+2(\gamma-\mu)\Psi_1-3\tau\Psi_2+2\sigma\Psi_3\\&\quad+(\bar{\tau}-2\bar{\beta}+2\alpha)\Phi_{02}+2(\bar{\mu}-\gamma)\Phi_{01}+2\tau\Phi_{11}-2\rho\Phi_{12}-\bar{\nu}\Phi_{00},\end{aligned} \tag{11.4-8c}$$
$$\begin{aligned}\mathrm{D}\Psi_2-\bar{\delta}\Psi_1+\Delta\Phi_{00}-\bar{\delta}\Phi_{01}+\frac{1}{12}\mathrm{D}R&=-\lambda\Psi_0-2(\alpha-\pi)\Psi_1+3\rho\Psi_2-2\kappa\Psi_3\\&\quad+(2\gamma+2\bar{\gamma}-\bar{\mu})\Phi_{00}-2(\bar{\tau}+\alpha)\Phi_{01}-2\tau\Phi_{10}+2\rho\Phi_{11}+\bar{\sigma}\Phi_{02},\end{aligned} \tag{11.4-8d}$$
$$\begin{aligned}\bar{\delta}\Psi_3-\mathrm{D}\Psi_4+\bar{\delta}\Phi_{21}-\Delta\Phi_{20}&=3\lambda\Psi_2-2(\alpha+2\pi)\Psi_3+(4\epsilon-\rho)\Psi_4\\&\quad+(2\gamma-2\bar{\gamma}+\bar{\mu})\Phi_{20}+2(\bar{\tau}-\alpha)\Phi_{21}+2\lambda\Phi_{11}-2\nu\Phi_{10}-\bar{\sigma}\Phi_{22},\end{aligned} \tag{11.4-8e}$$
$$\begin{aligned}\Delta\Psi_3-\delta\Psi_4+\bar{\delta}\Phi_{22}-\Delta\Phi_{21}&=3\nu\Psi_2-2(\gamma+2\mu)\Psi_3+(4\beta-\tau)\Psi_4\\&\quad+(\bar{\tau}-2\bar{\beta}-2\alpha)\Phi_{22}+2(\gamma+\bar{\mu})\Phi_{21}+2\lambda\Phi_{12}-2\nu\Phi_{11}-\bar{\nu}\Phi_{20},\end{aligned} \tag{11.4-8f}$$
$$\begin{aligned}\Delta\Psi_2-\delta\Psi_3+\mathrm{D}\Phi_{22}-\delta\Phi_{21}+\frac{1}{12}\Delta R&=2\nu\Psi_1-3\mu\Psi_2+2(\beta-\tau)\Psi_3+\sigma\Psi_4\\&\quad+(\bar{\rho}-2\epsilon-2\bar{\epsilon})\Phi_{22}+2(\bar{\pi}+\beta)\Phi_{21}+2\pi\Phi_{12}-2\mu\Phi_{11}-\bar{\lambda}\Phi_{20},\end{aligned} \tag{11.4-8g}$$
$$\mathrm{D}\Psi_3-\bar{\delta}\Psi_2-\mathrm{D}\Phi_{21}+\delta\Phi_{20}-\frac{1}{12}\bar{\delta}R=-2\lambda\Psi_1+3\pi\Psi_2-2(\epsilon-\rho)\Psi_3-\kappa\Psi_4$$

$$+(2\bar{\alpha}-2\beta-\bar{\pi})\Phi_{20}-2(\bar{\rho}-\epsilon)\Phi_{21}-2\pi\Phi_{11}+2\mu\Phi_{10}+\bar{\kappa}\Phi_{22}, \tag{11.4-8h}$$

$$\mathrm{D}\Phi_{11}-\delta\Phi_{10}-\bar{\delta}\Phi_{01}+\Delta\Phi_{00}+\frac{1}{8}\mathrm{D}R=\bar{\sigma}\Phi_{02}+\sigma\Phi_{20}-\bar{\kappa}\Phi_{12}-\kappa\Phi_{21}$$
$$+(2\gamma+2\bar{\gamma}-\mu-\bar{\mu})\Phi_{00}+(\pi-2\alpha-2\bar{\tau})\Phi_{01}+(\bar{\pi}-2\bar{\alpha}-2\tau)\Phi_{10}, \tag{11.4-8i}$$

$$\mathrm{D}\Phi_{12}-\delta\Phi_{11}-\bar{\delta}\Phi_{02}+\Delta\Phi_{01}+\frac{1}{8}\delta R=\bar{\nu}\Phi_{00}-\bar{\lambda}\Phi_{10}+\sigma\Phi_{21}-\kappa\Phi_{22}+2(\bar{\pi}-\tau)\Phi_{11}$$
$$+(2\bar{\beta}-2\alpha+\pi-\bar{\tau})\Phi_{02}+(\bar{\rho}+2\rho-2\bar{\epsilon})\Phi_{12}+(2\gamma-2\bar{\mu}-\mu)\Phi_{01}, \tag{11.4-8j}$$

$$\mathrm{D}\Phi_{22}-\delta\Phi_{21}-\bar{\delta}\Phi_{12}+\Delta\Phi_{11}+\frac{1}{8}\Delta R=\nu\Phi_{01}+\bar{\nu}\Phi_{10}-\bar{\lambda}\Phi_{20}-\lambda\Phi_{02}-2(\mu+\bar{\mu})\Phi_{11}$$
$$+(\rho+\bar{\rho}-2\epsilon-2\bar{\epsilon})\Phi_{22}+(2\bar{\beta}+2\pi-\bar{\tau})\Phi_{12}+(2\beta+2\bar{\pi}-\tau)\Phi_{21}. \tag{11.4-8k}$$

当只考虑真空爱因斯坦引力场方程时，上式最后三个恒为零，前八个式子及其复共轭可描述全部 Bianchi 恒等式.

11.4.4 麦克斯韦方程组和爱因斯坦方程组

我们还没有系统介绍麦氏、爱氏理论；在这里，先给出两个方程的 NP 形式以备后用；详细推导过程可参考[6]§1.8(f)或[44]. 实反对称电磁场张量 F_{ab} 有六个独立分量，现在用复数来表示，则只需三个复变量即可，它们是

$$\Phi_0=F_{13}=F_{ab}l^am^b, \tag{11.4-9a}$$

$$\Phi_1=\frac{1}{2}(F_{12}+F_{43})=\frac{1}{2}F_{ab}(l^an^b+\overline{m}^am^b), \tag{11.4-9b}$$

$$\Phi_2=F_{42}=F_{ab}\overline{m}^an^b. \tag{11.4-9c}$$

无源麦克斯韦方程组（$\nabla_bF^{ab}=0,\ \nabla_{[a}F_{bc]}=0$）在 NP 形式中具体表示为

$$\mathrm{D}\Phi_1-\bar{\delta}\Phi_0=(\pi-2\alpha)\Phi_0+2\rho\Phi_1-\kappa\Phi_2, \tag{11.4-10a}$$

$$\mathrm{D}\Phi_2-\bar{\delta}\Phi_1=-\lambda\Phi_0+2\pi\Phi_1+(\rho-2\epsilon)\Phi_2, \tag{11.4-10b}$$

$$\Delta\Phi_0-\delta\Phi_1=(2\gamma-\mu)\Phi_0-2\tau\Phi_1+\sigma\Phi_2, \tag{11.4-10c}$$

$$\Delta\Phi_1-\delta\Phi_2=\nu\Phi_0-2\mu\Phi_1+(2\beta-\tau)\Phi_2. \tag{11.4-10d}$$

我们只考虑电磁能动张量（$T_{ab}=F_{ac}F_b^{\cdot c}-\frac{1}{4}g_{ab}F_{cd}F^{cd}$），此时，爱因斯坦引力场方程组（$R_{ab}=8\pi(T_{ab}-\frac{1}{2}g_{ab}T)$）在 NP 形式中表示为

$$\Phi_{\mu\nu}=\Phi_\mu\bar{\Phi}_\nu,\qquad \mu,\nu=0,1,2. \tag{11.4-11}$$

其中 $\Phi_{\mu\nu}$ 定义见(11.3-10).

11.5 Petrov 分类

对 Weyl 张量进行代数分类会令黑洞研究变得简单，Petrov 最早研究了这个问题；此处采用文献[6]§1.9中的叙述.

11.5.1 四类光基矢变换

给定四维闵氏时空 (M,g)，其切空间是平直的，即 Minkowski 时空；若对其实基矢 $(E_\mu)^a$ 实施 Lorentz 变换，可对 NP 四个类光基矢(11.3-2)产生如下三种类型变换：甲、乙和丙. 我们分别叙述它们.

甲：保持实类光基矢 l^a 不变，四个基矢变换是：

$$l^a \to l^a, \quad m^a \to m^a + zl^a, \quad \overline{m}^a \to \overline{m}^a + \bar{z}l^a, \text{ 和 } n^a \to n^a + \bar{z}m^a + z\overline{m}^a + z\bar{z}l^a.$$

其中 z 是流形 M 上的复数函数.

甲类旋转对应的 Lorentz 变换为式(15.7-42)，即下式

$$S_1(\alpha,\beta) = \begin{bmatrix} 1+\zeta & \alpha & \beta & -\zeta \\ \alpha & 1 & 0 & -\alpha \\ \beta & 0 & 1 & -\beta \\ \zeta & \alpha & \beta & 1-\zeta \end{bmatrix}, \qquad \text{其中 } \zeta = \frac{1}{2}(\alpha^2+\beta^2). \tag{11.5-1}$$

可以验证 S_1 是 Lorentz 变换（$S_1^T \eta S_1 = \eta$）. 将它作用在四个实基矢上

$$\begin{bmatrix} (E_0')^a \\ (E_1')^a \\ (E_2')^a \\ (E_3')^a \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} (E_0)^a \\ (E_1)^a \\ (E_2)^a \\ (E_3)^a \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1+\zeta & \alpha & \beta & -\zeta \\ \alpha & 1 & 0 & -\alpha \\ \beta & 0 & 1 & -\beta \\ \zeta & \alpha & \beta & 1-\zeta \end{bmatrix},$$

用上式得到的新基矢 $(E_\mu')^a$ 构造 NP 类光基矢符合甲中的变换，对应的 $z = \alpha - \mathrm{i}\beta$（$\alpha$、$\beta$ 为实数）.

甲类变换会给 NP 中各量带来改变，比如考虑 Weyl 标量 Ψ_0，有

$$\Psi_0 = C_{1313} \to C_{abcd} l^a (m^b + zl^b) l^c (m^d + zl^d) = C_{1313}.$$

经过简单计算，Ψ_0 是不变的．再计算一个略微复杂一点的

$$\begin{aligned}\Psi_1 =&C_{1213} \to C_{abcd}l^a(n^b+\bar{z}m^b+z\overline{m}^b+z\bar{z}l^b)l^c(m^d+zl^d)\\ =&C_{1213}+\bar{z}C_{1313}+zC_{1413}+z\bar{z}C_{1113}+zC_{1112}+z\bar{z}C_{1113}+z^2C_{1411}+z^2C_{1111}\\ =&\Psi_1+\bar{z}\Psi_0.\end{aligned}$$

其它各量变化如下

$$\begin{cases}\Psi_0\to\Psi_0, \quad \Psi_1\to\Psi_1+\bar{z}\Psi_0, \quad \Psi_2\to\Psi_2+2\bar{z}\Psi_1+\bar{z}^2\Psi_0,\\ \Psi_3\to\Psi_3+3\bar{z}\Psi_2+3\bar{z}^2\Psi_1+\bar{z}^3\Psi_0,\\ \Psi_4\to\Psi_4+4\bar{z}\Psi_3+6\bar{z}^2\Psi_2+4\bar{z}^3\Psi_1+\bar{z}^4\Psi_0.\end{cases} \tag{11.5-2}$$

用类似方法可以得出自旋系数变换如下

$$\begin{cases}\kappa\to\kappa, \quad \sigma\to\sigma+z\kappa, \quad \rho\to\rho+\bar{z}\kappa, \quad \epsilon\to\epsilon+\bar{z}\kappa,\\ \tau\to\tau+z\rho+\bar{z}\sigma+z\bar{z}\kappa, \quad \pi\to\pi+2\bar{z}\epsilon+\bar{z}^2\kappa+\mathrm{D}\bar{z},\\ \alpha\to\alpha+\bar{z}(\rho+\epsilon)+\bar{z}^2\kappa, \quad \beta\to\beta+z\epsilon+\bar{z}\sigma+z\bar{z}\kappa,\\ \gamma\to\gamma+z\alpha+\bar{z}(\beta+\tau)+z\bar{z}(\rho+\epsilon)+\bar{z}^2\sigma+z\bar{z}^2\kappa,\\ \lambda\to\lambda+\bar{z}(2\alpha+\pi)+\bar{z}^2(\rho+2\epsilon)+\bar{z}^3\kappa+\bar{\delta}\bar{z}\bar{z}\mathrm{D}\bar{z},\\ \mu\to\mu+z\pi+2\bar{z}\beta+2z\bar{z}\epsilon+\bar{z}^2\sigma+z\bar{z}^2\kappa+\delta\bar{z}+z\mathrm{D}\bar{z},\\ \nu\to\nu+z\lambda+\bar{z}(\mu+2\lambda)+\bar{z}^2(\tau+2\beta)+\bar{z}^3\sigma+z\bar{z}(\pi+2\alpha)\\ \quad +z\bar{z}^2(\rho+2\epsilon)+z\bar{z}^3\kappa+(\Delta+\bar{z}\delta+z\bar{\delta}+z\bar{z}\mathrm{D})\bar{z}.\end{cases} \tag{11.5-3}$$

表示麦克斯韦场的标量变成

$$\Phi_0\to\Phi_0, \quad \Phi_1\to\Phi_1+\bar{z}\Phi_0, \quad \Phi_2\to\Phi_2+2\bar{z}\Phi_1+\bar{z}^2\Phi_0. \tag{11.5-4}$$

用于爱因斯坦场方程的 Ricci 曲率(11.3-10)变化是

$$\begin{aligned}\Phi_{00} =&\frac{1}{2}R_{11}\to\frac{1}{2}R_{11}=\Phi_{00}\\ \Phi_{01} =&\frac{1}{2}R_{13}\to\frac{1}{2}R_{ab}l^a(m^b+zl^b)=\frac{1}{2}R_{13}+z\frac{1}{2}R_{11}=\Phi_{01}+z\Phi_{00}\\ \Phi_{02} =&\frac{1}{2}R_{33}\to\frac{1}{2}R_{ab}(m^am^b+zl^am^b+zm^al^b+z^2l^al^b)=\Phi_{02}+2z\Phi_{01}+z^2\Phi_{00}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Phi_{10} =&\frac{1}{2}R_{14} \to \frac{1}{2}R_{ab}l^a(\overline{m}^b + \bar{z}l^b) = \Phi_{10} + \bar{z}\Phi_{00}\\
\Phi_{12} =&\frac{1}{2}R_{23} \to \Phi_{12} + \bar{z}\Phi_{02} + 2z\Phi_{11} + 2z\bar{z}\Phi_{01} + z^2\Phi_{10} + z^2\bar{z}\Phi_{00}\\
\Phi_{20} =&\frac{1}{2}R_{44} \to \frac{1}{2}R_{ab}(\overline{m}^a\overline{m}^b + \bar{z}l^a\overline{m}^b + \bar{z}\overline{m}^a l^b + \bar{z}^2 l^a l^b) = \Phi_{20} + 2\bar{z}\Phi_{10} + \bar{z}^2\Phi_{00}\\
\Phi_{21} =&\frac{1}{2}R_{24} \to \Phi_{21} + z\Phi_{20} + 2\bar{z}\Phi_{11} + 2z\bar{z}\Phi_{10} + \bar{z}^2\Phi_{01} + z\bar{z}^2\Phi_{00}\\
\Phi_{22} =&\frac{1}{2}R_{22} \to \Phi_{22} + 2z\bar{z}^2\Phi_{01} + \bar{z}^2\Phi_{02} + 2\bar{z}\Phi_{12} + 4z\bar{z}\Phi_{11} + 2z\Phi_{21}\\
&+ z^2\Phi_{20} + 2z^2\bar{z}\Phi_{10} + z^2\bar{z}^2\Phi_{00}\\
\Phi_{11} =&\frac{1}{4}(R_{12} + R_{34}) \to \Phi_{11} + \bar{z}\Phi_{01} + z\Phi_{10} + z\bar{z}\Phi_{00}\\
R =&2(R_{34} - R_{12}) \to R
\end{aligned}$$

乙：保持实类光基矢 n^a 不变，四个基矢变换是

$$n^a \to n^a, \quad m^a \to m^a + wn^a, \quad \overline{m}^a \to \overline{m}^a + \bar{w}n^a, \text{ 和 } l^a \to l^a + \bar{w}m^a + w\overline{m}^a + w\bar{w}n^a.$$

其中 w 是流形 M 上的复数函数．乙类旋转对应的 Lorentz 变换为式(11.5-1)的转置，即 $S_2(\alpha,\beta) = S_1^T(\alpha,\beta)$．将它作用在四个实基矢上，得到新实基矢 $(E'_\mu)^a$，用此构造 NP 类光基矢符合乙中的变换，对应的 $w = \alpha - \mathbb{i}\beta$．这类变换只需将甲中的 l^a 和 n^a 互换即可，其效果是

$$\begin{cases}
\Psi_0 \leftrightarrows \overline{\Psi}_4, \quad \Psi_1 \leftrightarrows \overline{\Psi}_3, \quad \Psi_2 \leftrightarrows \overline{\Psi}_2; \quad \Phi_0 \leftrightarrows -\overline{\Phi}_2, \quad \Phi_1 \leftrightarrows -\overline{\Phi}_1;\\
\kappa \leftrightarrows -\bar{\nu}, \ \rho \leftrightarrows -\bar{\mu}, \ \sigma \leftrightarrows -\bar{\lambda}, \ \alpha \leftrightarrows -\bar{\beta}, \ \epsilon \leftrightarrows -\bar{\gamma}, \ \pi \leftrightarrows -\bar{\tau}
\end{cases} \tag{11.5-5}$$

特别的，乙类旋转对 Weyl 标量的影响是

$$\begin{cases}
\Psi_0 \to \Psi_0 + 4w\Psi_1 + 6w^2\Psi_2 + 4w^3\Psi_3 + w^4\Psi_4,\\
\Psi_1 \to \Psi_1 + 3w\Psi_2 + 3w^2\Psi_3 + w^3\Psi_4,\\
\Psi_2 \to \Psi_2 + 2w\Psi_3 + w^2\Psi_4, \quad \Psi_3 \to \Psi_3 + w\Psi_4, \quad \Psi_4 \to \Psi_4.
\end{cases} \tag{11.5-6}$$

用于爱因斯坦场方程的 Ricci 曲率(11.3-10)变化是

$$\begin{aligned}
\Phi_{00} =&\frac{1}{2}R_{11} \to \Phi_{22} + 2w\bar{w}^2\Phi_{01} + \bar{w}^2\Phi_{02} + 2\bar{w}\Phi_{12} + 4w\bar{w}\Phi_{11} + 2w\Phi_{21}\\
&+ w^2\Phi_{20} + 2w^2\bar{w}\Phi_{10} + w^2\bar{w}^2\Phi_{00}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\Phi_{01} =& \frac{1}{2}R_{13} \to \Phi_{01} + \bar{w}\Phi_{02} + 2w\Phi_{11} + 2w\bar{w}\Phi_{12} + w^2\Phi_{21} + w^2\bar{w}\Phi_{22} \\
\Phi_{02} =& \frac{1}{2}R_{33} \to \frac{1}{2}R_{ab}(m^a m^b + w n^a m^b + w m^a n^b + w^2 n^a n^b) = \Phi_{02} + 2w\Phi_{12} + w^2\Phi_{22} \\
\Phi_{10} =& \frac{1}{2}R_{14} \to \Phi_{10} + w\Phi_{20} + 2\bar{w}\Phi_{11} + 2w\bar{w}\Phi_{21} + \bar{w}^2\Phi_{12} + w\bar{w}^2\Phi_{22} \\
\Phi_{12} =& \frac{1}{2}R_{23} \to \frac{1}{2}R_{ab}n^a(m^b + w n^b) = \Phi_{12} + w\Phi_{22} \\
\Phi_{20} =& \frac{1}{2}R_{44} \to \frac{1}{2}R_{ab}(\overline{m}^a\overline{m}^b + \bar{w}n^a\overline{m}^b + \bar{w}\overline{m}^a n^b + \bar{w}^2 n^a n^b) = \Phi_{20} + 2\bar{w}\Phi_{21} + \bar{w}^2\Phi_{22} \\
\Phi_{21} =& \frac{1}{2}R_{24} \to \frac{1}{2}R_{ab}n^a(\overline{m}^b + \bar{w}n^b) = \Phi_{21} + \bar{w}\Phi_{22} \\
\Phi_{22} =& \frac{1}{2}R_{22} \to \frac{1}{2}R_{ab}n^a n^b = \Phi_{22} \\
\Phi_{11} =& \frac{1}{4}(R_{12} + R_{34}) \to \Phi_{11} + \bar{w}\Phi_{12} + w\Phi_{21} + w\bar{w}\Phi_{22} \\
R =& 2(R_{34} - R_{12}) \to R
\end{aligned}
$$

丙：保持实类光基矢 l^a 和 n^a 方向不变，并在 $(m^a, \overline{m}^a)$ 平面上将基矢 m^a 和 $\overline{m}^a$ 旋转 θ 角；四个基矢变换是

$$
l^a \to A^{-1}l^a, \quad n^a \to An^a, \quad m^a \to e^{\mathrm{i}\theta}m^a, \text{ 和 } \overline{m}^a \to e^{-\mathrm{i}\theta}\overline{m}^a.
$$

其中 A 和 θ 是两个实数函数．丙类旋转对应的 Lorentz 变换是

$$
S_3(A,\theta) = \begin{bmatrix}
\frac{1}{2}(A^{-1} + A) & 0 & 0 & \frac{1}{2}(A^{-1} - A) \\
0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\
0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\
\frac{1}{2}(A^{-1} - A) & 0 & 0 & \frac{1}{2}(A^{-1} + A)
\end{bmatrix} \tag{11.5-7}
$$

可验证 S_3 是 Lorentz 变换，将它作用在四个实基矢上，得到新实基矢 $(E'_\mu)^a$，用此构造 NP 类光基矢符合丙中变换．此变换对 Weyl 标量和麦氏标量的影响是

$$
\begin{cases}
\Psi_0 \to A^{-2}e^{2\mathrm{i}\theta}\Psi_0,\ \Psi_1 \to A^{-1}e^{\mathrm{i}\theta}\Psi_1,\ \Psi_2 \to \Psi_2,\ \Psi_3 \to Ae^{-\mathrm{i}\theta}\Psi_3, \\
\Psi_4 \to A^2e^{-2\mathrm{i}\theta}\Psi_4;\ \Phi_0 \to A^{-1}e^{\mathrm{i}\theta}\Phi_0,\ \Phi_1 \to \Phi_1,\ \Phi_2 \to Ae^{-\mathrm{i}\theta}\Phi_2;
\end{cases} \tag{11.5-8}
$$

对自旋系数的影响是

$$\begin{cases} \kappa \to A^{-2}e^{\mathrm{i}\theta}\kappa,\ \sigma \to A^{-1}e^{2\mathrm{i}\theta}\sigma,\ \rho \to A^{-1}\rho\ \tau \to e^{\mathrm{i}\theta}\tau,\ \pi \to e^{-\mathrm{i}\theta}\pi, \\ \lambda \to Ae^{\mathrm{i}\theta}\lambda, \quad \nu \to A^{2}e^{-\mathrm{i}\theta}\nu, \quad \epsilon \to A^{-1}\epsilon - \frac{1}{2}A^{-2}\mathrm{D}A + \frac{\mathrm{i}}{2}A^{-1}\mathrm{D}\theta, \\ \gamma \to A\gamma - \frac{1}{2}\Delta A + \frac{\mathrm{i}}{2}A\Delta\theta, \quad \alpha \to e^{-\mathrm{i}\theta}\alpha + \frac{\mathrm{i}}{2}e^{-\mathrm{i}\theta}\bar{\delta}\theta - \frac{1}{2}A^{-1}e^{-\mathrm{i}\theta}\bar{\delta}A, \\ \mu \to A\mu, \quad \beta \to e^{\mathrm{i}\theta}\beta + \frac{\mathrm{i}}{2}e^{\mathrm{i}\theta}\bar{\delta}\theta - \frac{1}{2}A^{-1}e^{\mathrm{i}\theta}\bar{\delta}A. \end{cases} \tag{11.5-9}$$

用于爱因斯坦场方程的 Ricci 曲率(11.3-10)变化是

$$\begin{cases} \Phi_{00} \to A^{-2}\Phi_{00}, \quad \Phi_{01} \to A^{-1}e^{\mathrm{i}\theta}\Phi_{01}, \quad \Phi_{02} \to e^{2\mathrm{i}\theta}\Phi_{02}, \\ \Phi_{10} \to A^{-1}e^{-\mathrm{i}\theta}\Phi_{10}, \quad \Phi_{11} \to \Phi_{11}, \quad \Phi_{12} \to Ae^{\mathrm{i}\theta}\Phi_{12}, \\ \Phi_{20} \to e^{-2\mathrm{i}\theta}\Phi_{20},\ \Phi_{21} \to Ae^{-\mathrm{i}\theta}\Phi_{21},\ \Phi_{22} \to A^{2}\Phi_{22},\ R \to R. \end{cases} \tag{11.5-10}$$

其中 z 和 w 是流形 M 上的两个复数函数，A 和 θ 是两个实数函数；Lorentz 群包含六个实参量，上面三种变化同样包含六个实参量，两者相互对应.

11.5.2 主类光矢量方法

有两种等价的方法来将 Weyl 张量分类，分别是本征值方法和主类光矢量方法；我们只叙述主类光矢量方法. 在 NP 类光四标架中 Weyl 张量化为五个标量：$\Psi_0,\ \Psi_1,\ \Psi_2,\ \Psi_3,\ \Psi_4$；这些标量取值依赖于标架方向的选取，也依赖于所经受的 Lorentz 变换的六个参数. 如果标架选取适当，则 Weyl 标量中会有多个为零；对这个问题的回答导致了 Petrov 分类.

假设 $\Psi_4 \neq 0$，若 $\Psi_4 = 0$，对标架实施 甲 类变换，则它就不再为零了.

现在考虑有参数 w 的 乙 类变换，Weyl 标量变换方程是(11.5-6)，即下式

$$\begin{cases} \Psi_0^{(n)} = \Psi_0 + 4w\Psi_1 + 6w^2\Psi_2 + 4w^3\Psi_3 + w^4\Psi_4, \\ \Psi_1^{(n)} = \Psi_1 + 3w\Psi_2 + 3w^2\Psi_3 + w^3\Psi_4, \\ \Psi_2^{(n)} = \Psi_2 + 2w\Psi_3 + w^2\Psi_4,\ \Psi_3^{(n)} = \Psi_3 + w\Psi_4,\ \Psi_4^{(n)} = \Psi_4. \end{cases} \tag{11.5-11}$$

其中标记上标“(n)”的 Ψ 是新值，它由旧值变换而来. 设有代数方程

$$\Psi_4 w^4 + 4\Psi_3 w^3 + 6\Psi_2 w^2 + 4\Psi_1 w + \Psi_0 = 0. \tag{11.5-12}$$

这个方程有四个根：w_1, w_2, w_3, w_4；当 w 取这四个中的任一个时，由式(11.5-11)第一个方程可知 $\Psi_0^{(n)} = 0$. 此时，基矢 l^a 对应新的方向，即 $l^a + \bar{w}m^a + w\overline{m}^a + w\bar{w}n^a$.

定义 11.19 l^a 的新方向（$l^a+\bar{w}m^a+w\overline{m}^a+w\bar{w}n^a$）被称为 Weyl 张量的**主类光方向**. 如果上述四个根互不相等，那么 Weyl 张量称为**代数普通**的，否则称为**代数特殊**的.

方程(11.5-12)四个根（w_1,w_2,w_3,w_4）不同重合方式导致了 Petrov 分类.

Petrov O 型 这种类型是指四个根全部为零，是平庸情形. 此时所有 Weyl 标量都是零，进而可得 Weyl 张量也是零；根据定理8.66可知时空是共形平坦的.

Petrov N 型 这种类型是指有非零四重根. 容易看出由参数 w 的 乙 类旋转能使 Ψ_0、Ψ_1、Ψ_2 和 Ψ_3 同时为零，只留下 Ψ_4 一个非零量.

Petrov I 型 这种类型是指四个根互不相同. 我们通过第一个根 w_1（比如说）的 乙 类变换将 $\Psi_0^{(1)}$ 变为恒零量. 再通过 甲 类旋转（不影响 Ψ_0）能将 Ψ_4 为零（取方程(11.5-12)根的倒数即可，见式(11.5-2)）. 这样使 Ψ_0 和 Ψ_4 为零后，保留 Ψ_1、Ψ_2 和 Ψ_3 非零. 我们注意到在 丙 类变换下 Ψ_1、Ψ_2 和 Ψ_3 保持不变，但 丙 类旋转会改变 Ψ_0 和 Ψ_4 的值.

Petrov II 型 这种类型是指有两个重根，比如 $w_1=w_2$，这两个根不等于 w_3 或 w_4，并且 $w_3\neq w_4$. 在这种情形下，$w_1(=w_2)$ 为方程(11.5-12)的解，并且是其导数（对 w 求导）的解，即是下式

$$\Psi_4w^3+3\Psi_3w^2+3\Psi_2w+\Psi_1=0. \tag{11.5-13}$$

的解. 此时，参数为 $w=w_1=w_2$ 的 乙 类旋转能将 Ψ_0 和 Ψ_1 变成零；再由 甲 类旋转（不改变 Ψ_0 和 Ψ_1 的值）能使 Ψ_4 为零；只留下 Ψ_2 和 Ψ_3 不为零. 对于 丙 类旋转，Ψ_2 保持不变，但 Ψ_3 会变.

Petrov D 型 这种类型是指有两组相互可区分的重根，比如 $w_1=w_3,w_2=w_4$ 但 $w_1\neq w_2$. 对于引力论来说这是最重要的一种类型；通过旋转，能令 Ψ_0、Ψ_1、Ψ_3 和 Ψ_4 同时为零，只留下 Ψ_2 一个非零标量.

依照假定，在参数为 w 的 乙 类旋转后，Ψ_0 可以化为如下形式

$$\Psi_0^{(1)}=\Psi_4(w-w_1)^2(w-w_2)^2. \tag{11.5-14}$$

我们对上式中的 w 求导数，求导后乘以适当系数使得 w 最高次幂前的系数是 Ψ_4；经过连续四次求导便可以得到 $\Psi_1^{(1)},\Psi_2^{(1)},\Psi_3^{(1)},\Psi_4^{(1)}$.

$$\Psi_1^{(1)}=\frac{1}{2}\Psi_4(w-w_1)(w-w_2)(2w-w_1-w_2), \tag{11.5-15a}$$
$$\Psi_2^{(1)}=\frac{1}{3}\Psi_4\big((w-w_1)(w-w_2)+\frac{1}{2}(2w-w_1-w_2)^2\big), \tag{11.5-15b}$$
$$\Psi_3^{(1)}=\frac{1}{2}\Psi_4(2w-w_1-w_2), \tag{11.5-15c}$$
$$\Psi_4^{(1)}=\Psi_4. \tag{11.5-15d}$$

选择 $w=w_1$，由式(11.5-15)可知

$$\Psi_0^{(1)}=0=\Psi_1^{(1)},\ \Psi_2^{(1)}=\frac{1}{6}\Psi_4(w_1-w_2)^2,\ \Psi_3^{(1)}=\frac{1}{2}\Psi_4(w_1-w_2),\ \Psi_4^{(1)}=\Psi_4.$$

现给标架一个参数为 $\bar z$ 的甲类旋转；新 Weyl 标量值是（标记为“(2)”）

$$\Psi_0^{(2)}=0=\Psi_1^{(2)},\qquad \Psi_2^{(2)}=\Psi_2^{(1)}=\frac{1}{6}\Psi_4(w_1-w_2)^2. \tag{11.5-16}$$

上述三个值较为简单，剩下两个值略显复杂，见下式

$$\Psi_3^{(2)}=\Psi_3^{(1)}+3\bar z\Psi_2^{(1)}=\frac{1}{2}\Psi_4(w_1-w_2)\big(1+\bar z(w_1-w_2)\big),$$
$$\Psi_4^{(2)}=\Psi_4+4\bar z\cdot\frac{1}{2}\Psi_4(w_1-w_2)+6\bar z^2\cdot\frac{1}{6}\Psi_4(w_1-w_2)^2=\Psi_4\big(1+\bar z(w_1-w_2)\big)^2.$$

$\bar z$ 是自由参数，我们选取其为 $\bar z=(w_2-w_1)^{-1}$；这样的选择能使 $\Psi_3^{(2)}$ 和 $\Psi_4^{(2)}$ 为零. 因此，由一个参数为 w_1 的乙类旋转，再接一个参数为 $\bar z=(w_2-w_1)^{-1}$ 的甲类旋转，$\Psi_0^{(2)}$、$\Psi_1^{(2)}$、$\Psi_3^{(2)}$ 和 $\Psi_4^{(2)}$ 都被简化为零，唯独 $\Psi_2^{(2)}$ 不为零. 现在可以把上角标“(2)”丢掉，直接说：经过变换只有 Ψ_2 不为零；并且 Ψ_2 对丙类旋转保持不变.

Petrov III 型 这种类型是指有三个重根，比如 $w_1=w_2=w_3(\neq w_4)$. 不难看出由参数 $w=w_1$ 的乙类旋转能令 Ψ_0、Ψ_1 和 Ψ_2 同时为零；再接一个甲类旋转能使 Ψ_4 为零（不影响 Ψ_0、Ψ_1 和 Ψ_2 为零）. 只留下 Ψ_3 一个非零量，它的值在丙类旋转下可变.

注：Petrov 最早采用矩阵本征值方法进行分类，请参阅[57]§4.1-4.2或[80]§3.2.

11.6 类光曲线

令 $C(t)$ 是 M 中光滑曲线，它在局部坐标系 $(U;x^\alpha)$ 中的分量表达式为：

$$x^\alpha \equiv x^\alpha(t), \qquad \alpha=0,1,2,3, \quad t\in(-\delta,\delta)\subset\mathbb{R}. \tag{11.6-1}$$

曲线 $C(t)$ 的切线切矢量记为

$$l^a \equiv \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a\Big|_{C(t)} = \frac{\mathrm{d}x^\alpha\big(C(t)\big)}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial}{\partial x^\alpha}\right)^a. \tag{11.6-2}$$

现设 $C(t)$ 是类光曲线，在 $\{l^a,n^a,m^a,\overline{m}^a\}$ 下，利用(11.3-22) 和(11.3-4)可得

$$l^b\nabla_b l_a = (\epsilon+\bar{\epsilon})l_a - \kappa\overline{m}_a - \bar{\kappa}m_a. \tag{11.6-3}$$

由上式可知：$C(t)$ 是类光测地线充要条件是 $\kappa=0$；若再要求 $Re(\epsilon)=0$，则 t 是仿射参数.

下面我们只关心仿射参数化的类光矢量 l^a，即 $\kappa=0=\epsilon+\bar{\epsilon}$. 此时，由式(11.3-22)易得

$$\nabla_{[b}l_{a]} = (\bar{\alpha}+\beta-\tau)\overline{m}_{[b}l_{a]} + (\alpha+\bar{\beta}-\bar{\tau})m_{[b}l_{a]} + (\rho-\bar{\rho})\overline{m}_{[b}m_{a]}. \tag{11.6-4}$$

$$l_{[c}\nabla_b l_{a]} = (\rho-\bar{\rho})l_{[c}\overline{m}_b m_{a]}. \tag{11.6-5}$$

参考 §10.5.1知识，由式(11.6-5)可知类光测地线切矢量 l^a 是超曲面正交的充要条件是 ρ 为实数. 进一步，若在要求 $\bar{\alpha}+\beta=\tau$，则从式(11.6-4)可知切矢量 l^a 就等于一个标量场梯度.

由式(11.3-22)易得仿射参数化类光测地线 $C(t)$ 的切线切矢量 l^a 满足

$$\frac{1}{2}\nabla^a l_a = -\frac{1}{2}(\rho+\bar{\rho}) \overset{def}{=} \theta. \tag{11.6-6}$$

最后一步，我们定义了 θ. 我们继续给出另一定义，并给出了计算结果

$$\omega^2 \overset{def}{=} \frac{1}{2}(\nabla_{[b}l_{a]})\nabla^b l^a = -\frac{1}{4}(\rho-\bar{\rho})^2. \tag{11.6-7}$$

经过一些计算可以得到

$$\frac{1}{2}(\nabla_{(b}l_{a)})\nabla^b l^a = |\sigma|^2+\theta^2. \tag{11.6-8}$$

式(11.6-6)、(11.6-7)和(11.6-8)只要求 l^a 是类光测地线（仿射参数化）切矢量即可，无需额外要求；因对称、反对称性，上面三式计算过程中很多项直接相消. θ、ω 和 σ 被称为**光学标量**，其中 σ 就是 NP 型式中的自旋系数. 它们分别表示膨胀、旋转和剪切.

11.7 Goldberg–Sachs 定理

当 Ricci 曲率恒为零（$R_{ab}=0$）时，那么黎曼曲率张量和 Weyl 张量重合.

定理 11.20 如果 Weyl 张量是 Petrov II 型的，并且选择类光基矢是使得 l^a 为主类光方向，且 $\Psi_0=0=\Psi_1$；那么 $\kappa=0=\sigma$. 反之，如果 $\kappa=0=\sigma$，那么有 $\Psi_0=0=\Psi_1$，并且 Weyl 张量是 II 型的.

这个定理将场的 II 型特征与无剪切、类光测地线的存在相互联系.

当 $\Psi_0=0=\Psi_1$ 时，Bianchi 恒等式(11.4-8)中的 a,b,c,d,g,h 可得

$$\sigma\Psi_2=0,\ \delta\Psi_2=3\tau\Psi_2-2\sigma\Psi_3,\ \Delta\Psi_2-\delta\Psi_3=2(\beta-\tau)\Psi_3+\sigma\Psi_4-3\mu\Psi_2.$$
$$\kappa\Psi_2=0,\ \mathrm{D}\Psi_2=3\rho\Psi_2-2\kappa\Psi_3,\ \mathrm{D}\Psi_3-\bar{\delta}\Psi_2=3\pi\Psi_2-2(\epsilon-\rho)\Psi_3-\kappa\Psi_4.$$

若空间不是共形平坦的，即 Weyl 标量不都为零，则由上式第一行可得 $\sigma=0$，第二行可得 $\kappa=0$. 也就是，类光矢量 l^a 是测地线（$\kappa=0$）切矢量，以及它是无剪切的（$\sigma=0$）.

逆定理的证明则要费一番周折. 我们已知 $\kappa=0=\sigma$. 首先，通过 丙 类旋转（不改变 κ,σ 的零值），使得 $\epsilon=0$. 从 NP 方程(11.4-3)中的 a,b,c,l,n 可得（利用 $\kappa=\sigma=\epsilon=0$）

$$\begin{aligned}&\mathrm{D}\tau=\rho(\tau+\bar{\pi})+\Psi_1,\ (a);\quad 0=\Psi_0,\ (b);\quad \mathrm{D}\rho=\rho^2,\ (c);\\&\delta\rho=\rho(\bar{\alpha}+\beta)+\tau(\rho-\bar{\rho})-\Psi_1,\ (l);\quad \mathrm{D}\beta=\beta\bar{\rho}+\Psi_1,\ (n).\end{aligned}\tag{11.7-1}$$

由上式已得到 $\Psi_0=0$. 如果 $\rho=0$，则由(11.7-1)的 (l) 式可得 $\Psi_1=0$，这正是我们想要的结果；但 ρ 可能不是零，故我们假设 $\rho\neq0$.

甲 类旋转（见式(11.5-2)和(11.5-3)）并不改变 Ψ_0 的值，也不影响 κ,σ,ϵ 的零值；但此类旋转能令 $\tau=0$.

由 Bianchi 恒等式(11.4-8)中的 a,b 得（利用 $\kappa=\sigma=\epsilon=\tau=\Psi_0=0$）

$$\mathrm{D}\Psi_1=4\rho\Psi_1,\qquad \delta\Psi_1=2\beta\Psi_1.\tag{11.7-2}$$

由上式可得

$$(\mathrm{D}\delta-\delta\mathrm{D})\ln\Psi_1=2\mathrm{D}\beta-4\delta\rho.\tag{11.7-3}$$

利用式(11.7-1)中的 $(l),(n)$，以及 $\tau=0$ 可得

$$(\mathrm{D}\delta-\delta\mathrm{D})\ln\Psi_1=2\bar{\rho}\beta-4(\bar{\alpha}+\beta)\rho+6\Psi_1.\tag{11.7-4}$$

此时，需要利用式(11.4-2b)（去掉各种为零的量后）

$$\delta\mathrm{D}-\mathrm{D}\delta=(\bar{\alpha}+\beta-\bar{\pi})\mathrm{D}-\bar{\rho}\delta. \tag{11.7-5}$$

将上式计算

$$(\mathrm{D}\delta-\delta\mathrm{D})\ln\Psi_1=\bar{\rho}\delta\ln\Psi_1-(\bar{\alpha}+\beta-\bar{\pi})\mathrm{D}\ln\Psi_1=2\beta\bar{\rho}-4(\bar{\alpha}+\beta-\bar{\pi})\rho. \tag{11.7-6}$$

计算过程中要用到式(11.7-2)．将上式计算结果代入式(11.7-4)得

$$\Psi_1=\frac{2}{3}\bar{\pi}\rho. \tag{11.7-7}$$

然而，式(11.7-1)中的 (a) 式（令 $\tau=0$）给出

$$\Psi_1=-\rho\bar{\pi}. \tag{11.7-8}$$

上两式是矛盾的，这说明前面假设 $\rho\neq0$ 是不成立的；ρ 必须是零，进而 $\Psi_1=0$．这便证明了 Goldberg-Sachs 定理． ■

这个定理有一个重要的推论：

推论 11.21 *如果场是代数特殊的，并且是 Petrov D 型，那么两个主类光方向 l^a 和 n^a 既是测地线切矢量又是无剪切的；即若有 $\Psi_0=\Psi_1=\Psi_3=\Psi_4=0$，则必有 $\kappa=\sigma=\nu=\lambda=0$．反之亦然．*

目前，在广义相对论中得到黑洞解，比如史瓦西黑洞或克尔黑洞，都是 Petrov D 型的，这种情形使得 NP 型式在分析黑洞类光测地线时有着较为方便之处．

小结

更多零模问题请参考 Duggal 教授及其合作者写的几部专著，比如[12]．

Newman–Penrose 型式是广义相对论中一种常用的方法，它将在黑洞物理的求解、分析中起到重要作用．

第十二章　复几何初步

我们先回顾一些复变函数的基本概念；然后补充一些复线性空间的知识；之后，引入复结构、线性空间的复化；最后介绍复流形和殆复流形.

12.1　复变函数极简概要

本节回顾一些复变函数基本内容.

在复平面某子区域 D 中，如果单值、有限复变函数

$$f(z)\equiv f(x,y)=u(x,y)+\mathbb{i}v(x,y);\quad z\equiv x+\mathbb{i}y,\ \forall x,y\in\mathbb{R}. \tag{12.1-1}$$

其中 u、v 是实函数. 每一点都是可微的（或可导），那么称 $f(z)$ 是 D 内的**解析函数**或**全纯函数**（holomorphic）. 实或复函数在 p 点解析是指存在 p 点小邻域使得在此邻域内该函数的幂级数是收敛的.

函数 $f(z)$ 可微的充分必要条件是：在区域 D 中，满足**柯西-黎曼条件**：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\qquad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}. \tag{12.1-2}$$

利用柯西-黎曼条件可将 $f(z)$ 的导数表示成如下形式

$$\frac{\mathrm{d}f(z)}{\mathrm{d}z}=\frac{\partial u}{\partial x}+\mathbb{i}\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial x}-\mathbb{i}\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial y}-\mathbb{i}\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial y}+\mathbb{i}\frac{\partial v}{\partial x}. \tag{12.1-3}$$

我们有如下变换关系

$$z=x+\mathbb{i}y,\quad \bar{z}=x-\mathbb{i}y\quad\Leftrightarrow\quad x=(z+\bar{z})/2,\quad y=(z-\bar{z})/2\mathbb{i}. \tag{12.1-4}$$

由上式容易得到

$$\frac{\partial}{\partial z}=\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial z}+\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial z}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}-\mathbb{i}\frac{\partial}{\partial y}\right). \tag{12.1-5}$$

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + \mathbb{i}\frac{\partial}{\partial y}\right). \tag{12.1-6}$$

利用上式，容易得到

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} + \mathbb{i}\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right) + \frac{\mathbb{i}}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right). \tag{12.1-7}$$

由式(12.1-2)可见：柯西-黎曼条件等价于 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$；也就是说 $f(z)$ 是 D 上的全纯函数等价于 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$. 这个纯粹形式化的结论大致说明：全纯函数 $f(z)$ 与 $\bar{z}$ 无关，它仅是 z 的函数. 故全纯函数确实是复变量（z）的函数，而不是两个实变数（x, y）的函数. 一般说来含两个实变量的复值函数有如下关系：

$$f(x, y) = f\left(\frac{z + \bar{z}}{2}, \frac{z - \bar{z}}{2\mathbb{i}}\right), \tag{12.1-8}$$

同时与 $z, \bar{z}$ 有关.

12.2 复线性空间

§3.1至 §3.4中的内容是建立在一般数域 $\mathbb{F}$ 上的，那里的结论基本都适用于本节的复线性空间 V（见定义3.1）；此处，我们补充些内容.

例3.7和例3.8指出了数域不同，空间维数可能不同；下面命题作了推广.

命题 12.1 设 V 是数域 $\mathbb{C}$ 上 m 维线性空间. 数域 $\mathbb{R}$ 是数域 $\mathbb{C}$ 的一个子集，并且 $\mathbb{C}$ 可以看成数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间，其维数是 2. 那么 V 可以看成数域 $\mathbb{R}$ 上的 $2m$ 维线性空间.

证明 . 由于数域 $\mathbb{R}$ 是数域 $\mathbb{C}$ 的一个子集，故 $\mathbb{R}$ 中元素与 V 中矢量可以按照 $\mathbb{C}$ 与 V 的数量乘法来作为 $\mathbb{R}$ 与 V 的数量乘法. 这种定义方式满足定义3.1中的 8 个条件（请读者自行验证）；最终，集合 V 可以看成数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

下面求证其维数是 $2m$. 作为 $\mathbb{C}$ 上的线性空间 V，我们取它的一组基底 $\{\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_m\}$. $\mathbb{C}$ 作为域 $\mathbb{R}$ 上的二维空间，我们取定一组基矢 $\{\epsilon_1 = 1,\ \epsilon_2 = \mathbb{i}\}$. $\forall \alpha \in V$，有

$$\alpha = \sum_{j=1}^{m} c_j \boldsymbol{e}_j, \qquad c_j \in \mathbb{C},\ j = 1, 2, \cdots, m. \tag{12.2-1}$$

对于 $\mathbb{C}$ 中的元素 c_j 可以表示为

$$c_j = a_j\epsilon_1 + b_j\epsilon_2 = a_j\cdot 1 + b_j\cdot \mathbb{i}, \qquad a_j, b_j \in \mathbb{R}, \quad j = 1, 2, \cdots, m. \tag{12.2-2}$$

因此

$$\alpha = \sum_{j=1}^{m} c_j \boldsymbol{e}_j = \sum_{j=1}^{m} (a_j\epsilon_1 + b_j\epsilon_2)\boldsymbol{e}_j = \sum_{j=1}^{m} \big(a_j(\epsilon_1\boldsymbol{e}_j) + b_j(\epsilon_2\boldsymbol{e}_j)\big). \tag{12.2-3}$$

上式表明 $\forall\alpha \in V$ 可以由

$$B_m \equiv \{\epsilon_1\boldsymbol{e}_1, \cdots, \epsilon_1\boldsymbol{e}_m;\ \epsilon_2\boldsymbol{e}_1, \cdots, \epsilon_2\boldsymbol{e}_m\} = \{\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_m;\ \mathbb{i}\boldsymbol{e}_1, \cdots, \mathbb{i}\boldsymbol{e}_m\}$$

线性表出，且表出系数都是数域 $\mathbb{R}$ 中的常数. B_m 更确切的表述是两个基矢量的张量积，即 $B_m \equiv \{\epsilon_1 \otimes \boldsymbol{e}_1, \cdots, \epsilon_1 \otimes \boldsymbol{e}_m;\ \epsilon_2 \otimes \boldsymbol{e}_1, \cdots, \epsilon_2 \otimes \boldsymbol{e}_m\}$.

下面用反证法证明集合 B_m 是线性无关的. 假设存在非零实数 $a_j, b_j,\ j = 1, \cdots, m$ 使得 $\sum_{j=1}^{m}\big(a_j(\epsilon_1\boldsymbol{e}_j) + b_j(\epsilon_2\boldsymbol{e}_j)\big) = 0$；将此式稍作变化

$$0 = \sum_{j=1}^{m}\big(a_j\epsilon_1 + b_j\epsilon_2\big)\boldsymbol{e}_j = \sum_{j=1}^{m}\big(a_j\cdot 1 + b_j\cdot\mathbb{i}\big)\boldsymbol{e}_j. \tag{12.2-4}$$

我们已知在数域 $\mathbb{C}$ 上 $\{\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_m\}$ 是线性无关的；因此从上式可以得到

$$a_j\cdot 1 + b_j\cdot\mathbb{i} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a_j = 0,\ b_j = 0; \quad j = 1, 2, \cdots, m. \tag{12.2-5}$$

与假设矛盾，故集合 B_m 是线性无关的；因此它可以作为数域 $\mathbb{R}$ 上线性空间 V 的基矢量，这也就说明了数域 $\mathbb{R}$ 上线性空间 V 的维数是 $2m$. ■

12.2.1 厄米双线性函数

实线性空间中有对称双线性函数及其内积，如果直接将其（见定义3.2）推广到复线性空间中，尤其令复空间内积满足定义3.2中的第一条：$\langle\alpha, \beta\rangle = \langle\beta, \alpha\rangle$；那么在正交归一基矢下，复矢量 α 的内积是

$$\langle\alpha, \alpha\rangle = \sum_{i,j}\langle a^i\boldsymbol{e}_i, a^j\boldsymbol{e}_j\rangle = \sum_{i,j} a^i a^j\delta_{ij} = \sum_{i=1}^{m}(a^i)^2. \tag{12.2-6}$$

注意复矢量 α 的系数 a^i 是复数，上式求和后一般不是实数；也就是说在复空间中矢量长度无法定义；可见这种内积定义方式必须修改.

Hermite[1] 克服了此种困难；我们先叙述厄米双线性函数概念.

定义 12.2 复线性空间 V 上的复值函数 $h(\cdot,\cdot)$ 称为**厄米双线性函数**，是指它满足如下条件（下式中 $\forall c\in\mathbb{C}$, $\forall\alpha,\beta,\gamma\in V$，$\bar{c}$ 是 c 的复共轭，可以是无穷维）：

$$h(c\cdot\alpha+\beta,\gamma)=\bar{c}\cdot h(\alpha,\gamma)+h(\beta,\gamma),\quad h(\gamma,c\cdot\alpha+\beta)=c\cdot h(\gamma,\alpha)+h(\gamma,\beta).$$

可见厄米双线性函数对于第一个位置矢量不是线性的，此性质称为**反线性**或**共轭线性**；第二个位置矢量是线性的. 这种对称性可称为**厄米对称**.

在复线性空间 V 中取定一组基矢 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m$. 对任意厄米双线性函数，有

$$h(\alpha,\beta)=\bar{x}^iy^jh(\boldsymbol{e}_i,\boldsymbol{e}_j)=\bar{x}^TAy;\qquad A\equiv h(\boldsymbol{e}_i,\boldsymbol{e}_j).\tag{12.2-7}$$

其中 $\alpha=\sum_i x^i\boldsymbol{e}_i$，$\beta=\sum_j y^j\boldsymbol{e}_j$，$x=(x^1,\cdots,x^m)^T$，$y=(y^1,\cdots,y^m)^T$；$A$ 称为厄米双线性函数 h 在基矢 $\{e_i\}$ 上的度量矩阵，显然它是一个复矩阵.

反之，任意给定一个复矩阵 A，则

$$h(\alpha,\beta)\equiv h\left(x^i\boldsymbol{e}_i,\ y^j\boldsymbol{e}_j\right)\overset{def}{=}\bar{x}^TAy,\qquad\forall\alpha,\beta\in V\tag{12.2-8}$$

定义了复空间 V 上的一个厄米双线性函数 $h(\cdot,\cdot)$. 因此厄米双线性函数与 m 维复数矩阵之间有双射关系.

定义 12.3 满足 $A=\bar{A}^T$ 的复数矩阵称为**厄米矩阵**；满足 $A=-\bar{A}^T$ 的复数矩阵称为**反厄米矩阵**；通常记 $A^\dagger\equiv\bar{A}^T$，上标 T 表示矩阵转置，横线表示复共轭.

例 12.4 设 A 是任意复数矩阵，则它可唯一地分解成 $A=H+K$，其中

$$H=\frac{1}{2}(A+\bar{A}^T),\quad\text{厄米矩阵};\quad K=\frac{1}{2}(A-\bar{A}^T),\quad\text{反厄米矩阵}.\tag{12.2-9}$$

例 12.5 在 m 维复线性空间 V 中取定两组基矢 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m$ 和 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_m$；存在非奇异复数矩阵 C 使得 $(\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_m)=(\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m)C$. 设 h 是 V 上厄米双线性函数，则有（下式中 $B\equiv h(\boldsymbol{e}_k,\boldsymbol{e}_l)$）：

$$A\equiv h(\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\epsilon}_j)=h\left(\sum\nolimits_k\boldsymbol{e}_kC_{ki},\ \sum\nolimits_l\boldsymbol{e}_lC_{lj}\right)=\sum\nolimits_{kl}\bar{C}_{ki}C_{lj}h(\boldsymbol{e}_k,\boldsymbol{e}_l)=C^\dagger BC.$$

若两个不同复矩阵（A、B）变换关系是 $A=C^\dagger BC$（C 非奇异），则称 A、B 是**复相似的**.

本例说明 V 上厄米双线性函数 h 在不同基矢下对应的矩阵是复相似的. ■

[1] Charles Hermite(1822-1901) 法国数学家，译为厄尔米特，简称厄米.

12.2.2 酉空间

定义 12.6 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间（有限维或无限维），在 V 上定义一个二元运算，有复数 c 与之对应，称为**酉内积**（简称**酉积**）；或**幺正内积**；或 **Hermite 内积**；记为 $c=\langle\alpha,\beta\rangle$；它需满足如下性质：

(1) $\langle\alpha,\beta\rangle=\overline{\langle\beta,\alpha\rangle}$；

(2) $\langle\alpha,k\beta\rangle=\langle\alpha,\beta\rangle\,k$；

(3) $\langle\alpha,\beta+\gamma\rangle=\langle\alpha,\beta\rangle+\langle\alpha,\gamma\rangle$；

(4) $\langle\alpha,\alpha\rangle$ 是非负实数；$\langle\alpha,\alpha\rangle=0\Longleftrightarrow\alpha=\mathbf{0}$.

其中 $\forall\alpha,\beta,\gamma\in V$，$\forall k\in\mathbb{C}$. 这样的线性空间称为**酉空间**或**幺正空间**.

当把 $\mathbb{C}$ 换成 $\mathbb{R}$ 时，酉积就退化为欧氏内积. 代数上习惯称为酉内积，几何上习惯称为 Hermite 内积，物理上习惯称为幺正内积. 由酉空间定义易得：

$$\langle k\alpha,\beta\rangle=\overline{\langle\beta,k\alpha\rangle}=\overline{\langle\beta,\alpha\rangle}\bar{k}=\langle\alpha,\beta\rangle\,\bar{k}. \tag{12.2-10}$$

容易看出酉内积是正定、厄米双线性函数. 与实数域上的欧几里得内积不同；酉内积12.6不是对称的，而是厄米对称的.

给定任意 m 维复线性空间 V，再给定一组基矢量 $\{e_i\}$；V 中任意两个矢量 α,β 可表示为 $\alpha=\sum_i x^i\boldsymbol{e}_i$，$\beta=\sum_j y^j\boldsymbol{e}_j$，$x=(x^1,\cdots,x^m)^T$，$y=(y^1,\cdots,y^m)^T$. 我们已知系数 $\{x^i,y^j\}$ 肯定是复数；但对基矢 $\{e_i\}$ 知之甚少，一般说来只知道它是个符号，不了解具体表征什么内容. 我们可以规定基矢 $\{e_i\}$ 的酉内积是：$\langle\boldsymbol{e}_i,\boldsymbol{e}_j\rangle=\delta_{ij}$. 也就是规定基矢 $\{e_i\}$ 是正交归一的；此种情况下，酉内积为

$$\langle\alpha,\beta\rangle=\bar{x}^iy^j\langle\boldsymbol{e}_i,\boldsymbol{e}_j\rangle=\bar{x}^iy^j\delta_{ij}=\sum\nolimits_{i=1}^{m}\bar{x}^iy^i. \tag{12.2-11}$$

上式为最常用的酉内积形式.

例 12.7 在 m 维复线性空间 V 中取定两组基矢 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m$ 和 $\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_m$；已知两组基矢都是正交归一的；存在非奇异复数矩阵 U 使得 $(\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_m)=(\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m)U$. 那么有

$$\langle\boldsymbol{e}_i,\boldsymbol{e}_j\rangle=\delta_{ij}=\langle\boldsymbol{\epsilon}_i,\boldsymbol{\epsilon}_j\rangle=\sum\nolimits_{kl}\bar{U}_{ki}U_{lj}\langle\boldsymbol{e}_k,\boldsymbol{e}_l\rangle=\sum\nolimits_{kl}\bar{U}_{ki}U_{lj}\delta_{kl}=\sum\nolimits_{k}\bar{U}_{ki}U_{kj}.$$

上式说明两组正交归一基矢量间的变换系数满足

$$U^\dagger U=I\quad\Leftrightarrow\quad U\text{可逆且}U^{-1}=U^\dagger\quad\Leftrightarrow\quad UU^\dagger=I. \tag{12.2-12}$$

满足上述关系的矩阵称为**幺正矩阵**（或酉矩阵）；即，联系两组正交归一基矢量的变换矩阵是幺正矩阵．若 U 是无穷维的，则需满足 $U^\dagger U = I = UU^\dagger$． ■

定义 12.8 设有酉空间 V；$\forall \alpha \in V$，$\|\alpha\| \equiv \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$ 称为 α 的**模**（或**长度**）．

定理 12.9 设 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是酉内积空间（有限维或无穷维）；则有

$$|\langle x, y \rangle| \leqslant \|x\| \cdot \|y\|, \qquad \text{对于任意但非零的 } x, y \in V. \tag{12.2-13}$$

且上式中的等号当且仅当 x 与 y 线性相关时成立．

证明 ．设 z 是酉空间 V 中的任意矢量，根据酉内积定义必有 $\langle z, z \rangle \geqslant 0$；我们利用此式来证明 **Cauchy–Schwarz 不等式**(12.2-13)．假设有

$$z = x + \lambda y; \qquad \forall x, y \in V, \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

式中 λ 是一个任意参量．不论 λ 如何，都有

$$0 \leqslant \langle z, z \rangle = \langle x, x \rangle + \lambda \langle x, y \rangle + \bar{\lambda} \langle y, x \rangle + \lambda \bar{\lambda} \langle y, y \rangle. \tag{12.2-14}$$

我们给 λ 选择一个数值：$\lambda = -\langle y, x \rangle / \langle y, y \rangle$．于是在式(12.2-14)右端，第二、三两项相等并且与第四项异号，故该式变为：

$$\langle x, x \rangle - \frac{\langle x, y \rangle \langle y, x \rangle}{\langle y, y \rangle} \geqslant 0.$$

由于 $\langle y, y \rangle > 0$，我们可以用它去乘上列不等式而得到：$|\langle x, y \rangle| \leqslant \|x\| \cdot \|y\|$．这正是式(12.2-13)．仅当 $\langle z, z \rangle = 0$ 时（即 $z = 0$），式(12.2-13)中等号才成立；此时意味着 $x + \lambda y = 0$，即两个矢量（x、y）线性相关． ■

定义 12.10 若 m 维酉空间 V 上线性变换 $\hat{U}$ 满足 $\left\langle \hat{U}\alpha, \hat{U}\beta \right\rangle = \langle \alpha, \beta \rangle, \forall \alpha, \beta \in V$；则称 $\hat{U}$ 为酉空间 V 上的**幺正变换**或**酉变换**．

定理 12.11 设 V 是 m 维酉空间，酉变换 $\hat{U}$ 在正交归一基底下对应酉矩阵 U．

证明 ．$\forall \alpha, \beta \in V$，我们已知 $\left\langle \hat{U}\alpha, \hat{U}\beta \right\rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$，即

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \sum_{kl} \left\langle \alpha^i \boldsymbol{e}_k U_{ki}, \beta^j \boldsymbol{e}_l U_{lj} \right\rangle = \sum_{kl} \bar{U}_{ki} U_{lj} \bar{\alpha}^i \beta^j \langle \boldsymbol{e}_k, \boldsymbol{e}_l \rangle = \sum_k \bar{U}_{ki} U_{kj} \bar{\alpha}^i \beta^j$$

$$\Rightarrow \bar{\alpha}^i \beta^j \delta_{ij} = \sum\nolimits_k \bar{U}_{ki} U_{kj} \bar{\alpha}^i \beta^j \quad \Rightarrow \quad U^\dagger U = I.$$

可见在正交归一基底下幺正变换对应幺正矩阵． ■

定理 12.12 设 A 是任意 m 维幺正矩阵；则一定存在一个幺正矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=D$，其中 $D=\mathrm{diag}\{e^{\mathrm{i}\theta_1},\cdots,e^{\mathrm{i}\theta_m}\}$，$0\leqslant\theta_j<2\pi$，$j=1,2,\cdots,m$.

定理 12.13 设 A 是任意 m 维厄米矩阵；则一定存在一个幺正矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=D$，其中 $D=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_m\}$，且 $\lambda_j\,(j=1,2,\cdots,m)$ 为实数.

上面两个定理的证明可参考[85]$^{\mathrm{p.522}}$，或类似文献.

定义 12.14 m 维酉空间上线性变换 $\hat{A}$ 称为**厄米变换**是指 $\left\langle\hat{A}\alpha,\beta\right\rangle=\left\langle\alpha,\hat{A}\beta\right\rangle$.

厄米变换 $\hat{A}$ 在正交归一基底下对应的矩阵是厄米矩阵（证明留给读者）.

12.3 复结构

给定数域 $\mathbb{C}$ 上复线性空间 V，取定其中一组基矢 $\{\boldsymbol{e}_i\}$；再令 V^* 表示其对偶空间，基矢是 $\{\boldsymbol{e}^{*i}\}$. 复空间的基底 $\{\boldsymbol{e}_i\}$ 是抽象的，我们只知道它是一个符号，一般说来不能对它进行取复共轭、取复角等操作. 参考命题12.1，可知空间

$$V_{\mathbb{R}}\equiv\mathrm{Span}_{\mathbb{R}}\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m;\ \mathrm{i}\boldsymbol{e}_1,\cdots,\mathrm{i}\boldsymbol{e}_m\}. \tag{12.3-1}$$

是复线性空间 V 限制在实数域 $\mathbb{R}$ 上的具体表现形式；很明显实数域上线性空间 $V_{\mathbb{R}}$ 是 $2m$ 维的；其实就是同一集合 V 在不同数域（$\mathbb{C}$ 和 $\mathbb{R}$）上的具体表现.

12.3.1 复结构定义

定义 12.15 设 W 是一个实线性空间，若其上存在一个实线性变换 $\mathbb{J}:W\to W$ 满足 $\mathbb{J}^2\equiv\mathbb{J}\circ\mathbb{J}=-\mathrm{id}$，那么称 $\mathbb{J}$ 是 W 上的一个**复结构**.

由例3.83容易看出 $\mathbb{J}$ 是实线性空间 W 上的一个 $\binom{1}{1}$ 型张量.

在 $V_{\mathbb{R}}$ 定义实线性变换$\mathbb{J}:V_{\mathbb{R}}\to V_{\mathbb{R}}$，它作用在基矢上的具体表达式为

$$\mathbb{J}(\boldsymbol{e}_i)=\mathrm{i}\boldsymbol{e}_i,\quad \mathbb{J}(\mathrm{i}\boldsymbol{e}_i)=-\boldsymbol{e}_i;\qquad 1\leqslant i\leqslant m. \tag{12.3-2}$$

容易算出

$$\mathbb{J}\circ\mathbb{J}(\boldsymbol{e}_i)=\mathbb{J}(\mathrm{i}\boldsymbol{e}_i)=-\boldsymbol{e}_i,\quad \mathbb{J}\circ\mathbb{J}(\mathrm{i}\boldsymbol{e}_i)=-\mathbb{J}\boldsymbol{e}_i=-\mathrm{i}\boldsymbol{e}_i. \tag{12.3-3}$$

需要注意 $\mathbb{J}$ 是实线性变换，虚数单位 $\mathbb{i}$ 不能移进、移出括号，即 $\mathbb{J}(\mathbb{i}\boldsymbol{e}_i)\neq\mathbb{i}\mathbb{J}(\boldsymbol{e}_i)$；实数是可以移进、移出的，即 $\mathbb{J}(a\boldsymbol{e}_i)=a\mathbb{J}(\boldsymbol{e}_i)$，$\forall a\in\mathbb{R}$．变换矩阵如下：

$$\mathbb{J}\begin{pmatrix}\boldsymbol{e}_1\\ \vdots\\ \boldsymbol{e}_m\\ \mathbb{i}\boldsymbol{e}_1\\ \vdots\\ \mathbb{i}\boldsymbol{e}_m\end{pmatrix}^T=\begin{pmatrix}\boldsymbol{e}_1\\ \vdots\\ \boldsymbol{e}_m\\ \mathbb{i}\boldsymbol{e}_1\\ \vdots\\ \mathbb{i}\boldsymbol{e}_m\end{pmatrix}^T\begin{pmatrix}0&\cdots&0&-1&\cdots&0\\ \vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ 0&\cdots&0&0&\cdots&-1\\ 1&\cdots&0&0&\cdots&0\\ \vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ 0&\cdots&1&0&\cdots&0\end{pmatrix}. \tag{12.3-4}$$

上式中除标注 ±1 的矩阵元外，所有矩阵元都是零．当把复线性空间 V 看成 $V_{\mathbb{R}}$ 时，由式(12.3-2)定义的映射 $\mathbb{J}$ 是 $V_{\mathbb{R}}$ 上的复结构，称为 $V_{\mathbb{R}}$ 的**典型复结构**.

下面计算 $\mathbb{J}$ 作用在 $V_{\mathbb{R}}$ 中任意矢量 $v=a^j\boldsymbol{e}_j+b^j\mathbb{i}\boldsymbol{e}_j$（$\forall a^j,b^j\in\mathbb{R}$）的结果．

$$\begin{aligned}\mathbb{J}v&=\mathbb{J}\left(a^j\boldsymbol{e}_j+b^j\mathbb{i}\boldsymbol{e}_j\right)=a^j\mathbb{J}(\boldsymbol{e}_j)+b^j\mathbb{J}(\mathbb{i}\boldsymbol{e}_j)=a^j(\mathbb{i}\boldsymbol{e}_j)+b^j(-\boldsymbol{e}_j)\\&\xlongequal[-1=\mathbb{i}^2]{\text{令}}a^j\mathbb{i}\boldsymbol{e}_j+b^j(\mathbb{i}\mathbb{i}\boldsymbol{e}_j)=\mathbb{i}\left(a^j\boldsymbol{e}_j+b^j\mathbb{i}\boldsymbol{e}_j\right)=\mathbb{i}v.\end{aligned} \tag{12.3-5}$$

$$\mathbb{J}^2v=\mathbb{J}\circ\mathbb{J}v=\mathbb{J}\left(a^j(\mathbb{i}\boldsymbol{e}_j)+b^j(-\boldsymbol{e}_j)\right)=a^j(-\boldsymbol{e}_j)-b^j(\mathbb{i}\boldsymbol{e}_j)=-v. \tag{12.3-6}$$

$\mathbb{J}$ 作用在 $V_{\mathbb{R}}$ 中的元素 v 相当于把 v 看成复空间 V 中的元素乘以虚数单位 $\mathbb{i}$，然后再把它看作 $V_{\mathbb{R}}$ 中的元素．由式(12.3-5)可知实线性变换 $\mathbb{J}$ 在 $V_{\mathbb{R}}$ 中的定义是良好的，与 V 中基底 $\{\boldsymbol{e}_j\}$ 选取无关．反之，我们有如下定理．

定理 12.16 设 W 是有复结构 $\mathbb{J}$ 的 n 维实线性空间，那么 n 必是偶数，即 $n=2m$．并且在 W 中存在一组基底 $\{\boldsymbol{\epsilon}_\alpha,\ 1\leqslant\alpha\leqslant2m\}$ 使得

$$\mathbb{J}\boldsymbol{\epsilon}_i=\boldsymbol{\epsilon}_{m+i},\quad \mathbb{J}\boldsymbol{\epsilon}_{m+i}=-\boldsymbol{\epsilon}_i;\qquad 1\leqslant i\leqslant m. \tag{12.3-7}$$

因此，存在一个 m 维复线性空间 V，把它限制在实数域 $\mathbb{R}$ 上得到的空间 $V_{\mathbb{R}}=W$，并且 $\mathbb{J}$ 是 $V_{\mathbb{R}}$ 上的典型复结构.

证明 . 首先定义复数和线性空间 W 中的元素的数量乘法如下，$\forall a,b\in\mathbb{R}$ 有 $a+\mathbb{i}b\in\mathbb{C}$，$\forall\alpha\in W$，令

$$(a+\mathbb{i}b)\cdot\alpha\overset{def}{=}a\alpha+b\mathbb{J}\alpha.\quad \text{数量乘法记号“}\cdot\text{”通常会被省略} \tag{12.3-8}$$

可以验证，$\forall c, c_1, c_2 \in \mathbb{C}$ 和 $\forall \alpha, \beta \in W$ 有

$$c_1(c_2\alpha) = (c_1c_2)\alpha, \quad c(\alpha+\beta) = c\alpha + c\beta, \quad (c_1+c_2)\alpha = c_1\alpha + c_2\alpha. \tag{12.3-9}$$

故线性空间 W 关于数量乘法(12.3-8)构成一个复线性空间，现将这个复线性空间记作 V. 很明显 $V_{\mathbb{R}} = W$，并且 $\mathbb{J}$ 是 $V_{\mathbb{R}}$ 的典型复结构.

如果复数域上 V 的复维数是 m，那么由命题12.1容易看到 $n = 2m$. 在复线性空间 V 中任意取定一个基底 $\{\boldsymbol{\epsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\epsilon}_m\}$，则 $\mathbb{J}\boldsymbol{\epsilon}_i = \mathbb{i}\boldsymbol{\epsilon}_i$, $1 \leqslant i \leqslant m$；并且 $\{\boldsymbol{\epsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\epsilon}_m; \mathbb{J}\boldsymbol{\epsilon}_1, \cdots, \mathbb{J}\boldsymbol{\epsilon}_m\}$ 是实线性空间 $V_{\mathbb{R}} = W$ 的基底；这个基底便可满足定理要求. ■

综和命题12.1和定理12.16可得如下定理：

定理 12.17 *m 维复线性空间 V 等价于有确定复结构的 $2m$ 维实线性空间 $V_{\mathbb{R}}$.*

命题 12.18 *设 $\mathbb{J}$ 是 $2m$ 维实线性空间 $V_{\mathbb{R}}$ 的复结构，V 是其相应的 m 维复线性空间. V 上的复线性变换 $\mathcal{A}$ 自然是 $V_{\mathbb{R}}$ 上的线性变换. 如果 $\mathcal{A}$ 关于 V 的基 $\{\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_m\}$ 的矩阵是 $B + \mathbb{i}C$（其中 B、C 是实矩阵），那么 $\mathcal{A}$ 作为 $V_{\mathbb{R}}$ 上的线性变换关于基 $\{\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_m; \mathbb{J}\boldsymbol{e}_1, \cdots, \mathbb{J}\boldsymbol{e}_m\}$ 的矩阵是：$\begin{pmatrix} B & -C \\ C & B \end{pmatrix}$.*

证明 . 我们设实矩阵 $B = \{b_{ij}\}$、$C = \{c_{ij}\}$，则

$$\begin{aligned} \mathcal{A}\boldsymbol{e}_j =& \sum_i \boldsymbol{e}_i(b_{ij} + \mathbb{i}c_{ij}) = \sum_i \boldsymbol{e}_i b_{ij} + \sum_i (\mathbb{J}\boldsymbol{e}_i)c_{ij}, \\ \mathcal{A}(\mathbb{J}\boldsymbol{e}_j) =& \mathbb{i}(\mathcal{A}\boldsymbol{e}_j) = \mathbb{i}\sum_i \boldsymbol{e}_i(b_{ij} + \mathbb{i}c_{ij}) = \sum_i (\mathbb{J}\boldsymbol{e}_i)b_{ij} - \sum_i \boldsymbol{e}_i c_{ij}. \end{aligned}$$

把上式写成矩阵形式，便证明了命题. ■

命题 12.19 *设有两个复线性空间 U, V，它们分别对应 $(U_{\mathbb{R}}, \mathbb{J})$ 和 $(V_{\mathbb{R}}, \tilde{\mathbb{J}})$；有实线性映射 $\phi : U_{\mathbb{R}} \to V_{\mathbb{R}}$. 那么 ϕ 是复线性映射的充要条件是：$\phi \circ \mathbb{J} = \tilde{\mathbb{J}} \circ \phi$.*

证明 . $\forall \alpha \in U_{\mathbb{R}}$，已知 $\mathbb{J}, \tilde{\mathbb{J}}$ 是典型复结构；自然有 $\mathbb{i}\alpha = \mathbb{J}\alpha$ 和 $\mathbb{i}\phi(\alpha) = \tilde{\mathbb{J}}\phi(\alpha)$.

先证“$\Rightarrow$”. 已知 ϕ 是复线性映射；$\phi(\mathbb{J}\alpha) = \phi(\mathbb{i}\alpha) = \mathbb{i}\phi(\alpha) = \tilde{\mathbb{J}}\phi(\alpha)$.

再证“$\Leftarrow$”. $\forall a, b \in \mathbb{R}$，$\phi\big((a+\mathbb{i}b)\alpha\big) = a\phi(\alpha) + b\phi(\mathbb{J}\alpha) = a\phi(\alpha) + b\tilde{\mathbb{J}}\phi(\alpha) = a\phi(\alpha) + b\mathbb{i}\phi(\alpha) = (a+b\mathbb{i})\phi(\alpha)$；故 ϕ 是复线性映射.

如果 ϕ 可逆，则 $\phi \circ \mathbb{J} = \tilde{\mathbb{J}} \circ \phi$ 通常写为 $\mathbb{J} = \phi^{-1} \circ \tilde{\mathbb{J}} \circ \phi$.

如果 $U_{\mathbb{R}} \equiv V_{\mathbb{R}}$，则线性映射 ϕ 退化为 $V_{\mathbb{R}}$ 上的线性变换. ■

设 $\mathbb{J}$ 是 $2m$ 维实线性空间 $V_{\mathbb{R}}$ 的复结构，其上的线性变换 ϕ 在基矢组 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m;\mathbb{J}\boldsymbol{e}_1,\cdots,\mathbb{J}\boldsymbol{e}_m\}$ 上的矩阵是：$\left(\begin{smallmatrix}A & B\\ C & D\end{smallmatrix}\right)$. 那么可以得到：$\phi\circ\mathbb{J}=\mathbb{J}\circ\phi \Leftrightarrow A=D, B=-C$. 此时 ϕ 作为 $V_{\mathbb{R}}$ 所对应的复线性空间 V 上的基 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m\}$ 的矩阵是：$A+\mathbb{i}C$. 本自然段计算不难，留给读者当练习.

12.3.2 复化与实形

定义 12.20 设 V_r 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 m 维实线性空间，$\{\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_m\}$ 是它的一组基矢. 形式地引入集合

$$V_r^{\mathbb{C}}\equiv\left\{\sum\nolimits_{k=1}^{m}c_k\boldsymbol{\epsilon}_k\mid c_k=a_k+\mathbb{i}b_k,\quad a_k,b_k\in\mathbb{R},\quad 1\leqslant k\leqslant m\right\}. \tag{12.3-10}$$

则 $V_r^{\mathbb{C}}$ 是复线性空间，称为实线性空间 V_r 的**复化**.

由定义12.20可以看出 $\{\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_m\}$ 是 $V_r^{\mathbb{C}}$ 的一组基矢，那么 $V_r^{\mathbb{C}}$ 的复维数与 V_r 的实维数是相等的，都是 m. 为了说明定义12.20是合理的，我们还需证明该取法与实线性空间 V_r 的基矢选取无关. 在 V_r 中另取一组基 $\{\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_m\}$，两组基矢间的变换关系是

$$\boldsymbol{\eta}_j=\sum\nolimits_{k=1}^{m}\boldsymbol{\epsilon}_k d^k{}_j,\qquad d^k{}_j\in\mathbb{R},\quad 1\leqslant j,k\leqslant m. \tag{12.3-11}$$

故有

$$\sum\nolimits_{j=1}^{m}c_j\boldsymbol{\eta}_j=\sum\nolimits_{k=1}^{m}\left(\sum\nolimits_{j=1}^{m}c_j d^k{}_j\right)\boldsymbol{\epsilon}_k. \tag{12.3-12}$$

因 $c_j=a_j+\mathbb{i}b_j\in\mathbb{C}$，$d^k{}_j\in\mathbb{R}$，故 $\sum_j c_j d^k{}_j\in\mathbb{C}$；所以由上式可知 $\sum_j c_j\boldsymbol{\eta}_j\in V_r^{\mathbb{C}}$. 上式说明了由 $\{\boldsymbol{\eta}\}$ 定义的复化与 $\{\boldsymbol{\epsilon}\}$ 定义的复化是相同的复线性空间.

定义 12.21 设 L_c 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 m 维复线性空间，$\{\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m\}$ 是它的一组基矢. 形式地引入集合

$$L_c^{\mathbb{R}}\equiv\left\{\sum\nolimits_{k=1}^{m}a_k\boldsymbol{\alpha}_k\mid a_k\in\mathbb{R},\quad 1\leqslant k\leqslant m\right\}. \tag{12.3-13}$$

则 $L_c^{\mathbb{R}}$ 是实线性空间，称为复线性空间 L_c 的**实形式**.

因复数包含实数，故矢量组 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m\}$ 是实线性无关的；而且由实系数 a_k 组合得到的矢量 $\sum_{k=1}^m a_k\boldsymbol{\alpha}_k$ 满足线性空间的八条公理；这便验证了定义12.21是合理的. $L_c^{\mathbb{R}}$ 的实维数与 L_c 的复维数是相等的，都是 m. L_c 的实形式 $L_c^{\mathbb{R}}$ 的定义和复线性空间 L_c 的基矢选取有关；不同的基很可能给出不同的实形式（见注解15.20）. 这与实线性空间的复化不同. 不难看出 $L_c^{\mathbb{R}}$ 的复化 $(L_c^{\mathbb{R}})^{\mathbb{C}}\equiv L_c$.

12.4 复流形

实流形是实空间 $\mathbb{R}^m$ 的一些开子集以 C^r 可微方式拼接在一起的结果. 与此类似，复流形是复空间 $\mathbb{C}^m$ 的一些开子集以全纯方式拼接在一起的结果. 在§12.1中已经初步介绍了全纯的概念，下面把它推广到更一般的情形.

定义 12.22 设 U,V 分别是 $\mathbb{C}^m,\mathbb{C}^n$ 的开子集，映射 $\phi: U\to V$ 可以表示成 $w^\alpha=\phi^\alpha(z^1,\cdots,z^m),\ 1\leqslant\alpha\leqslant n$. 若每一个 ϕ^α 都是 U 上的全纯函数，则称 ϕ 是从 U 到 V 的**全纯映射**.

若 $m=n$，ϕ 和 ϕ^{-1} 是全纯，且 ϕ 是同胚，则称 ϕ 是**全纯变换**.

有了这些准备，我们给出复流形的定义.

定义 12.23 设 M 是 $2m$ 维实流形. 若存在坐标卡集 $\Sigma=\{(U_\alpha,\phi_\alpha);\ \alpha\in I\}$，其中 $\phi_\alpha: U_\alpha\to\mathbb{C}^m(=\mathbb{R}^{2m})$ 是从 M 开子集 U_α 到 $\mathbb{C}^m$ 的同胚映射，使得 $\{U_\alpha\}$ 是 M 的一个开覆盖，并且对于任意的 $\alpha,\beta\in I$，当 $U_\alpha\cap U_\beta\neq\varnothing$ 时，复合映射 $\phi_\alpha\circ\phi_\beta^{-1}$ 是从 $\mathbb{C}^m$ 开子集 $\phi_\beta(U_\alpha\cap U_\beta)$ 到 $\mathbb{C}^m$ 开子集 $\phi_\alpha(U_\alpha\cap U_\beta)$ 的全纯变换，则称坐标卡集 Σ 是流形 M 的一个**复坐标覆盖**. M 的极大复坐标覆盖称为它的**复流形结构**；指定了复流形结构的 $2m$ 维实流形 M 称为 m 维**复流形**；属于复流形结构的坐标卡 (U_α,ϕ_α) 称为 M 的**容许复坐标卡**.

我们知道任一 m 维复流形都有自然方式看成 $2m$ 维实流形（参见命题12.1）. 反之未必，即并非任何 $2m$ 维实流形都能构造出 m 维复流形.

定义 12.24 设 M 是 $2m$ 维光滑实流形. 若在 M 上存在一个光滑 $\binom{1}{1}$ 型张量场 $\mathbb{J}$，使得 $\forall p\in M$，$\mathbb{J}_p\equiv\mathbb{J}(p)$ 是切空间 T_pM 上的复结构；则称 $(M,\mathbb{J})$ 是一个**殆复流形**（almost complex manifold），$\mathbb{J}$ 称为 M 上的**复结构**. ■

可以证明复流形肯定是殆复流形.

殆复流形何时是复流形？这是艰深的课题，请参阅本章末文献.

小结

本章内容主要参考了[70]第七章. 基于复流形，还可以引入复矢量丛的概念，进而引入复联络以及复曲率等概念，有兴趣读者请参考上述文献.

第十三章　李群与李代数初步

李群是由挪威数学家 Sophus Lie 最早研究的；它是一类重要的微分流形，其线性化后便是李代数．李群内容十分丰富，我们不可能详细叙述整个理论，只能介绍一些基本概念、重要定理．详尽论述可见本章所引文献；所有忽略的定理证明可在上述文献中查到．由于抽象指标记号对于有较多缩并、求导的运算较为合适，而李群中较少用到这类运算；故本章不用抽象指标，而采用 §3.7记号．

13.1　李群与李代数定义

定义 13.1 设 G 是一个非空集合．若 **(1)** G 是一个群；**(2)** G 是 m 维 C^∞ 实流形；**(3)** 群乘法和求逆是 C^∞ 可微的（即映射 $g*h^{-1}$ 是 G 上的 C^∞ 映射，$\forall g,h\in G$）．则称 G 是一个 m 维**实李群**．李群**维数**是指它作为流形的维数．

若李群的拓扑结构是紧致的（见定义2.59），则称 G 为**紧致李群**．

若上述条件只在 G 的包含幺元局部连通开集 U 成立，则称 U 是**局部李群**．

若将上述定义中 C^∞ 改为 C^0，则称 G 为**拓扑群**．

若将上述定义中 C^∞ 改为复解析，把底流形改为复流形，则称 G 为**复李群**．

我们知道任一 m 维复流形（见 §12.4），都有自然方式看成 $2m$ 维实流形；$\forall g,h\in G$，映射 $g*h^{-1}$ 是复解析的，自然也是实解析映射，那自然是 C^∞ 的，因此 G 是 $2m$ 维实李群．反之未必．

定义 13.2 设 $\mathscr{G}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 m 维线性空间，$\forall X,Y\in\mathscr{G}$，有 $\mathscr{G}$ 中唯一一个元素 $[X,Y]$ 与之对应（**封闭性**），$[X,Y]$ 称为换位子或**李积**，且满足如下性质：

(1) 反对称性：$[X,Y]=-[Y,X]$；

(2) 双 $\mathbb{F}$-线性：$[X+kY,Z]=[X,Z]+k[Y,Z]$，常常省略前缀“$\mathbb{F}$-”；

(3) Jacobi 恒等式：$\big[X,[Y,Z]\big]+\big[Y,[Z,X]\big]+\big[Z,[X,Y]\big]=0$．

其中 $\forall X,Y,Z\in\mathscr{G}$，$\forall k\in\mathbb{F}$，则称 $\mathscr{G}$ 是一个 m 维**李代数**．李代数维数是指它作为线性空间的维数．若 $\mathbb{F}$ 是实数域，则称 $\mathscr{G}$ 为**实李代数**；若 $\mathbb{F}$ 是复数域，则称 $\mathscr{G}$ 为**复李代数**；我们不考虑其它数域情形．

紧致李群的李群李代数（定义见第419页，及定理13.60）称为**紧致李代数**．

由 (1) 和 (2) 可知，李积对第二个因子也是线性的，即李积是双线性的．

$$[Z,X+kY]=-[X+kY,Z]=-[X,Z]-k[Y,Z]=[Z,X]+k[Z,Y].$$

定义 13.3 设有两个李群 G 和 H，且 $H\subset G$．如果 **(1)** H 是 G 的子群；**(2)** 恒等映射 $\mathrm{id}:H\to G$ 是浸入子流形．则称 H 为 G 的**李子群**．

如果映射 $\mathrm{id}:H\to G$ 是正则嵌入子流形，则称 H 为 G 的**拓扑李子群**．

定义 13.4 设李群 H 是李群 G 的李子群，如果 H 还是 G 的闭子集（见定义2.37），则称 H 为 G 的**闭子群**．

定义 13.5 设有李代数 $\mathscr{G}$，$\mathscr{H}$ 是它的线性子空间；如果 $\forall\mathfrak{h}_1,\mathfrak{h}_2\in\mathscr{H}$ 有 $[\mathfrak{h}_1,\mathfrak{h}_2]\in\mathscr{H}$，那么称 $\mathscr{H}$ 是 $\mathscr{G}$ 的**李子代数**．

定义 13.6 设有李代数 $\mathscr{G}$ 及其子代数 $\mathscr{H}$，如果 $[\mathfrak{g},\mathfrak{h}]\subset\mathscr{H}$，$\forall\mathfrak{g}\in\mathscr{G}$，$\forall\mathfrak{h}\in\mathscr{H}$；则称 $\mathscr{H}$ 是 $\mathscr{G}$ 的**理想**（ideal）．

因李代数具有反对称性（$[X,Y]=-[Y,X]$），故理想不分左、右，全部是双边理想．李代数中理想的概念与群理论中正规子群（见定义2.11）概念相当．

定义 13.7 设有李群 G 及其李代数 $\mathscr{G}$．若 G 不含有正规李子群（除群 G 本身和单位元 e 构成的子群之外），则称 G 是**单李群**（英文是 simple，译为“单纯”，简称为“单”）．若 G 不含有可对易正规李子群（除单位元 e 构成的子群之外），则称 G 是**半单李群**（semi-simple）．

定义 13.8 如果 $\mathscr{G}$ 不含有理想（除 $\mathscr{G}$ 本身和零元 $\{0\}$ 构成的理想之外），则称 $\mathscr{G}$ 是**单李代数**．如果 $\mathscr{G}$ 不含非零可对易理想，则称 $\mathscr{G}$ 是**半单李代数**．

设有李代数 $\mathscr{G}$，$\mathscr{H}$ 是它的李子代数．我们用记号 $[\mathscr{G},\mathscr{H}]$表示由所有 $[X,Y]$（$\forall X\in\mathscr{G}$，$\forall Y\in\mathscr{H}$）生成的 $\mathscr{G}$ 的线性子空间．

13.1.1 一维李代数

一维李代数 $\mathscr{G}$ 非常简单，可任选一个非零矢量 $\mathfrak{g}\in\mathscr{G}$ 作为此李代数的基矢；那么 $\forall\mathfrak{h}\in\mathscr{G}$ 都可以表示成它的倍数，即 $\mathfrak{h}=c\mathfrak{g}$．根据李代数定义13.2可知：

$[\mathfrak{h},\mathfrak{g}]=[c\mathfrak{g},\mathfrak{g}]=c[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]=0$. 即它们是可对易的，这说明所有的一维李代数都是可对易代数（Abel 代数）. 任何形式的一维李代数都是同构的（定义见 §13.3.1）；换句话说，在同构意义下只有一个一维李代数.

依照定义，一维李代数是单纯李代数；而维数大于 1 的对易李代数一定不是单纯李代数. 因此，除了一维李代数外，单纯李代数都是不可对易的.

一维李代数是单纯的，并且它不是半单纯的；这是唯一的不是半单却是单李代数的例子. 除了一维李代数之外，所有单李代数都是半单的.

今后我们谈及单纯或半单纯时总假定李代数的维数大于 1，即从 2 维谈起.

13.1.2 二维李代数

对于任意有限维的线性空间，选定一组基矢量，我们人为规定任意两个基矢的李积为零；这种规定满足李代数定义. 这段描述是在说任意有限维度的李代数中一定存在可对易李代数，二维李代数自然不能例外，并且在同构意义下这个李代数是唯一的. 二维可对易李代数十分简单，不再赘述；它的一个矩阵实现：

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix};\qquad B=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}. \tag{13.1-1}$$

A、B 是这个李代数的两个基，不难验证它们是对易的.

下面考虑二维不可对易李代数 $\mathscr{G}$. 设它的基矢为 x_1、x_2，并且 $[x_1,x_2]\neq 0$. 令 $[x_1,x_2]=a_1x_1+a_2x_2$，其中 $a_1,a_2\in\mathbb{F}$；不失一般性假设 $a_2\neq 0$. 令

$$x=x_1/a_2,\qquad y=[x_1,x_2]=a_1x_1+a_2x_2. \tag{13.1-2}$$

不难验证 $[x,y]=y$，并且 x、y 仍是线性无关的，故 $\{x,y\}$ 也可以看作李代数 $\mathscr{G}$ 的基矢. 上面这段描述说明：在同构意义下，二维非对易李代数也只有一个. 它的一个矩阵实现为：

$$x=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix};\qquad y=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}. \tag{13.1-3}$$

总之，数域上的二维李代数在同构意义下只有两个；一个是可对易的；另一个是不可对易的，且存在一组基矢 $\{x,y\}$ 使得 $[x,y]=y$.

容易看出 $\mathrm{Span}\{0,y\}$ 是二维非对易李代数的理想；故它不是半单的.

13.2 李群与李代数例子

13.2.1 李群例子

例 13.9 李群直积. 设有李群 G、H，在积流形 $G\times H$ （见 §4.2.2）上定义

$$(g_1,h_1)\cdot(g_2,h_2)\overset{def}{=}(g_1g_2,h_1h_2),\qquad (g,h)^{-1}\overset{def}{=}(g^{-1},h^{-1}). \tag{13.2-1}$$

其中 $\forall g,g_1,g_2\in G$; $\forall h,h_1,h_2\in H$. 请读者验证 (g,h) 满足群的定义. 这样定义的群乘法与求逆运算都是无穷阶可微的，故 $G\times H$ 是李群，称为李群 G 和 H 的直积. 并且 $\dim(G\times H)=\dim G+\dim H$. ■

例 13.10 验证实数域 $\mathbb{R}$ 关于加法构成一维李群.

首先，$\mathbb{R}$ 是一维光滑流形. 其次，对于群乘法（已选为实数加法），$\mathbb{R}$ 中元素具有封闭性、可结合性；数字 0 是单位元；任意实数 r 的相反数 $-r$ 是其逆元. 综上 $\mathbb{R}$ 是群. 很明显对于实数加法（群乘法）和取负（群元求逆）运算是 C^∞ 运算，即无穷多次可微. 因加法可交换，故实数群是可对易李群.

同理，$\mathbb{R}^m$ 关于加法构成 m 维李群；一般记作 $(\mathbb{R}^m,+)$. 可以证明，任意 $m\geqslant 1$ 维李群 $(\mathbb{R}^m,+)$ 都是**单连通**的. ■

我们用一个具体的例子来再次解释一下什么叫作群运算 C^∞ 可微性.

例 13.11 一维环群 T^1 可以看作 $\mathbb{R}^2$ 中的一个圆周 $S^1=\{e^{2\pi\mathrm{i}t}\}$，在 S^1 上的乘法和求逆运算分别是

$$e^{2\pi\mathrm{i}t}\cdot e^{2\pi\mathrm{i}s}=e^{2\pi\mathrm{i}(t+s)};\qquad (e^{2\pi\mathrm{i}t})^{-1}=e^{-2\pi\mathrm{i}t}.$$

很明显上述两个运算的函数都是 C^∞ 可微的，这便是定义13.1中 C^∞ 可微的具体示例. 由此可见 T^1 是个一维交换李群. 一维环群 T^1 同构于商群 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. 高维环群可以看作一维环群的直积 $T^m=T^1\times\cdots\times T^1\cong\mathbb{R}^m/\mathbb{Z}^m$. ■

从例13.10和13.11可知：李代数相同（一维李代数皆同构），它们的李群未必微分同胚. 两者李代数相同，但例13.10中李群是非紧致的，例13.11中李群是紧致的，两者不可能同胚. 其实 $(\mathbb{R},+)$ 是 T^1 的无穷度通用覆盖群.

例 13.12 设有任意 $g\in G$，但 g 固定不变；令

$$L_g(x)=g\cdot x,\qquad \forall x\in G. \qquad \textbf{左移动} \tag{13.2-2}$$

$$R_g(x) = x \cdot g, \qquad \forall x \in G. \qquad \textbf{右移动} \tag{13.2-3}$$

这两个映射都是光滑双射，它们逆映射分别是

$$L_g \circ L_{g^{-1}} = L_{g^{-1}} \circ L_g = \mathrm{id} = L_g \circ L_g^{-1} = L_g^{-1} \circ L_g, \tag{13.2-4}$$

$$R_g \circ R_{g^{-1}} = R_{g^{-1}} \circ R_g = \mathrm{id} = R_g \circ R_g^{-1} = R_g^{-1} \circ R_g. \tag{13.2-5}$$

除非 $g = e$，否则 L_g、R_g 都没有不动点，这也是群乘法可逆的结果：$L_g h = gh = h \Rightarrow g = e$. 而且，从单位元 e 出发，令 g 变动通过左作用可以抵达群 G 的任何一点，因为有 $L_g e = g,\ \forall g$. 右作用也类似. ■

例 13.13 一般线性群 $GL(m,\mathbb{F})$ （General Linear Group）.

矩阵形式：全体可逆、$\mathbb{F}$ 数值、m 维矩阵构成一个集合，并取矩阵的乘法为群乘法，则此集合构成一个群，称为 $\mathbb{F}$ 值**一般线性群**，记为 $GL(m,\mathbb{F})$. 先验证，它是一个群. 首先，多个可逆矩阵相乘后还是可逆矩阵，乘法具有封闭性、结合性. 其次，取单位矩阵为 $GL(m,\mathbb{F})$ 的单位元. 最后，可逆矩阵 T 的逆矩阵一定是存在的，取群元 T 的逆元是逆矩阵 T^{-1}，很明显 $T^{-1} \in GL(m,\mathbb{F})$. 这便验证了 $GL(m,\mathbb{F})$ 是一个群.

$GL(m,\mathbb{F})$ 的矩阵元可以排成一个 m^2 的列矢量，它同构于 $\mathbb{F}^{m^2}$，因而它有流形 $\mathbb{F}^{m^2}$ 的光滑结构；进而它也是光滑流形.

设有 $GL(m,\mathbb{F})$ 中两个元素 $A = (a^j_{\cdot i}), B = (b^j_{\cdot i})$，它们的乘积是 $(A \cdot B)^j_{\cdot i} = \sum_k a^j_{\cdot k} b^k_{\cdot i}$，这个运算只涉及数的乘法和加法，自然是 C^∞ 可微的. 矩阵 A 的逆是 $(A^{-1})^j_{\cdot i} = \tilde{A}^j_{\cdot i}/\det A$，其中 $\tilde{A}^j_{\cdot i}$ 是矩阵 A 中元素 $a^j_{\cdot i}$ 的代数余子式，$\det A$ 是其行列式；代数余子式和行列式运算只涉及数的乘法和加法，然后是两者相除，自然也是 C^∞ 可微的. 这便说明了群 $GL(m,\mathbb{F})$ 中的群元乘法和群元逆运算都是 C^∞ 可微的，所以群 $GL(m,\mathbb{F})$ 是 m^2 维李群.

线性变换形式：设有数域 $\mathbb{F}$ 上 m 维线性空间 V，其上全体可逆线性变换构成集合 $GL(V)$，群乘法定义为两个可逆线性变换的相继作用. 多个可逆线性变换的相继作用仍是可逆线性变换，同时这种相继作用满足结合律. 恒等线性变换自然属于 $GL(V)$. 因此，$GL(V)$ 构成一个群.

取 V 的一个基底 e_i，则可逆线性变换在此基底下双射于一个可逆矩阵，那么 $GL(V)$ 同构于 $GL(m,\mathbb{F})$. 两个可逆线性变换的相继作用也双射于可逆矩阵乘法，恒等线性变换双射于单位矩阵. 可见 $GL(V)$ 群与群 $GL(m,\mathbb{F})$ 是同构，也

是一个李群．当作基底变换时，可逆矩阵之间相差一个合同变换，合同变换不影响光滑性；因此微分结构与基底选择无关．

这是一般线性群的两种表述方式． ■

13.2.2 李代数例子

命题 13.14 定义13.2中性质 (1) 等价于 $[X,X]=0$.

证明 . 证明过程并不难，留给读者当练习． ■

设李代数 $\mathfrak{g}$ 的一组基为 $X_1,\cdots,X_m$，由于李积满足封闭性，所以李积一定可以用这个基矢展开，即有

$$[X_i,X_j]=c_{ij}^k X_k,\qquad 1\leqslant i,j,k\leqslant m. \tag{13.2-6}$$

其中 c_{ij}^k 称为李代数 $\mathfrak{g}$ 的**结构常数**．很明显，定义13.2中性质 (1) 和 (3) 变为

$$c_{ij}^k+c_{ji}^k=0, \tag{13.2-7}$$

$$c_{ij}^s c_{sl}^k+c_{jl}^s c_{si}^k+c_{li}^s c_{sj}^k=0. \tag{13.2-8}$$

不同李代数的结构常数一般是不同的．同一个李代数在不同基矢下，结构常数也可能不同．设一李代数 $\mathfrak{g}$，它还有另一组基 $Y_1,\cdots,Y_m$，基矢间变换关系为 $Y_i=X_s a^s{}_i$；其中矩阵 $(a^s{}_i)$ 可逆．若有 $[Y_i,Y_j]=\tilde{c}_{ij}^k Y_k$，则有

$$\tilde{c}_{ij}^k Y_k=[Y_i,Y_j]=[a^s{}_i X_s,a^t{}_j X_t]=a^s{}_i a^t{}_j c_{st}^r X_r=a^s{}_i a^t{}_j (a^{-1})^k{}_r c_{st}^r Y_k. \tag{13.2-9}$$

由此可以得到不同基矢下，结构常数的变换关系是

$$\tilde{c}_{ij}^k=a^s{}_i a^t{}_j (a^{-1})^k{}_r c_{st}^r=a^s{}_i a^t{}_j (a^{-T})_r{}^k c_{st}^r. \tag{13.2-10}$$

由上式可以看出，结构常数 c_{ij}^k 服从 $\binom{1}{2}$ 型张量的变换规则．

例 13.15 $\mathbb{R}^3$ 中的叉乘构成李代数．设有 $\mathbb{R}^3$ 中三个矢量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$，定义李积为 $[\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}]\overset{def}{=}\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$．显然，叉乘符合定义13.2中性质 (1) 和 (2)．对于性质 (3)，有

$$\begin{aligned}&\big[\boldsymbol{u},[\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}]\big]+\big[\boldsymbol{v},[\boldsymbol{w},\boldsymbol{u}]\big]+\big[\boldsymbol{w},[\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}]\big]\\ =&\boldsymbol{u}\times(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w})+\boldsymbol{v}\times(\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{u})+\boldsymbol{w}\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})\\ =&(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{w})\boldsymbol{v}-(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v})\boldsymbol{w}+(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{u})\boldsymbol{w}-(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w})\boldsymbol{u}+(\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v})\boldsymbol{u}-(\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{u})\boldsymbol{v}=0.\end{aligned}$$

这说明由叉乘定义的李积满足 Jacobi 恒等式，故它是一个（实）李代数． ■

例 13.16 设 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{C})$ 是复数域上 $m\times m$ 矩阵全体构成的集合，显然这是一个 m^2 维的线性空间. $\forall X,Y\in\mathfrak{gl}(m,\mathbb{C})$，定义李积为 $[X,Y]\overset{def}{=}XY-YX$，即两矩阵相乘之差. 容易验证此定义满足李代数定义13.2中的三条性质，因此 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{C})$ 是 m^2 维复李代数. 注：不要求 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{C})$ 中矩阵非退化.

设 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{R})$ 是 m 维实矩阵全体构成的集合；同理，它是 m^2 维实李代数.

$\mathfrak{gl}(m)$ 是李群 $GL(m)$ 的李代数，见例题13.35. ■

定义 13.17 $GL(V)$ 的子群称为**线性李群**. $\mathfrak{gl}(V)$ 的子代数称为**线性李代数**.

例 13.18 实光滑流形 M 上所有光滑切矢量场构成线性空间 $\mathfrak{X}(M)$，在 $\mathfrak{X}(M)$ 上定义李积为 Poisson 括号（见式(4.8-10)）. 下面验证 $\mathfrak{X}(M)$ 是李代数，首先，Poisson 括号运算是封闭的；其次，定理4.58保证了 Poisson 括号满足李代数定义13.2；故它是一个李代数. 作为线性空间的 $\mathfrak{X}(M)$ 一般情形下是无穷维的（见第127页），故此李代数也是无穷维的. ■

命题 13.19 设 $\mathfrak{h}$ 是李代数 $\mathfrak{g}$ 的理想. 在商空间$\mathfrak{g}/\mathfrak{h}=\{\bar{x}=x+\mathfrak{h}\mid x\in\mathfrak{g}\}$ 中定义括号积为 $[\bar{x},\bar{y}]=\overline{[x,y]}$，$\forall x,y\in\mathfrak{g}$；则 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 也是李代数，称为 $\mathfrak{g}$ 对 $\mathfrak{h}$ 的**商代数**.

证明 . 线性空间的商空间概念见 §3.1.3. 首先，证明商空间中括号积定义的合理性. 设 $\overline{x_1}=\bar{x}$, $\overline{y_1}=\bar{y}$，即 $x-x_1=u\in\mathfrak{h}$，$y-y_1=v\in\mathfrak{h}$. 于是 $[x,y]-[x_1,y_1]=[x_1+u,\ y_1+v]-[x_1,y_1]=[x_1,v]+[u,y_1]+[u,v]\in\mathfrak{h}$. 故有 $\overline{[x_1,y_1]}=\overline{[x,y]}$.

其次,证明所定义的括号积满足李代数定义要求.$[\bar{x},\bar{x}]=\overline{[x,x]}=0$;$\overline{[x+z,\bar{y}]}=\overline{[x+z,y]}=\overline{[x,y]+[z,y]}=[\bar{x},\bar{y}]+[\bar{z},\bar{y}]$;$\overline{[\lambda x},\bar{y}]=\overline{[\lambda x,y]}=\lambda[\bar{x},\bar{y}]$.最后验证 Jacobi 恒等式：$\big[\bar{x},[\bar{y},\bar{z}]\big]+\big[\bar{y},[\bar{z},\bar{x}]\big]+\big[\bar{z},[\bar{x},\bar{y}]\big]=\overline{\big[x,[y,z]\big]+\big[y,[z,x]\big]+\big[z,[x,y]\big]}=0$. 故 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 是李代数. ■

例 13.20 三维实李代数的 Bianchi 分类.

只需要李代数定义（无需其它知识）便可对一维、二维李代数进行分类（见 §13.1）. 下面将通过结构常数来阐述三维实李代数的分类[31]§116，故写在此处.

设有三维实李代数 $\mathfrak{g}$，它有三个线性无关的基矢 $\{e_1,e_2,e_3\}$；这三个基矢的结构常数为 C_{ij}^k，由于下标反对称，故 C_{ij}^k 共有 9 个独立数值. 由此可设

$$C_{ij}^k=\sum_{l=1}^{3}\epsilon_{ijl}n^{lk}+\delta_i^k a_j-\delta_j^k a_i;\quad \epsilon_{123}=1. \tag{13.2-11}$$

为避免不必要的歧义，本例题显式写出求和号. 其中 n^{lk} 是三维实对称矩阵，共有六个独立数值；a_j 是三维列矢量，共有三个独立数值；加起来与 C_{ij}^k 的 9 个独

立数值相同. 容易看出式(13.2-11)等号两端关于下标 $\{ij\}$ 反对称. 将(13.2-11)式代入 C_{ij}^{k} 满足的 Jacobi 恒等式(13.2-8)，有

$$\sum\nolimits_{k=1}^{3} n^{lk}a_k = 0; \qquad l = 1,2,3. \tag{13.2-12}$$

一定存在正交矩阵X 使得实对称矩阵 n^{lk} 对角化[84]p.289，即

$$\sum\nolimits_{lk} X^{-1}_{\bar{l}l} n^{lk} X_{k\bar{k}} = n^{\bar{l}}\delta_{\bar{l}\bar{k}}, \qquad \text{重复角标}\,\bar{l}\,\text{不求和} \tag{13.2-13}$$

用 X^{-1} 左乘式(13.2-12)，有

$$0 = \sum\nolimits_{kk'l} X^{-1}_{\bar{l}l} n^{lk}\delta_{kk'}a_{k'} = \sum\nolimits_{kk'l\bar{k}} X^{-1}_{\bar{l}l} n^{lk} X_{k\bar{k}} X^{-1}_{\bar{k}k'} a_{k'}.$$

令 $\bar{a}_{\bar{k}} \equiv \sum_{k'} X^{-1}_{\bar{k}k'} a_{k'}$，利用式(13.2-13)继续上式计算，有

$$0 = \sum\nolimits_{\bar{k}} n^{\bar{l}}\delta_{\bar{l}\bar{k}}\bar{a}_{\bar{k}} = n^{\bar{l}}\bar{a}_{\bar{l}}. \qquad \text{重复角标}\,\bar{l}\,\text{不求和} \tag{13.2-14}$$

即：$n^1\bar{a}_1 = 0$ 且 $n^2\bar{a}_2 = 0$ 且 $n^3\bar{a}_3 = 0$.

用 X 右乘式(13.2-11)，有

$$\begin{aligned} &\sum\nolimits_{k} C_{ij}^{k} X_{k\bar{k}} = \sum\nolimits_{kll'\bar{l}} \epsilon_{ijl'} X_{l'\bar{l}} X^{-1}_{\bar{l}l} n^{lk} X_{k\bar{k}} + \sum\nolimits_{k} (\delta_i^k a_j - \delta_j^k a_i) X_{k\bar{k}} \\ \Rightarrow\quad &\sum\nolimits_{k} C_{ij}^{k} X_{k\bar{k}} = n^{\bar{k}} \sum\nolimits_{l'} \epsilon_{ijl'} X_{l'\bar{k}} + \sum\nolimits_{k} (\delta_i^k a_j - \delta_j^k a_i) X_{k\bar{k}}. \end{aligned}$$

用 $X^{-1}_{\bar{i}i} X^{-1}_{\bar{j}j}$ 左乘上式并对 i,j,k 求和（参考式(13.2-10)，相当于基矢变换）：

$$\bar{C}_{\bar{i}\bar{j}}^{\bar{k}} = \bar{\epsilon}_{\bar{i}\bar{j}\bar{k}} n^{\bar{k}} + \delta_{\bar{i}}^{\bar{k}}\bar{a}_{\bar{j}} - \delta_{\bar{j}}^{\bar{k}}\bar{a}_{\bar{i}}. \qquad \text{重复角标}\,\bar{k}\,\text{不求和} \tag{13.2-15}$$

现在我们有六个参数：n^1、n^2、n^3，$\bar{a}_1$、$\bar{a}_2$、$\bar{a}_3$. 由式(13.2-14)，我们知道它们还需满足三个约束，也就是独立的参数只有三个. 不失一般性，我们令 $\bar{a}_2 = 0 = \bar{a}_3$、$\bar{a}_1 = a$；此时约束也只剩下一个：$n^1 a = 0$. 这种选择相当于有四个参数：$n^1$、$n^2$、$n^3$、$a$，和一个约束 $n^1 a = 0$；独立参数个数没有变化. 由(13.2-15)可以得到基矢对易关系（为简单起见，去掉上面的横线）：

$$[e_1, e_2] = -ae_2 + n^3 e_3, \quad [e_2, e_3] = n^1 e_1, \quad [e_3, e_1] = n^2 e_2 + ae_3. \tag{13.2-16}$$

由第54页推论3.46可知：一定可以通过基矢的归一化，使得 n^1、n^2、n^3 只取：-1、0、$+1$. 实参数 a 是任意的；若 $a = 0$，称为 **A 类**，否则称为 **B 类**. 通过四个

实参数 (a, n^1, n^2, n^3) 的不同取值将三维实李代数分为 11 类（同构意义下）；这个分类最早是由 Luigi Bianchi 于 1898 年给出的．幂零、可解的概念见 §13.6.

I 型：$(0,0,0,0)$．可对易李代数，幂零．

II 型：$(0,1,0,0)$．幂零．同构于 Heisenberg 代数．

III 型：$(1,0,1,-1)$．可解．

IV 型：$(1,0,0,1)$．可解．

V 型：$(1,0,0,0)$．可解．

VI 型：$(a,0,1,-1)$．可解．

VI_0 型：$(0,1,-1,0)$．可解．同构于 $\mathfrak{iso}(1,1)$．

VII 型：$(a,0,1,1)$．可解．

VII_0 型：$(0,1,1,0)$．可解．同构于 $\mathfrak{iso}(2)$．

VIII 型：$(0,1,1,-1)$．半单．同构于 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$．

IX 型：$(0,1,1,1)$．半单．同构于 $\mathfrak{so}(3)$．

更详尽讨论以及其它低维李代数分类可参考[52]． ■

练习 13-1 验证式(13.2-12)成立．

13.3 李群同态与表示

13.3.1 同态、表示定义

定义 13.21 *若从李群 G 到李群 H 存在一个光滑映射$\phi: G \to H$（流形角度），它是群 G 到群 H 的群同态映射（见21页定义2.12，群角度）；那么称 ϕ 是李群 G 到 H 的*同态映射*.*

*若 ϕ 是群同构（群角度）且微分同胚（流形角度），则称之为李群间的*同构映射*，记为 $G \cong H$．李群 G 到它自身的同构称为李群 G 的*自同构*.*

定义 13.22 *设 $\mathscr{G}, \mathscr{H}$ 是两个李代数．设 $\psi: \mathscr{G} \to \mathscr{H}$ 是保持李积不变的线性映射，即 $\psi\big([X,Y]\big) = \big[\psi(X), \psi(Y)\big]$，$\forall X, Y \in \mathscr{G}$．则称 ψ 是从李代数 $\mathscr{G}$ 到 $\mathscr{H}$ 的*同态*．如果同态 ψ 是线性空间中的线性同构映射，则称之为李代数*同构*.*

我们将李群 G 的全体自同构映射（双射）所组成的集合记为 $\mathrm{Aut}(G)$，这些双射构成一个群，称为李群 G 的*自同构群*．验证 $\mathrm{Aut}(G)$ 是群的工作留给读者．

李群、李代数表示理论是一个非常专门且深入的学科，任何具体群的实际应用绝大多数都是用它的表示．第22页所叙述的群表示定义2.18适用于李群；但我们还是再次叙述一次：

定义 13.23 如果存在从李群 G 到一般线性群 $GL(m,V)$ 的李群同态映射 $\phi: G \to GL(V)$，则称 (ϕ,V) 为李群 G 的一个 m 维**线性表示**，简称**表示**．如果 ϕ 是李群单同态映射，则称为**忠实表示**．V 是表示空间，$\dim V$ 是表示**维数**．

定义 13.24 设 $\mathfrak{g}$ 为李代数，V 是数域 $\mathbb{F}$ 上有限维线性空间．若存在从 $\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{gl}(V)$ 的同态映射 $\rho:\mathfrak{g}\to\mathfrak{gl}(V)$，则称 ρ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个**线性表示**，V 是表示空间，$\dim V$ 是表示**维数**．

寻找群 G 表示的大体步骤是：首先，选一个线性空间 V；其次，找到可逆线性变换构成的群（即 $GL(V)$），它也称为 V 上全体可逆线性自同构群；最后，寻找到 G 到 $GL(V)$ 某个子群的同态映射 ϕ，ϕ 便是群表示．如果 V 是实数域上空间，则群表示为**实表示**；如果 V 是复数域上空间，则为**复表示**．

下面介绍覆盖群概念，省略的定理证明可在文献[91]p.231–240查到．

定义 13.25 李代数 $\mathfrak{g}$ 的**中心**定义为：$C(\mathfrak{g})=\{x\in\mathfrak{g}\mid[x,y]=0,\forall y\in\mathfrak{g}\}$．

定义 13.26 设 G,F 是连通李群，$\phi:G\to F$ 是连续同态映射．若 F 中存在一个单位元 e_F 的邻域 U，使得 $\phi^{-1}(U)$ 的每个连通分支都是 G 中的开集，且在 ϕ 下与 U 同胚，则称 G 为 F 的**覆盖群**．$\ker\phi=\phi^{-1}(e)=\Gamma$ 为覆盖群 (G,ϕ) 关于 F 的 **Poincaré 群**，Poincaré 群中元素个数称为**覆盖叶数**．

定理 13.27 设 (G,ϕ) 是李群 F 的覆盖群，则其 Poincaré 群 $\Gamma=\phi^{-1}(e)$ 为 G 的**离散正规子群**，因而 Γ 是李群 G 中心 $C(G)$ 的子集，且 $\phi^{-1}(f)=\{g\in G\mid\phi(g)=f\}=g\Gamma$，其中 g 是 $\phi^{-1}(f)$ 中任一元素，G/Γ 与 F 是同构的拓扑群．

定理 13.28 设 F 是任意一个连通李群，则在同构意义下存在唯一的单连通李群 G，以及覆盖映射 ϕ 使得 (G,ϕ) 是 F 的覆盖群．称 G 是 F 的**通用覆盖群**．

注意“单连通”和“连通”是两个不同的概念；连通是点集拓扑中概念；单连通是代数拓扑中概念，在单连通定义中事先要求拓扑是连通的．

13.3.2 半直积群

介绍到这里，我们稍微偏离一下主题．例13.9中引入了直积的概念，现在借助自同构映射来引入半直积定义．设有两个群 $G=\{g\}$ 和 $H=\{h\}$，G 的自同构群是 $\mathrm{Aut}(G)$，其元素 $\nu\in\mathrm{Aut}(G)$．如果存在一个把群 H 映射为 $\mathrm{Aut}(G)$ 的同态映射 $\Phi: H\to\mathrm{Aut}(G)$，其具体表达式为

$$\Phi: h\to\nu_h,\qquad h\in H,\quad \nu\in\mathrm{Aut}(G). \tag{13.3-1}$$

那么，便可定义 G 和 H 的**半直积群**$K=G\rtimes H$，其元素可唯一地记为 $k\equiv(g,h)$；半直积群 K 中元素的群乘法为：

$$k_1k_2\equiv(g_1,h_1)(g_2,h_2)\overset{def}{=}\big(g_1\nu_{h_1}(g_2),\ h_1h_2\big). \tag{13.3-2}$$

下面，我们验证在上述群乘法定义下 K 确实是一个群．

首先，群乘法的封闭性是显然的．

其次，设群 G、H 的幺元分别是 I_g、I_h，则由自同构 $\nu_h\in\mathrm{Aut}(G)$ 可得

$$\nu_h(I_g)=I_g,\quad \forall h\in H;\qquad \nu_{I_h}(g)=g,\quad \forall g\in G. \tag{13.3-3}$$

利用上式可以证明，$\forall g'\in G$, $\forall h'\in H$ 有

$$(I_g,I_h)(g',h')=\big(I_g\nu_{I_h}(g'),I_hh'\big)=(I_gg',I_hh')=(g',h'). \tag{13.3-4}$$

$$(g',h')(I_g,I_h)=\big(g'\nu_{h'}(I_g),h'I_h\big)=(g'I_g,h'I_h)=(g',h'). \tag{13.3-5}$$

上两式说明 (I_g,I_h) 是 K 的单位元．

第三，证明群乘法满足结合律．根据自同构映射 $\nu_h\in\mathrm{Aut}(G)$ 的属性可知

$$\nu_h(g_1g_2)=\nu_h(g_1)\nu_h(g_2);\qquad \nu_{h_1h_2}(g)=\nu_{h_1}\big(\nu_{h_2}(g)\big). \tag{13.3-6}$$

利用此式可证半直积乘法满足结合律：

$$\begin{aligned}
&\big[(g_1,h_1)(g_2,h_2)\big](g_3,h_3)=\big(g_1\nu_{h_1}(g_2),h_1h_2\big)(g_3,h_3)=\big(g_1\nu_{h_1}(g_2)\nu_{h_1h_2}(g_3),\ h_1h_2h_3\big)\\
=&\Big(g_1\nu_{h_1}(g_2)\nu_{h_1}\big(\nu_{h_2}(g_3)\big),\ h_1h_2h_3\Big)=\Big(g_1\nu_{h_1}\big(g_2\nu_{h_2}(g_3)\big),\ h_1h_2h_3\Big)\\
=&(g_1,h_1)\big(g_2\nu_{h_2}(g_3),h_2h_3\big)=(g_1,h_1)\big[(g_2,h_2)(g_3,h_3)\big].
\end{aligned}$$

最后，半直积 (g,h) 的逆元是：$\big(\nu_{h^{-1}}(g^{-1}),\ h^{-1}\big)$；验证之

$$(g,h)\big(\nu_{h^{-1}}(g^{-1}),h^{-1}\big)=\Big(g\nu_h\big(\nu_{h^{-1}}(g^{-1})\big),\ hh^{-1}\Big)=\big(g\nu_{I_h}(g^{-1}),\ I_h\big)=(I_g,I_h).$$
$$\big(\nu_{h^{-1}}(g^{-1}),h^{-1}\big)(g,h)=\big(\nu_{h^{-1}}(g^{-1})\nu_{h^{-1}}(g),\ h^{-1}h\big)=\big(\nu_{h^{-1}}(g^{-1}g),\ I_h\big)=(I_g,I_h).$$

综合上述四条可知 K 是群.

从群 $K=G\rtimes H$ 构造来看，G 是 K 的不变子群；验证如下，$\forall g'\in G$ 有

$$(g,h)g'(g,h)^{-1}=(g,h)(g',I_{h'})\big(\nu_{h^{-1}}(g^{-1}),h^{-1}\big)=\big(g\nu_h(g'),hI_{h'}\big)\big(\nu_{h^{-1}}(g^{-1}),h^{-1}\big)$$
$$=\Big(g\nu_h(g')\nu_h\big(\nu_{h^{-1}}(g^{-1})\big),\ hh^{-1}\Big)=\big(g\nu_h(g')g^{-1},\ I_h\big)\quad\in G.$$

上式最后一步中的元素 $g\nu_h(g')g^{-1}$ 仍是群 G 中的元素，故上式说明 G 是 K 的不变子群. 但是一般说来 H 不是 K 的不变子群. 当 G、H 都是 K 的不变子群时，半直积就退化为直积了. 由此也可看出半直积比直积条件弱一些.

介绍一下半直积的另一种记号. 认识到 G 是 K 的不变子群后，我们也可将 G 和 H 的半直积群记号拓展一下，记 $K=G\rtimes H=H\ltimes G$，即“乘号”的开口指向不变子群；此时 K 中元素也要作相应改变，记为 $k\equiv(h,g)$. 增加这种记号后，容易造成误解；为了避免不必要的麻烦，我们约定：本书只用记号“$\rtimes$”；g 和 h 顺序不能改变，不变子群的在前面，即 $k\equiv(g,h)$.

我们也可以将上述构造过程反过来，将一个大群分解为两个群的半直积，这需要原来的大群有不变子群才可以.

13.4 左不变切矢量场

李群集几何与代数性质于一身，难于研究，把李群线性化得到一个有限维线性空间来代替它（仅在局部），通过对这个线性空间的研究便可了解诸多李群知识；这个线性化的矢量空间就是李代数.

左移动 L_g 是光滑同胚，它诱导出单位元 e 附近的线性同构映射 $(L_{g*})_e:T_eG\to T_gG$，其中 $(L_{g*})_e$ 下标中星号后面的 e 表示被作用对象是单位元的切空间；而元素 e 还可以换成其它群元，比如 h，$(L_{g*})_h$ 代表映射从 T_hG 到 $T_{gh}G$ 的线性映射. 我们不省略此映射中的圆括号，以避免不必要的误解.

13.4.1 两点间矢量变换

$\forall X_e \in T_eG$，借助左移动 L_g 在 G 上产生一个切矢量场 $\widetilde{X}$ 如下

$$\widetilde{X}(g) = (L_{g*})_e X_e, \qquad \forall g \in G. \tag{13.4-1}$$

因 L_g 是双射，当 g 遍历整个李群 G 时，$\widetilde{X}$ 便是微分流形 G 上的一个切矢量场. 当一组 $X_i \in T_eG$ 构成线性空间 T_eG 的基底时，左移动后的相应全体 $\widetilde{X}_i$ 也构成微分流形 G 切丛 TG 的基底.

我们将李群 G 上的群乘法记为

$$\varphi(g_1, g_2) = g_1 \cdot g_2, \qquad \forall g_1, g_2 \in G. \tag{13.4-2}$$

取单位元 e 附近的线性空间 T_eG 局部坐标为 $(U; x^i)$，再取 g 附近的线性空间 T_gG 局部坐标为 $(V; z^\alpha)$. φ 是光滑映射，利用它的连续性，适当缩小 U，存在 g 的小邻域 $V_1 \subset V$，使得 $\varphi(V_1 \times U) \subset V$，并记 $y^\alpha = z^\alpha|_{V_1}$. 这样，群乘法 φ 可用局部坐标表示为（其中 $1 \leqslant \alpha, j \leqslant m$）

$$z^\alpha = \varphi^\alpha(y^1, \cdots, y^m, x^1, \cdots, x^m), \qquad \{y^j\} \subset V_1,\ \{x^j\} \subset U. \tag{13.4-3}$$

很明显，φ^α 是自变量 y^j, x^j 的 C^∞ 函数.

$\forall X_e \in T_eG$，在 U 中都存在一条光滑曲线 $\gamma(t), -\epsilon < t < \epsilon$ 使得

$$\gamma(0) = e, \quad \gamma'(0) = X_e. \tag{13.4-4}$$

读者需要注意满足上述条件的曲线不止一条，它们都过 e 点且在此点相切，并且切矢量都相等；在 e 点局部此条曲线是唯一的，但远离 e 后可能不同. 左移动可以把整条曲线 $\gamma(t), -\epsilon < t < \epsilon$ 移动到 g 点，并且在 g 的切矢量是

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \big(g \cdot \gamma(t)\big) \xlongequal{4.5-8} (L_{g*})_e \gamma'(0) = (L_{g*})_e X_e = \widetilde{X}(g). \tag{13.4-5}$$

设 $\gamma(t)$ 的坐标是 $x^i(t)$，于是

$$X_e = \gamma'(0) = \frac{\mathrm{d}x^i(0)}{\mathrm{d}t}\frac{\partial}{\partial x^i} \qquad \Leftrightarrow \quad X_e^a = \frac{\mathrm{d}x^i(0)}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a. \tag{13.4-6}$$

那么，$\widetilde{X}(g)$ 的坐标表达式为

$$\widetilde{X}(g) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \big(g \cdot \gamma(t)\big) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \left(\varphi^\alpha\big(y^1, \cdots, y^m, x^1(t), \cdots, x^m(t)\big)\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right)$$

$$=\frac{\partial\varphi^\alpha(y,x)}{\partial x^j}\frac{\mathrm{d}x^j(0)}{\mathrm{d}t}\frac{\partial}{\partial y^\alpha}.$$

从上式可以说明两件事：第一，可以看出 $\widetilde{X}(g)$ 在 g 点是 C^∞ 可微的；第二，可以得到点 e 和 g 间基矢的变换公式.

$$(L_{g*})_e\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_e=\left.\frac{\partial\varphi^\alpha(y,x)}{\partial x^i}\right|_{\substack{x=e\\y=g}}\left.\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right|_g. \tag{13.4-7}$$

其中系数称为李群 G 的**辅助函数**，后面会多次用到这个函数，为此单列出来：

$$l_i^\alpha(y)\equiv\left.\frac{\partial\varphi^\alpha(y,x)}{\partial x^i}\right|_{\substack{x=e\\y=g}}. \tag{13.4-8}$$

上式与切映射公式（见(4.5-5)）本质相同. 与此对偶，可导出右移动的公式：

$$(R_{g*})_e\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_e=\left.\frac{\partial\varphi^\alpha(x,y)}{\partial x^i}\right|_{\substack{x=e\\y=g}}\left.\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right|_g. \tag{13.4-9}$$

13.4.2 切矢量场

前面只是两不同点间的矢量变换，下面进入切矢量场的内容.

定义 13.29 *设切矢量场 $X\in\mathfrak{X}(G)$，若 $\forall g\in G$ 都有 $L_{g*}X=X$（$R_{g*}X=X$），那么称切矢量场 X 是李群 G 的*左（右）不变切矢量场.

因 X 是切矢量场，故 X 在微分流形 G 上每一点都有定义；比如 X 定义在点 h，定义13.29中利用左移动将其移动到 gh 处，即 $(L_{g*})_hX(h)$；当 g 和 h 遍历整个李群 G 时，都有此式（$(L_{g*})_hX(h)=X(gh)$）成立，那么 X 便是左不变切矢量场. 右不变切矢量场也作类似理解.

定理 13.30 *设 G 是 m 维李群，幺元 e 中的切矢量 $X_e\in T_eG$ 经过左移动 L_g（g 遍历整个 G）变换产生一个切矢量场 $\widetilde{X}$，它是 G 左移动不变切矢量场. 反之，G 上任意左不变切矢量场都可由 T_eG 中某切矢量经左移动生成.*

证明 . 设 $\forall h\in G$，$\forall X_e\in T_eG$，由式(13.4-5)可知

$$(L_{h*})_g\circ(L_{g*})_eX_e=(L_{h*})_g\widetilde{X}(g\cdot e)=\widetilde{X}(h\cdot g). \tag{13.4-10}$$

因 h,g 都是任意群元，由上式可以看出：$\widetilde{X}(g)$ 是左移动不变切矢量场.

反之，任选 G 上左移动不变切矢量场 Y，即有

$$(L_{h*})_g Y(g) = Y(h \cdot g), \qquad \forall h, g \in G. \tag{13.4-11}$$

令 $g = e$ 得 $(L_{h*})_e Y(e) = Y(h)$，即满足定理要求. ■

定理 13.31 将 m 维李群 G 上全体左不变切矢量场的集合记为 $\mathscr{G}$，则 $\mathscr{G}$ 是 m 维线性空间，它与切空间 T_eG 同构.

证明 . 若 X, Y 是 G 上左不变切矢量场，则 $X + \lambda \cdot Y (\forall \lambda \in \mathbb{R})$ 也是李群 G 上的左不变切矢量场，满足封闭性. 不难验证 $\mathscr{G}$ 满足定义3.1，故 $\mathscr{G}$ 是线性空间.

由定理13.30可知，任意一左不变切矢量场 X 都可由单位元处的线性空间 T_eG 中矢量生成，我们定义一个映射 σ，它将 X 对应为 T_eG 中生成它的矢量：

$$\sigma(X) = X(e). \tag{13.4-12}$$

定理13.30已表明 σ 是双射；同时 $\sigma(X+\lambda\cdot Y) = X(e)+\lambda\cdot Y(e) = \sigma(X)+\lambda\cdot\sigma(Y)$，这便验证了 σ 是 $\mathbb{R}$-线性的. 故 σ 是同构映射. 我们已知 T_eG 是 m 维的，那么自然可以得到线性空间 $\mathscr{G}$ 也是 m 维的.

此外，$\forall X, Y \in \mathscr{G}$ 及 $\forall g \in G$ 都有 $L_{g*}X = X$, $L_{g*}Y = Y$，即切矢量场 X, Y 分别与它们自身是 L_g-相关的. 由定理4.65可知

$$L_{g*}[X, Y] = [L_{g*}X, L_{g*}Y] = [X, Y], \qquad \forall X, Y \in \mathscr{G}. \tag{13.4-13}$$

上式说明矢量场 $[X, Y]$ 也是左移动不变的，即 $[X, Y] \in \mathscr{G}$；所以 Poisson 括号在 $\mathscr{G}$ 上是封闭的；因此 $\mathscr{G}$ 是一个李代数，称之为**李群 G 的李代数**.

需要注意李群 G 的李代数 $\mathscr{G}$ 是有限维的；而例13.18中的李代数 $\mathfrak{X}(G)$ 是无穷维的；并且 $\mathscr{G}$ 是 $\mathfrak{X}(G)$ 的子代数. ■

因 $\mathscr{G}$ 与 T_eG 同构，故在 T_eG 中可以引入如下李积：$\forall A, B \in T_eG$ 有

$$[A, B] \overset{def}{=} [X, Y](e), \quad X, Y\text{是由}A, B\text{得到的左不变切矢量场.} \tag{13.4-14}$$

即切矢量场 X, Y 在单位元 e 处的对易关系决定了 A, B 的对易关系. 在这样的对易关系下，T_eG 也构成了李代数；很多时候，也称T_eG 是李群 G 的李代数. 通常我们将 T_eG 上的李代数记为 $\mathfrak{g}$；之后我们不再严格区分 $\mathfrak{g}$ 和 $\mathscr{G}$. 需要强调的是：式(13.4-14)中对易关系是以最自然的方式给定的，在这之前 T_eG 中矢量的对易关系是没有定义的.

13.4.3 李群李代数结构常数

本小节进一步阐述上面定义的李群 G 的李代数 $\mathscr{G}$（或 T_eG）. 下面来导出 T_eG 中的结构常数，我们选取 $\{\frac{\partial}{\partial x^i}|_e\}$ 为 T_eG 的基底；由式(13.4-7)可以导出上述 m 个基底生成的左不变切矢量场.

$$X_i(g)=(L_{g*})_e\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_e=\left.\frac{\partial\varphi^\alpha(y,x)}{\partial x^i}\right|_{\substack{x=e\\y=g}}\left.\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right|_g. \tag{13.4-15}$$

则

$$[X_i,X_j](g)=\left[\left.\frac{\partial\varphi^\beta(y,x)}{\partial x^i}\right|_{\substack{x=e\\y=g}}\left.\frac{\partial^2\varphi^\alpha(y,x)}{\partial y^\beta\partial x^j}\right|_{\substack{x=e\\y=g}}-\left.\frac{\partial\varphi^\beta(y,x)}{\partial x^j}\right|_{\substack{x=e\\y=g}}\left.\frac{\partial^2\varphi^\alpha(y,x)}{\partial y^\beta\partial x^i}\right|_{\substack{x=e\\y=g}}\right]\left.\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right|_g.$$

令上式中的 $g\to e$，则 $\varphi^\beta(y,x)\to x^\beta$，即 $\frac{\partial\varphi^\beta(y,x)}{\partial x^i}\to\delta_i^\beta$；那么可得到 T_eG 中基底 $\{\frac{\partial}{\partial x^i}|_e\}$ 间的结构常数

$$[X_i,X_j](e)=\left[\left.\frac{\partial^2\varphi^\alpha(y,x)}{\partial y^i\partial x^j}\right|_{\substack{x=e\\y=e}}-\left.\frac{\partial^2\varphi^\alpha(y,x)}{\partial y^j\partial x^i}\right|_{\substack{x=e\\y=e}}\right]\left.\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right|_e. \tag{13.4-16}$$

$$\text{记}\quad c_{ij}^\alpha=\left.\frac{\partial^2\varphi^\alpha(y,x)}{\partial y^i\partial x^j}\right|_{\substack{x=e\\y=e}}-\left.\frac{\partial^2\varphi^\alpha(y,x)}{\partial y^j\partial x^i}\right|_{\substack{x=e\\y=e}};\ \text{显然有}\ c_{ij}^\alpha=-c_{ji}^\alpha. \tag{13.4-17}$$

13.4.4 例题

例 13.32 可对易群意味着群乘法是可交换的，即 $\varphi(x,y)=\varphi(y,x)$. 由式(13.4-17)可知结构常数恒为零，即 $c_{ij}^\alpha=0$. ■

例 13.33 验证数域 $\mathbb{F}^*\equiv\mathbb{F}\backslash\{0\}$ 关于乘法构成一维李群.

首先，$\mathbb{F}^*$ 是一维光滑流形. 其次，对于群乘法（已选为 $\mathbb{F}$ 数乘法），$\mathbb{F}^*$ 中元素具有封闭性、可结合性；数字 1 是单位元；任意数 r 的倒数 $1/r$ 是其逆元. 综上 $\mathbb{F}^*$ 是群. 很明显对于数乘法（群乘法）和取倒数（群元求逆）运算是 C^∞ 运算，即无穷多次可微. 因乘法可交换，故称法群是可对易李群. 一般记作 $(\mathbb{F}^*,\times)$. 很明显，$(\mathbb{F}^*,\times)$ 有两个互相不连通的连通分支. ■

例 13.34 设 C^* 是非零复数全体构成的集合. (1) 额外引入复数乘法，证明 C^* 是二维实李群. (2) 求出李代数的基矢和结构常数.

先证 (1). 我们是在实数域 $\mathbb{R}$ 上讨论问题，是把 C^* 看成一个有序二维数对；即将 $z=x+\mathbb{i}y$ 映射为 (x,y)，这是个双射. 可以看出 C^* 是二维光滑流形. 设有复数 $z_1=x_1+\mathbb{i}y_1$ 和 $z_2=x_2+\mathbb{i}y_2$，则复数乘法为

$$z_1\cdot z_2=\varphi(z_1,z_2)=(x_1x_2-y_1y_2,\ x_2y_1+x_1y_2). \tag{13.4-18}$$

由于已将零（$(0,0)$）排除，所以复数乘法可逆（即除法），是

$$\varphi^{-1}(z)=\left(\frac{x}{x^2+y^2},\ \frac{-y}{x^2+y^2}\right). \tag{13.4-19}$$

由上两式可见复数乘法、求逆都是 C^∞ 函数运算.

下面再说明 C^* 对复数乘法构成群. 首先，C^* 对群乘法具有封闭性；其次，群乘法满足结合律；再者，存在逆元和单位元（复数 $e=(1,0)$）；故 C^* 构成群.

因此，C^* 是个二维李群.

再解 (2). 利用上面复数乘法公式(13.4-18)，先求四个辅助函数

$$\left.\frac{\partial\varphi^\alpha(z_1,z_2)}{\partial x_2}\right|_{z_2=e}=(x_1,\ y_1),\qquad \left.\frac{\partial\varphi^\alpha(z_1,z_2)}{\partial y_2}\right|_{z_2=e}=(-y_1,\ x_1). \tag{13.4-20}$$

在由式(13.4-7)可得 $z_1=x_1+\mathbb{i}y_1$ 处的基矢

$$\begin{aligned}X_1=&L_{g^*}\left.\frac{\partial}{\partial x_2}\right|_e=\left.\frac{\partial\varphi^1(z_1,z_2)}{\partial x_2}\right|_{z_2=e}\left.\frac{\partial}{\partial x_1}\right|_{z_1}+\left.\frac{\partial\varphi^2(z_1,z_2)}{\partial x_2}\right|_{z_2=e}\left.\frac{\partial}{\partial y_1}\right|_{z_1}\\ =&x_1\left.\frac{\partial}{\partial x_1}\right|_{z_1}+y_1\left.\frac{\partial}{\partial y_1}\right|_{z_1},\end{aligned} \tag{13.4-21}$$

$$X_2=L_{g^*}\left.\frac{\partial}{\partial y_2}\right|_e=-y_1\left.\frac{\partial}{\partial x_1}\right|_{z_1}+x_1\left.\frac{\partial}{\partial y_1}\right|_{z_1}. \tag{13.4-22}$$

由于复数乘法构成的李群是可对易群，所以结构常数都是零. 这也可以直接由 $[X_1,X_2]$ 直接计算得到（留给读者当练习）.

例题13.33和本例是群 $GL(1,\mathbb{F})$，它在李群一维表示中有重要作用；尤其复数域上的乘法群特别重要，故我们单独拿出来再叙述一遍. ■

例 13.35 一般线性群 $GL(m,\mathbb{R})$ 的李代数 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{R})$.

取 $GL(m,\mathbb{R})$ 中两个元素 $A=(a^j_{\cdot i}),B=(b^j_{\cdot i})$，它们的群乘积是 $(A\cdot B)^j_{\cdot i}=\sum_k a^j_{\cdot k}b^k_{\cdot i}$. 仿照上个例题，先求辅助函数

$$\left.\frac{\partial\varphi^j_{\cdot i}(A,B)}{\partial b^t_s}\right|_{b=I}=a^j_{\cdot k}\delta^k_{\cdot t}\delta^s_{\cdot i}=a^j_{\cdot t}\delta^s_{\cdot i}. \tag{13.4-23}$$

由式(13.4-7)可得李代数 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{R})$ 的基矢

$$X^s_{\cdot t}=L_{g*}\left.\frac{\partial}{\partial a^t_s}\right|_e=a^j_{\cdot t}\delta^s_{\cdot i}\left.\frac{\partial}{\partial a^j_i}\right|_g=a^j_{\cdot t}\left.\frac{\partial}{\partial a^j_s}\right|_g. \tag{13.4-24}$$

基矢间的对易关系是

$$\begin{aligned}[X^s_{\cdot t},X^l_{\cdot k}]=&a^j_{\cdot t}\left.\frac{\partial}{\partial a^j_s}\right|_g a^i_{\cdot k}\left.\frac{\partial}{\partial a^i_l}\right|_g-a^i_{\cdot k}\left.\frac{\partial}{\partial a^i_l}\right|_g a^j_{\cdot t}\left.\frac{\partial}{\partial a^j_s}\right|_g\\ =&a^i_{\cdot t}\delta^s_{\cdot k}\left.\frac{\partial}{\partial a^i_l}\right|_g-a^j_{\cdot k}\delta^l_{\cdot t}\left.\frac{\partial}{\partial a^j_s}\right|_g=\delta^s_{\cdot k}X^l_{\cdot t}-\delta^l_{\cdot t}X^s_{\cdot k}.\end{aligned} \tag{13.4-25}$$

由上式易得李代数 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{R})$ 的结构常数是

$$C^{(pq)}_{(st)(lk)}=\delta^s_{\cdot k}\delta^q_{\cdot t}\delta^l_{\cdot p}-\delta^l_{\cdot t}\delta^q_{\cdot k}\delta^s_{\cdot p}. \tag{13.4-26}$$

李群 $GL(m,\mathbb{R})$ 的李代数 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{R})$ 可以表示为

$$\mathfrak{gl}(m,\mathbb{R})=\mathrm{Span}_{\mathbb{R}}\left\{a^j_{\cdot t}\left.\frac{\partial}{\partial a^j_s}\right|_g\right\}. \tag{13.4-27}$$

除了按照上述微分几何的方式求解基矢之外，还可按照矩阵形式来求解．在例13.16中，已经说明 $\mathfrak{gl}(m)$ 是李代数，它的基矢是矩阵 $E^i_{\cdot j}(1\leqslant i,j\leqslant m)$；其中 $E^i_{\cdot j}$ 表示的第 i 行、第 j 列元素为 1，其余矩阵元是零．按照矩阵乘法，有

$$[E^s_{\cdot t},E^l_{\cdot k}]=E^s_{\cdot t}E^l_{\cdot k}-E^l_{\cdot k}E^s_{\cdot t}=\delta^l_{\cdot t}E^s_{\cdot k}-\delta^s_{\cdot k}E^l_{\cdot t}. \tag{13.4-28}$$

李代数是一种特殊的线性空间；一般说来，我们并不关心线性空间基矢长啥模样，只需关心线性变换（以及李积等）在基矢上的作用；如果作用相同，并且基矢间有线性同构关系，那么两组不同的基矢就没有差别了．只要我们找到两组不同基矢间的同构关系（见13.22），那么就可以不再严格区分它们了．依照这样的认知，我们在微分形式 $X^s_{\cdot t}$ 基矢和矩阵形式 $E^i_{\cdot j}$ 基矢间建立线性双射 π 如下：

$$\pi(X^i_{\cdot j})=-E^i_{\cdot j};\qquad 1\leqslant i,j\leqslant m. \tag{13.4-29}$$

因已约定双射 π 是线性的，故有

$$\pi(c\cdot X^i_{\cdot j}+X^t_{\cdot s})=-c\cdot E^i_{\cdot j}-E^t_{\cdot s}=c\cdot\pi(X^i_{\cdot j})+\pi(X^t_{\cdot s});\qquad \forall c\in\mathbb{R}. \tag{13.4-30}$$

所以双射 π 是线性同构映射. 又由于

$$\pi\left([X^s_{\cdot t}, X^l_{\cdot k}]\right) = \pi\left(\delta^s_{\cdot k}X^l_{\cdot t} - \delta^l_{\cdot t}X^s_{\cdot k}\right) = \delta^l_{\cdot t}E^s_{\cdot k} - \delta^s_{\cdot k}E^l_{\cdot t} = [E^s_{\cdot t}, E^l_{\cdot k}] = \left[\pi(X^s_{\cdot t}), \pi(X^l_{\cdot k})\right].$$

上式说明映射 π 保李积不变. 上面讨论表明：从纯粹的代数角度来看，基矢是微分形式的李代数完全同构于矩阵形式的李代数；两者没有区别.

这也就说明了：一般线性群 $GL(m,\mathbb{R})$ 的李代数就是例题13.16中的 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{R})$. 这一结论对于 $GL(m,\mathbb{C})$ 和 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{C})$ 也成立. ■

13.4.5 左不变仿射联络

定义 13.36 设有 m 维李群 G. $\forall g \in G$，$\forall X, Y \in \mathfrak{X}(G)$，若 $L_{g*}(\nabla_X Y) = \nabla_{L_{g*}X}(L_{g*}Y)$，则称仿射联络 ∇ 是李群 G 的**左不变仿射联络**.

定理 13.37 设 $\mathscr{G}$、∇ 是李群 G 的李代数和仿射联络；则 ∇ 是左不变的充分必要条件是：$\forall X, Y \in \mathscr{G}$ 都有 $\nabla_X Y \in \mathscr{G}$.

证明 . 先证“$\Rightarrow$”. $\forall X, Y \in \mathscr{G}$，$\forall g \in G$，$L_{g*}X = X$，$L_{g*}Y = Y$. 因 ∇ 是左不变的，故 $L_{g*}(\nabla_X Y) = \nabla_{L_{g*}X}(L_{g*}Y) = \nabla_X Y$. 此式说明 $\nabla_X Y$ 也是左不变切矢量场，故 $\nabla_X Y \in \mathscr{G}$.

再证“$\Leftarrow$”. 已知 $\forall X, Y \in \mathscr{G}$ 都有 $\nabla_X Y \in \mathscr{G}$. 在 $\mathscr{G}$ 中取定一组基底 $\{\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_m\}$，则 $\forall Z, W \in \mathfrak{X}(G)$ 都存在 $z^i, w^j \in C^\infty(G)$ 使得 $Z = z^i\boldsymbol{e}_i$、$W = w^j\boldsymbol{e}_j$ 成立. 于是有 $L_{g*}Z = (z^i L_{g^{-1}})L_{g*}\boldsymbol{e}_i$，$L_{g*}W = (w^j L_{g^{-1}})L_{g*}\boldsymbol{e}_j$，$L_{g*}\boldsymbol{e}_i = \boldsymbol{e}_i$，$\nabla_{\boldsymbol{e}_i}\boldsymbol{e}_j = L_{g*}(\nabla_{\boldsymbol{e}_i}\boldsymbol{e}_j)$；由此得

$$\begin{aligned}
\nabla_{L_{g*}Z}(L_{g*}W) =& \nabla_{(z^i L_{g^{-1}})L_{g*}\boldsymbol{e}_i}\left((w^j L_{g^{-1}})L_{g*}\boldsymbol{e}_j\right) = (z^i L_{g^{-1}})\nabla_{L_{g*}\boldsymbol{e}_i}\left((w^j L_{g^{-1}})L_{g*}\boldsymbol{e}_j\right)\\
=& (z^i L_{g^{-1}})(L_{g*}\boldsymbol{e}_j)L_{g*}\boldsymbol{e}_i\left((w^j L_{g^{-1}})\right) + (z^i L_{g^{-1}})(w^j L_{g^{-1}})\nabla_{L_{g*}\boldsymbol{e}_i}\left(L_{g*}\boldsymbol{e}_j\right)\\
=& \Big(\big(z^i\boldsymbol{e}_i(w^j)\big)L_{g^{-1}}\Big)(L_{g*}\boldsymbol{e}_j) + (z^i w^j L_{g^{-1}})\nabla_{L_{g*}\boldsymbol{e}_i}\left(L_{g*}\boldsymbol{e}_j\right)\\
=& L_{g*}\Big(\big(z^i\boldsymbol{e}_i(w^j)\big)\boldsymbol{e}_j\Big) + L_{g*}\Big((z^i w^j)\nabla_{\boldsymbol{e}_i}\boldsymbol{e}_j\Big) = L_{g*}(\nabla_Z W).
\end{aligned}$$

故 ∇ 是 G 的左不变联络. ■

设 ∇ 是李群 G 的左不变联络，在其李代数 $\mathscr{G}$ 中取定一组基底 $\{\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_m\}$. 因 $\nabla_{\boldsymbol{e}_i}\boldsymbol{e}_j \in \mathscr{G}$，由定理13.31可知存在常数$\{\Gamma^k_{ji}\}$ 使得 $\nabla_{\boldsymbol{e}_i}\boldsymbol{e}_j = \Gamma^k_{ji}\boldsymbol{e}_k$. 对一般的联络而言 $\{\Gamma^k_{ji}\}$ 是标量函数场，此处它们是常数.

有关更多左不变仿射联络知识可参考[25]§2.1.3.

13.4.6 右不变切矢量场

也存在通过右不变切矢量场来阐述本节理论的方式，具体可参见[70]§6.1；我们不打算全面介绍这种描述方式，只给出两者李积的关系. 先阐述右不变切矢量场的李代数的结构常数；选取 $\{\frac{\partial}{\partial x^i}|_e\}$ 为 T_eG 的基底，它对应的 m 个右不变切矢量场是（参见式(13.4-9)）：

$$Y_i(g) = (R_{g*})_e \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_e = \left.\frac{\partial \varphi^\alpha(x,y)}{\partial x^i}\right|_{\substack{x=e\\y=g}} \left.\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right|_g . \tag{13.4-31}$$

则

$$[Y_i, Y_j](g) = \left[\left.\frac{\partial \varphi^\beta(x,y)}{\partial x^i}\right|_{\substack{x=e\\y=g}} \left.\frac{\partial^2 \varphi^\alpha(x,y)}{\partial y^\beta \partial x^j}\right|_{\substack{x=e\\y=g}} - \left.\frac{\partial \varphi^\beta(x,y)}{\partial x^j}\right|_{\substack{x=e\\y=g}} \left.\frac{\partial^2 \varphi^\alpha(x,y)}{\partial y^\beta \partial x^i}\right|_{\substack{x=e\\y=g}} \right] \left.\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right|_g .$$

令上式中的 $g \to e$，则 $\varphi^\beta(x,y) \to x^\beta$，即 $\frac{\partial \varphi^\beta(x,y)}{\partial x^i} \to \delta_i^\beta$；那么可得到 T_eG 中基底 $\{\frac{\partial}{\partial x^i}|_e\}$ 间的（右）结构常数

$$[Y_i, Y_j](e) = \left[\left.\frac{\partial^2 \varphi^\alpha(x,y)}{\partial y^i \partial x^j}\right|_{\substack{x=e\\y=e}} - \left.\frac{\partial^2 \varphi^\alpha(x,y)}{\partial y^j \partial x^i}\right|_{\substack{x=e\\y=e}} \right] \left.\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right|_e . \tag{13.4-32}$$

$$\text{记} \quad \tilde{c}_{ij}^\alpha = \left.\frac{\partial^2 \varphi^\alpha(x,y)}{\partial y^i \partial x^j}\right|_{\substack{x=e\\y=e}} - \left.\frac{\partial^2 \varphi^\alpha(x,y)}{\partial y^j \partial x^i}\right|_{\substack{x=e\\y=e}} . \tag{13.4-33}$$

对比左不变切矢量场的结构常数 c_{ij}^α（见式(13.4-17)）可知：右不变切矢量场的结构常数 $\tilde{c}_{ij}^\alpha$ 与 c_{ij}^α 互为相反数，即

$$\tilde{c}_{ij}^\alpha = -c_{ij}^\alpha . \tag{13.4-34}$$

设 $\xi_i \in T_eG$. 令 X_i 表示由 ξ_i 左移动产生的左不变切矢量场，令 Y_i 表示由 ξ_i 右移动产生的右不变切矢量场. 利用左不变切矢量场 X_i，我们定义了 T_eG 中矢量的对易关系，即式(13.4-14). 与之类似，用右不变切矢量场 Y_i 也可以定义 T_eG 中矢量的对易关系如下：

$$[\xi_i, \xi_j]_r \overset{def}{=} [Y_i, Y_j](e). \qquad \text{右不变切矢量场} \tag{13.4-35}$$

$$[\xi_i, \xi_j]_l = [X_i, X_j](e). \qquad \text{左不变切矢量场} \tag{13.4-14}$$

由式(13.4-34)不难得到：

$$[\xi_i, \xi_j]_l = -[\xi_i, \xi_j]_r . \tag{13.4-36}$$

在实际使用中要注意这个“负号”的存在.

13.5 Maurer–Cartan 型式场

前面叙述了李群 G 的左不变切矢量场，这节来叙述它的对偶——左不变 1 次型式场，通常称为李群 G 的 Maurer–Cartan 型式场，简称 MC 场.

定义 13.38 设李群 G 是 m 维的，$\omega\in\mathfrak{X}^*(G)$. 如果 $\forall g\in G$ 都有 $L_g^*\omega=\omega$ 成立，那么称 ω 是李群 G 上的**左不变 1 次型式场**，也称为 **Maurer–Cartan 型式场**.

此定义与定义13.29是相互对偶的. 已知左移动 L_g 是光滑同胚，它所诱导的拉回映射 $L_g^*:T_{gh}^*G\to T_h^*G$ 自然是线性同构. 定义(13.38)中的式子 $L_g^*\omega=\omega$ 可具体理解为

$$L_g^*\omega(g\cdot h)=\omega(h)\quad\Leftrightarrow\quad L_g^*\omega(h)=\omega(g^{-1}\cdot h).\tag{13.5-1}$$

由此容易得到（其中 $X\in T_hG$）

$$\omega(h)(X)=\big(L_g^*\omega(g\cdot h)\big)(X)=\big(\omega(g\cdot h)\big)(L_{g*}X).\tag{13.5-2}$$

连续两次拉回映射是

$$L_f^*L_g^*\omega(h)=L_f^*\omega(g^{-1}\cdot h)=\omega(f^{-1}\cdot g^{-1}\cdot h)=L_{gf}^*\omega(h).\tag{13.5-3}$$

定理 13.39 有李群 G 上的 $\omega\in\mathfrak{X}^*(G)$ 是 MC 型式场的充要条件是：对于任意左不变切矢量场 X，$\omega(X)$ 是常数.

证明 . 先证“$\Rightarrow$”. 如果 ω 是 MC 型式场，令式(13.5-2)中的 $h=e$，那么有

$$\big(\omega(g)\big)(L_{g*}X_e)=\omega_e(X_e)=\text{常数}.\tag{13.5-4}$$

再证“$\Leftarrow$”. 如果 $\omega_g(X_g)=$ 常数, $\forall g\in G$，那么有

$$\omega_e(X_e)=\omega_g(X_g)=\omega_g(L_{g*}X_e)=L_g^*(\omega_g)X_e.\tag{13.5-5}$$

因 $X_e\in T_e(G)$ 是任取的，故有 $\omega_e=L_g^*(\omega_g)$，所以它是 MC 型式场. ■

定理 13.40 全体 MC 型式场构成线性空间（维数同李群 G 的维数），记为 $\mathscr{G}^*$.

证明 . 设李群 G 维数是 m. $\mathscr{G}^*$（MC 场就是全体左不变余切矢量场的集合，也就是 1 型式场的集合）是李代数 $\mathscr{G}$（全体左不变切矢量场的集合）的对偶空间；为此我们先叙述 $\mathscr{G}$ 的基矢量. 李群 G 单位元 e 处有局部坐标系 $(U;x^i)$，e 对

应坐标原点 $\{0\}$. 设由自然基矢 $\frac{\partial}{\partial x^i}|_e$ 生成的左不变切矢量场是（参见式(13.4-7)，辅助函数）

$$E_i = L_{g*}\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_e = l_i^k(x)\left.\frac{\partial}{\partial x^k}\right|_g; \quad l_i^k(x) \in C^\infty(U), \quad l_i^k(0) = \delta_i^k. \tag{13.5-6}$$

$\frac{\partial}{\partial x^i}|_e$ 是 T_eG 上的基矢量组，$\{E_i\}$ 是李代数 $\mathscr{G}$ 上的基矢量组，两者同构. 我们需要寻找 $\{E_i\}$ 的对偶矢量组；从 T_e^*G 的对偶基矢 $\mathrm{d}x^j|_e$ 出发，令

$$E^{*j} = L_{g^{-1}}^* \mathrm{d}x^j|_e = \tilde{l}_l^j \mathrm{d}x^l|_g. \tag{13.5-7}$$

余切空间 T_e^*G 是 m 维的，那么由 $\{E^{*j}\}$ 张成的空间自然也是 m 维的. 我们已知在单位元 e 处有 $\mathrm{d}x^j|_e(\frac{\partial}{\partial x^i}|_e) = \delta_i^j$，即两者是相互对偶的；我们也要求 E^{*j}, E_i 相互对偶，则有

$$\delta_i^j = E^{*j}(E_i) = \tilde{l}_l^j \mathrm{d}x^l|_g \left(l_i^k \left.\frac{\partial}{\partial x^k}\right|_g \right) = \tilde{l}_l^j l_i^k \delta_k^l = \tilde{l}_l^j l_i^l. \tag{13.5-8}$$

上式说明系数矩阵 $\tilde{l}_l^j$ 和 l_i^l 是互逆关系. 我需要证明 $\{E^{*j}\}$ 是左不变 1 形式场.

$$L_{h^{-1}}^* E^{*j} = L_{h^{-1}}^* L_{g^{-1}}^* \mathrm{d}x^j|_e = L_{g^{-1}h^{-1}}^* \mathrm{d}x^j|_e = \tilde{l}_k^j \mathrm{d}x^k|_{hg} \tag{13.5-9}$$

上式符合式(13.5-1)，也就验证了 $\{E^{*j}\}$ 是左不变 1 形式场，即 MC 场；我们猜测由它张成的空间就是 $\mathscr{G}^*$，即 $\mathscr{G}^* = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}\{E^{*j}\}$；只需最后一步证明.

我们任取一个 MC 场 $\omega(g)$，它满足式(13.5-1) （$L_{g^{-1}}^*\omega(h) = \omega(g\cdot h)$）；令 $h = e$ 有 $\omega(g) = L_{g^{-1}}^*\omega(e)$. 在 $T_e^*(G)$ 中，$\omega(e)$ 一定可以用 $\mathrm{d}x^i|_e$ 来展开的，即 $\omega(e) = a(x)_i \mathrm{d}x^i|_e$. 由此不难看到任选的 MC 场 $\omega(g)$ 可以表示为 $\omega(g) = L_{g^{-1}}^*\omega(e) = \omega(g) = L_{g^{-1}}^* a(x)_i \mathrm{d}x^i|_e = a_i(x)\tilde{l}_k^i \mathrm{d}x^k|_g = a_i(x)E^{*i}$；这说明任意 MC 场都是由 $\{E^{*j}\}$ 张成的，也就证明了 $\mathscr{G}^* = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}\{E^{*j}\}$.

由于 $\mathscr{G}^*$ 是线性同构于 $T_e^*(G)$ 的，这完全类似于 $\mathscr{G}$ 线性同构 $T_e(G)$，故 $\mathscr{G}^*$ 也是 m 维线性空间. ■

13.6 可解、幂零李代数

本节省略的定理证明可在[75]§4.1-§4.2中查到；或查阅任意一本李代数书籍.

命题 13.41 设 $\mathfrak{g}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的李代数. $\mathfrak{g}$ 中序列

$$\mathfrak{g}^{(0)}=\mathfrak{g},\ \mathfrak{g}^{(1)}=\left[\mathfrak{g}^{(0)},\mathfrak{g}^{(0)}\right],\cdots,\mathfrak{g}^{(k+1)}=\left[\mathfrak{g}^{(k)},\mathfrak{g}^{(k)}\right],\cdots$$
$$\mathfrak{g}^{0}=\mathfrak{g},\quad \mathfrak{g}^{1}=\left[\mathfrak{g},\mathfrak{g}^{0}\right],\qquad \cdots,\mathfrak{g}^{k+1}=\left[\mathfrak{g},\mathfrak{g}^{k}\right],\cdots$$

的每一项都是 $\mathfrak{g}$ 的理想，它们分别称为 $\mathfrak{g}$ 的**导代数序列**、**降中心序列**.

证明 . 很明显 $\mathfrak{g}^1=[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]=\mathfrak{g}^{(1)}$；当 $k\geqslant 2$ 时，两个序列一般不等.

对 k 作归纳证明，$\mathfrak{g}^{(0)}=\mathfrak{g}$ 自然是 $\mathfrak{g}$ 的理想. 设 $\mathfrak{g}^{(k)}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想，于是

$$\left[\mathfrak{g},\mathfrak{g}^{(k+1)}\right]=\left[\mathfrak{g},\left[\mathfrak{g}^{(k)},\mathfrak{g}^{(k)}\right]\right]=\left[\left[\mathfrak{g},\mathfrak{g}^{(k)}\right],\mathfrak{g}^{(k)}\right]\subseteq\left[\mathfrak{g}^{(k)},\mathfrak{g}^{(k)}\right]=\mathfrak{g}^{(k+1)}.$$

上式说明导代数序列是理想. 降中心序列证明类似，请读者补齐. ■

定义 13.42 设 $\mathfrak{g}$ 是李代数. 若有 k 使得 $\mathfrak{g}^k=0$，则称 $\mathfrak{g}$ 为**幂零李代数**（nilpotent）. 若有 k 使得 $\mathfrak{g}^{(k)}=0$，则称 $\mathfrak{g}$ 为**可解李代数**（solvable）.

由于可解（幂零）李代数必定包含非零可对易理想，故它一定不是半单的.

例 13.43 显然，可对易李代数（Abel 李代数）是幂零李代数. ■

例 13.44 所有 m 阶上三角方阵集 $\mathfrak{t}(m,\mathbb{F})$ 构成可解李代数.

$\mathfrak{g}$ 是由 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{F})$ 中所有上三角方阵全体组成的李代数. 令

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & & * \\ & \ddots & \\ & & a_{mm}\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} b_{11} & & * \\ & \ddots & \\ & & b_{mm}\end{pmatrix}.$$

上面方阵中的空白部分全为零，下同. 由于

$$[A,B]=AB-BA=\begin{pmatrix} 0 & c_{12} & \cdots & c_{1m} \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & c_{m-1\,m} \\ & & & 0\end{pmatrix},$$

当然，这里的 $c_{ij}(i<j)$ 依赖于 a_{kl} 、$b_{kl}(k\leqslant l)$；因此有

$$\mathfrak{g}^{(1)}=[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]=\left\{\begin{pmatrix} 0 & c_{12} & \cdots & c_{1m} \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & c_{m-1\,m} \\ & & & 0\end{pmatrix},\quad c_{ij}\in\mathbb{F},\quad i<j\right\}.$$

由直接计算可得：

$$\mathfrak{g}^{(2)}=\left[\mathfrak{g}^{(1)},\mathfrak{g}^{(1)}\right]=\left\{\begin{pmatrix} 0 & 0 & c_{13} & \cdots & c_{1m} \\ & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & c_{m-2\,m} \\ & & & \ddots & 0 \\ & & & & 0 \end{pmatrix},\quad c_{ij}\in\mathbb{F},\quad i<j-1\right\}.$$

用归纳法容易得到 $\mathfrak{g}^{(m)}=0$ （零矩阵），所以 $\mathfrak{t}$ 是可解的． ■

例 13.45 所有 m 阶严格上三角方阵集 $\mathfrak{n}(m,\mathbb{F})$ 构成幂零李代数．

严格上三角方阵是指对角元全部为零的上三角方阵．重复上一例题的过程，可以验证 $\mathfrak{n}(m,\mathbb{F})$ 是幂零李代数． ■

例 13.46 由于 $\mathfrak{g}^{(k)}\subseteq\mathfrak{g}^{k}$，所以幂零李代数是可解李代数．反之未必． ■

例 13.47 设 $\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})\cap\mathfrak{t}(2,\mathbb{C})$，则 $\mathfrak{g}^{1}=\mathfrak{g}^{(1)}=\mathfrak{n}(2,\mathbb{C})\neq\{0\}$．继续计算易得 $\mathfrak{g}^{(2)}=\{0\}$；$k\geqslant 1$ 时，$\mathfrak{g}^{k}=\mathfrak{g}^{1}\neq\{0\}$．因此 $\mathfrak{g}$ 是可解的，但不是幂零的． ■

例 13.48 易证一维、二维李代数（见 §13.1）都是可解李代数；一维李代数和二维可对易李代数还是幂零李代数．不难验证二维非对易李代数不是幂零的． ■

例 13.49 令 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{iso}(2)$ 或 $\mathfrak{so}(3)$ （见 §13.10.4.2、§13.11.3.1）．

三维李代数 $\mathfrak{iso}(2)$ 的基 X_1,X_2,X_3 满足：

$$[X_1,X_2]=X_3,\quad [X_1,X_3]=-X_2,\quad [X_2,X_3]=0.$$

则 $\mathfrak{g}^{(1)}=[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ 是由 X_2,X_3 张成的 $\mathfrak{g}$ 的一个理想子代数；继续计算，易得 $\left[\mathfrak{g}^{(1)},\mathfrak{g}^{(1)}\right]=0$．故 $\mathfrak{iso}(2)$ 是一个可解李代数．易证 $\mathfrak{iso}(2)$ 不是幂零李代数．

另一个三维李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 基矢的对易关系是

$$[X_1,X_2]=X_3,\quad [X_2,X_3]=X_1,\quad [X_3,X_1]=X_2.$$

经过简单计算不难发现 $\mathfrak{g}^{(1)}=\mathfrak{g}$，故它不是可解的． ■

例 13.50 由幂零李代数定义可知：$\mathfrak{g}$ 是幂零的充要条件是存在正整数 k 使得 $\forall x_i\in\mathfrak{g}$（$i=1,2,\cdots,k$），有

$$[x_1,[x_2,\cdots,[x_k,y]\cdots]]=\mathrm{ad}_{x_1}\mathrm{ad}_{x_2}\cdots\mathrm{ad}_{x_k}(y)=0,\qquad\forall y\in\mathfrak{g}.$$

其中 ad_x 定义见 §13.9.1． ■

下面定理是可解（幂零）李代数中极其基本的定理.

定理 13.51 （李定理）设 (ρ, V) 是复数域 $\mathbb{C}$ 上有限维可解李代数 $\mathfrak{g}$ 的有限维表示. 则在 V 中存在基矢，使得 $\forall x \in \mathfrak{g}, \rho(x)$ 在此基下的矩阵为上三角方阵.

定理 13.52 （Engel 定理）设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，$\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的子代数，其中任何元素均是 V 的幂零线性变换，则 $\mathfrak{g}$ 是幂零李代数.

定理 13.53 如果 $\mathfrak{g}$ 是作用在 m 维实（或复）线性空间 V 上的幂零李代数，那么 V 中存在一组基使得 $\mathfrak{g}$ 中任意线性变换 A 关于这组基矢所对应的矩阵是严格上三角方阵 $\mathfrak{n}(m, \mathbb{F})$.

上述三个定理表明：在复数域（不能是实数域）上研究可解李代数，在同构意义下就是研究全体复上三角方阵及其子代数. 在实（或复）数域上研究幂零李代数，在同构意义下就是研究全体严格上三角方阵及其子代数.

命题 13.54 可解（幂零）李代数的子代数（商代数）是可解（幂零）的.

命题 13.55 若李代数 $\mathfrak{g}$ 可解（幂零），则 g 的任何子代数以及到另一李代数内的同态像都是可解（幂零）的；特别 $\mathfrak{g}$ 的任一商代数都是可解（幂零）的.

命题 13.56 设有数域 $\mathbb{F}$ 上的李代数 $\mathfrak{g}$；如果 $\mathfrak{g}$ 的两个理想 $\mathfrak{h}$、$\mathfrak{k}$ 是可解（幂零）的，则 $\mathfrak{h}+\mathfrak{k}$（它俩的和）仍是可解（幂零）的.

下面讨论可解李群、幂零李群.

设 G 是一个 m 维 $(m \geqslant 1)$ 李群，A, B 是 G 的两个子群. 记 (A, B) 是由所有的 $\{xyx^{-1}y^{-1} \mid x \in A, y \in B\}$ 生成的 G 的子群. 如果 A, B 是 G 的不变子群，则 (A, B) 也是 G 的一个不变子群. 用 $(\overline{A, B})$ 表示 (A, B) 的闭包.

令 $G^{(0)} = G$；用归纳法定义 $G^{(k+1)} = \left(\overline{G^{(k)}, G^{(k)}}\right)$，其中 k 是自然数. 如果存在正整数 k，使得 $G^{(k)} = e$，则称**李群 G 是可解的**. 这里，每个 $G^{(k)}$ 都是 G 的闭的不变子群.

令 $G^0 = G$；用归纳法定义 $G^{k+1} = \left(\overline{G, G^k}\right)$，其中 k 是自然数. 如果存在正整数 k，使得 $G^k = e$，则称**李群 G 是幂零的**. 幂零李群自然是可解的.

定理 13.57 设 G 是一个 m 维连通李群；则 G 是可解的（幂零的）充分必要条件是 G 的李群李代数 $\mathfrak{g}$ 是可解的（幂零的）.

我们给出两个例子. 第一个：任一个 Abel 李群都是可解李群.

例 13.58 $ISO(2)$ 群（见 §13.11.3.1）是一个可解群.

$ISO(2)$ 群的矩阵表示为：

$$G=\left\{\left.\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & a\\ \sin\theta & \cos\theta & b\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\right|(\theta,a,b)\in\mathbb{R}^3\right\}.$$

由计算可知

$$G^{(1)}=\left\{\left.\begin{pmatrix}1 & 0 & z_1\\ 0 & 1 & z_2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\right|z_1,z_2\in\mathbb{R}\right\},$$

进而 $G^{(2)}=\left(\overline{G^{(1)},G^{(1)}}\right)=I_3$ （I_3 是单位矩阵）；故 G 是一个可解李群. ■

13.7 李群、李代数基本定理

定理 13.59 设 $(U,\varphi),(V,\varphi)$ 为李群 G 包含幺元 e 的标架，使得 $V^{-1}=V,V^3\subset U,\bar{V}\subset U$. 设李群 G 的幺元 e 坐标为 0，记乘法函数为 $\varphi(x,y)$（见式(13.4-3)），辅助函数构成的方阵为 $L(x)=\left(l_j^i\right),\det L(x)>0,\forall x\in\varphi(V)$. 则有

(1) （李氏第一定理）$\varphi(x,0)=x$，且乘法函数 φ 适合偏微分方程

$$\frac{\partial\varphi(x,y)}{\partial y}=L\big(\varphi(x,y)\big)L(y)^{-1}. \tag{13.7-1}$$

(2) （李氏第二定理）辅助函数（定义见(13.4-8)）

$$l_i^j(x)=\left.\frac{\partial\varphi^j(x,y)}{\partial y_i}\right|_{y=0},\quad \text{及初值 } l_i^j(0)=\delta_i^j,\quad 1\leqslant i,j\leqslant n \tag{13.7-2}$$

满足偏微分方程组

$$l_i^k(x)\frac{\partial l_j^p(x)}{\partial x_k}-l_j^k(x)\frac{\partial l_i^p(x)}{\partial x_k}=C_{ij}^k l_k^p(x),\quad 1\leqslant i,j,k,p\leqslant n. \tag{13.7-3}$$

(3) （李氏第三定理）结构常数 C_{ij}^k, $1\leqslant i,j,k\leqslant n$ 满足如下关系

$$C_{ij}^k+C_{ji}^k=0;\qquad C_{ij}^pC_{pk}^q+C_{jk}^pC_{pi}^q+C_{ki}^pC_{pj}^q=0. \tag{13.7-4}$$

上述定理证明见[75]§3.7定理 19. 下面叙述李氏三个定理的逆定理（证明见[75]§3.7定理 20）.

定理 13.60 设有李代数 $\mathfrak{g}$；则存在局部李群 G，G 的李代数与 $\mathfrak{g}$ 同构.

不同李群可能有相同的李代数，确切地说（证明见[75]§3.7定理 21）：

定理 13.61 若局部李群 G 和 H 的李代数同构，则 G 和 H 局部微分同胚.

关于李群和李代数同态有如下重要定理；定理证明可参阅[70]§6.1定理 1.5.

定理 13.62 设有两个李群 G, H，它们的李代数是 $\mathscr{G}, \mathscr{H}$. 假设有同态映射 $\phi : G \to H$，那么 **(1)** ϕ 在它们的李代数间诱导出同态映射 $\psi = \phi_* : \mathscr{G} \to \mathscr{H}$ 是李代数同态；**(2)** 如果 ϕ 是李群同构，那么 $\psi = \phi_*$ 也是李代数的同构.

李群同态（同构）可以诱导出李代数同态（同构）. 反之则未必，具体情形可参考[91]p.226–231，以及定理 3.2.13 至 3.2.21. 我们摘录定理如下：

定理 13.63 设有连通李群 H 及其李代数 $\mathfrak{h}$，再设有单连通李群 G 及其李代数 $\mathfrak{g}$. 设 ρ 是从李代数 $\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{h}$ 的同态映射，则存在唯一的从单连通李群 G 到李群 H 的李群同态映射 σ 使得 $\sigma_* = \rho$ 成立.（证明见[91]p.235定理 3.2.14）

定理 13.64 任给李代数 $\mathfrak{L}$. 在李群同构的意义下唯一存在连通且单连通李群 $\widehat{G}$，它的李代数 $\widehat{\mathfrak{g}}$ 和 $\mathfrak{L}$ 同构（这是在说在同构意义下李代数 $\mathfrak{L}$ 和单连通李群 $\widehat{G}$ 相互唯一确定）. 若存在其它连通李群 G 的李代数 $\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{L}$ 同构，这等价于，在李群 $\widehat{G}$ 中存在离散正规子群 Γ，使得商李群 $\widehat{G}/\Gamma$ 和 G 同构. 确切地说 $(\widehat{G}, \phi)$ 为李群 G 的通用覆盖群，$\pi : \widehat{G} \to \widehat{G}/\Gamma$ 为自然映射，$\sigma : \widehat{G}/\Gamma \to G$ 为满同构，则有覆盖映射 $\phi = \sigma \circ \pi$.（证明见[91]p.238定理 3.2.20）

定理 13.65 设李群 H 为李群 G 的李子群，H 的李代数是 $\mathscr{H}$，G 的李代数是 $\mathscr{G}$. 则必有：**(1)** $\mathscr{H}$ 是 $\mathscr{G}$ 的子代数. **(2)** $\mathscr{G}$ 每个子代数恰好是 G 内唯一一个连通李子群的李代数.（证明见[75]§3.8定理 22）

定理 13.66 若李群 H 为李群 G 的闭子群，则 H 是 G 的拓扑李子群.（证明见[75]§3.8定理 23）

定理 13.67 （Ado 定理）数域上的 m 维李代数必定同构于一个矩阵李代数 $\mathfrak{gl}(m, \mathbb{F})$ 的李子代数.（证明参见[26]§7.4）

李群有直积、半直积概念；与之对应，李代数有直和、半直和的概念.

定义 13.68 如果李代数 $\mathfrak{g}$ 有两个理想 $\mathfrak{h}$、$\mathfrak{k}$，并且满足 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} + \mathfrak{k}$、$\mathfrak{h} \cap \mathfrak{k} = \{0\}$；那么称 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{h}$、$\mathfrak{k}$ 的**直和**，记为 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{k}$.

定义 13.69 如果李代数 $\mathfrak{g}$ 有理想 $\mathfrak{h}$ 和子代数 $\mathfrak{k}$（不是理想，只是子代数），并且

满足 $\mathfrak{g}=\mathfrak{h}+\mathfrak{k}$、$\mathfrak{h}\cap\mathfrak{k}=\{0\}$；那么称 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{h}$、$\mathfrak{k}$ 的**半直和**，记为 $\mathfrak{g}=\mathfrak{h}\oplus_{\mathrm{S}}\mathfrak{k}$.

定理 13.70 （Levi–Malcev 定理）数域上的任意有限维李代数 $\mathfrak{g}$ 必定可以分解为可解李代数 $\mathfrak{s}$ 与半单李代数 $\mathfrak{k}$ 的半直和，即 $\mathfrak{g}=\mathfrak{s}\oplus_{\mathrm{S}}\mathfrak{k}$.（证明参见[26]$^{\S 5.6}$）

复半单李代数分类已由 Cartan 完成．可解李代数分类仍未彻底解决.

13.8 单参数子群与指数映射

13.8.1 单参数子群

单参数子群是最简单的李子群之一，容易研究清楚．单参数子群理论与单参数微分变换群（见 §4.10）内容有密切关系．我们已经知道实数域 $\mathbb{R}$ 关于加法构成一维、单连通、可对易李群（见例13.10），用它可以定义单参数子群.

定义 13.71 设 G 是李群，其维数不小于 1．如果映射 $\sigma:\mathbb{R}\to G$ 是浸入的（微分流形角度），并且又是群 $(\mathbb{R},+)$ 到群 G 内的一个同态（群的角度）；则称 σ 是 G 的**单参数子群**.

定理 13.72 m 维李群 G 的任一左不变切矢量场 X 都是完备的.

证明 . 完备的定义见4.78．我们不考虑 X 的积分曲线有人为奇点的情形；若有，通过延拓消除即可．根据 §4.10理论（李群 G 也是光滑流形，自然可用该节理论）可知在 $\mathbb{R}$ 的局部开区间 $(-\epsilon,+\epsilon)$（$\epsilon>0$）上 X 一定存在积分曲线 $\sigma(t)$ 满足：$\sigma:(-\epsilon,+\epsilon)\to G$，$\sigma(0)=e$，$\sigma'(0)=X$；其中 e 是 G 的单位元．取 $\sigma(t)$ 线上一点 $h\equiv\sigma(\epsilon/2)$，再定义 $\nu(t)\equiv h\cdot\sigma(t-\epsilon/2)$；$h$ 和 $\sigma(t-\epsilon/2)$ 都是李群 G 中的群元，$\nu(t)$ 是通过两者的群乘法来定义的；由这个定义不难看出 $\nu(t)$ 的定义域是 $(-\epsilon/2,\,3\epsilon/2)$.

为了进一步讨论，我们先证明一个公式．设 f 是 $\sigma(\mathbb{R})$ 上任意的 C^∞ 函数场，

$$
\begin{aligned}
L_{\sigma_{t_2}*}\circ\sigma_{t_1*}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)f &\xlongequal{4.38(2)} \left(L_{\sigma_{t_2}}\circ\sigma_{t_1}\right)_*\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)f \xlongequal{4.5-8} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f\left(L_{\sigma_{t_2}}\circ\sigma_{t_1}\right)\\
&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f\left(\sigma_{t_2}\circ\sigma_{t_1}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f\big(\sigma(t_2+t_1)\big)=\sigma_{(t_1+t_2)*}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)f.
\end{aligned}
$$

其中 t_1,t_2 是任意固定实数，且 t 的取值不超出定义域范围．上式说明，有

$$
L_{\sigma_{t_2}*}\circ\sigma_{t_1*}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)=\sigma_{(t_1+t_2)*}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\sigma(t_1+t_2)}. \tag{13.8-1}
$$

利用上式，我们可以求取曲线 $\nu(t)$ 的导数了，

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\nu(0)} = (L_h \circ \sigma_{t-\epsilon/2})_* \left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \right) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\sigma(0)}. \tag{13.8-2}$$

这说明 $\nu(t)$ 和 $\sigma(t)$ 在它们定义域重合的区域中，它们各自诱导的切矢量场是相同的；由积分曲线局部唯一性定理（常微分方程解唯一性）可知定义域重合区域里（$(-\epsilon/2, \epsilon)$）积分曲线也是重合的，即 $\nu = \sigma$. 由此可见原始积分曲线 $\sigma(t)$ 的定义域 $(-\epsilon, \epsilon)$ 已被延拓至 $(-\epsilon, 3\epsilon/2)$；重复上述操作便可得到左不变切矢量场 X 的一条定义在全实数轴 $\mathbb{R}$ 上的积分曲线，也就说明了 X 是完备的. ■

定理 13.73 *设 G 是 $m(>0)$ 维李群，任意给定 T_eG 内一个非零矢量 X_e，由 X_e 生成的左不变切矢量场是 $X(t)$；那么一定存在唯一单参数子群 $\sigma(t)$ 满足 $X(t) = \sigma_{t*}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)$. 并且，切矢量场 $X(t)$ 在 G 上生成的单参数变换群 ϕ_t 恰好是 $\sigma(t)$ 在 G 上的右移动，即 $\phi_t(g) = R_{\sigma(t)}(g) = g \cdot \sigma(t),\ \forall g \in G$.*

证明 . 由定理13.72可知 $X(t)$ 是完备矢量场；根据 §4.10理论可知，在单位元 e 附近存在邻域 U，$X(t)$ 在 U 上的限制 $X|_U$ 可诱导唯一一个（局部）单参数变换群 $\phi : (-\epsilon, \epsilon) \times U \to G$.

任取李群 G 中的元素 g，那么 $\tilde{U} = g \cdot U = L_g(U)$ 是 g 的一个邻域. 则

$$\tilde{\phi}(t, h) = g \cdot \phi(t, g^{-1} \cdot h), \qquad \forall (t, h) \in (-\epsilon, \epsilon) \times \tilde{U}, \tag{13.8-3}$$

是从 $(-\epsilon, \epsilon) \times \tilde{U}$ 到 G 的局部单参数变换群. 容易求得 $\tilde{\phi}(t, h)$ 诱导的切矢量场

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \tilde{\phi}(t, h) \overset{4.5-8}{=\!=\!=} L_{g*} \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \phi(t, g^{-1}h) = L_{g*}\big(X(g^{-1}h)\big) = X(h). \tag{13.8-4}$$

这说明 $\tilde{\phi}(t, h)$ 诱导的切矢量场仍是 $X(t)$（注意 $X(t)$ 是左不变的）. 令

$$\sigma(t) \overset{def}{=} \phi(t, e), \qquad \forall t \in \mathbb{R}. \tag{13.8-5}$$

映射 $\sigma(t)$ 显然是和 X 相关的，为了简洁起见，没有把它记成 $\sigma_X(t)$. 由 $\phi(t)$ 的性质可知

$$\sigma(t + s) = \phi(t + s, e) = \phi_s \circ \phi_t(e) = \phi_s\big(\sigma(t)\big) = \phi_s \circ L_{\sigma(t)}(e). \tag{13.8-6}$$

因为 $X(t)$ 是左移动 $L_{\sigma(t)}$ 不变的矢量场，由命题4.84可知：ϕ_s 与 $L_{\sigma(t)}$ 是可交换的．继续上式的计算，有

$$\sigma(t+s)=L_{\sigma(t)}\circ\phi_s(e)=L_{\sigma(t)}\circ\sigma(s)=\sigma(t)\cdot\sigma(s). \tag{13.8-7}$$

这说明 $\sigma(t)$ 是群 $(\mathbb{R},+)$，同时它也是李群 G 的同态映射；因此 $\sigma:\mathbb{R}\to G$ 是李群 G 的单参数子群．

对于任意 $g\in G$，由于 $X(t)$ 是左不变切矢量场，由命题4.84可知 $\phi_t\circ L_g=L_g\circ\phi_t$；将此式作用在单位元 e 上便有

$$\phi_t\circ L_g(e)=L_g\circ\phi_t(e)\Rightarrow\phi_t\circ g=L_g\circ\sigma(t)=g\cdot\sigma(t)=R_{\sigma(t)}(g). \tag{13.8-8}$$

注意到 $\phi_t\circ g$ 是 $\phi_t(g)$，便可知上式满足定理要求．

注意到 $X(e)=\sigma'(0)=\sigma_{0*}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)$．令式(13.8-1)中 $t_1=0,\ t_2=t$，有

$$\sigma_{t*}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)=L_{\sigma_{t*}}\circ\sigma_{0*}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)=L_{\sigma_{t*}}\big(X(e)\big)=X\big(\sigma(t)\big). \tag{13.8-9}$$

上式说明由式(13.8-5)定义的单参数子群符合定理中要求．$\sigma(t)$ 的唯一性可由常微分方程组解唯一性定理得到． ■

通过上述分析可知（严紧证明见[90]§2.1定理 1）：

定理 13.74 如下四种表述等价：**(1)** 李群 G 的李代数 $\mathfrak{g}$；**(2)** 左不变切矢量场；**(3)** （左）单参数微分同胚群的切矢量场；**(4)** 单参数子群的切矢量场．

13.8.2 指数映射

定义 13.75 设有李群 G，$\forall X_e\in T_eG$，用 $\sigma_X:\mathbb{R}\to G$ 表示李群 G 中由 X_e 确定的单参数子群（见(13.8-5)）．定义**指数映射**为 $\exp:T_eG\to G$，具体表示为

$$\exp(X)\overset{def}{=}\sigma_X(1);\qquad\forall X\in T_eG. \tag{13.8-10}$$

定理 13.76 设有 m 维李群 G，指数映射 $\exp:T_eG\to G$ 是光滑的，且有

$$(1):\exp(tX)=\sigma_X(t);\qquad(2):(\exp)_{*0}=\mathrm{id}. \tag{13.8-11}$$

其中 $\exp(tX)$ 中的 X 也称为李群 G 的**生成元**．第 (2) 条是说指数映射在零矢量处是 G 切空间的恒等映射．

李群 G 的李代数 $\mathscr{G}$ 是其左不变切矢量场；有些时候，把 $\mathscr{G}$（或 T_eG）中的一组基矢量称为李群 G 的（无穷小）**生成元**（generator）；这是因为可以用指数映射将李代数 T_eG 中元素映射到李群 G 中．但是根据命题13.93可知，并不是每一个群元都在指数映射的像集内；故生成元这个称呼并不是那么贴切．

证明 ．单位元 e 处有局部坐标系 $(U;x^i)$，e 对应坐标原点 $\{0\}$．设由自然基矢 $\frac{\partial}{\partial x^i}|_e$ 生成的左不变切矢量场是（参见式(13.4-7)，辅助函数）

$$E_i=(L_{g*})_e\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_e=l_i^j(x)\left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_g;\quad l_i^j(x)\in C^\infty(U),\quad l_i^j(0)=\delta_i^j. \tag{13.8-12}$$

$\frac{\partial}{\partial x^i}|_e$ 是 T_eG 上的基矢组，$\{E_i\}$ 是李代数 $\mathscr{G}$ 上的基矢组，两者同构．$\forall(a^1,\cdots,a^m)\in\mathbb{R}^m$，那么 $X=a^i\frac{\partial}{\partial x^i}|_e$ 所生成的左不变切矢量场是

$$\widetilde{X}=a^iE_i=a^il_i^j(x)\frac{\partial}{\partial x^j}. \tag{13.8-13}$$

由 $\widetilde{X}$ 构建一个常微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}x^j(t)}{\mathrm{d}t}=a^il_i^j(x);\qquad \text{初条件 } x^j(0)=0. \tag{13.8-14}$$

那么，上述方程组的解便是左不变切矢量场 $\widetilde{X}$ 过单位元 e 的积分曲线，此积分曲线显然为由式(13.8-5)定义的 $\sigma_X(t)$；现在我们将这个解记为 $\exp(tX)\equiv\sigma_X(t)$；也就是说式(13.8-14)中的 $x^j(t)$ 是 $\exp(tX)\equiv\sigma_X(t)$ 的局部坐标表达．当 $t=0$ 时，自然得到单位元 e（它的局部坐标是 $\{0\}$）；当 $t=1$ 时，此解便是指数映射(13.8-10)；由此可见第 (1) 条是成立的．根据常微分方程解存在唯一性依赖定理可知 $\exp(tX)$ 是参数 $t,a^1,\cdots,a^m$ 的光滑函数．

采用直接求导的方式证明第 (2) 条；因 $\exp(tX)$ 是左不变切矢量场 $\widetilde{X}$ 过单位元 e 的积分曲线，故

$$X=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}\exp(t\cdot X)=(\exp)_{*0}\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}(t\cdot X)\right)=(\exp)_{*0}(X). \tag{13.8-15}$$

定理第 (2) 条得证． ■

指数映射是通过单参数子群来定义的，那么明显有

$$\exp(t+s)X=\sigma_X(s+t)=\sigma_X(t)\cdot\sigma_X(s)=\exp(tX)\cdot\exp(sX). \tag{13.8-16}$$

由定理4.40可以得到如下命题：

命题 13.77 指数映射 $\exp : T_eG \to G$ 在单位元 e 的小邻域内是局部微分同胚的.

定理 13.78 设 F 是从 m 维李群 M 到 n 维李群 N 的 C^∞ 同态映射. 对于 M 内任意单参数子群 $\exp(tX)$，有 $F\big(\exp(tX)\big) = \exp\big(t(F_*X)\big)$.

证明 . 因 F 是同态映射，那么有（其中 $X \in T_eM$）

$$F\big(\exp(t+s)X\big) = F\big(\exp(tX)\cdot\exp(sX)\big) = F\big(\exp(tX)\big)\cdot F\big(\exp(sX)\big).$$

上式说明 $F\big(\exp(tX)\big)$ 是李群 N 内的单参数子群；故存在 $Y \in T_eN$ 使得 $F\big(\exp(tX)\big) = \exp(tY)$. 我们要证明的是 $Y_{e_N} = F_*X_{e_M}$. 我们来求取单位元处的切矢量.

$$Y_{e_N} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F\big(\exp(tX)\big)\Big|_{t=0} \overset{4.5-8}{=\!=} F_*\left(\frac{\mathrm{d}\exp(tX)}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0}\right) = F_*\big(\exp_{*0}(X)\big) \overset{13.76}{=\!=} F_*(X_{e_M}).$$

证毕. ■

例 13.79 指数映射 $\exp(tX) \equiv \sigma(t)$ 在原点 $\{0\}$（单位元 e）处的展开.

设 m 维李群 G 上有 C^∞ 函数场 f. 左不变切矢量场 $X(t)$ 诱导出来的积分曲线是单参数子群 $\sigma(t)$；$X(t)$ 作用在 f 上，有

$$X(f) = \frac{\mathrm{d}x^j}{\mathrm{d}t}\Big|_{\sigma(t)}\frac{\partial f}{\partial x^j} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\Big|_{\sigma(t)}. \tag{13.8-17}$$

继续对上式求导数，有

$$X^k(f) = \frac{\mathrm{d}^k f}{\mathrm{d}t^k}\Big|_{\sigma(t)} = \frac{\mathrm{d}^k f\big(\sigma(t)\big)}{\mathrm{d}t^k}. \tag{13.8-18}$$

流形 G 单位元 e 附近是可以用一个坐标域（比如用 U 表示）覆盖住的；在 U 内，f 就是 $\mathbb{R}^m$ 上的普通多元函数，Taylor 展开自然适用于它. 沿曲线 $\sigma(t)$ 标量函数场 f 有展开式

$$f\big(\sigma(t)\big) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{t^k}{k!}\frac{\mathrm{d}^k f\big(\sigma(0)\big)}{\mathrm{d}t^k} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{t^k}{k!}X^k\Big(f\big(\sigma(0)\big)\Big). \tag{13.8-19}$$

在流形论中 $\sigma(t)$ 的分量就是局部坐标，如果我们选 f 是恒等映射，即 f 把坐标映射为坐标；那么从上式可得

$$\sigma(t) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{t^k}{k!}\,X^k\big|_{\sigma(0)}\,, \qquad -\epsilon < t < \epsilon. \tag{13.8-20}$$

而 $\sigma(t)$ 是由 X 生成的单参数子群，有 $\sigma(t)\equiv\exp(tX)$，故可得

$$\exp(tX)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{t^k}{k!}X^k=e+t\cdot X+\frac{t^2}{2!}X^2+\cdots,\qquad \forall X\in T_eG \tag{13.8-21}$$

这就是指数映射在单位元 e 处的展开式. ■

不加证明地给出 Baker–Campbell–Hausdorff 公式[75]§3.8的几个近似表达.

$$\exp(tX)\exp(tY)=\exp\Big(t(X+Y)+\frac{t^2}{2}[X,Y]+o(t^2)\Big), \tag{13.8-22}$$

$$\exp(tX)\exp(tY)\exp(-tX)\exp(-tY)=\exp\big(t^2[X,Y]+o(t^2)\big), \tag{13.8-23}$$

$$\exp(tX)\exp(tY)\exp(-tX)=\exp\big(tY+t^2[X,Y]+o(t^2)\big). \tag{13.8-24}$$

其中 X,Y 是李群 G 的李代数 $\mathscr{G}$ 中的元素，也就是切矢量场；t 是实参数；$o(t^2)$ 表示它是 t 的 3 阶及以上阶小量，且包含更高阶的嵌套对易子（比如 $[X,[X,Y]]$、$[Y,[X,Y]]$ 等）. 上述三个公式表征了指数映射将李群 G 单位元 e 处切空间的切矢量映入李群 G 的性状.

由单参数子群定义的指数映射和由黎曼测地线定义的指数映射（见 §9.2.1）有很多相似之处；其实在满足一定条件下两者是相同的，见推论13.115.

13.8.3 矩阵群的指数映射

在例13.35中，已经指出 $GL(m,\mathbb{C})$（所有 m 维可逆矩阵）的李代数是 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{C})$（任意 m 维矩阵）. 已知任意固定的 m 维复数矩阵 X，考虑如下矩阵级数：

$$\exp X\equiv I_m+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k!}X^k\equiv I_m+X+\frac{1}{2!}X^2+\cdots+\frac{1}{k!}X^k+\cdots \tag{13.8-25}$$

其中 I_m 是 m 维单位矩阵，注意上式中的 X 未必可逆. 式(13.8-25)为矩阵的指数级数，我们将它记为 $\exp X$；因为它和实数或复数的指数函数 e^x 展开式形式几乎完全相同. 后面会看到这正是把式(13.8-10)称为**“指数映射”**的原因.

令 ρ 是 X 矩阵元最大模数值，即 $\rho=\max\limits_{i,j}|x_{ij}|$. 级数(13.8-25)矩阵元为

$$\begin{aligned}(\exp X)_{ij}=&\delta_{ij}+x_{ij}+\frac{1}{2!}\sum_{l=1}^{m}x_{il}x_{lj}+\cdots+\frac{1}{k!}\sum_{l_1\cdots l_{k-1}}^{m}x_{il_1}x_{l_1l_2}\cdots x_{l_{k-1}j}+\cdots\\ \leqslant&1+\rho+\frac{1}{2!}m\rho^2+\cdots+\frac{1}{k!}m^{k-1}\rho^k+\cdots\end{aligned}$$

上式中第二行的级数是绝对收敛的，故矩阵级数(13.8-25)是有意义的.

若两个矩阵的乘法可对易，即 $XY=YX$，则可得（可参考[63]$^{3.35(9)}$）：

$$\exp(X+Y)=\exp X\cdot\exp Y. \tag{13.8-26}$$

令上式中的 $Y=-X$，则上式变为 $\exp X\cdot\exp(-X)=\exp(X-X)=\exp(0)=I_m$. 这说明矩阵级数 $\exp X$ 是非退化的，故有 $\exp X\in GL(m,\mathbb{C})$（其中 X 是任意 m 维矩阵，即 $X\in\mathfrak{gl}(m,\mathbb{C})$）.

定义映射 $F:\mathbb{R}\to GL(m,\mathbb{C})$，它的具体表达式为（exp 是(13.8-25)）

$$F(t)\overset{def}{=}\exp(tX),\qquad \text{非零矩阵 } X\in\mathfrak{gl}(m,\mathbb{C}),\quad \forall t\in\mathbb{R}. \tag{13.8-27}$$

由式(13.8-26)容易看出：$\forall t,s\in\mathbb{R}$，有

$$F(t)F(s)=\exp(tX)\cdot\exp(sX)=\exp(tX+sX)=\exp\big((t+s)X\big)=F(t+s).$$

上式说明映射 F 对实参数构成加法群，并且满足同态映射定义. 从微分流形角度来看，在坐标卡 $\big(GL(m,\mathbb{C}),\varphi\big)$ 下，$\varphi(\exp tX)$ 的第 ij 项是

$$(\exp tX)_{ij}=\delta_{ij}+tx_{ij}+\frac{t^2}{2!}\sum_{l=1}^{m}x_{il}x_{lj}+\cdots+\frac{t^k}{k!}\sum_{l_1\cdots l_{k-1}}^{m}x_{il_1}\cdots x_{l_{k-1}j}+\cdots$$

上式中只有数的乘法和加法，故 F 是 C^∞ 的. 映射 $F:\mathbb{R}\to GL(m,\mathbb{C})$ 在 $t=0$ 点的 Jacobi 矩阵是一个 $1\times m^2$ 的矩阵

$$(x_{11},x_{12},\cdots,x_{1m};\quad\cdots\quad;x_{m1},x_{m2},\cdots,x_{mm}). \tag{13.8-28}$$

由于我们已经约定 $X=(x_{ij})$ 不是零矩阵，故上述 Jacobi 矩阵的秩为 1；这说明 F 是浸入同态映射. 最终得到 F（式(13.8-27)）是 $GL(m,\mathbb{C})$ 的单参数子群.

既然是单参数子群，那么式(13.8-27)也可看成（其实就是）$\mathbb{R}^{2m^2}$ 中的一条光滑曲线，不难求出单参数子群 F 的切矢量

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(I_m+tX+\frac{1}{2}t^2X^2+\cdots\right)=X\cdot\exp tX=(\exp tX)X. \tag{13.8-29}$$

尤其在 $t=0$ 处的切矢量是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(t)\bigg|_{t=0}=X. \tag{13.8-30}$$

当 $t=1$ 时 $GL(m,\mathbb{C})$ 的单参数子群(13.8-27)便是它的指数映射（(13.8-10)），表达式为式(13.8-25)．这便解释了式(13.8-10)为何被称为“**指数映射**”.

需要指出的是：对数（实数或复数）的指数函数成立的结果可能适用于指数矩阵，也可能不适用；比如，当 $[X,Y]\neq 0$ 时，$\exp(X+tY)$ 的导数就不是 $Y\exp(X+tY)$．读者可以试着计算这个导数．

命题 13.80 *$GL(m,\mathbb{C})$ 的任意单参数子群都具有式(13.8-27)的形式．*

证明 . 设有 $GL(m,\mathbb{C})$ 的任意单参数子群 $\widetilde{F}(t)$,自然是通过求解方程式(13.8-14)来决定 $\widetilde{F}(t)$ 的表达式．$GL(m,\mathbb{C})$ 单位元处的切矢量 X_e（也就是李代数）自然是 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{C})$ 中矩阵．

式(13.8-30)说明单参数子群 $F(t)=\exp tX$ 在单位元处的切矢量 X 也是 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{C})$ 中矩阵；而 $F(t)$ 自然也可通过求解式(13.8-14)来得到．式(13.8-30)中的 X 可以取遍 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{C})$ 中所有矩阵，故 $GL(m,\mathbb{C})$ 的任意单参数子群 $\widetilde{F}(t)$ 具有 $F(t)=\exp tX$ 的形式． ■

矩阵级数的计算 再给出一个关于 $GL(m,\mathbb{C})$ 指数映射的表达式，更能体现“指数”这个名称了．对于任意复数矩阵 X 相似于一个 Jordan 标准型，即存在可逆矩阵 $B\in GL(m,\mathbb{C})$ 使得 $B\cdot X\cdot B^{-1}$ 成为上三角矩阵；此结论可查阅任意线性代数教材．Jordan 矩阵对角线上的数是 X 的特征值（也称为本征值），即有

$$B\cdot X\cdot B^{-1}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_m\end{pmatrix}. \tag{13.8-31}$$

上式左下角矩阵元都是零，右上角可能非零可能是零；对角线是 X 的特征值，特征值重根按重数计算，比如 λ_1 是三重根，则对角元上有三个 λ_1．由上式可得

$$B\cdot X^k\cdot B^{-1}=(B\cdot X\cdot B^{-1})\cdots(B\cdot X\cdot B^{-1})=\begin{pmatrix}\lambda_1^k & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_m^k\end{pmatrix}.$$

有限个上三角矩阵乘积仍是上三角矩阵．故有

$$B\cdot(\exp X)\cdot B^{-1}=\exp(B\cdot XB^{-1})=\begin{pmatrix}e^{\lambda_1} & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & e^{\lambda_m}\end{pmatrix}. \tag{13.8-32}$$

上式中对指数映射 $\exp X$ 进行相似变换，得到一个上三角矩阵；对角元是本征值 λ_i 的指数函数 e^{λ_i}. 由此可得 $GL(m,\mathbb{C})$ 指数映射 $\exp X$ 的行列式为

$$\det(\exp X) = (\det B)(\det \exp X)(\det B^{-1}) = \prod_{i=1}^{m} e^{\lambda_i} = e^{\sum_i \lambda_i}. \tag{13.8-33}$$

由上式更加明显地看出 $\det(\exp X) \neq 0$.

13.9 伴随表示与 Killing 型

13.9.1 伴随表示

在这里，我们只讨论李群、李代数的一种自然且重要的表示——伴随表示（Adjoint Representation），其表示空间就是李群、李代数空间自身.

对于李群 G 中任意元素 g，定义映射 $F(g): G \to G$ 如下：

$$\big(F(g)\big)(h) \overset{def}{=} ghg^{-1}, \quad \forall h \in G; \Leftrightarrow \ F(g) = L_g \circ R_{g^{-1}} = R_{g^{-1}} \circ L_g. \tag{13.9-1}$$

可见 $F(g)$ 是李群 G 到自身的光滑同胚，显然它将单位元映射为单位元. 在一般文献中，常常使用 $\mathrm{ad}(g)$ 来代替式(13.9-1)中的 $F(g)$；但这样容易与后面的记号混淆，故我们作了上述符号的替换，即 $\mathrm{ad}(g) \to F(g)$. $\forall h,k \in G$，有

$$F(g)(h\cdot k) = g(h\cdot k)g^{-1} = g(h\cdot g^{-1}\cdot g\cdot k)g^{-1} = F(g)(h)\cdot F(g)(k). \tag{13.9-2}$$

$$F(g)(h^{-1}) = gh^{-1}g^{-1} = (ghg^{-1})^{-1} = \big(F(g)(h)\big)^{-1}. \tag{13.9-3}$$

以上两式说明 $F(g)$ 保持群乘法和求逆运算不变；$F(g)$ 由左右移动构成，故它是双射；综上，可以看出 $F(g)$ 是李群 G 的同构映射，称之为**内自同构**. 当 g 遍历李群 G 时，全体 $F(g)$ 构成一个群，称为**内自同构群**，记为 $F(G)$；下面，我们验证这一点. 首先，当 $g=e$ 时 $F(e)$ 是恒等映射，可作为 $F(G)$ 的单位元. 其次，它满足封闭性，验证如下：$\forall k \in G$ 有

$$F(g)\circ F(h)(k) = g(hkh^{-1})g^{-1} = (gh)k(gh)^{-1} = F(gh)(k). \tag{13.9-4}$$

此式说明 $F(g)\circ F(h)$ 仍是自同构映射，也就是说集合 $F(G)$ 中的任意两个元素 $F(g)$、$F(h)$ 之积仍在集合 $F(G)$ 中. 第三，$\big(F(g)\circ F(h)\big)\circ F(k) = F(g)\circ\big(F(h)\circ$

$F(k)\big)$ 的成立几乎一望而知，这说明群乘法具有结合性．最后，它的逆元也在集合 $F(G)$ 中，

$$F(g^{-1})\circ F(g)(h)=F(g^{-1})(ghg^{-1})=g^{-1}ghg^{-1}g=h\ \Rightarrow\ F(g^{-1})=\big(F(g)\big)^{-1}.$$

上式说明 $F(g)$ 逆元也在 $F(G)$ 中．验证完毕．

内自同构群 $F(G)$ 是自同构群 $\mathrm{Aut}(G)$（见 §13.3.1）的一个子群．

由定理13.62可知，自同构映射 $F(g)$ 会诱导出李代数 $\mathscr{G}$ 上的自同构映射

$$\mathrm{Ad}_g\equiv\big(F(g)\big)_{*e}:\mathscr{G}\to\mathscr{G}. \tag{13.9-5}$$

因 $F(g)$ 是同构映射，故 $\forall X,Y\in\mathscr{G}$ 可以得到一个常用公式：

$$\begin{aligned}\mathrm{Ad}_g[X,Y]=&\big(F(g)\big)_{*e}[X,Y]\overset{4.8-19}{=\!=\!=}\big[\big(F(g)\big)_{*e}X,\ \big(F(g)\big)_{*e}Y\big]\\=&\left[\mathrm{Ad}_gX,\ \mathrm{Ad}_gY\right].\end{aligned} \tag{13.9-6}$$

而 $\mathscr{G}$ 还可以看作是线性空间，则它上的自同构 Ad_g 还可以看成线性空间 $\mathscr{G}$ 中的线性变换，故有 $\mathrm{Ad}_g\in GL(\mathscr{G})$；而 $GL(\mathscr{G})$ 本身是一个群．$\forall g,h\in G$，有

$$\mathrm{Ad}_{g\cdot h}\overset{13.62}{=\!=\!=}\big(F(g\cdot h)\big)_{*e}\overset{\substack{13.9-4\\4.38(2)}}{=\!=\!=}\big(F(g)\big)_{*e}\circ\big(F(h)\big)_{*e}=\mathrm{Ad}_g\circ\mathrm{Ad}_h. \tag{13.9-7}$$

上式说明 Ad 是从群 G 到群 $GL(\mathscr{G})$（注意它是李代数 $\mathscr{G}$ 作为线性空间时的一般线性群）的同态映射；因映射 F 是由 C^∞ 映射 L_g 和 R_g 构成，故可证 Ad 也是 C^∞ 的（省略不证）．称 C^∞ 同态映射 $\mathrm{Ad}:G\to GL(\mathscr{G})$ 为李群 G 的**伴随表示**．由定理13.62可知同态映射 $\mathrm{Ad}:G\to GL(\mathscr{G})$ 还会诱导出李代数间的同态

$$\mathrm{ad}:\mathscr{G}\to\mathfrak{gl}(\mathscr{G}),\quad \text{具体形式为}\quad \mathrm{ad}_X\equiv\mathrm{Ad}_{*e}X,\quad \forall X\in T_eG. \tag{13.9-8}$$

称其为李代数 $\mathscr{G}$ 的**伴随表示**．因空间 $\mathscr{G}$ 是 m 维的，故伴随表示也是 m 维．

从伴随表示的定义可以看到

$$\mathrm{Ad}_g=(L_{g*})_{g^{-1}}\circ(R_{g^{-1}*})_e=(R_{g^{-1}*})_g\circ(L_{g*})_e, \tag{13.9-9}$$

$$\mathrm{Ad}_gX=\big(F(g)\big)_{*e}\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}\exp(tX)\right)\overset{4.5-8}{=\!=\!=}\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}\left(g\cdot e^{tX}\cdot g^{-1}\right), \tag{13.9-10}$$

$$\mathrm{ad}_XY=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\mathrm{Ad}_{\exp(tX)}Y\right)\big|_{t=0}. \tag{13.9-11}$$

由定理13.78中公式 $F\big(\exp(tX)\big)=\exp\big(t(F_*X)\big)$，结合式(13.9-10)可得：

$$g\cdot\exp(tX)\cdot g^{-1}=\exp(t\mathrm{Ad}_gX). \tag{13.9-12}$$

$\forall A\in GL(m)$、$\forall X\in\mathfrak{gl}(m)$，利用式(13.8-21)，有

$$\begin{aligned}A\exp(tX)A^{-1}=&A\left(I+t\cdot X+\frac{t^2}{2!}X^2+\cdots\right)A^{-1}\\=&I+t\cdot AXA^{-1}+\frac{t^2}{2!}(AXA^{-1})^2+\cdots=\exp(tAXA^{-1}).\end{aligned}$$

由上式以及式(13.9-12)，$\forall A\in GL(m)$、$\forall X\in\mathfrak{gl}(m)$，有

$$\mathrm{Ad}_AX=AXA^{-1}.\qquad\text{注意 }A\text{ 必须为矩阵群元素} \tag{13.9-13}$$

定理 13.81 $\forall X,Y\in\mathscr{G}$，$\mathrm{ad}_X(Y)=[X,Y]$.

证明 . 由定理13.78可得（F 定义见式(13.9-1)）

$$F(\exp tX)\big(\exp(tY)\big)=\exp\big(t(F_{*\exp(tX)}Y)\big)=\exp\big(t\cdot\mathrm{Ad}_{\exp(tX)}Y\big). \tag{13.9-14}$$

依照定义(13.9-1)，并利用式(13.8-24)，有

$$F(\exp tX)(\exp tY)=(\exp tX)\cdot(\exp tY)\cdot(\exp tX)^{-1}=\exp\big(tY+t^2[X,Y]+O(t^3)\big).$$

再利用定理13.76和命题13.77可知在包含 0 的一个小开集内，指数映射 exp 是局部微分同胚的；并且当 $t\to0$ 时是恒等映射；故从上式和式(13.9-14)可以得到

$$\mathrm{Ad}_{\exp(tX)}Y=Y+t[X,Y]+O(t^2). \tag{13.9-15}$$

再次利用定理13.78可得

$$\mathrm{Ad}_{\exp(tX)}Y=\big(\exp(t\cdot\mathrm{ad}_X)\big)Y\overset{13.8-21}{=\!=\!=}\big(e+t\cdot\mathrm{ad}_X+O(t^2)\big)Y. \tag{13.9-16}$$

结合上两式可得（令 $t\to0$）

$$\mathrm{ad}_XY=[X,Y]. \tag{13.9-17}$$

一般称 ad_X 为由 X 导出的**内导子**. 为清晰起见可将 ad_XY 记为 $\mathrm{ad}_X(Y)$. ■

定理 13.82 $\mathrm{ad}_{[X,Y]} = [\mathrm{ad}_X,\ \mathrm{ad}_Y]$.

证明 . $\forall Z \in \mathscr{G}$，并利用李代数的 Jacobi 恒等式，有

$$\begin{aligned}\mathrm{ad}_{[X,Y]}(Z) &= \big[[X,Y],\ Z\big] = -\big[[Y,Z],\ X\big] - \big[[Z,X],\ Y\big] \\ &= -\left[\mathrm{ad}_Y Z, X\right] + \left[\mathrm{ad}_X Z, Y\right] = \mathrm{ad}_X\big(\mathrm{ad}_Y Z\big) - \mathrm{ad}_Y\big(\mathrm{ad}_X Z\big) = \left[\mathrm{ad}_X, \mathrm{ad}_Y\right](Z).\end{aligned}$$

因 Z 的任意性，命题得证. ■

我们可以从多个角度来看问题，比如 $GL(V)$ 是从矢量空间 V 到矢量空间 V 的全体可逆线性变换的集合；$\forall g \in GL(V)$ 它将 V 中矢量映射为另一矢量，故从多重映射角度（见例3.83）来看，g 可以看成 $\binom{1}{1}$ 型张量，也就是说 $GL(V)$ 是 $\mathcal{T}_1^1(V)$ 中可逆 $\binom{1}{1}$ 型张量构成的空间. 我们用 $\binom{1}{1}$ 型张量观点再次审视一下 Ad_g 和 ad_X. $\mathrm{Ad}_g \in GL(\mathscr{G})$ 是 $\mathscr{G}$ 上的线性变换，故它是李代数 $\mathscr{G}$ 上的 $\binom{1}{1}$ 型张量. $\mathrm{ad}_X \in \mathfrak{gl}(\mathscr{G})$ 是 $\mathscr{G}$ 上的线性变换，故它也是李代数 $\mathscr{G}$ 上的 $\binom{1}{1}$ 型张量.

定义 13.83 定义在李群 G 的李代数 $\mathscr{G}$ 上的某个对象（或操作）称为$\mathrm{Ad}(G)$-**不变的**是指：此对象在变换 $\mathrm{Ad}_g : \mathscr{G} \to \mathscr{G}$ （$\forall g \in G$）下保持不变.

13.9.2 李代数 Killing 型

定义 13.84 设有 m 维李代数 $\mathscr{G}$，定义 $\mathscr{G}$ 上的 **Killing 型**为

$$(X,Y) \equiv \mathrm{Tr}(\mathrm{ad}_X \mathrm{ad}_Y); \quad \text{ad是内导子，Tr是迹算符，} X,Y \in \mathscr{G}. \tag{13.9-18}$$

Killing 型有很多称呼，如 Killing 度规场，Cartan 内积，Cartan–Killing 度规.

我们先看一下 Killing 型的具体表达. 设 m 维李代数 $\mathscr{G}$ 基矢为 $\{X_\mu \mid \mu = 1, \cdots, m\}$，基矢间的李积关系是 $[X_\mu, X_\nu] = C_{\mu\nu}^{\tau} X_\tau$，其中 $C_{\mu\nu}^{\tau}$ 是结构常数. 李代数的 Killing 型是（我们通常把它记为 $g_{\mu\nu}$）

$$g_{\mu\nu} = (X_\mu, X_\nu) = \mathrm{Tr}(\mathrm{ad}_{X_\mu} \mathrm{ad}_{X_\nu}) = C_{\mu\rho}^{\tau} C_{\nu\tau}^{\rho}. \tag{13.9-19}$$

计算过程并不难. 设 $\mathscr{G}$ 中两矢量 Y, Z 可表示成 $Y = y^\alpha X_\alpha$, $Z = z^\beta X_\beta$. 根据内导子关系式（见定理13.81），有

$$\mathrm{ad}_Y(Z) = [Y,Z] = [y^\alpha X_\alpha,\ z^\beta X_\beta] = y^\alpha z^\beta [X_\alpha,\ X_\beta] = y^\alpha z^\beta C_{\alpha\beta}^{\sigma} X_\sigma. \tag{13.9-20}$$

由上式可知 ad_Y（即定义13.84中的 ad_Y）可看成一个矩阵，它的表达式为

$$(\mathrm{ad}_Y)^\sigma_\beta = y^\alpha C^\sigma_{\alpha\beta}. \tag{13.9-21}$$

由此，容易求得李代数 $\mathscr{G}$ 的 Killing 型是

$$(Y,Z) = \mathrm{Tr}(\mathrm{ad}_Y \mathrm{ad}_Z) = \mathrm{Tr}\big((\mathrm{ad}_Y)^\sigma_\beta (\mathrm{ad}_Z)^\beta_\rho\big) = y^\alpha z^\nu C^\sigma_{\alpha\beta} C^\beta_{\nu\sigma}. \tag{13.9-22}$$

经过比对可得式(13.9-19).

例 13.85 二维非对易李代数的 Killing 型（见 §13.1.2）.

其非零结构常数为：$C^2_{12} = 1 = -C^2_{21}$. 由式(13.9-19)可得 $g_{\mu\nu} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. ■

例 13.86 一般线性李代数 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{F})$ 的 Killing 型.

李代数 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{F})$ 结构常数是(13.4-26)，由此得它的 Killing 型

$$\begin{aligned} g_{(st)(ij)} =& C^{(pq)}_{(st)(lk)} C^{(lk)}_{(ij)(pq)} = \left(\delta^s_{\cdot k}\delta^q_{\cdot t}\delta^l_{\cdot p} - \delta^l_{\cdot t}\delta^q_{\cdot k}\delta^s_{\cdot p}\right)\left(\delta^i_{\cdot q}\delta^k_{\cdot j}\delta^p_{\cdot l} - \delta^p_{\cdot j}\delta^k_{\cdot q}\delta^i_{\cdot l}\right) \\ =& 2m\,\delta_{it}\delta_{sj} - 2\delta_{st}\delta_{ij}. \end{aligned} \tag{13.9-23}$$

由于是矩阵，故为双指标；且指标在前表示行、指标在后表示列，无论在上还是在下；所有重复指标都需求和，无需一上一下. ■

例 13.87 证明 $\forall x \in \mathfrak{gl}(m,\mathbb{F})$，有 $\mathrm{Tr}(\mathrm{ad}_x) = 0$.

参考例题13.35，我们取 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{F})$ 的基矢为矩阵 $E^s_{\cdot t}(1 \leqslant s,t \leqslant m)$，其中 $E^s_{\cdot t}$ 表示的第 s 行、第 t 列元素为 1，其余矩阵元是零. 那么

$$\mathrm{ad}_{E^s_{\cdot t}} = C^{(pq)}_{(st)(lk)} = \delta^l_{\cdot t}\delta^q_{\cdot k}\delta^s_{\cdot p} - \delta^s_{\cdot k}\delta^q_{\cdot t}\delta^l_{\cdot p}.$$

其中指标 (st) 固定不变，指标 (pq) 表示行，指标 (lk) 表示列. 当 $l=p$、$k=q$ 时，代表对角元素；故上述矩阵的迹为

$$\mathrm{Tr}\left(\mathrm{ad}_{E^s_{\cdot t}}\right) = \sum_{p,q=1}^{m}\left(\delta^p_{\cdot t}\delta^q_{\cdot q}\delta^s_{\cdot p} - \delta^s_{\cdot q}\delta^q_{\cdot t}\delta^p_{\cdot p}\right) = m\delta^s_{\cdot t} - m\delta^s_{\cdot t} = 0.$$

上式说明：$\forall x \in \mathfrak{gl}(m,\mathbb{F})$，有 $\mathrm{Tr}(\mathrm{ad}_x) = 0$. ■

定理 13.88 李代数 $\mathscr{G}$ 的 Killing 型有如下性质：

(1) 对称性：$(X,Y) = (Y,X)$.

(2) 双线性性：$\forall X,Y,Z \in \mathscr{G}$，$\forall \lambda \in \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，有

$$(X+\lambda Y, Z) = (X,Z) + \lambda(Y,Z); \qquad (X, \lambda Y + Z) = \lambda(X,Y) + (X,Z).$$

(3) $\big([X,Y],Z\big) + \big(Y,[X,Z]\big) = 0$，即 $(\mathrm{ad}_X Y, Z) + (Y, \mathrm{ad}_X Z) = 0$.

证明. 前两条的证明极为简单. 下面给出第 (3) 条的证明；依定义，有

$$\begin{aligned}&\big([X,Y],Z\big)+\big(Y,[X,Z]\big)=\mathrm{Tr}(\mathrm{ad}_{[X,Y]}\mathrm{ad}_Z)+\mathrm{Tr}(Y,\mathrm{ad}_{[X,Z]})\\=&\mathrm{Tr}([\mathrm{ad}_X,\mathrm{ad}_Y]\mathrm{ad}_Z)+\mathrm{Tr}(\mathrm{ad}_Y[\mathrm{ad}_X,\mathrm{ad}_Z])\\=&\mathrm{Tr}(\mathrm{ad}_X\mathrm{ad}_Y\mathrm{ad}_Z)-\mathrm{Tr}(\mathrm{ad}_Y\mathrm{ad}_X\mathrm{ad}_Z)+\mathrm{Tr}(\mathrm{ad}_Y\mathrm{ad}_X\mathrm{ad}_Z)-\mathrm{Tr}(\mathrm{ad}_Y\mathrm{ad}_Z\mathrm{ad}_X)\end{aligned}$$

有限维矩阵乘积之迹有如下关系：$\mathrm{Tr}(ABC)=\mathrm{Tr}(CAB)$. 继续上式计算，有

$$\big([X,Y],Z\big)+\big(Y,[X,Z]\big)=\mathrm{Tr}(\mathrm{ad}_X\mathrm{ad}_Y\mathrm{ad}_Z)-\mathrm{Tr}(\mathrm{ad}_Y\mathrm{ad}_Z\mathrm{ad}_X)=0.$$

证毕. ■

命题 13.89 李群 G 的 Killing 型是 $\mathrm{Ad}(G)$-不变的，即 $\forall X,Y\in\mathscr{G}$ 及 $\forall g\in G$ 有 $(X,Y)=(\mathrm{Ad}_gX,\mathrm{Ad}_gY)$.

证明. 设 $\phi:\mathscr{G}\to\mathscr{G}$ 是李代数的自同构映射，即有 $\mathrm{ad}_{\phi(X)}\phi(Y)=\phi\circ\mathrm{ad}_XY$；因此有 $\mathrm{ad}_{\phi(X)}=\phi\circ\mathrm{ad}_X\circ\phi^{-1}$. 故有

$$(\phi X,\phi Y)=\mathrm{Tr}\big(\mathrm{ad}_{\phi(X)}\mathrm{ad}_{\phi(Y)}\big)=\mathrm{Tr}\big(\phi\circ\mathrm{ad}_X\mathrm{ad}_Y\circ\phi^{-1}\big)=\mathrm{Tr}\big(\mathrm{ad}_X\mathrm{ad}_Y\big)=(X,Y).$$

因 Ad_g 是李代数 $\mathscr{G}$ 上的自同构，故令上式中的 $\phi=\mathrm{Ad}_g$ 即可. ■

命题 13.90 设李代数 $\mathfrak{g}$ 有直和分解 $\mathfrak{g}=\mathfrak{h}\oplus\mathfrak{k}$，也就是说 $\mathfrak{h}$、$\mathfrak{k}$ 都是 $\mathfrak{g}$ 的理想；则 Killing 型有如下分解：$(\cdot,\cdot)_{\mathfrak{g}}=(\cdot,\cdot)_{\mathfrak{h}}+(\cdot,\cdot)_{\mathfrak{k}}$.

证明. 设 $\mathfrak{h}$ 的基矢为 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m\}$；$\mathfrak{k}$ 的基矢为 $\{\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_n\}$；则 $\mathfrak{g}$ 的基矢为 $\{\boldsymbol{e}_i;\boldsymbol{\epsilon}_\alpha\}$. 基矢间的李积关系为（其中 $1\leqslant i,j,k\leqslant m$，$1\leqslant\alpha,\beta,\gamma\leqslant n$）

$$[\boldsymbol{e}_i,\boldsymbol{e}_j]=C_{ij}^k\boldsymbol{e}_k;\quad[\boldsymbol{\epsilon}_\alpha,\boldsymbol{\epsilon}_\alpha]=C_{\alpha\beta}^\gamma\boldsymbol{\epsilon}_\gamma;\quad[\boldsymbol{e}_i,\boldsymbol{\epsilon}_\alpha]=0\ \Leftrightarrow\ C_{i\alpha}^k=0=C_{i\alpha}^\gamma.$$

我们用拉丁字母、希腊字母分别表示 $\mathfrak{h}$、$\mathfrak{k}$ 的指标索引. $\forall x,y\in\mathfrak{g}$，设它们可以展开为：$x=x^i\boldsymbol{e}_i+x^\alpha\boldsymbol{\epsilon}_\alpha$，$y=y^j\boldsymbol{e}_j+y^\beta\boldsymbol{\epsilon}_\beta$. 那么，有

$$\begin{aligned}(x,y)_{\mathfrak{g}}=&\big(x^i\boldsymbol{e}_i+x^\alpha\boldsymbol{\epsilon}_\alpha,\ y^j\boldsymbol{e}_j+y^\beta\boldsymbol{\epsilon}_\beta\big)_{\mathfrak{g}}\quad\text{注意}\mathfrak{h},\mathfrak{k}\text{交叉部分的结构常数为零}\\=&\big(x^i\boldsymbol{e}_i,\ y^j\boldsymbol{e}_j\big)_{\mathfrak{h}}+\big(x^\alpha\boldsymbol{\epsilon}_\alpha,\ y^\beta\boldsymbol{\epsilon}_\beta\big)_{\mathfrak{k}}.\end{aligned}$$

上式即为命题中 Killing 型分解的具体解释. ■

命题 13.91 设李代数 $\mathfrak{g}$ 有理想 $\mathfrak{h}$；则 $(x,y)_{\mathfrak{g}}=(x,y)_{\mathfrak{h}}$，$\forall x,y\in\mathfrak{h}$.

证明 . 设 $\mathfrak{h}$ 基为 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m\}$；将它扩充为 $\mathfrak{g}$ 的基：$\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m;\boldsymbol{\epsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\epsilon}_n\}$. 我们用拉丁字母表示 $\mathfrak{h}$ 的指标索引；用希腊字母表示剩余的指标索引. $\forall x,y\in\mathfrak{h}$，则它们可以展开为：$x=x^i\boldsymbol{e}_i+x^\alpha\boldsymbol{\epsilon}_\alpha$，$y=y^j\boldsymbol{e}_j+y^\beta\boldsymbol{\epsilon}_\beta$，依约定有 $x^\alpha=0=y^\beta$. 因 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想，故 $\mathrm{ad}_{\boldsymbol{e}_i}\boldsymbol{e}_j\in\mathfrak{h}$，$\mathrm{ad}_{\boldsymbol{e}_i}\boldsymbol{\epsilon}_\alpha\in\mathfrak{h}$，$\mathrm{ad}_{\boldsymbol{\epsilon}_\alpha}\boldsymbol{e}_i\in\mathfrak{h}$；也就是 $C_{ij}^\gamma=0=C_{i\alpha}^\gamma$. 利用结构常数这个属性，有

$$(x,y)_{\mathfrak{g}}=\left(x^i\boldsymbol{e}_i+x^\alpha\boldsymbol{\epsilon}_\alpha,\ y^j\boldsymbol{e}_j+y^\beta\boldsymbol{\epsilon}_\beta\right)_{\mathfrak{g}}=\left(x^i\boldsymbol{e}_i+0,\ y^j\boldsymbol{e}_j+0\right)_{\mathfrak{g}}=\left(x^i\boldsymbol{e}_i,\ y^j\boldsymbol{e}_j\right)_{\mathfrak{h}}.$$

这说明 $\mathfrak{g}$ 的 Killing 型在其理想 $\mathfrak{h}$ 上的限制就是 $\mathfrak{h}$ 的 Killing 型. 需注意，如果 $\mathfrak{h}$ 仅是 $\mathfrak{g}$ 的子代数，不是理想，则没有上述属性. ■

13.10 常用矩阵李群

本节介绍几个常用矩阵李群（有限维）与李代数；详细、严谨论述可参考[21]Part I，本节中未给出的定理证明过程可在其中查到. 尤其不去证明各种群的拓扑属性（比如紧致、连通、单连通等等），而是直接陈述它们.

13.10.1 几个定理

命题 13.92 设有矩阵李群 G（$GL(m,\mathbb{C})$ 的子群）及其李代数 $\mathfrak{g}$. 则矩阵 $X\in\mathfrak{g}$ 的充要条件是：存在实单参数子群 $\gamma(t)\in G$ 在单位元（$\gamma(0)=e$）处的切矢量满足 $\gamma'(0)=X$.

证明 . 根据定理13.74可知矩阵李群 G 的李代数 $\mathfrak{g}$ 就是其全体单参数子群在单位元 e 处的切矢量的集合，反之亦然. 对于矩阵李群 $GL(m,\mathbb{C})$ 来说，我们已经证明其全部单参数子群皆有指数映射形式（见命题13.80）；故只需要对其全部指数映射求导即可. ■

命题 13.93 如果 G 是一连通、紧致矩阵李群，则由李代数到李群的指数映射 $\exp:\mathfrak{g}\to G$ 是满射；即有 $\exp\mathfrak{g}=G$.（证明见[21]§11.2推论 11.10）

从命题13.93可知，如果 G 不是紧致矩阵李群，那么 exp 可能不是满映射. $GL(m)$、$SL(m)$ 等群不是紧致的，故它们的指数映射可能不是满的. 即一般只

有 $\exp\mathfrak{gl}(m)\subset GL(m)$，但没有 $\exp\mathfrak{gl}(m)=GL(m)$. 例如 $\left(\begin{smallmatrix}-2&0\\0&-1\end{smallmatrix}\right)\in GL(2)$ 就没有指数映射下的原像.

13.10.2 一般线性群

一般线性群已经分散在例题13.13、13.16、13.35中以及 §13.8.3中介绍过了. 我们会在各小节介绍其它矩阵群，这些群都是 $GL(m)$ 的闭子群，具体来说，由定理13.66可知：$SL(m,\mathbb{R})$、$O(m,\mathbb{R})$ 是 $GL(m,\mathbb{R})$ 的拓扑李子群；$SL(m,\mathbb{C})$、$U(m,\mathbb{C})$ 是 $GL(m,\mathbb{C})$ 的拓扑李子群. 由定理13.65可知 $GL(m)$ 子群的李代数也是 $\mathfrak{gl}(m)$ 的李子代数. 我们已知 $\mathfrak{gl}(m)$ 是 m 维任意（实或复）矩阵，那么它的子群所对应的李代数自然也是 m 维任意（实或复）矩阵的某个子集.

13.10.3 特殊线性群

特殊线性群 $SL(m,\mathbb{C})$ （Special Linear ）是一般线性群的子群，定义为

$$SL(m,\mathbb{C})=\{A\in GL(m,\mathbb{C})\mid \det A=1\}. \tag{13.10-1}$$

也就是给 $GL(m,\mathbb{C})$ 群元增加一条约束，令其矩阵的行列式为 1. $SL(m,\mathbb{C})$ 任意两个元素的群乘积得到的元素行列式仍是 1，故对群乘法具有封闭性，也就是说 $SL(m,\mathbb{C})$ 构成子群. $GL(m,\mathbb{C})$ 群元的行列式是非零的，也就是 $\mathbb{C}\backslash\{0\}$；$SL(m,\mathbb{C})$ 群元的行列式是 1；$GL(m,\mathbb{C})$ 减掉 $SL(m,\mathbb{C})$ 后剩余元素的行列式取值范围是 $C\equiv\mathbb{C}\backslash\{0,1\}$，显然 C 是开集. 行列式映射 det 是拓扑学上的连续函数，那么它的 $\det^{-1}C$ 构成的逆像集也是开集；因此由定义2.37可知 $\det A=1$ 所构成的集合是闭集，也就是说 $SL(m,\mathbb{C})$ 是 $GL(m,\mathbb{C})$ 的拓扑闭子集. 这便回应本节开头所述 $SL(m,\mathbb{C})$ 是闭子集的断言. 上面关于闭子集的论述同样适用于 $SL(m,\mathbb{R})$、$SO(m,\mathbb{R})$、$SU(m,\mathbb{C})$ 等子群.

作为 $GL(m,\mathbb{C})$ 拓扑李子群的 $SL(m,\mathbb{C})$，指数映射自然也适合于它. 假设 $\exp tA\in SL(m,\mathbb{C})$，那么必然有 $\det e^{tA}=e^{t\mathrm{Tr}A}=1$；对此式求实数 t 的导数得，$(\mathrm{Tr}A)e^{t\mathrm{Tr}A}=0$，令 $t=0$ 则有 $\mathrm{Tr}A=0$；即零点的切矢量是全体 $\mathrm{Tr}A=0$ 的矩阵集合，将其记为：

$$\mathfrak{sl}(m,\mathbb{C})=\{A\in\mathfrak{gl}(m,\mathbb{C})\mid \mathrm{Tr}A=0\}. \tag{13.10-2}$$

反之，零迹矩阵的指数映射都是 $SL(m,\mathbb{C})$ 的群元（这几乎一望而知）. 根据命题13.92可知 $\mathfrak{sl}(m,\mathbb{C})$ 是群 $SL(m,\mathbb{C})$ 的李代数.

$SL(m,\mathbb{R})$ 的定义与 $SL(m,\mathbb{C})$ 的定义完全类似，只是把上面公式中的 $\mathbb{C}$ 换成 $\mathbb{R}$ 即可. 其它所有内容几乎无需改变，结论也无任何变化（除了维数）.

由于 $SL(m)$ 群是在 $GL(m)$ 群上增加一个约束得到的，即矩阵行列式等于 1. 对于 $SL(m,\mathbb{C})$ 而言，行列式等于 1 相当于实部为 1 和虚部为零，是两个约束；故 $SL(m,\mathbb{C})$ 实维数是 $2m^2-2$. 对于 $SL(m,\mathbb{R})$ 而言，是一个约束，故它的实维数是 m^2-1.

可以证明 $\mathfrak{sl}(m,\mathbb{F})$ 是 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{F})$ 的理想；$\forall X\in\mathfrak{sl}(m,\mathbb{F})$, $\forall Y\in\mathfrak{gl}(m,\mathbb{F})$，有

$$\mathrm{Tr}[X,Y]=\mathrm{Tr}(XY-YX)=0\ \Rightarrow\ [X,Y]\in\mathfrak{sl}(m,\mathbb{F}). \tag{13.10-3}$$

同理可证 $SL(m,\mathbb{F})$ 是 $GL(m,\mathbb{F})$ 的不变子群；$\forall A\in SL(m,\mathbb{F}), B\in GL(m,\mathbb{F})$ 有

$$\det\left(B\cdot A\cdot B^{-1}\right)=\det(B)\cdot\det(A)\cdot\det\left(B^{-1}\right)=\det A=1. \tag{13.10-4}$$

在映射行列式 det 的作用下 $GL(m,\mathbb{F})$ 同态于 $(\mathbb{F}^*,\times)$（见例13.33），而且是同态映射是满的. $(\mathbb{F}^*,\times)$ 的单位元是数字 1，故可知 $GL(m,\mathbb{F})$ 在 det 作用下的同态核是 $SL(m,\mathbb{F})$. 换句话说，有商群关系 $GL(m,\mathbb{F})/SL(m,\mathbb{F})=(\mathbb{F}^*,\times)$.

与一般线性群相同，特殊线性群也是非紧致李群.

13.10.4 保度规群

任取数域 $\mathbb{F}$ 上的 $m\times m$ 矩阵 S，考虑 $GL(m,\mathbb{F})$ 中的子集

$$G(S)=\left\{A\in GL(m,\mathbb{F})\mid A^TSA=S\right\}.\quad T\ \text{表示转置} \tag{13.10-5}$$

$G(S)$ 是 $GL(m,\mathbb{F})$ 中的普通子群，且为闭子集，所以 $G(S)$ 是 $GL(m,\mathbb{F})$ 的拓扑李子群. 将 $G(S)$ 的李代数记为 $\mathfrak{g}(s)$，它自然是 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{F})$ 的李子代数.

例 13.94 解释式(13.10-5)为何保度规，即为何等距.

在一个实线性空间 V 中给定对称、非退化的矩阵 S 后，可认为 S 是 V 的度规. 设 V 中有两个不同矢量 x,y（列矢量），在经历某个保度规群元素 A（满足(13.10-5)式的矩阵）作用后变成了 $x'=Ax$，$y'=Ay$；那么有

$$(x'-y')^TS(x'-y')=(x-y)^TA^TSA(x-y)\overset{13.10-5}{=\!=\!=}(x-y)^TS(x-y).$$

可见 x,y 之间的距离在经过保度规群元 A 作用后距离不变. ■

任取 $X\in\mathfrak{gl}(m,\mathbb{F})$，若 $\exp tX\in G(S)$，即满足 $(\exp tX)^TS(\exp tX)=S$，$\forall t\in\mathbb{R}$；对此式等号两侧求 t 的导数，再令 $t\to 0$，可以得到 $X^TS+SX=0$. 则可以建立 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{F})$（全体 m 阶矩阵，可以是退化的）的子集

$$\tilde{\mathfrak{g}}(s)=\left\{X\in\mathfrak{gl}(m,\mathbb{F})\mid X^TS+SX=0\right\}. \tag{13.10-6}$$

显然 $\tilde{\mathfrak{g}}(s)$ 是 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{F})$ 的子代数. 我们还需验证 $\exp(tX)\in G(S),\ \forall X\in\tilde{\mathfrak{g}}(s)$. 利用式 $C_{m+1}^k=C_m^k+C_m^{k-1}$ 可证 $\sum_{k=0}^m C_m^k(X^T)^kSX^{m-k}=0,\ \forall m\geqslant 1$；借用此式可以证明 $(\exp tX)^TS(\exp tX)=S,\ \forall t\in\mathbb{R}$. 证明过程大致如下：首先，我们已知对有限个矩阵相乘与转置是可交换的，即 $(X^T)^2=(X^2)^T,\ \cdots,\ (X^T)^k=(X^k)^T$；我们忽略无穷个矩阵相乘所带来的（可能存在、可能不存在的）不确定性，我们认为无限个矩阵相乘与转置也是可交换的. 其次，直接计算

$$\begin{aligned}(\exp tX)^TS(\exp tX)=&\left(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{t^k}{k!}(X^T)^k\right)S\left(\sum_{l=0}^{\infty}\frac{t^l}{l!}X^l\right)\\ =&S+\sum_{m=1}^{\infty}\frac{t^m}{m!}\sum_{k=0}^{m}\frac{m!}{k!(m-k)!}(X^T)^kSX^{m-k}=S.\end{aligned}$$

这便说明了 $\exp tX\in G(S),\ \forall X\in\tilde{\mathfrak{g}}(s)$. 对于矩阵群，全部单参数子群都具有指数映射形式（见定理13.80）；根据命题13.92可知 $G(S)$ 的李代数就是 $\tilde{\mathfrak{g}}(s)$；之后我们将略去式(13.10-6)中 $\mathfrak{g}$ 上的波浪号，直接使用记号 $\mathfrak{g}(s)$.

由各种不同的非退化方阵 S（可被理解成某种度规），可以得到一系列重要的典型群；我们介绍如下几个：正交群、广义正交群、酉群和辛群.

式(13.10-5)中的构造还可以变为如下形式：

$$A^TSA=S\ \Rightarrow\ S=A^{-T}SA^{-1};\qquad \text{记 } A^{-T}\equiv(A^{-1})^T. \tag{13.10-7}$$

因此，上式说明：若 $A\in G(S)$，则 $A^{-1}\in G(S)$.

对于正交群、广义正交群、酉群来说，S 是非退化矩阵且 $S=S^{-1}$；故，我们可以从“若 $A,A^{-1}\in G(S)$”出发来进一步推演.

$$(A^{-T})SA^{-1}=S\ \Rightarrow\ AS^{-1}A^T=S^{-1}\ \Rightarrow\ ASA^T=S\ \Rightarrow\ \left((A^T)\right)^TS(A^T)=S.$$

因此，上式说明：当 $S=S^{-1}$ 时，若 $A\in G(S)$，则 $A^T\in G(S)$.

这说明对于正交群、广义正交群、酉群来说，可以把式(13.10-5)（即 $G(S)$）中条件写成 $ASA^T = S$，或 $A^TSA = S$，或 $A^{-1}S(A^{-1})^T = S$，等等.

对于正交群、广义正交群、酉群和辛群来说，式(13.10-6)是它们的李代数. 后面我们会通过对单参数子群求导的方式得到这些矩阵及对易关系；请读者自行验证这些矩阵满足式(13.10-6).

命题 13.95 设 $S' = C^TSC$（C 非退化，合同关系），则 $G(S)$ 同构于 $G(S')$.

证明 . 我们先建立如下线性同构映射：

$$F(S) = C^{-1}SC; \qquad \det(C) \neq 0. \tag{13.10-8}$$

因 $C^{-1}(S + \lambda \cdot T)C = C^{-1}SC + \lambda \cdot C^{-1}TC$，其中 $\lambda \in \mathbb{F}$；故可知上述映射是线性的. 又因 C 是非退化的，故 $F(S)$ 是线性同构.

$$A^TSA = S \;\Rightarrow\; A^TC^{-T}S'C^{-1}A = C^{-T}S'C^{-1} \;\Rightarrow\; (C^{-1}AC)^TS'(C^{-1}AC) = S'.$$

由上式可知，$G(S)$ 线性同构于 $G(S')$.

由定理13.62可知：$G(S)$ 的李群李代数 $\mathfrak{g}(s)$ 也有类似同构关系. ■

13.10.4.1 正交群

在实数域 $\mathbb{R}$ 中，取式(13.10-5)中的 S 为单位矩阵 I，则

$$O(m) = G(I) = \left\{A \in GL(m,\mathbb{R}) \mid AA^T = I\right\}. \tag{13.10-9}$$

称为实**正交群**（Orthogonal group）. 由式(13.10-6)可得 $O(m)$ 李代数

$$\mathfrak{o}(m) = \left\{X \in \mathfrak{gl}(m,\mathbb{R}) \mid X + X^T = 0\right\}. \tag{13.10-10}$$

由上式可知其李代数是反对称矩阵，从而可得 $\mathfrak{o}(m)$ 及 $O(m)$ 维数：$m(m-1)/2$.

由式(13.10-9)可得正交矩阵行列式：$\det A \cdot \det A^T = 1 \;\Rightarrow\; \det A = \pm 1$. 群元行列式为 ± 1，也就注定了 $O(m)$ 不是连通的. 含幺元连通分支是：

$$SO(m) = \left\{A \in GL(m,\mathbb{R}) \mid AA^T = I \text{ 且 } \det A = 1\right\}. \tag{13.10-11}$$

称为**特殊正交群**；它的李代数与式(13.10-10)相同. $SO(m)$ 对应着欧氏空间 R^m 的转动，故通常也称之为**转动群**. 因 $SO(m)$ 群是连通、紧致的，故由命题13.93可知指数映射是满射，即不但 $\exp\mathfrak{o}(m) \subset SO(m)$，并且 $\exp\mathfrak{o}(m) = SO(m)$.

不难验证 $SO(m)$ 是 $O(m)$ 的不变子群，其行列式映射的像是 $\{+1,-1\}$. 我们将 $O(m)$ 中行列式为 -1 的所有元素记为 $R_\ell(m)$，显然单位矩阵（幺元）不属于 $R_\ell(m)$，故它不是群；$R_\ell(m)$ 称为**反射**，且 $R_\ell(m)\cap SO(m)=\varnothing$. 令 $r_\ell=\mathrm{diag}(-1,1,\cdots,1)$，它是一个 m 维对角矩阵；显然 $\det r_\ell=-1$，故 $r_\ell\in R_\ell$. 由群论陪集分解定理可得 R_ℓ 中任意一个元素都能表示成 r_ℓ 与 $SO(m)$ 中某个元素的群乘，即

$$O(m)=SO(m)\cup\big(r_\ell SO(m)\big)=SO(m)\cup R_\ell,\qquad R_\ell(m)\cap SO(m)=\varnothing.$$

记 $C_2=\{I_m,\ r_\ell\}$，即二阶循环群 C_2 由 m 维单位矩阵 I_m 和 r_ℓ 组成. 我们定义映射 $\phi:C_2\to\mathrm{Aut}\big(SO(m)\big)$ 为 $\phi(N)=c\cdot N\cdot c^{-1},\ c\in C_2,\ N\in SO(m)$；不难验证 $\phi(N)$ 是 $SO(m)$ 中的元素. 由此可以看出 $O(m)=SO(m)\rtimes C_2$（半直积定义见 §13.3.2）.

当 m 是奇数时，$-I_m\in R_\ell(m)$，此时 $\{I_m,-I_m\}$ 也是 $O(m)$ 群的不变子群. 故 $O(m)=SO(m)\times\{I_m,-I_m\}$，即此时是直积. 当 m 是偶数时，半直积不能退化到直积，此时 $-I_m\in SO(m),\ -I_m\notin R_\ell(m)$.

讨论几个低维正交群. $SO(1)$ 是零维李群（单点集 $\{1\}$），极平凡.

一维李群 $SO(2)$ 同构于 $x-y$ 平面上的绕 z 轴旋转，详见 §13.10.4.2. 需要指出的是：$SO(2)$ 是无穷度连通的（用专业术语来说它的基本群是整数加法群 $(\mathbb{Z},+)$，$\mathbb{Z}$ 有无穷多个元素，故为无穷度连通），它的通用覆盖群是单连通的实数加法群 $(\mathbb{R},+)$. 它们的群表示见 §15.1.4.

13.10.4.2 SO(3) 群

定理 13.96 *$SO(3)$ 中非幺元的元素 A 是 $\mathbb{R}^3$ 中一个转角为 θ 的绕 $\boldsymbol{n}$ 轴的转动.*

上述定理称为欧拉定理，证明可见[37]定理 9.2.6. 在三维位型空间中，位置矢量 $\boldsymbol{x}$ 绕过原点的固定轴 $\boldsymbol{n}$ （单位矢量）转过无限小 $\mathrm{d}\theta$ 的转动算符是：

$$\boldsymbol{x}'=\hat{Q}(\boldsymbol{n}\mathrm{d}\theta)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}+\mathrm{d}\theta\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{x}. \tag{13.10-12}$$

上式中描述的无穷小转动称为**固有转动**，$\mathrm{d}\theta$ 的旋转方向与固定轴 $\boldsymbol{n}$ 符合右手螺旋定则. 欧拉定理是在说：$SO(3)$ 中的元素 R 同构于 $\mathbb{R}^3$ 中固有转动. 描述转动矩阵的作用方式见例题13.121、13.122.




图 13.1: 欧拉角：临时轴 N 是 y 轴




图 13.2: 欧拉角：临时轴 N 是 x 轴

我们可以借用 $\mathbb{R}^3$ 中常用的欧拉角 α, β, γ 描述转动 R. 图13.1蓝色标小写字母 xyz 的坐标轴为未转动的，红色标大写字母 XYZ 的坐标轴为转动后最终位置，绿色标字母 N 的轴为中间步骤. 我们用 $C_k(\psi)$ 表示绕 k 轴旋转 ψ 角. 第一步是进动，绕 z 轴转动 α 角，即 $C_z(\alpha)$，转动后，y 轴就转到了 N 轴位置，z 轴不动. 第二步是章动[1]，绕 N 轴转动 β 角，即 $C_N(\beta)$，蓝色小写 z 轴转到了红色大写 Z 轴位置；蓝色的小写 xy 平面也旋转到了红色大写 XY 平面. 第三步是自转，绕红色大写 Z 轴转动 γ 角，即 $C_Z(\gamma)$, 此时就得到了坐标轴最终位置. 我们将这三次转动记为

$$R(\alpha\beta\gamma) = C_Z(\gamma)C_N(\beta)C_z(\alpha). \tag{13.10-13}$$

注意转动的乘积顺序不能随意改变. 我们注意到

$$C_N(\beta) = C_z(\alpha)C_y(\beta)C_z(-\alpha), \tag{13.10-14}$$

$$C_Z(\gamma) = C_z(\alpha)C_y(\beta)C_z(\gamma)C_y(-\beta)C_z(-\alpha). \tag{13.10-15}$$

代入上面的转动矩阵后，就得到了式(13.10-13)的欧拉角表示

$$R(\alpha\beta\gamma) = C_z(\alpha)C_y(\beta)C_z(\gamma) = \tag{13.10-16}$$

[1]章动英文是 nutation，本意点头. 地球除了进动（岁差），还有章动，周期大约 18.6 年. 中国《周髀算经》中记载十九为一“章”，这就是此词翻译的由来（$18.6 \approx 19$）. 地球章动周期和天文观测光行差皆由英国人 James Bradley(1693-1762) 发现.

$$\begin{pmatrix} \cos\alpha\cos\beta\cos\gamma-\sin\alpha\sin\gamma & -\cos\alpha\cos\beta\sin\gamma-\sin\alpha\cos\gamma & \cos\alpha\sin\beta \\ \sin\alpha\cos\beta\cos\gamma+\cos\alpha\sin\gamma & -\sin\alpha\cos\beta\sin\gamma+\cos\alpha\cos\gamma & \sin\alpha\sin\beta \\ -\sin\beta\cos\gamma & \sin\beta\sin\gamma & \cos\beta \end{pmatrix}.$$

上面已经用到了绕坐标轴的旋转

$$C_z(\alpha)=\begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\ C_y(\beta)=\begin{pmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{pmatrix}. \tag{13.10-17}$$

图13.1中临时轴 N 是 y 轴. 可将 N 选为 x 轴（图13.2），此时式(13.10-13)为

$$R(\alpha\beta\gamma)=C_z(\alpha)C_x(\beta)C_z(\gamma)= \tag{13.10-18}$$
$$\begin{pmatrix} \cos\alpha\cos\gamma-\sin\alpha\cos\beta\sin\gamma & -\sin\alpha\cos\beta\cos\gamma-\cos\alpha\sin\gamma & \sin\alpha\sin\beta \\ \sin\alpha\cos\gamma+\cos\alpha\cos\beta\sin\gamma & \cos\alpha\cos\beta\cos\gamma-\sin\alpha\sin\gamma & -\cos\alpha\sin\beta \\ \sin\beta\sin\gamma & \sin\beta\cos\gamma & \cos\beta \end{pmatrix}.$$

其中

$$C_x(\beta)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\beta & -\sin\beta \\ 0 & \sin\beta & \cos\beta \end{pmatrix}. \tag{13.10-19}$$

两者没有本质差别. 两种变换方法中，欧拉角的取值范围是：$0\leqslant\alpha,\gamma<2\pi,\ 0\leqslant\beta\leqslant\pi$. 用欧拉角表示转动时，当 $\beta=0$ 时，只要 $\alpha+\gamma$ 的值相等就代表同一转动，有无穷多种表示；同理，当 $\beta=\pi$ 时，只要 $\alpha-\gamma$ 的值相等就代表同一转动，有无穷多种表示；这是需要注意的. 这正反映了二维闭球面不能用一个坐标域覆盖的事实，即至少需要两个坐标域才能覆盖二维球面流形（见例4.11）.

约定：式(13.10-16)或式(13.10-18)需右作用在基矢量 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\}$（行）上；或者左作用在某矢量的具体分量 $(x,y,z)^T$（列）上；不能反过来.

我们把 $\mathfrak{so}(3)$ 李代数放到 §15.2.6，与 $\mathfrak{su}(2)$ 一起讨论.

13.10.4.3 广义正交群

在实数域 $\mathbb{R}$ 中，取式(13.10-5)中的 S 为（按照物理习惯，作替换 $S\to\eta$）

$$\eta=\begin{pmatrix} -I_p & 0 \\ 0 & I_q \end{pmatrix},\quad I_p,I_q \text{ 是单位矩阵};\ p+q=m,\ 0\leqslant p,q\leqslant m. \tag{13.10-20}$$

那么

$$O(p,q)=G(\eta)=\left\{A\in GL(m,\mathbb{R})\mid A\eta A^T=\eta\right\},\tag{13.10-21}$$

称为 (p,q) 型**广义正交群**（Generalized orthogonal group）；当 $p=1,q=3$ 时，就是通常的 Lorentz 群（见 §13.11.4）．不难发现 $O(p,q)\cong O(q,p)$，两者只差一个相似变换．有关系 $O(m)\equiv O(0,m)$．由式(13.10-6)得它的李代数是

$$\mathfrak{o}(p,q)=\left\{X\in\mathfrak{gl}(m,\mathbb{R})\mid X\eta+\eta X^T=0\right\}.\tag{13.10-22}$$

通过上式可知它的维数是

$$\dim\mathfrak{o}(p,q)=\dim O(p,q)=\frac{1}{2}m(m-1)=\frac{1}{2}(p+q)(p+q-1).\tag{13.10-23}$$

由式(13.10-21)可得广义正交矩阵行列式：$\det A\cdot\det\eta\cdot\det A^T=\det\eta\ \Rightarrow$ $\det A=\pm1$；这也就注定了 $O(p,q)$ 不是连通的．行列式为 1 的分支是

$$SO(p,q)=\left\{A\in GL(m,\mathbb{R})\mid A\eta A^T=\eta\ \text{且}\ \det A=1\right\}.\tag{13.10-24}$$

正交群 $O(m)$ 有两个连通分支，而 $O(p,q)$ 群有四个连通分支．将其记为

$$g=\begin{pmatrix}a_T & b\\ c & a_S\end{pmatrix},\qquad \forall g\in O(p,q),\quad 0<p<m.\tag{13.10-25}$$

其中类时部分的 a_T 是 $p\times p$ 的矩阵，类空部分的 a_S 是 $q\times q$ 的矩阵．

可以用反证法证明它们的行列式都是非奇异的，即 $|a_T|\neq0$、$|a_S|\neq0$．假设行列式 $|a_T|=0$，则存在非零的 p 维列矢量 s 使得 $a_Ts=0$．设 $r=\binom{s}{0}$，则 $gr=\binom{0}{cs}$．首先，有 $(gr)^T\eta gr=r^T(g^T\eta g)r=r^T\eta r=-s^Ts<0$；其次，有 $(gr)^T\eta gr=(0\ cs)\eta\binom{0}{cs}=(cs)^T(cs)\geqslant0$．两者相互矛盾，故必有 $|a_T|\neq0$．类似可证 $|a_S|\neq0$．

对于 $0<p<m$ 的广义正交群可以分成四片，见表13.1．

表 13.1: $O(p,q)$ 群的分类记号

$\lvert a_T\rvert>0,\ \lvert a_S\rvert>0$	$\lvert a_T\rvert>0,\ \lvert a_S\rvert<0$	$\lvert a_T\rvert<0,\ \lvert a_S\rvert>0$	$\lvert a_T\rvert<0,\ \lvert a_S\rvert<0$
$O^{++}(p,q)$	$O^{+-}(p,q)$	$O^{-+}(p,q)$	$O^{--}(p,q)$

不难发现：$SO(p,q)=O^{++}(p,q)\cup O^{--}(p,q)$．很多时候我们记 $O^{++}(p,q)$ 为 $SO^+(p,q)$；固有正时 Lorentz 群即为 $SO^+(1,3)$．

当 $0<p<m$ 时，$O(p,q)$ 及 $SO^+(p,q)$ 是非紧致的；这与正交群不同．

13.10.4.4 酉群

本小节在复数域 $\mathbb{C}$ 中讨论问题．此时，需要把式(13.10-5)、(13.10-6)中的一个矩阵换成复共轭，即

$$G(S)=\left\{A\in GL(m,\mathbb{C})\mid AS\bar{A}^T=S\right\}; \tag{13.10-26}$$

$$\mathfrak{g}(s)=\left\{X\in\mathfrak{gl}(m,\mathbb{C})\mid XS+S\bar{X}^T=0\right\}. \tag{13.10-27}$$

请读者仿照本节开头论述一下上述构造仍是李群及其李代数．

取式(13.10-26)中的 S 为单位矩阵，那么

$$U(m)=G(S)=\left\{A\in GL(m,\mathbb{C})\mid A\bar{A}^T=I\right\}, \tag{13.10-28}$$

称为**酉群**，也称为**幺正群** [2]；满足上式的复矩阵称为**酉矩阵**或**幺正矩阵**．由式(13.10-27)得它的李代数是

$$\mathfrak{u}(m)=\left\{X\in\mathfrak{gl}(m,\mathbb{C})\mid X+\bar{X}^T=0\right\}. \tag{13.10-29}$$

通过上式可知 $\mathfrak{u}(m)$ 的实维数是：m^2．故酉群的李代数是由反厄米复矩阵组成．

可以证明 $U(m)$ 群是紧致、连通的，故有 $\exp\mathfrak{u}(m)=U(m)$．

设有幺正矩阵 U，那么必然有 $\bar{U}^TU=I$，两边取行列式，得

$$1=\det\bar{U}\cdot\det U=\overline{\det U}\cdot\det U\quad\Rightarrow\quad\det U=e^{\mathrm{i}\phi},\ \phi\in\mathbb{R}. \tag{13.10-30}$$

上式说明酉矩阵的行列式是模为一的复数，复角 ϕ 无法确定，它处于复平面的单位圆周上．如果进一步要求酉群元素的行列式为 $+1$（复角 $\phi=0$），那么可得如下**特殊酉群**：

$$SU(m)=\left\{A\in GL(m,\mathbb{C})\mid A\bar{A}^T=I\ \text{且}\ \det A=1\right\}. \tag{13.10-31}$$

特殊酉群的李代数是零迹反厄米复矩阵

$$\mathfrak{su}(m)=\left\{X\in\mathfrak{gl}(m,\mathbb{C})\mid X+\bar{X}^T=0\ \text{且}\ \mathrm{Tr}X=0\right\}. \tag{13.10-32}$$

$\mathfrak{su}(m)$ 的实维数是：m^2-1．

可以证明 $SU(m)$ 是紧致、单连通的李群，故有 $\exp\mathfrak{su}(m)=SU(m)$．

[2] Unitary group 可以音译成酉群，常见于数学领域；也可以被意译成幺正群，常见于物理领域．

$U(1)$ 群 此时式(13.10-28)中的矩阵 A 是一维的，可设 $[A]=a+\mathbb{i}b$（其中 $a,b\in\mathbb{R}$），那么有 $a^2+b^2=1$；由此可见 $U(1)$ 与 $SO(2)$ 群同构．很明显，$U(1)$ 还能表示成指数形式：$U(1)=\exp(\mathbb{i}\theta),\ \theta\in\mathbb{R}$．$U(1)$ 是连通的，但不是单连通的．

$SU(1)$ 不是连续群，是单点集（$(1,0)$），平庸无奇．

13.10.4.5 辛群

在数域 $\mathbb{F}$ 中，取式(13.10-5)中的 S 为反对称矩阵

$$J=\begin{pmatrix}0 & I_m\\ -I_m & 0\end{pmatrix},\tag{13.10-33}$$

那么

$$Sp(m,\mathbb{F})=G(J)=\left\{A\in GL(2m,\mathbb{F})\mid AJA^T=J\right\},\tag{13.10-34}$$

称为**辛群**（Symplectic group），$Sp(m,\mathbb{F})$ 中的元素称为**辛矩阵**．它的李代数是

$$\mathfrak{sp}(m,\mathbb{F})=\left\{X\in\mathfrak{gl}(2m,\mathbb{F})\mid XJ+JX^T=0\right\}.\tag{13.10-35}$$

由上式可得复辛群的实维数是 $2(2m^2+m)$，实辛群维数是 $2m^2+m$．

13.10.5 古典李群、李代数

记 A_m 为 $SL(m+1,\mathbb{C})$．记 C_m 为 $Sp(m,\mathbb{C})$．

在复数域 $\mathbb{C}$ 中，取式(13.10-5)中的 S 为单位矩阵 I，则

$$O(m,\mathbb{C})=\left\{A\in GL(m,\mathbb{C})\mid AA^T=I\right\};\quad SO(m,\mathbb{C})=O(m,\mathbb{C})\cap SL(m,\mathbb{C}).$$

记 B_m 为 $SO(2m+1,\mathbb{C})$．记 D_m 为 $SO(2m,\mathbb{C})$．

A_m、B_m、C_m、D_m 称为**古典李群**，其李代数称为**古典李代数**．

复数域上的正交群 $O(m,\mathbb{C})$ 在物理学上几乎无用，同时我们不省略复数域 $\mathbb{C}$ 的标记．本书中，所有的 $O(m)$ 均指 $O(m,\mathbb{R})$，即省略实数域 $\mathbb{R}$ 的标记．

定理 13.97 古典李代数 $A_m(m\geqslant 1)$、$B_m(m\geqslant 1)$、$C_m(m\geqslant 1)$、$D_m(m\geqslant 3)$ 是单纯李代数．（证明见[75]$^{\text{p.148}}$定理 6，或[88]$^{\S 1.3}$定理 1.2）

表13.2中“连通性”一栏，上面是点集拓扑的连通属性；下面是代数拓扑的属性（单连通或复连通）．表中“维数”是指实数域上李群的维数．

表 13.2: 常用矩阵李群

李群	矩阵	实维数	连通性	紧致性	李群李代数
$GL(m,\mathbb{R})$	m 维可逆实矩阵	m^2	非连通 非单连通	非紧	m 维任意 实矩阵
$GL(m,\mathbb{C})$	m 维可逆复矩阵	$2m^2$	连通 非单连通	非紧	m 维任意 复矩阵
$SL(m,\mathbb{R})$	行列式为 1 的 m 维可逆实矩阵	m^2-1	连通 非单连通	非紧	m 维无迹 实矩阵
$SL(m,\mathbb{C})$	行列式为 1 的 m 维可逆复矩阵	$2m^2-2$	连通 单连通	非紧	m 维无迹 复矩阵
$O(m)$	m 维正交实矩阵	$\frac{m(m-1)}{2}$	非连通 非单连通	紧致	m 维反对 称实矩阵
$SO(m)$	行列式为 1 的 m 维正交实矩阵	$\frac{m(m-1)}{2}$	连通 2 度连通	紧致	m 维反对 称实矩阵
$SO^+(1,3)$	4 维实矩阵 Λ 且 $\eta=\Lambda^T\eta\Lambda$	6	连通 2 度连通	非紧	4 维实矩阵 A $A^T=-\eta A\eta$
$U(m)$	m 维幺正矩阵	m^2	连通 ∞ 度连通	紧致	m 维反厄 米复矩阵
$SU(m)$	行列式为 1 的 m 维幺正矩阵	m^2-1	连通 单连通	紧致	m 维反厄米 无迹复矩阵

13.11 物理中常用等距李群

继 §13.10.4，本节再描述一些保度规群[60]，有些群会涉及流形局部坐标.

13.11.1 等距映射补遗

在 §8.4我们已初步讨论了等距映射（Isometry），等距定义自然仍为8.21；我们从群论角度再次讨论这个问题.

对于光滑广义黎曼流形 M，所有从 M 到 M 的等距映射集合 $I(M)$，在把复合映射当成群乘法的情形下构成一个群，称为 M 的**等距群**. 验证 $I(M)$ 是群的工作留给读者（极易）. 粗略地说，$I(M)$ 越大，M 越简单. 有的 M 除了恒等

映射之外可能没有等距映射，称为平凡情形；但是许多流形有足够大的等距群，因此可以应用李群知识．在非平凡情况下，$I(M)$ 是 M 的几何不变量，它的重要性几乎可以和曲率、测地线比拟．

由于 M 的每个切空间与 $\mathbb{R}^n_\nu$ 是（局部）等距同胚的，因此等距群 $I(\mathbb{R}^n_\nu)$ 在广义黎曼几何中具有基本意义．

定理 13.98 设在广义黎曼流形 (M,g)、(N,h) 间存在局部等距同构映射 $\phi: M \to N$．则 $\forall p \in M$，交换图13.3成立；其中 $U_p \subset T_pM$，$V_{\phi(p)} \subset T_{\phi(p)}N$ 分别是 $\exp_p$ 和 $\exp_{\phi(p)}$ 的法邻域（指数映射的像集，见 §9.2.1）．




图 13.3: 等距——指数映射交换图

证明 . 设 $\gamma(t)$ 是 M 中测地线，且 $p=\gamma(0)$；由定理8.36可知映射 $\phi\circ\gamma(t)$ 是 N 中测地线．$\forall v \in U_p$，与之对应 $\phi_* v \in V_{\phi(p)}$；两条测地线诱导的指数映射分别是：$\exp_p(tv) = \gamma(t;p,v)$ 和 $\exp_{\phi(p)}(t\,\phi_* v) = \phi\circ\gamma\big(t;\phi(p),\phi_* v\big)$．由定理8.36有

$$\phi\big(\exp_p(tv)\big) = \exp_{\phi(p)}(t\,\phi_* v). \tag{13.11-1}$$

这正是本定理需要证明的，即交换图13.3． ■

命题 13.99 设有两个连通广义黎曼流形 M、N，存在局部等距同构映射 $\phi,\psi: M \to N$．若存在一个点 $p \in M$ 使得 $\phi(p)=\psi(p)$ 和 $\phi_{p*}=\psi_{p*}$ 成立，则有 $\phi=\psi$．

证明 . 令 $A = \{q \in M \mid \phi_{q*} = \psi_{q*}\}$．因 $p \in A$，故 A 不是空集；又因映射的连续性可知 A 不只包含 p 点．$\forall q \in A$，自然存在 q 的法邻域 $U \subset M$；那么 $\forall r \in U$ 一定存在 $v \in T_qM$ 使得 $r = \gamma_v(1) = \exp_q(v)$ 成立；则（要用式(13.11-1)）

$$\phi(r) = \phi\big(\gamma_v(1)\big) = \gamma_{\phi_*(v)}(1) = \gamma_{\psi_*(v)}(1) = \psi\big(\gamma_v(1)\big) = \psi(r). \tag{13.11-2}$$

故在开集 U 上 $\phi=\psi$；因此 $\forall r\in U$，都有 $\phi_{r*}=\psi_{r*}$；从而 $U\subset A$；这说明 A 是 M 中的开集．如果 A 不能覆盖整个 M，那么另取 $w\in A$ 且 $w\neq p$，以 w 为原点再次运用指数映射方式将 A 延拓，直至能够覆盖流形 M． ■

例 13.100 标量函数场变换规则．

我们以量子物理中的波函数为例来说明标量函数场在对称操作下的变换规则．考虑量子物理中一个态矢量 $|\psi\rangle$，在位型空间表象中态函数是 $\psi(\boldsymbol{r})=\langle\boldsymbol{r}|\psi\rangle$．用 Q 表示某种对称作用，它会把态函数作整体变换；变换后在新的位置 $\boldsymbol{r}'=Q\boldsymbol{r}$ 的态函数与老位置的态函数是相等的，这是对称变换的要求；用公式表示为

$$\psi(\boldsymbol{r})=\psi'(\boldsymbol{r}')$$

我们将新旧位置关系（$\boldsymbol{r}'=Q\boldsymbol{r}$）代入上式，有

$$\psi(\boldsymbol{r})=\psi'(Q\boldsymbol{r})\quad\Leftrightarrow\quad\psi(Q^{-1}\boldsymbol{r})=\psi'(\boldsymbol{r}).$$

在对称变换 Q 的作用下，新的态矢量 ψ' 可用一个函数变换算符来表示，即

$$\psi'(\boldsymbol{r})\overset{def}{=}\hat{D}(Q)\psi(\boldsymbol{r}).\qquad\text{等号两边的宗量 }\boldsymbol{r}\text{ 是相同的}\tag{13.11-3}$$

那么便有

$$\psi(Q^{-1}\boldsymbol{r})=\psi'(\boldsymbol{r})\equiv\hat{D}(Q)\psi(\boldsymbol{r}).\tag{13.11-4}$$

上式便是态矢量在对称变换下的变化关系式． ■

13.11.2 平移群

在 $\mathbb{R}^m$ 中，**平移**（translation）是一种几何变换，它将图形、形状或空间的每个点在给定方向上移动相同的距离．平移也可以解释为向每个点添加一个常量矢量，或移动坐标系的原点．用坐标语言来说，便是：

$$x\to x':x'^i=x^i+a^i\quad\Leftrightarrow\quad\boldsymbol{x}'=\hat{Q}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}+\boldsymbol{a};\qquad 1\leqslant i\leqslant m.\tag{13.11-5}$$

其中 x^i 是旧坐标，x'^i 是新坐标，a^i 是常数．需要强调一点：算符 $\hat{Q}$ 不是线性算符，例如 $\hat{Q}(2\boldsymbol{x})=2\boldsymbol{x}+\boldsymbol{a}\neq 2\big(\hat{Q}(\boldsymbol{x})\big)=2\boldsymbol{x}+2\boldsymbol{a}$．

仅有平移的坐标表示是不够的，假设存在用坐标 $\{x^i\}$ 描述的标量函数 $f(\boldsymbol{x})$，我们要求 $f(\boldsymbol{x})$ 在平移操作下不变；参考式(13.11-4)，用 $\hat{T}(m)$ 表示作用在 f 上的算符，有

$$f'(\boldsymbol{x})=\hat{T}(m)f(\boldsymbol{x})=f(\hat{Q}^{-1}\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}). \tag{13.11-6}$$

自然把群乘法取成连续进行两次“坐标加法”，即 $\boldsymbol{x}$ 加上 $\boldsymbol{b}$，再加上 $\boldsymbol{a}$；对于 $\hat{T}(m)$ 来说便是复合映射，即群乘法是

$$\hat{T}(m)_{\boldsymbol{a}}\circ\hat{T}(m)_{\boldsymbol{b}}\ f(\boldsymbol{x})=\hat{T}(m)_{\boldsymbol{a}}\ f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b})=f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})=\hat{T}(m)_{\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}}\ f(\boldsymbol{x}).$$

容易验证上式操作构成群：首先，此操作具有封闭性；其次，加法具有结合性；第三，当 $\boldsymbol{a}=0$ 时，操作(13.11-6)是恒等映射，可看作单位元；最后，参量是 $-\boldsymbol{a}$ 和 $+\boldsymbol{a}$ 的操作互逆．由于加法具有交换性（即群乘法具有交换性），故此群是可对易群（阿贝尔群）；我们称之为**平移群**．由于 $\mathbb{R}^m$ 本身就是光滑流形，再加上“群乘法”和“求逆”运算是 C^∞ 的（加法和取负号操作当然是 C^∞ 的），故平移群是李群．

平移群适用于各种度规场，但我们只考虑正定度规以及闵氏度规．

由于李群是可微的，我们将式(13.11-6)展开，有

$$\hat{T}(m)f(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a})=f(\boldsymbol{x})+(-a^i)\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x^i}+\frac{1}{2!}(-a^i)(-a^j)\frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x^i\partial x^j}+\cdots$$

上式说明，平移算符可以表示成

$$\hat{T}(m)\equiv\exp\left(-a^j\frac{\partial}{\partial x^j}\right)\equiv\exp\left(-\mathbb{i}a^j\hat{P}_j\right),\qquad \hat{P}_j\overset{def}{=}-\mathbb{i}\frac{\partial}{\partial x^j}. \tag{13.11-7}$$

上式中顺便给出了平移 $\hat{P}_j$ 的定义；并且把平移算符形式地表示成指数形式．由于两个不同坐标的偏导数是可交换的，所以不难看出式(13.11-7)中的平移算符仍是阿贝尔群．上面给出的平移算符是微分形式的，在式(13.11-14)中给出了平移李代数的矩阵形式．

虽然算符 $\hat{Q}$ 不是线性算符，但平移算符 $\hat{T}(m)$ 是线性的：

$$\begin{aligned}\hat{T}(m)\big(kf(\boldsymbol{x})+g(\boldsymbol{x})\big)=&k\left(f(\boldsymbol{x})-a^i\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x^i}+\cdots\right)+\left(g(\boldsymbol{x})-a^i\frac{\partial g(\boldsymbol{x})}{\partial x^i}+\cdots\right)\\=&k\hat{T}(m)\big(f(\boldsymbol{x})\big)+\hat{T}(m)\big(g(\boldsymbol{x})\big).\end{aligned}$$

平移群是连通、单连通、非紧致李群．

例 13.101 号差为 -2 的 Lorentz 度规（也称为闵氏度规）下的平移算符.

号差为 $+2$ 的 Lorentz 度规下动量算符定义成 $\hat{P}_\mu = -\mathbb{i}\frac{\partial}{\partial x^\mu}$（见式(13.11-7)），有一个负号；同时非时间部分 $\hat{P}_j = \hat{P}^j$（即 $j = 1,2,3$），时间部分 $\hat{P}_0 = -\hat{P}^0$.

不论何种号差，逆变矢量的形式是一样的；故不论号差，动量算符的逆变形式为：$\hat{P}^\mu = \mathbb{i}\{\frac{\partial}{\partial t}, -\frac{\partial}{\partial x}, -\frac{\partial}{\partial y}, -\frac{\partial}{\partial z}\}$. 由此可知号差为 -2 的 Lorentz 度规下动量算符是：$\hat{P}^\mu = \mathbb{i}\frac{\partial}{\partial x_\mu}$ 以及 $\hat{P}_\mu = \mathbb{i}\frac{\partial}{\partial x^\mu}$.

除此以外，在不同号差下，两个矢量的缩并也相差一个负号；故号差为 -2 的闵氏度规下平移算符是 $\hat{T}(m) = \exp\left(\mathbb{i}a^\mu \hat{P}_\mu\right)$，与式(13.11-7)差一负号. ■

13.11.3 欧几里得群

在低速、低能情形下（比如牛顿力学范畴内），几乎所有证据表明，三维物理空间是均匀和各向同性的，因此在孤立系统上进行的科学实验的结果不应取决于所使用的实验装置（或参考系）的特定位置或方向. 这一基本事实是通过假设基础空间是一个欧几里得空间而纳入数学框架的. m 维欧几里得空间（正定度规）的对称群是欧几里得群（记为 $E(m)$ 或 $ISO(m)$）：

定义 13.102 欧几里得群由 $(\mathbb{R}^m, \delta)$ 上的所有连续、等距、“线性”变换组成.

上述定义中线性两个字加上引号是因为平移不是线性算符（见 §13.11.2），纯旋转是线性算符；无穷小平移是线性的. 对应的坐标变换是

$$x \to x' : x'^i = R^i{}_j x^j + a^i, \qquad 1 \leqslant i \leqslant m. \tag{13.11-8}$$

用矩阵形式表示为（后面会证明式中 $R \in O(m)$）

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{x}' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & \boldsymbol{a} \\ \boldsymbol{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{x} \\ 1 \end{bmatrix} \overset{def}{=} \boldsymbol{T} \begin{bmatrix} \boldsymbol{x} \\ 1 \end{bmatrix}. \qquad \boldsymbol{T}^{-1} = \begin{bmatrix} R^{-1} & -R^{-1}\boldsymbol{a} \\ \boldsymbol{0}^T & 1 \end{bmatrix}. \tag{13.11-9}$$

我们把一个 m 维列矢量末尾增加一行，数值为 1；从而变成了 $m+1$ 维列矢量，称之为**齐次坐标**；这样做的目的只是为了表示方便，没有其它意义了. 上式最后定义了矩阵 $\boldsymbol{T}$，并给出了它的逆.

在空间均匀前提下，平移（见 §13.11.2）是等距变换，这种性质与度规是否正定无关. 在正定度规下，要求此变换是等距的，即

$$(x'-y')^T(x'-y') = (\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})^T R^T R(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) = (x-y)^T(x-y) \;\Rightarrow\; R^T R = I.$$

可见只要变换 R 是实正交矩阵（见 §13.10.4.1）就可等距，也就是 R 是 $O(m)$ 群中的元素，包含纯转动和反射．这便说明了欧几里得群由两种类型的变换组成：平移和转动．为了使问题简化，可以将 R 限定在 $SO(m)$ 中；此时，通常把 $E(m)$ 记为 $SE(m)$ 或 $E^+(m)$.

这就是说 $I(\mathbb{R}^m)=E(m)$，它的维数是：

$$\dim\big(I(\mathbb{R}^m)\big)=\dim\hat{T}(m)+\dim O(m)=m+m(m-1)/2=m(m+1)/2.$$

我们把 $E(m)$ 的群乘法定义为复合映射，连续两次欧氏变换为

$$\begin{bmatrix}R_1 & \boldsymbol{a_1}\\ \mathbf{0}^T & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}R_2 & \boldsymbol{a_2}\\ \mathbf{0}^T & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}R_1 & \boldsymbol{a_1}\\ \mathbf{0}^T & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}R_2\boldsymbol{x}+\boldsymbol{a_2}\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}R_1R_2\boldsymbol{x}+R_1\boldsymbol{a_2}+\boldsymbol{a_1}\\ 1\end{bmatrix}.\quad(13.11\text{-}10)$$

很明显，两次欧氏变换是不可对易的．不难验证平移群 $\hat{T}(m)$ 是 $E(m)$ 的不变子群，即 $\forall u\in E(m)$，$\forall t\in\hat{T}(m)$ 有

$$u^{-1}tux=\begin{bmatrix}R^{-1} & -R^{-1}\boldsymbol{a}\\ \mathbf{0}^T & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}R\boldsymbol{x}+\boldsymbol{a}+\boldsymbol{t}\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}+R^{-1}\boldsymbol{t}\\ 1\end{bmatrix}.\qquad(13.11\text{-}11)$$

因为 $E(m)$ 有一个不变子群 $\hat{T}(m)$，所以它不是一个单纯群；因为 $\hat{T}(m)$ 是阿贝尔的，故它也不是半单纯的．$E(m)$ 是不连通的，它有两个分支；其中 $SE(m)$ 是包含单位元的连通分支．因平移群是非紧致的，故 $E(m)$ 也是非紧致李群．

依照 §13.3.2可知：$E(m)=\hat{T}(m)\rtimes O(m)$．依照半直积定义可以把 $E(m)$ 中元素记为 (t,o)，其中 $t\in\hat{T}(m)$，$o\in O(m)$，且不能把 (t,o) 改变顺序为 (o,t)．为了更清晰地描述这个半直积，我们从定义的角度再次描述一下．可以定义平移群 $\hat{T}(m)$ 的自同构映射为：$\Psi_{R_1}(\boldsymbol{a}_2)=R_1\boldsymbol{a}_2=\hat{T}(m)_{R_1\boldsymbol{a}_2}$，其中 $R_1\in O(m)$，$\boldsymbol{a}_2\in\hat{T}(m)$．那么连续两次欧氏变换可以表示为：$(\boldsymbol{a}_1,R_1)(\boldsymbol{a}_2,R_2)=(\boldsymbol{a}_1\Psi_{R_1}(\boldsymbol{a}_2),R_1R_2)=(\boldsymbol{a}_1+R_1\boldsymbol{a}_2,R_1R_2)$．这与上面用矩阵表示的连续两次欧氏变换完全相同．

13.11.3.1 $ISO(2)$

二维欧几里得群 $ISO(2)$（或 $E(2)$）的乘法关系(13.11-9)中的 $\boldsymbol{T}$ 可表示为

$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{a},\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & a^1\\ \sin\theta & \cos\theta & a^2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.\qquad(13.11\text{-}12)$$

很明显，$\boldsymbol{T}(0,\theta)$ 是 $SO(2)$，它表示 $x-y$ 平面内的旋转（即绕 z 轴旋转），它可以表示成（参见式(15.2-48)）

$$\boldsymbol{T}(0,\theta)=R(\theta)=\exp(-\mathbb{i}\theta J);\ J=\begin{pmatrix}0&-\mathbb{i}&0\\ \mathbb{i}&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\cong\hat{J}=-\mathbb{i}(x\partial_y-y\partial_x). \tag{13.11-13}$$

$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{a},0)$ 是平移群 $\hat{T}(2)$. 在李代数同构前提下，李代数基矢是矩阵还是偏导数算符是没有差别的. 平移群算符(13.11-7)中使用的是偏导数算符，现把它换成矩阵形式（参考(13.11-9)）：

$$\hat{P}_1=-\mathbb{i}\frac{\partial}{\partial x^1}\ \cong\ \begin{pmatrix}0&0&\mathbb{i}\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\equiv P_1,\quad \hat{P}_2=-\mathbb{i}\frac{\partial}{\partial x^2}\ \cong\ \begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&\mathbb{i}\\0&0&0\end{pmatrix}\equiv P_2. \tag{13.11-14}$$

通过直接计算可以验证式(13.11-14)中的矩阵是可对易的，即 $[P_1,P_2]=0$. 因平移群是阿贝尔的，它的单参数子群形式为（即式(13.11-7)，但基矢换成了矩阵）

$$\hat{T}(2)=\exp\left(-\mathbb{i}a^jP_j\right)=\exp\left(-\mathbb{i}a^1P_1\right)\exp\left(-\mathbb{i}a^2P_2\right). \tag{13.11-15}$$

可将(13.11-14)式中矩阵代入上式验证: $\exp(-\mathbb{i}a^jP_j)$ 就是式(13.11-9)中的平移.

不难发现式(13.11-13)中的 J 和式(13.11-14)的 P_1,P_2 是指数映射的生成元；也就是说 J,P_1,P_2 是 $ISO(2)$ 群李代数 $\mathfrak{iso}(2)$ 的基矢，通过矩阵的直接计算可得到对易关系如下：

$$[P_1,P_2]=0,\quad [J,P_1]=\mathbb{i}P_2,\quad [J,P_2]=-\mathbb{i}P_1 \tag{13.11-16}$$

上式是矩阵形式基矢量的对易关系. 直接计算偏导数形式的基矢量对易关系，所得结果与上式相同；故两者是同构的，可以不必仔细区分.

命题 13.103 $ISO(2)$ 中的元素可分解为 $\boldsymbol{T}(\boldsymbol{a},\theta)=\hat{T}(2)R(\theta)$.

证明 . 应用式(13.11-10)，有

$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{a},\theta)\big(R(\theta)\big)^{-1}=\boldsymbol{T}(\boldsymbol{a},\theta)\boldsymbol{T}(0,-\theta)=\boldsymbol{T}(\boldsymbol{a},\theta-\theta)=\boldsymbol{T}(\boldsymbol{a},0)=T(2).$$

将 $R(\theta)$ 乘在上式两端便可证明命题. ■

13.11.3.2 李代数收缩一：几何形式的 $\mathfrak{so}(3) \to \mathfrak{iso}(2)$

这里叙述较易理解的几何形式 Inönü–Wigner 收缩．作为李变换群，$SO(3)$ 是二维球面的对称群，$ISO(2)$ 是二维平面的对称群；可以通过球面上的点在平面上的立体投影来建立这些群的元素之间的对应关系．当球的半径变大时，这种对应关系就变得简单了．我们将看到：当球半径趋于无限大时，群 $SO(3)$ “收缩”到 $ISO(2)$.

我们以地球为例．以地心 O 为原点建立坐标系 XYZ，Z 是由地心指向北极点 N 方向，X 轴由地心指向经纬度 $(0,0)$ 点方向，按右手叉乘法则确定 Y 轴方向．以北极点 N 为原点再建立一个坐标系 xyz，z 和 Z 重合，x 平行于 X，y 平行于 Y．很明显，$x-y$ 平面切于地球表面，切点是北极点 N．有一个人（比如你）站在北极点 N 处做三个动作，第一个朝 $-y$ 方向迈一步，距离是 d_2；第二个朝 x 方向迈一步，距离是 d_1；第三个是站在 N 点自转 θ 角．很明显这两个距离都远远小于地球半径 R，即 $d_1 \lll R$，$d_2 \lll R$．对于 $OXYZ$ 系来说，第一个动作相当于绕 X 旋转了 $\alpha = -d_2/R$ 角度，第二个动作相当于绕 Y 旋转了 $\beta = d_1/R$ 角度，第三个动作相当于绕 Z 轴旋转了 θ 角．借用式(15.2-46)，可以将上述三个动作表示成（三个坐标约是：$X \approx 0,\ Y \approx 0,\ Z \approx R$）

$$\alpha\hat{L}_X + \beta\hat{L}_Y + \theta\hat{L}_Z = -d_2\frac{\hat{L}_X}{R} + d_1\frac{\hat{L}_Y}{R} + \theta\hat{L}_Z. \tag{13.11-17}$$

由于 $d_1 \lll R$，$d_2 \lll R$，故可以认为 $R \to \infty$，则有

$$\begin{aligned}
\frac{1}{R}\hat{L}_X &= -\mathbb{i}\frac{1}{R}(Y\partial_Z - Z\partial_Y) = -\mathbb{i}\frac{1}{R}(Y\partial_Z - R\partial_Y) \ \to\ \mathbb{i}\partial_Y = -\hat{P}_Y, \\
\frac{1}{R}\hat{L}_Y &= -\mathbb{i}\frac{1}{R}(Z\partial_X - X\partial_Z) = -\mathbb{i}\frac{1}{R}(R\partial_X - X\partial_Z) \ \to\ -\mathbb{i}\partial_X = \hat{P}_X.
\end{aligned}$$

也就是说当半径趋于无穷大时，旋转算符 $\frac{1}{R}\hat{L}_X$ 趋于平移算符 $-\hat{P}_Y$，旋转算符 $\frac{1}{R}\hat{L}_Y$ 趋于平移算符 $\hat{P}_X$．这样，原来绕三个轴的旋转(13.11-17)变成了如下三个操作：第一个动作变成沿 $-y$ 方向平移 d_2；第二个动作变成沿 x 方向平移 d_1；第三个动作不变，即绕 Z 轴旋转不变；用公式表示便是

$$\alpha\hat{L}_X + \beta\hat{L}_Y + \theta\hat{L}_Z = -d_2\frac{\hat{L}_X}{R} + d_1\frac{\hat{L}_Y}{R} + \theta\hat{L}_Z \ \to\ d_2\hat{P}_Y + d_1\hat{P}_X + \theta\hat{L}_Z. \tag{13.11-18}$$

这就是说：当 $R \to \infty$ 时，旋转算符 $\hat{L}_X, \hat{L}_Y, \hat{L}_Z$（$SO(3)$ 生成元）收缩成算符 $\hat{P}_x, \hat{P}_y, \hat{L}_z$（$ISO(2)$ 生成元）．对易关系也有相应的收缩变化，即式(15.2-47)变为：

$$\left[\frac{1}{R}\hat{L}_X,\ \frac{1}{R}\hat{L}_Y\right] = \mathbb{i}\frac{1}{R^2}\hat{L}_Z = \mathbb{i}\frac{1}{R^2}\big(-\mathbb{i}(X\partial_Y - Y\partial_X)\big) \ \to\ \left[\hat{P}_Y,\ \hat{P}_X\right] = 0.$$

$$\left[\frac{1}{R}\hat{L}_Y,\ \hat{L}_Z\right]=\mathbb{i}\frac{1}{R}\hat{L}_X=\mathbb{i}\frac{1}{R}\big(-\mathbb{i}(Y\partial_Z-Z\partial_Y)\big)\ \to\ \left[\hat{P}_X,\ \hat{L}_Z\right]=-\partial_Y=-\mathbb{i}\hat{P}_Y.$$
$$\left[\hat{L}_Z,\ \frac{1}{R}\hat{L}_X\right]=\mathbb{i}\frac{1}{R}\hat{L}_Y=\mathbb{i}\frac{1}{R}\big(-\mathbb{i}(Z\partial_X-X\partial_Z)\big)\ \to\ \left[\hat{L}_Z,\ \hat{P}_Y\right]=-\partial_X=-\mathbb{i}\hat{P}_X.$$

上式说明了：当 $R\to\infty$ 时，$\mathfrak{so}(3)$ 李代数收缩到 $\mathfrak{iso}(2)$ 李代数.

13.11.4 Lorentz 群

我们假设读者学过狭义相对论. 在 Lorentz 变换中，两个坐标系的速度差与 x 轴平行；这一节我们给出速度差与 x 轴不平行的 Lorentz 变换，数学上复杂了许多，但实质物理内容没有任何改变.

由一般 Lorentz 变换（即 $\Lambda^T\eta\Lambda=\eta$，见式(13.10-21)）可知

$$\Lambda^{\mu}{}_{\rho}\eta_{\mu\nu}\Lambda^{\nu}{}_{\sigma}=\eta_{\rho\sigma}\quad\Leftrightarrow\quad(\Lambda^{-1})^{\rho}{}_{\mu}=\eta_{\mu\nu}\Lambda^{\nu}{}_{\sigma}\eta^{\rho\sigma}\equiv\Lambda_{\mu}{}^{\rho}.\tag{13.11-19}$$

若只考虑单位元附近的无穷小 Lorentz 变换，即令 $\Lambda^{\mu}{}_{\rho}=\delta^{\mu}_{\rho}+\omega^{\mu}{}_{\rho}$，有

$$(\delta^{\mu}_{\rho}+\omega^{\mu}{}_{\rho})\eta_{\mu\nu}(\delta^{\nu}_{\sigma}+\omega^{\nu}{}_{\sigma})=\eta_{\rho\sigma}\xrightarrow[\text{一阶项}]{\text{只保留}}\omega_{\rho\sigma}=-\omega_{\sigma\rho}.\tag{13.11-20}$$

上式中 $\omega_{\rho\sigma}\equiv\omega^{\mu}{}_{\sigma}\eta_{\mu\rho}$. 也就是说无穷小 Lorentz 变换是反对称的六个元素.

把一般 Lorentz 变换写成分量

$$(\Lambda^0_{\cdot 0})^2-\sum_{j=1}^{3}(\Lambda^j_{\cdot 0})^2\quad=1\quad=(\Lambda^0_{\cdot 0})^2-\sum_{j=1}^{3}(\Lambda^0_{\cdot j})^2,\tag{13.11-21}$$
$$\Lambda^0_{\cdot 0}\Lambda^0_{\cdot i}-\sum_{j=1}^{3}\Lambda^j_{\cdot 0}\Lambda^j_{\cdot i}\quad=0\quad=\Lambda^i_{\cdot 0}\Lambda^0_{\cdot 0}-\sum_{j=1}^{3}\Lambda^i_{\cdot j}\Lambda^0_{\cdot j},\quad i,k=1,2,3,\tag{13.11-22}$$
$$-\Lambda^0_{\cdot i}\Lambda^0_{\cdot k}+\sum_{j=1}^{3}\Lambda^j_{\cdot i}\Lambda^j_{\cdot k}\quad=\delta_{ik}\quad=-\Lambda^i_{\cdot 0}\Lambda^k_{\cdot 0}+\sum_{j=1}^{3}\Lambda^i_{\cdot j}\Lambda^k_{\cdot j},.\tag{13.11-23}$$

从 Lorentz 变换的另一形式（$\Lambda\eta^{-1}\Lambda^T=\eta^{-1}$）出发可证明上面三式的后半段；其中(13.11-23)的后半段也是对角单位矩阵，只不过指标在上面. 由式(13.11-21) 可以看到：要么 $\Lambda^0_{\cdot 0}\geqslant+1$，要么 $\Lambda^0_{\cdot 0}\leqslant-1$. 依照 $\Lambda^0_{\cdot 0}$ 的符号和 $\det(\Lambda)$ 的符号，我们把 Lorentz 变换分为四类（如表13.3，类似于表13.1）. 这四片 Lorentz 变换是互相不连通的，其中固有正时部分包含单位变换，是我们要主要研究的部分. 其它三个部分可以通过离散变换（空间反射 ($\mathcal{P}$) 与时间反演 ($\mathcal{T}$)）与固有正时部分相联系. 下面分别介绍几种常用的 Lorentz 变换.

表 13.3: Lorentz 变换分类

$\det(\Lambda)$	$\Lambda^0_{\cdot 0}$	记号	名称
$+1$	$\geqslant +1$	$L^{\uparrow}_{+}$	固有正时 (proper orthochronous)
$+1$	$\leqslant -1$	$L^{\downarrow}_{+}$	固有非正时 (proper non-orthochronous)
-1	$\geqslant +1$	$L^{\uparrow}_{-}$	非固有正时 (improper orthochronous)
-1	$\leqslant -1$	$L^{\downarrow}_{-}$	非固有非正时 (improper non-orthochronous)

13.11.4.1 空间反射、时间反演

空间反射变换只将空间坐标反号，矩阵是 $\mathcal{P} = diag(+1, -1, -1, -1)$. 作变换 $x'^{\mu} = \mathcal{P}^{\mu}_{\nu} x^{\nu}$ 后，有 $x'^0 = +x^0, x'^i = -x^i$. 显然这种变换属于 $L^{\uparrow}_{-}$.

时间反演变换只将时间坐标反号，矩阵是 $\mathcal{T} = diag(-1, +1, +1, +1)$. 作变换 $x'^{\mu} = \mathcal{T}^{\mu}_{\nu} x^{\nu}$ 后，有 $x'^0 = -x^0, x'^i = +x^i$. 显然这种变换属于 $L^{\downarrow}_{-}$.

全反演就是时间反演和空间反射的联合变换，矩阵是 $\mathcal{PT}$. 作变换 $x'^{\mu} = (\mathcal{PT})^{\mu}_{\nu} x^{\nu}$ 后，有 $x'^0 = -x^0, x'^i = -x^i$. 显然这种变换属于 $L^{\downarrow}_{+}$.

以上三种变换是离散变换.

假设我们选定 $\Lambda \in L^{\uparrow}_{+}$，则 $\mathcal{P}\Lambda \in L^{\uparrow}_{-}, \mathcal{T}\Lambda \in L^{\downarrow}_{-}, \mathcal{PT}\Lambda \in L^{\downarrow}_{+}$. Lorentz 变换 $L^{\uparrow}_{+}$ 本身以及通过三个分立变换 $\mathcal{P}, \mathcal{T}, \mathcal{PT}$ 作用后可以遍历整个 Lorentz 变换，所以我们只需要研究 $L^{\uparrow}_{+}$ 就足够了. 而 $L^{\uparrow}_{+}$ 只包含纯空间固有转动和伪转动，这两种变换是连续的.

不难看出 $L^{\uparrow}_{+} \cup L^{\uparrow}_{-}$ 保时间方向不变，也就是 $\Lambda^0_0 > 0$ 的部分. $L^{\uparrow}_{+} \cup L^{\downarrow}_{+}$ 保纯空间定向不变，也就是 $\det(\Lambda) > 0$ 的部分. 纯空间定向概念见 §5.5（由一个 3×3 矩阵描述）；其实时间方向的概念也是如此定义的，只不过时间维度是一个数，不需要用矩阵行列式来描述，或者说是一个 1×1 的矩阵.

13.11.4.2 纯空间固有转动

纯空间固有转动 R 是 Lorentz 变换的一个子类，它不涉及时间轴，所以它属于同一惯性参考系中两个不同坐标系的变换；我们先看这种简单的情形. 最一般的情形就是把三个空间轴绕原点转动任意角，其矩阵形式为

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R^i_{\cdot j} \end{pmatrix}. \tag{13.11-24}$$

其中 3×3 矩阵 $R^i_{\cdot j}$ 是三维空间的固有转动（见 §13.10.4.2），此转动是包含单位变换在内连续变换，所以不含空间反射．这个部分变换 $\Lambda^0_{\cdot 0}\geqslant +1, \det(\Lambda)=+1$，它属于 $L^{\uparrow}_{+}$.

13.11.4.3 伪转动

选两个惯性系，系 O' 相对于 O 以速度 $\boldsymbol{v}$ 运动，这两个惯性系间的变换是伪转动[3]．前面介绍的沿 x 轴 Lorentz 变换就是最简单的伪转动．首先，我们选择两个坐标系的相应坐标轴互相平行且正方向相同，即 x 平行于 x'，等等．选择 x 轴平行于 $\boldsymbol{v}$．伪转动为

$$x'^{\mu}=B_x(v)^{\mu}_{\cdot\nu}x^{\nu}. \tag{13.11-25}$$

其中 $B_x(v)$ 是沿 x 轴的 Lorentz 变换，将上式写开即为：

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\dfrac{v_x}{c} & 0 & 0 \\ -\gamma\dfrac{v_x}{c} & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \equiv B_x(v) \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \tag{13.11-26}$$

如果两惯性系 $\tilde{O}$ 和 $\tilde{O}'$ 的速度差 $\boldsymbol{v}=(v_x,v_y,v_z)$ 不与坐标轴平行，但 $\tilde{O}$ 和 $\tilde{O}'$ 系中的坐标系相应轴仍旧相互平行、同向，我们来看此时 Lorentz 变换的伪转动 $B(\boldsymbol{v})$ 是什么样子．$\boldsymbol{v}$ 如图13.4所示．

在 $t=0=t'$ 时刻，两参考系的相应坐标轴是重合的．我们可以把 $\tilde{O}$ 和 $\tilde{O}'$ 系同时进行旋转，把坐标轴 $\tilde{x}(\tilde{x}')$ 旋转到的速度 $\boldsymbol{v}$ 方向上；即，$X=R^{-1}\tilde{X}$ 和 $X'=R^{-1}\tilde{X}'$，我们把 x^{μ} 简记为 $X=(x^0,x^1,x^2,x^3)^T$，略去了上下标．旋转后为 $O(O')$ 系，其坐标为 $X(X')$，且坐标轴 $x(x')$ 平行于速度 $\boldsymbol{v}$；为了区别起见，我们记 O 和 O' 系的速度差为 u，方向沿 x 轴，大小当然为 $|u|=|\boldsymbol{v}|$；联系 O 和 O' 系的伪转动是 $X'=B_x(u)X$，即式(13.11-25)．最后，再旋转回 $\tilde{O}$ 和 $\tilde{O}'$ 系．

$$X'=B_x(u)X \quad\Rightarrow\quad RX'=RB_x(u)X \quad\Rightarrow\quad \tilde{X}'=RB_x(u)R^{-1}\tilde{X}. \tag{13.11-27}$$

关键是求解旋转矩阵 $R^{-1}(\theta\phi)$ 的表达式．根据我们的约定（见例题13.121、13.122），旋转矩阵 $R^{-1}(\theta\phi)$ 左作用在分量 X 上，右作用在基矢 $\boldsymbol{e}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)$

[3]boost 这个词儿翻译众多，比如伪转动、推进、推动、平动等．在此我们选用伪转动．




图 13.4: 两参考系速度差 $\boldsymbol{v}$ 与坐标系的关系

上．现在考虑如图13.4所示的 $\boldsymbol{v}$，纯空间固有旋转 $R^{-1}(\theta\phi)$ 相当于将 $\boldsymbol{v}$（对应基矢 $\boldsymbol{e}$）旋转到 $\tilde{x}$（对应基矢 $\tilde{\boldsymbol{e}}$）的方向．不难求得

$$R^{-1}(\theta\phi)=C_{\tilde{y}}\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)C_{\tilde{z}}(-\phi)\ \Rightarrow\ R(\theta\phi)=C_{\tilde{z}}(\phi)C_{\tilde{y}}\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right). \tag{13.11-28}$$

上式计算中用到了 $C_k^{-1}(\psi)=C_k(-\psi)$．则有

$$B\left(\boldsymbol{v}\right)=RB_x(u)R^{-1}=C_{\tilde{z}}\left(\phi\right)C_{\tilde{y}}\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)B_x\left(u\right)C_{\tilde{y}}\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)C_{\tilde{z}}\left(-\phi\right).$$

经过矩阵乘法计算可以得到

$$B(\boldsymbol{v})=\begin{pmatrix}\gamma & -\gamma\frac{v_x}{c} & -\gamma\frac{v_y}{c} & -\gamma\frac{v_z}{c}\\ -\gamma\frac{v_x}{c} & 1+\frac{(\gamma-1)v_x^2}{v^2} & \frac{(\gamma-1)v_xv_y}{v^2} & \frac{(\gamma-1)v_xv_z}{v^2}\\ -\gamma\frac{v_y}{c} & \frac{(\gamma-1)v_xv_y}{v^2} & 1+\frac{(\gamma-1)v_y^2}{v^2} & \frac{(\gamma-1)v_yv_z}{v^2}\\ -\gamma\frac{v_z}{c} & \frac{(\gamma-1)v_xv_z}{v^2} & \frac{(\gamma-1)v_yv_z}{v^2} & 1+\frac{(\gamma-1)v_z^2}{v^2}\end{pmatrix}. \tag{13.11-29}$$

其中 $\gamma^{-1}=\sqrt{1-v^2/c^2}$．速度 $\boldsymbol{v}$ 的分量可以由图13.4计算求得

$$v_x=v\sin\theta\cos\phi,\quad v_y=v\sin\theta\sin\phi,\quad v_z=v\cos\theta. \tag{13.11-30}$$

计算中需注意 $|\boldsymbol{u}|=|\boldsymbol{v}|$，即原来沿 x 轴的速度 u 的大小与任意方向速度 $\boldsymbol{v}$ 的大小相等．从上面伪转动矩阵可见它必然是对称的．它穷尽了两惯性系 O 和 O' 间满足如下条件的线性变换：㊀两坐标系相应轴是相互平行且同向；㊁两坐标系的

空间坐标原点在 $t=0=t'$ 时重合；㊂两坐标系速度差 $\boldsymbol{v}$ 是常数，且方向任意. 符合这三条的 Lorentz 变换叫作**伪转动**.

从物理思辨显然可得 $B^{-1}(\boldsymbol{v})=B(-\boldsymbol{v})$. 由于只是速度前添加负号，所以式(13.11-29)只有第一行、第一列前添加负号即可，且 00 分量符号不变；右下角的 3×3 矩阵因负负得正，符号不变.

式(13.11-29)作用到时空坐标，也常写成另外一种形式

$$ct'=\gamma\left(ct-\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{r}}{c}\right),\quad \boldsymbol{r}'=\boldsymbol{r}+(\gamma-1)\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{r}}{v^2}\boldsymbol{v}-\gamma\frac{\boldsymbol{v}}{c}ct. \tag{13.11-31}$$

其中 $\boldsymbol{r}=(x,y,z)$、$\boldsymbol{v}=(v_x,v_y,v_z)$、$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{r}=v_xx+v_yy+v_zz$.

快度 我们用快度（rapidity）来改写式(13.11-29). 我们先考虑 $v_y=0=v_z$ 的最简单情形. 令 $\tanh\theta_x=v_x/c$，就有 $\gamma=\cosh\theta_x$；则 $-1<v_x/c<1$ 相当于 $-\infty<\theta_x<+\infty$，θ_x 称为**快度**；此时 Lorentz 矩阵可以表示为另一种形式

$$(\Lambda_x)^\mu_{\cdot\nu}=\begin{pmatrix}\cosh\theta_x & -\sinh\theta_x & 0 & 0\\ -\sinh\theta_x & \cosh\theta_x & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}. \tag{13.11-32}$$

我们来看一下沿 x 轴连续进行两次 Lorentz 变换会是什么结果. 先进行一次 Lorentz 变换 θ_2，然后再进行第二次 Lorentz 变换 θ_1，有

$$\Lambda_x(\theta_1)\Lambda_x(\theta_2)=\Lambda_x(\theta_1+\theta_2). \tag{13.11-33}$$

上式以快度表示；（省略无关紧要的 y 和 z 轴）计算过程是

$$\begin{pmatrix}\cosh\theta_1 & -\sinh\theta_1\\ -\sinh\theta_1 & \cosh\theta_1\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}\cosh\theta_2 & -\sinh\theta_2\\ -\sinh\theta_2 & \cosh\theta_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cosh(\theta_1+\theta_2) & -\sinh(\theta_1+\theta_2)\\ -\sinh(\theta_1+\theta_2) & \cosh(\theta_1+\theta_2)\end{pmatrix}$$

上面计算利用了双曲函数和差公式 $\sinh(x\pm y)=\sinh x\cosh y\pm\cosh x\sinh y$，$\cosh(x\pm y)=\cosh x\cosh y\pm\sinh x\sinh y$.

由式(13.11-33)可见用快度表示 Lorentz 变换时，它是单参数子群. 同理可以得到沿 y,z 方向的快度表达式：

$$(\Lambda_y)^\mu_{\cdot\nu}=\begin{pmatrix}\cosh\theta_y & 0 & -\sinh\theta_y & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ -\sinh\theta_y & 0 & \cosh\theta_y & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\quad (\Lambda_z)^\mu_{\cdot\nu}=\begin{pmatrix}\cosh\theta_z & 0 & 0 & -\sinh\theta_z\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ -\sinh\theta_z & 0 & 0 & \cosh\theta_z\end{pmatrix}.$$

当考虑 y 方向快度时，有 $v_x=0=v_z$；令 $\tanh\theta_y=v_y/c$，就有 $\gamma=\cosh\theta_y$；则 $-1<v_y/c<1$ 相当于 $-\infty<\theta_y<+\infty$. 当考虑 z 方向快度时，有 $v_x=0=v_y$；令 $\tanh\theta_z=v_z/c$，就有 $\gamma=\cosh\theta_z$；则 $-1<v_z/c<1$ 相当于 $-\infty<\theta_z<+\infty$.

13.11.4.4 Lorentz 矩阵分解

在狭义相对论发展的初期，学者们就基本解决了 Lorentz 变换矩阵的分解问题；此处的叙述参考了较新的文献[78]附录 G.9，而没有去寻找最原始的证明.

命题 13.104 *如果两个惯性坐标系 X 和 X' 由伪转动 $B(\boldsymbol{v})$ 联系，并且 $R\in SO(3)$，则 $\tilde{X}\equiv RX$ 和 $\tilde{X}'\equiv RX'$ 也由伪转动联系.*

证明. 设 $X'=B(\boldsymbol{v})X$，并且 $B(\boldsymbol{v})$ 是伪转动，则上节证明过程可以看出存在 $R_0\in SO(3)$ 使得 $B(\boldsymbol{v})=R_0B_x(u)R_0^{-1}$，因此 $X'=R_0B_x(u)R_0^{-1}X$，从而 $R_0^{-1}X'=B_x(u)R_0^{-1}X$，与 $\tilde{X}\equiv RX$ 和 $\tilde{X}'\equiv RX'$ 结合就给出 $R_0^{-1}R^{-1}\tilde{X}'=B_x(u)R_0^{-1}R^{-1}\tilde{X}$. 令 $R_1=RR_0$，则 $\tilde{X}'=R_1B_x(u)R_1^{-1}\tilde{X}$. 因此 $\tilde{X}$ 和 $\tilde{X}'$ 也由伪转动联系. ■

命题 13.105 *对于任意伪转动 $B(\boldsymbol{v})$，以及任意 $R\in SO(3)$，都有 $B(R\boldsymbol{v})=RB(\boldsymbol{v})R^{-1}$. 此式左边 $R\boldsymbol{v}$ 的分量是 $(R\boldsymbol{v})^i=R^i_{\cdot j}v^j$，是三维空间矢量. 右边的 R 是四维时空的转动，两者有一一对应关系(13.11-24).*

证明. 设有两个惯性参考系 O 和 O'，在它们中分别建立直角坐标系 $O-xyz$ 和 $O'-x'y'z'$；这两个坐标系符合上一节末尾给出的伪转动定义中的三个条件；O' 系相对于 O 系以常速度 $\boldsymbol{v}$ 运动，$\boldsymbol{v}$ 在 O 系的分量是 $\boldsymbol{v}=v^i\boldsymbol{e}_i$. 由于 O 和 O' 都是惯性系，那就存在联系两个坐标系的伪转动 $B(\boldsymbol{v})$，其表达式是(13.11-29)，即 $X'=B(\boldsymbol{v})X$.

设 R 是纯空间固有转动，再令 $\tilde{X}=RX$，$\tilde{X}'=RX'$；显然 $\tilde{X}$ 和 $\tilde{X}'$ 都是惯性坐标系，那么由命题13.104可知 $\tilde{X}$ 和 $\tilde{X}'$ 也由某个伪转动联系着. 两个惯性系参考系 $\tilde{X}$ 和 $\tilde{X}'$ 的速度差仍旧是 $\boldsymbol{v}$，只不过 $\boldsymbol{v}$ 在 $\tilde{X}$ 坐标系中的分量变成了 $\boldsymbol{v}=\tilde{v}^i\tilde{\boldsymbol{e}}_i=v^i\boldsymbol{e}_i$，其中 $\tilde{\boldsymbol{e}}_i=\boldsymbol{e}_jR^j_{\cdot i}$，$\tilde{v}^i=R^i_{\cdot k}v^k$. 纯空间转动不改变 $\boldsymbol{v}$ 的大小，只改变它的分量值. 联系两个坐标系 $\tilde{X}$ 和 $\tilde{X}'$ 的伪转动是 $B(\tilde{\boldsymbol{v}})$，其表达式仍旧是(13.11-29)，只不过，速度的分量变成了 $\tilde{\boldsymbol{v}}$ 的分量. 读者需注意式(13.11-29)的具体表达式是和速度的分量相关的. 因此有 $\tilde{X}'=B(\tilde{\boldsymbol{v}})\tilde{X}=B(R^i_{\cdot j}v^j)\tilde{X}$. 再与式 $\tilde{X}'=RX'=RB(\boldsymbol{v})X=[RB(\boldsymbol{v})R^{-1}]\tilde{X}$ 相比较，可知定理得证. ■

定理 13.106 对于任意的 $\Lambda\in L_+^{\uparrow}$，存在唯一的伪转动 $B(\boldsymbol{v})$ 以及唯一的纯空间固有转动 R，使得 $\Lambda=B(\boldsymbol{v})R=R'B(\boldsymbol{v})$，具体表达式见证明过程.

证明 . 甲若 Λ 是伪转动，则只需取 $B(\boldsymbol{v})=\Lambda, R=I$ 即可. 唯一性见丙.

乙下面证明 Λ 不是伪转动情形. 已知伪转动 $B(\boldsymbol{v})$ 是对称的，纯空间转动 R 形式是(13.11-24). 把 $B(\boldsymbol{v})$ 和 R 分别记成

$$B(\boldsymbol{v})=\begin{pmatrix} B^0_{\cdot 0} & B^0_{\cdot 1} & B^0_{\cdot 2} & B^0_{\cdot 3}\\ B^1_{\cdot 0} & B^1_{\cdot 1} & B^1_{\cdot 2} & B^1_{\cdot 3}\\ B^2_{\cdot 0} & B^2_{\cdot 1} & B^2_{\cdot 2} & B^2_{\cdot 3}\\ B^3_{\cdot 0} & B^3_{\cdot 1} & B^3_{\cdot 2} & B^3_{\cdot 3}\end{pmatrix},\qquad R=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & R^1_{\cdot 1} & R^1_{\cdot 2} & R^1_{\cdot 3}\\ 0 & R^2_{\cdot 1} & R^2_{\cdot 2} & R^2_{\cdot 3}\\ 0 & R^3_{\cdot 1} & R^3_{\cdot 2} & R^3_{\cdot 3}\end{pmatrix}. \tag{13.11-34}$$

那么 $B(\boldsymbol{v})$ 和 R 相乘的第一列是

$$B(\boldsymbol{v})R=\begin{pmatrix} B^0_{\cdot 0} & \cdots & \cdots & \cdots\\ B^1_{\cdot 0} & \cdots & \cdots & \cdots\\ B^2_{\cdot 0} & \cdots & \cdots & \cdots\\ B^3_{\cdot 0} & \cdots & \cdots & \cdots\end{pmatrix},\ \text{而}\ \Lambda=\begin{pmatrix} \Lambda^0_{\cdot 0} & \Lambda^0_{\cdot 1} & \Lambda^0_{\cdot 2} & \Lambda^0_{\cdot 3}\\ \Lambda^1_{\cdot 0} & \cdots & \cdots & \cdots\\ \Lambda^2_{\cdot 0} & \cdots & \cdots & \cdots\\ \Lambda^3_{\cdot 0} & \cdots & \cdots & \cdots\end{pmatrix}. \tag{13.11-35}$$

本定理中要证明 $\Lambda=B(\boldsymbol{v})R$，根据式(13.11-29)以及上式可以令

$$B^0_{\cdot 0}(\boldsymbol{v})=\gamma=\Lambda^0_{\cdot 0},\quad B^i_{\cdot 0}(\boldsymbol{v})=-\gamma\frac{v^i}{c}=\Lambda^i_{\cdot 0},\ \text{即}\ v^i=-c\frac{\Lambda^i_{\cdot 0}}{\Lambda^0_{\cdot 0}}. \tag{13.11-36}$$

号差 $+2$ 的 Lorentz 度规并不改变 v 纯空间分量正负号，故 $v_i=v^i$（$i=1,2,3$）. 利用(13.11-21)可以证明 $|v|<c$：

$$\sum_{i=1}^3\left(\frac{v^i}{c}\right)^2=\sum_{i=1}^3\left(\frac{\Lambda^i_{\cdot 0}}{\Lambda^0_{\cdot 0}}\right)^2=\frac{1}{(\Lambda^0_{\cdot 0})^2}\sum_{i=1}^3\left(\Lambda^i_{\cdot 0}\right)^2=\frac{1}{1+\sum_j\left(\Lambda^j_{\cdot 0}\right)^2}\sum_{i=1}^3\left(\Lambda^i_{\cdot 0}\right)^2<1.$$

即上面定义的速度是亚光速的. 先求出速度 $\boldsymbol{v}$ 的大小（要参考(13.11-21)）.

$$v^2=\sum_{i=1}^3 v_i^2=\frac{c^2}{(\Lambda^0_{\cdot 0})^2}\sum_{i=1}^3(\Lambda^i_{\cdot 0})^2=\frac{c^2}{(\Lambda^0_{\cdot 0})^2}\left((\Lambda^0_{\cdot 0})^2-1\right)=\frac{c^2}{\gamma^2}\left(\gamma^2-1\right). \tag{13.11-37}$$

有了速度分量，根据式(13.11-29)就可以构造出一伪转动 $B(\boldsymbol{v})$：

$$\begin{aligned} &B^0_{\cdot 0}(\boldsymbol{v})=B^0_{\cdot 0}(-\boldsymbol{v})=\Lambda^0_{\cdot 0},\qquad B^i_{\cdot 0}(\pm\boldsymbol{v})=\pm\Lambda^i_{\cdot 0},\\ &B^i_{\cdot j}(\boldsymbol{v})=B^i_{\cdot j}(-\boldsymbol{v})=\delta^i_j+(\gamma-1)\frac{v_iv_j}{v^2}=\delta^i_j+\frac{\Lambda^i_{\cdot 0}\Lambda^j_{\cdot 0}}{1+\Lambda^0_{\cdot 0}}.\end{aligned} \tag{13.11-38}$$

需要注意 $B^i_{\cdot j}$ 值右端 $\Lambda^j_{\cdot 0}$ 中的 j 是上标. 我们已经构造出一个伪转动(13.11-38), 由于我们要证明 $\Lambda = B(\boldsymbol{v})R$, 只需令 $R = B^{-1}(\boldsymbol{v})\Lambda = B(-\boldsymbol{v})\Lambda$, 把(13.11-38)式代入此式就可以得到

$$R^0_{\cdot 0} = 1, \quad R^i_{\cdot 0} = R^0_{\cdot i} = 0, \quad R^i_{\cdot j} = \Lambda^i_{\cdot j} - \frac{\Lambda^i_{\cdot 0}\Lambda^0_{\cdot j}}{1+\Lambda^0_{\cdot 0}}. \tag{13.11-39}$$

可以验证这个矩阵是正交矩阵, 可见 $R \in SO(3)$. 这步验证十分重要, 必不可少. 验证过程中的矩阵乘法会用到式 (13.11-21), (13.11-22)和(13.11-23).

现在回顾一下证明的大体过程, 按照一定规则先构造出伪转动(13.11-38), 然后求出了一个矩阵(13.11-39), 在验证了(13.11-39)是正交矩阵后, 就证明了任意 Lorentz 矩阵 Λ 都可进行分解 $\Lambda = B(\boldsymbol{v})R$, 分解后的 $B(\boldsymbol{v})$ 与 R 表达式见上.

丙 下面证明分解的唯一性. 设 Λ 另有分解 $\Lambda = B(\boldsymbol{u})\tilde{R}$, 则有 $B(\boldsymbol{u})\tilde{R} = B(\boldsymbol{v})R$, 由此容易得到 $B(\boldsymbol{u}) = B(\boldsymbol{v})R\tilde{R}^{-1}$, 而 $R\tilde{R}^{-1}$ 依旧是纯空间转动. 由式(13.11-35)易得 $B^0_{\cdot 0}(\boldsymbol{u}) = \Lambda^0_{\cdot 0} = B^0_{\cdot 0}(\boldsymbol{v})$, $B^i_{\cdot 0}(\boldsymbol{u}) = \Lambda^i_{\cdot 0} = B^i_{\cdot 0}(\boldsymbol{v})$. 这说明 $\gamma_u = \gamma_v$, $\gamma_u u^i = \gamma_v v^i \Rightarrow u^i = v^i$, 也就是 $B(\boldsymbol{u}) \equiv B(\boldsymbol{v})$, 从而 $\tilde{R} \equiv R$.

$\Lambda = R'B(\boldsymbol{v})$ 的分解证明留给读者当练习. ■

13.11.4.5 Lorentz 代数

正时固有 Lorentz 群 $SO^+(1,3)$ 有六个实参数来描述, 其中固有转动占三个, 伪转动占三个. 我们通过单参数子群来求取其李代数. 在 §15.2.6中, 我们找到了 $SO(3)$ 群的三个单参数子群; 只需将其拓展到四维空间即可. 它们是

$$r_1 = \begin{pmatrix} 0&0&0&0\\ 0&0&0&0\\ 0&0&0&-1\\ 0&0&1&0 \end{pmatrix}, \ r_2 = \begin{pmatrix} 0&0&0&0\\ 0&0&0&1\\ 0&0&0&0\\ 0&-1&0&0 \end{pmatrix}, \ r_3 = \begin{pmatrix} 0&0&0&0\\ 0&0&-1&0\\ 0&1&0&0\\ 0&0&0&0 \end{pmatrix}. \tag{13.11-40}$$

第469页中, 由快度描述的伪转动也是单参数子群. 只需对式(13.11-32)中所有矩阵元求 θ_x 的导数, 并在 $\theta_x = 0$ 取值, 即

$$b_1 = \left.\frac{\mathrm{d}\Lambda_x(\theta_x)}{\mathrm{d}\theta_x}\right|_{\theta_x=0} \quad b_2 = \left.\frac{\mathrm{d}\Lambda_y(\theta_y)}{\mathrm{d}\theta_y}\right|_{\theta_y=0} \quad b_3 = \left.\frac{\mathrm{d}\Lambda_z(\theta_z)}{\mathrm{d}\theta_z}\right|_{\theta_z=0}. \tag{13.11-41}$$

由上式计算出结果，得

$$b_1=\begin{pmatrix}0&-1&0&0\\-1&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},\ b_2=\begin{pmatrix}0&0&-1&0\\0&0&0&0\\-1&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},\ b_3=\begin{pmatrix}0&0&0&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\-1&0&0&0\end{pmatrix}. \tag{13.11-42}$$

通过直接计算，可以得到这些矩阵的对易关系（李积）如下

$$[r_i,r_j]=\sum_k\epsilon_{ijk}r_k,\quad [b_i,r_j]=\sum_k\epsilon_{ijk}b_k,\quad [b_i,b_j]=-\sum_k\epsilon_{ijk}r_k. \tag{13.11-43}$$

其中 $i,j,k=1,2,3$；$\epsilon_{ijk}=\delta^{123}_{ijk}$，定义见式(3.8-12)．式(13.11-40)、(13.11-42)连同对易关系(13.11-43)构成了 $\mathfrak{so}^+(1,3)$ 李代数．

物理学上较喜欢用厄米或反厄米矩阵来表示生成元，即作如下变换

$$J_i=\mathbb{i}r_i,\qquad K_i=\mathbb{i}b_i. \tag{13.11-44}$$

那么对易关系(13.11-43)变成（省略了求和符号）：

$$[J_i,J_j]=\mathbb{i}\epsilon_{ijk}J_k,\quad [J_i,K_j]=\mathbb{i}\epsilon_{ijk}K_k,\quad [K_i,K_j]=-\mathbb{i}\epsilon_{ijk}J_k. \tag{13.11-45}$$

厄米矩阵 J、反厄米矩阵 K（即式(13.11-44)）及其对易关系(13.11-45)是 $\mathfrak{so}^+(1,3)$ 李代数的另外一种常用表示．

若我们定义（$\eta=\mathrm{diag}(-1,1,1,1)$）

$$(\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\mu}{}_{\nu}\equiv\mathbb{i}(\eta^{\mu\sigma}\delta^{\rho}_{\nu}-\eta^{\mu\rho}\delta^{\sigma}_{\nu}). \tag{13.11-46}$$

上式为 Lorentz 代数的整体形式．则有

$$\{\mathcal{J}^{10},\mathcal{J}^{20},\mathcal{J}^{30}\}=\{K_1,K_2,K_3\},\ \{\mathcal{J}^{23},\mathcal{J}^{31},\mathcal{J}^{12}\}=\{J_1,J_2,J_3\}. \tag{13.11-47}$$

那么一般 Lorentz 变换可表示为

$$\Lambda^{\mu}{}_{\nu}=\exp\left(-\frac{\mathbb{i}}{2}\omega_{\rho\sigma}(\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\mu}{}_{\nu}\right). \tag{13.11-48}$$

通过矩阵的指数运算可以得到 $\exp(-\mathbb{i}\alpha J_1)=C_x(\alpha)$（见式(13.10-19)）；与之类似，$J_2,J_3$ 的矩阵指数为式(13.10-17)．同样，$\exp(-\mathbb{i}\theta K_1)=\Lambda_x(\theta)$，即式(13.11-32)；

另外两个的矩阵指数（$\exp(-\mathbb{i}\theta K_2)$、$\exp(-\mathbb{i}\theta K_3)$）自然是 y、z 方向的伪转动. 这些计算略显繁琐，但没有难度；也可借助计算机符号软件完成.

在 §15.2.6中，我们建立了 $\mathfrak{so}(3)$ 李代数矩阵基矢量和微分基矢量间的同构关系；仿照那里的做法，可以建立 Lorentz 李代数 $\mathfrak{so}^+(1,3)$ 矩阵基矢量和微分基矢量间的同构关系 Ψ.

$$\hat{J}_i=\Psi(J_i)=-\frac{\mathbb{i}}{2}\epsilon_{ijk}\left(x^j\frac{\partial}{\partial x^k}-x^k\frac{\partial}{\partial x^j}\right),\ \hat{K}_i=\Psi(K_i)=\mathbb{i}\left(t\frac{\partial}{\partial x^i}+x^i\frac{\partial}{\partial t}\right). \tag{13.11-49}$$

因 $x^0=t=-x_0$，故 $\Psi(K_i)$ 中圆括号内两部分符号相同. 通过直接计算可以验证微分形式的基矢量对易关系与(13.11-45)式完全相同，故它们是同构关系，没有必要严格区分它们.

13.11.5 Poincaré 群

Poincaré（Jules Henri Poincaré，1854–1912，法国数学家）群与欧几里得群大致相同，唯一不同的就是度规；欧氏群是正定度规，庞氏群是闵氏度规（$\eta=\mathrm{diag}(-1,1,1,1)$）. 整个理论物理（除引力外）都受狭义相对论约束，故庞氏群对整个理论物理都是至关重要的.

定义 13.107 Poincaré 群由 $(\mathbb{R}^4_1,\eta)$ 上的所有连续、等距、“线性”变换组成.

我们将庞氏群记为 $\mathcal{P}(1,3)$，可简记成 $\mathcal{P}$. 庞氏对应的坐标变换是

$$x\to x':x'^\mu=\Lambda^\mu_{\cdot\nu}x^\nu+b^\mu,\qquad 0\leqslant\mu\leqslant 3. \tag{13.11-50}$$

用矩阵形式表示为（后面会证明 Λ 是一般 Lorentz 矩阵，$\Lambda^{-1}=\eta\Lambda^T\eta$）

$$\begin{bmatrix}x'\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\Lambda&b\\\mathbf{0}^T&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\1\end{bmatrix}\overset{def}{=}\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}x\\1\end{bmatrix}.\qquad \boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}\Lambda^{-1}&-\Lambda^{-1}b\\\mathbf{0}^T&1\end{bmatrix}. \tag{13.11-51}$$

我们把一个 4 维列矢量末尾增加一行，数值为 1；从而变成了 5 维列矢量. 上式最后定义了矩阵 $\boldsymbol{P}$，并给出了它的逆. 在时空均匀前提下，我们已知平移是等距变换. 在闵氏度规下，要求此变换是等距的，即

$$\big(\eta(x'-y')\big)^T(x'-y')=(x-y)^T\Lambda^T\eta\Lambda(x-y)=(x-y)^T\eta(x-y)$$
$$\Rightarrow\Lambda^T\eta\Lambda=\eta.\qquad \text{因}x,y\text{的任意性}$$

可见只要变换 Λ 是 Lorentz 矩阵（见(13.10-21)）就可等距，也就是 Λ 是 $O(1,3)$ 群中的元素．这便说明了庞氏群由两种类型的变换组成：平移和 Lorentz 变换．

这就是说等距群 $I(\mathbb{R}^4_1,\eta)$ 是 $\mathcal{P}$．它的维数是：

$$\dim\big(I(\mathbb{R}^4_1)\big)=\dim\hat{T}(4)+\dim O(1,3)=10. \tag{13.11-52}$$

我们把 $\mathcal{P}$ 的群乘法定义为复合映射，连续两次庞氏变换为

$$\begin{bmatrix}\Lambda_1 & b_1\\ \mathbf{0}^T & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Lambda_2 & b_2\\ \mathbf{0}^T & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\Lambda_1\Lambda_2x+\Lambda_1b_2+b_1\\ 1\end{bmatrix}. \tag{13.11-53}$$

很明显，两次庞氏变换是不对易的．与欧几里得群几乎完全相同，可以验证平移群 $\hat{T}(4)$ 是 $\mathcal{P}$ 的不变子群，即 $\forall u\in\mathcal{P}$，$\forall t\in\hat{T}(4)$ 有

$$u^{-1}tux=\begin{bmatrix}\Lambda^{-1} & -\Lambda^{-1}b\\ \mathbf{0}^T & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Lambda x+b+t\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x+\Lambda^{-1}t\\ 1\end{bmatrix}. \tag{13.11-54}$$

因为 $\mathcal{P}$ 有可对易不变子群 $\hat{T}(4)$，所以它不是半单纯的．因平移群和 Lorentz 群是非紧致的，故 $\mathcal{P}$ 也是非紧致李群．

与欧几里得群相似，可知：$\mathcal{P}=\hat{T}(4)\rtimes O(1,3)$．依照半直积定义可以把 $\mathcal{P}$ 中元素记为 (b,Λ)，其中 $b\in\hat{T}(4)$，$\Lambda\in O(1,3)$．我们从定义角度再次叙述一遍这个半直积．可定义平移群 $\hat{T}(4)$ 的自同构映射为：$\Psi_{\Lambda_1}(b_2)=\Lambda_1b_2=\hat{T}(4)_{\Lambda_1b_2}$，其中 $\Lambda_1\in O(1,3)$，$b_2\in\hat{T}(4)$．那么连续两次庞氏变换可以表示为：

$$(b_1,\Lambda_1)(b_2,\Lambda_2)=\big(b_1\Psi_{\Lambda_1}(b_2),\ \Lambda_1\Lambda_2\big)=(b_1+\Lambda_1b_2,\ \Lambda_1\Lambda_2). \tag{13.11-55}$$

这与上面用矩阵表示的连续两次庞氏变换(13.11-53)完全相同．

仿照命题13.103可以证明：Poincaré 群可以分解成

$$\mathcal{P}(a,\Lambda)=\hat{T}(4)_a\Lambda. \tag{13.11-56}$$

其中 $\hat{T}(4)_a$ 是四维平移，Λ 是一般 Lorentz 变换．

例 13.108 仿照欧氏群和庞氏群的分析过程，可以看出平直流形 $\mathbb{R}^m_\nu$ 的等距群 $I(\mathbb{R}^m_\nu)$ 是 $\hat{T}(m)\rtimes O(\nu,m-\nu)$．故 $\dim\big(I(\mathbb{R}^m_\nu)\big)=m(m+1)/2$． ■

13.11.5.1 Poincaré 代数 I

Poincaré 代数包括四个平移（(13.11-7)）和六个 Lorentz 变换（(13.11-49)）.

$$\hat{H} \equiv +\hat{P}^0 = -\hat{P}_0 = \mathbb{i}\frac{\partial}{\partial x^0} = \mathbb{i}\frac{\partial}{\partial t}, \quad \hat{P}_i = -\mathbb{i}\frac{\partial}{\partial x^i}, \tag{13.11-57a}$$

$$\hat{J}_i = -\frac{\mathbb{i}}{2}\epsilon_{ijk}\left(x^j\frac{\partial}{\partial x^k} - x^k\frac{\partial}{\partial x^j}\right), \quad \hat{K}_i = \mathbb{i}\left(t\frac{\partial}{\partial x^i} + x^i\frac{\partial}{\partial t}\right). \tag{13.11-57b}$$

通过偏导数直接计算可以得到它们的对易关系（$i,j,k=1,2,3$，$\epsilon_{123}=1$）：

$$\left[\hat{J}_i, \hat{J}_j\right] = \mathbb{i}\sum_{k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\hat{J}_k. \tag{13.11-58a}$$

$$\left[\hat{J}_i, \hat{K}_j\right] = \mathbb{i}\sum_{k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\hat{K}_k. \tag{13.11-58b}$$

$$\left[\hat{K}_i, \hat{K}_j\right] = -\mathbb{i}\sum_{k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\hat{J}_k. \tag{13.11-58c}$$

$$\left[\hat{H}, \hat{P}_i\right] = \left[\hat{H}, \hat{J}_i\right] = \left[\hat{H}, \hat{H}\right] = \left[\hat{P}_i, \hat{P}_j\right] = 0. \tag{13.11-58d}$$

$$\left[\hat{H}, \hat{K}_i\right] = -\mathbb{i}\hat{P}_i. \tag{13.11-58e}$$

$$\left[\hat{P}_i, \hat{K}_j\right] = -\mathbb{i}\delta_{ij}\hat{H}. \tag{13.11-58f}$$

$$\left[\hat{P}_i, \hat{J}_j\right] = \mathbb{i}\sum_{k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\hat{P}_k. \tag{13.11-58g}$$

很明显，Lorentz 代数部分没有任何变化．Poincaré 代数基矢量除了微分形式外，还有取其同构的矩阵形式，从 Lorentz 代数及式(13.11-51)可知：

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&-\mathbb{i}&0\\ 0&0&\mathbb{i}&0&0\\ 0&0&0&0&0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&\mathbb{i}&0\\ 0&0&0&0&0\\ 0&-\mathbb{i}&0&0&0\\ 0&0&0&0&0 \end{pmatrix}, \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0&0&0&0&0\\ 0&0&-\mathbb{i}&0&0\\ 0&\mathbb{i}&0&0&0\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0 \end{pmatrix}. \tag{13.11-59}$$

$$K_1 = \begin{pmatrix} 0&-\mathbb{i}&0&0&0\\ -\mathbb{i}&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0 \end{pmatrix}, \quad K_2 = \begin{pmatrix} 0&0&-\mathbb{i}&0&0\\ 0&0&0&0&0\\ -\mathbb{i}&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0 \end{pmatrix}, \quad K_3 = \begin{pmatrix} 0&0&0&-\mathbb{i}&0\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0\\ -\mathbb{i}&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0 \end{pmatrix}.$$

$$H = P^0 = \begin{pmatrix} 0&0&0&0&+\mathbb{i}\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0 \end{pmatrix}, \ P_1 = \begin{pmatrix} 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&-\mathbb{i}\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0 \end{pmatrix}, \ P_2 = \begin{pmatrix} 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&-\mathbb{i}\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0 \end{pmatrix}, \ P_3 = \begin{pmatrix} 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&-\mathbb{i}\\ 0&0&0&0&0 \end{pmatrix}.$$

通过矩阵乘法可验证上述矩阵的对易关系与式(13.11-58)完全相同.

需注意：我们将 H 取为 P^0，而 $P^0 = -P_0$；但 $P^i = P_i$（$i=1,2,3$）.

读者可以试着计算矩阵指数：$\exp(\mathbb{i}tH)$、$\exp(-\mathbb{i}xP_1)$、$\exp(-\mathbb{i}\alpha J_1)$、$\exp(-\mathbb{i}\theta K_1)$ 等等，它们是式(13.11-51)、绕 x 轴转动和沿 x 轴的伪转动，等等.

13.11.6 Galilei 群

考虑 $GL(5,\mathbb{R})$ 的一个闭子群 G，它作用在 $\mathbb{R}^5$ 上齐次坐标的具体表达为

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}'\\ t'\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}R & \boldsymbol{v} & \boldsymbol{b}\\ 0 & 1 & \tau\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ t\\ 1\end{bmatrix}\overset{def}{=}\boldsymbol{G}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ t\\ 1\end{bmatrix}. \tag{13.11-60}$$

其中 $R\in SO(3)$；$\boldsymbol{v},\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^3$，$\boldsymbol{v}$ 表示速度，$\boldsymbol{b}$ 表示纯空间平移；$\tau\in\mathbb{R}$，表示绝对牛顿时间平移．这个群称为 **Galilei 群**．上式也可以写成

$$(\boldsymbol{x}',t')=(R\boldsymbol{x}+t\boldsymbol{v}+\boldsymbol{b},\ t+\tau). \tag{13.11-61}$$

验证 Galilei 变换构成群的工作留给读者．我们将通过 Inönü–Wigner 收缩的方式给出 Galilei 代数．狭义相对论的低速极限便是牛顿力学，那么 Poincaré 代数的低速极限（相当于光速 $c\to\infty$）就应该是 Galilei 代数．为此，我们需要恢复 Poincaré 代数中的光速 c，即

$$\hat{H}^G=c\hat{H}^P=c\mathbb{i}\frac{\partial}{\partial ct}=\mathbb{i}\frac{\partial}{\partial t},\quad \hat{K}_i^G=\frac{\hat{K}_i^P}{c}=\mathbb{i}\left(t\frac{\partial}{\partial x^i}+\frac{x^i}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\right). \tag{13.11-62}$$

其它算符并不改变．Poincaré 代数(13.11-58)变为

$$\left[\hat{J}_i,\hat{J}_j\right]=\mathbb{i}\epsilon_{ijk}\hat{J}_k. \tag{13.11-63a}$$

$$\left[\hat{J}_i,\hat{K}_j^G\right]=\mathbb{i}\epsilon_{ijk}\hat{K}_k^G. \tag{13.11-63b}$$

$$\left[\hat{K}_i^G,\hat{K}_j^G\right]=-\frac{1}{c^2}\mathbb{i}\epsilon_{ijk}\hat{J}_k\xrightarrow{c\to\infty}0. \tag{13.11-63c}$$

$$\left[\hat{H}^G,\hat{P}_i\right]=\left[\hat{H}^G,\hat{J}_i\right]=\left[\hat{H}^G,\hat{H}^G\right]=\left[\hat{P}_i,\hat{P}_j\right]=0. \tag{13.11-63d}$$

$$\left[\hat{H}^G,\hat{K}_i^G\right]=-\mathbb{i}\hat{P}_i. \tag{13.11-63e}$$

$$\left[\hat{P}_i,\hat{K}_j^G\right]=-\frac{1}{c^2}\mathbb{i}\delta_{ij}\hat{H}^G\xrightarrow{c\to\infty}0. \tag{13.11-63f}$$

$$\left[\hat{P}_i,\hat{J}_j\right]=\mathbb{i}\epsilon_{ijk}\hat{P}_k. \tag{13.11-63g}$$

当光速 $c\to\infty$ 时，上式便是 Galilei 代数．上式中，所有算符都应标记上标“G”；但对易关系发生变化的只有两个．

在李群、李代数理论中，群收缩（李代数收缩）是一个较为小众的课题，文献[18]第十章对此作了非常全面的总结．若读者有兴趣可仔细研读．

进一步阅读建议：我们可以使用群论描述各种运动，可参见[38]．

13.11.6.1 保 Galilei 变换不变的退型

我们仿照 §13.10.4开头的计算方式来寻找保 Galilei 变换不变的度规是什么. 忽略平移，将式(13.11-60)改成 4×4 的矩阵

$$\begin{bmatrix} t' \\ \boldsymbol{x}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \boldsymbol{v} & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ \boldsymbol{x} \end{bmatrix} \overset{def}{=} \boldsymbol{A} \begin{bmatrix} t \\ \boldsymbol{x} \end{bmatrix}. \tag{13.11-64}$$

假设保 Galilei 变换不变的度规为 $g_{\mu\nu}$（4×4 矩阵），则有

$$A^T g A = g \quad \Leftrightarrow \quad A^\mu{}_\rho g_{\mu\nu} A^\nu{}_\sigma = g_{\rho\sigma}. \tag{13.11-65}$$

将上式展开，有

$$g_{00} = v^j g_{jk} v^k + g_{0k} v^k + v^j g_{0j} + g_{00}, \tag{13.11-66}$$

$$g_{0i} = R^j{}_i g_{jk} v^k + R^j{}_i g_{0j}, \tag{13.11-67}$$

$$g_{il} = R^j{}_i g_{jk} R^k{}_l. \tag{13.11-68}$$

其中 $R^j{}_i$ 是 3×3 的实正交矩阵，即 $R^j{}_i R^j{}_k = \delta_{ik}$. Galilei 度量 $g_{\mu\nu}$ 的矩阵元不应依赖于 $R^j{}_i$ 以及速度 v^k. 首先，由式(13.11-68)可见 g_{ij} 与 $R^j{}_i$ 对易；因 $R^j{}_i$ 非常任意，故 g_{ij} 只能是单位矩阵的常数倍或者零矩阵. 其次，我们将 g_{ij} 的单位矩阵解代入式(13.11-67)后可见：g_{0i} 必然依赖于速度 v^k 以及转动 $R^j{}_i$，这是不允许的；所以 g_{ij} 没有单位矩阵解，它只能是零矩阵. 知道 g_{ij} 是零矩阵后，我们将其再次代入式(13.11-67)，可以看到 g_{0i} 依然依赖于转动 $R^j{}_i$，故必有 $g_{0i}=0$. 最后，由式(13.11-66)可知 g_{00} 可取任意值，一般我们取之为：$g_{00}=1$.

由此可见，保 Galilei 变换不变的度规 $g_{\mu\nu}$ 必然是退化的，除 $g_{00}=1$ 外，其余矩阵元都是零. 它是与时间相关的度规.

我们再看看 $g^{\mu\nu}$ 的情形. 此时需满足

$$A g^{-1} A^T = g^{-1} \quad \Leftrightarrow \quad A^\mu{}_\rho g^{\rho\sigma} A^\nu{}_\sigma = g^{\mu\nu}. \tag{13.11-69}$$

将上式展开，有

$$g^{ij} = v^i v^j g^{00} + v^i R^j{}_k g^{0k} + v^j R^i{}_k g^{0k} + R^i{}_k g^{kl} R^j{}_l, \tag{13.11-70}$$

$$g^{0j} = v^j g^{00} + R^j{}_k g^{0k}. \tag{13.11-71}$$

为了不让度规 $g^{\mu\nu}$ 依赖于速度 v^i 和转动 $R^j{}_k$，由式(13.11-71)可见必须令 $g^{0j}=0=g^{00}$．将这个解代入式(13.11-70)可得 $g^{ij}=\delta^{ij}$（即单位矩阵）．

由此可见，保 Galilei 变换不变的度规 $g^{\mu\nu}$ 必然是退化的，除 $g^{11}=g^{22}=g^{33}=1$ 外，其余矩阵元都是零．它是与空间相关的度规．

因度规退化（之后称它们为退型，见 §11.1），我们将保 Galilei 变换不变的 $g_{\mu\nu}$、$g^{\mu\nu}$ 分别记为 $\tau_{\mu\nu}$（与时间相关）、$h^{\mu\nu}$（与空间相关），它们的显式表述为：

$$\tau_{\mu\nu}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},\qquad h^{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}.\tag{13.11-72}$$

13.12 紧致李群的不变积分

设李群 G 维数是 m；$\omega_1,\cdots,\omega_m$ 是它的 MC 场的基矢，显然 $\forall x\in G$ 有

$$L_x^*(\omega_1\wedge\cdots\wedge\omega_m)|_x=\omega_1\wedge\cdots\wedge\omega_m|_e\neq 0.\tag{13.12-1}$$

上式中的 $\omega_1\wedge\cdots\wedge\omega_m$ 称为李群 G 的左不变体积元；进而如果在任意右移动 R_x 作用下 $\omega_1\wedge\cdots\wedge\omega_m$ 也是不变的，那么称之为李群 G 的**双不变体积元**．可以证明紧致连通李群上必存在双不变体积元（见[91]p. 288定理 4.1.4）．

有了双不变体积元概念，可仿照 §5.7中式(5.7-9)引入紧致李群 G 上**不变积分**的概念；$\forall f\in C^0(G)$ 以及 G 上任意单位分解 $\{h_\alpha\}$ 定义其积分为

$$\int_G f\cdot\omega_1\wedge\cdots\wedge\omega_m\overset{def}{=}\int_G\sum_\alpha h_\alpha f\cdot\omega_1\wedge\cdots\wedge\omega_m=\int_G f(g)\mathrm{d}g.\tag{13.12-2}$$

李群既是流形又是群，有时也将李群 G 上不变积分改用群元形式表示，即上式中最后一个等号的形式，其中 $\mathrm{d}g$ 表示体积元．

若双不变体积元 $\Omega=\lambda\cdot\omega_1\wedge\cdots\wedge\omega_m$，$(0\neq\lambda\in\mathbb{R})$ 积分满足 $\int_G\Omega$=1，则称此双不变体积元 Ω 是连通紧致李群 G 的 **Haar 测度**．以后谈及紧致李群上的积分时都是在 Haar 测度上讨论，并将其简记为 Ω．

如果李群是非紧致的，那么情况要糟糕一些；非紧群的左不变体积元可能不等于右不变体积元（例如参见[39]§6.1），此时不好定义 Haar 测度．

可证明（见[91]p.289定理 4.1.6）m 维连通紧致李群 G 上积分有如下性质：

$$\int_G (f+\lambda h)\Omega = \int_G f\Omega + \lambda \int_G h\Omega, \qquad \forall \lambda \in \mathbb{R},\ \forall f,h \in C^0(G). \tag{13.12-3}$$

$$\int_G f(g'g)\Omega(g) = \int_G f(gg')\Omega(g) = (-)^m \int_G f(g^{-1})\Omega(g) = \int_G f(g)\Omega(g). \tag{13.12-4}$$

第一式表明积分是线性的，证明很容易．式(13.12-4)中 $g' \in G$ 是任意但固定的，证明有些麻烦；由此式可以看到不变积分中的“不变”的含义．

下面给出几个具体的例子．

例 13.109 设 G 是有限群（可以看作连续拓扑群）；因它只包含有限个元素，故必然紧致；可以定义其积分如下：

$$I(f) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f(g), \qquad \forall f \in C^0(G),\ |G|\text{是指}G\text{的元素个数}. \tag{13.12-5}$$

例 13.110 幺模复数群 $G = S^1 = \{\exp \mathbb{i}\theta \mid 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi\}$ 上的不变积分：

$$\int_G f\Omega = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(e^{\mathbb{i}\theta})\mathrm{d}\theta. \tag{13.12-6}$$

容易验证：双不变性；若 $f \equiv 1$ 则积分为 1；线性性．

定理 13.111 （Weyl 定理）设有一般线性群 $GL(m,V)$，G 是 $GL(m,V)$ 中连通、紧致李子群．那么在线性空间 V 上存在 G-**不变标量积** (x,y)，即

$$\big(h(x),h(y)\big) = (x,y); \qquad \forall h \in G, \quad \forall x,y \in V. \tag{13.12-7}$$

证明 . 记 Ω 是紧致李群 G 的 Haar 测度．在 V 上取标量积 $\langle x,y\rangle$，用抽象指标表示就是 $\langle x,y\rangle = g_{ab}x^a y^b$；也就是我们需要预先给 V 指定一个度规；通常情况下，在实数域上我们取正定度规，在复数域上取正定的酉度规（见定义12.6）．令

$$(x,y) \overset{def}{=} \int_G \langle g(x), g(y)\rangle\, \Omega(g), \qquad \forall x,y \in V. \tag{13.12-8}$$

因 $g \in G \subset GL(V)$，故 g 本身是 V 上的线性变换；$g(x)$ 自然还是 V 中的矢量．这样定义的 (x,y) 显然是个标量积．$\forall h \in G$，有

$$\begin{aligned}\big(h(x),h(y)\big) &= \int_G \big\langle g\big(h(x)\big), g\big(h(y)\big)\big\rangle\, \Omega(g) = \int_G \langle g'(x), g'(y)\rangle\, \Omega(g'h^{-1}) \\ &\overset{\substack{\Omega(g)\text{是双}\\ \text{不变体积元}}}{=\!=\!=} \int_G \langle g'(x), g'(y)\rangle\, \Omega(g') = (x,y).\end{aligned}$$

因此，由式(13.12-8)定义标量积是 G-不变标量积． ■

定理 13.112 设有 m 维复线性空间 V，且度规选为酉内积12.6；以及其上的复一般线性群 $GL(V)$，G 是 $GL(V)$ 中连通、紧致李子群．那么在 V 上存在一组基使得 G 的表示矩阵都是幺正矩阵，即为幺正群 $U(m)$ 的紧致连通子群．

证明 ．幺正群概念见 §13.10.4.4．在 V 上取正交归一基矢量 $\{e_i\}$，度规正定：$\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$．故 $\forall x = \sum_i x_i e_i$，$y = \sum_j y_j e_j$ 有 $\langle x, y\rangle = \sum_{k=1}^{m} \bar{x}_k y_k$．$\forall g \in G$ 有 $g(e_i) = \sum_k C_{ik} e_k$，$1 \leqslant i \leqslant m$．由 Weyl 定理（见(13.12-7)和(13.12-8)）可知 $\big(g(x), g(y)\big) = (x, y)$；由此容易得到 $\bar{C} C^T = I$，其中 C 是 g 的表示方阵．这便证明了在正交归一基矢量下紧致连通李子群 G 的表示方阵构成幺正群 $U(m)$ 的紧致连通李子群．

若把定理中的“复”改成“实”，则酉积退化到欧氏内积，最终 G 的表示矩阵 C 满足 $CC^T = I$，即 C 实正交矩阵． ■

定理13.112说明：存在基矢变换，令紧致、线性李群的任意表示等价于幺正表示．故对于紧致李群来说，我们可以只讨论幺正表示，而不会失去一般性．

13.13 黎曼群

本节内容参考了[45]第 11 章双不变度规小节，以及[1]第二章．

李群 G 既是群又是微分流形，作为微分流形，我们可以给其指定广义黎曼度规场 g，即 g 的惯性指数可正可负．对于 G 上的任意两个切矢量场 X, Y，（为了避免与群元 g 混淆）将它们的标量积记为 $\langle X, Y\rangle$；若用抽象指标表示就是 $\langle X, Y\rangle \equiv g_{ab} X^a Y^b$．

定义 13.113 设 m 维李群 G 上有（广义）黎曼度规场 $\langle \cdot, \cdot \rangle$．

$$\langle X, Y\rangle_g = \langle (L_{a*})_g X,\ (L_{a*})_g Y\rangle_{ag};\quad L_a \text{ 是左移动},\quad \forall a, g \in G,\quad \forall X, Y \in T_g G.$$
$$\langle X, Y\rangle_g = \langle (R_{b*})_g X,\ (R_{b*})_g Y\rangle_{gb};\quad R_b \text{ 是右移动},\quad \forall b, g \in G,\quad \forall X, Y \in T_g G.$$

若它只满足上式中的第一条，则称 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 G 上的**左不变（广义）黎曼度规**；若它只满足上式中的第二条，则称 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 G 上的**右不变（广义）黎曼度规**．若同时满足两条，则称 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 G 上的**双不变（广义）黎曼度规**，同时称 G 为**（广义）黎曼群**．

容易看出，双不变黎曼度规本意是指：左右移动是等距同胚.

可以证明紧致李群上一定存在双不变黎曼度规场（见[1]§2.2命题 2.24）.

其实，李群 G 上的双不变度规场等同于 G 的李代数 $\mathfrak{g}$ 上的标量积，或者切空间 T_eG 上的标量积；读者应能记起李代数 $\mathfrak{g}$ 中的元素同构于单位元 e 处切空间 T_eG 中的元素. 若 $\langle\cdot,\cdot\rangle_e$ 是 T_eG 上的标量积，那么

$$\langle X,Y\rangle_a \overset{def}{=} \langle L_{a^{-1}*}X,\, L_{a^{-1}*}Y\rangle_e\,,\quad \forall X,Y\in T_aG. \tag{13.13-1}$$

便是一个左不变度规场，由此可知李群 G 上一定存在左不变度规场.

13.13.1 左不变

本小节假定李群 G 上有左不变度规场，且李群上的左不变仿射联络（见§13.4.5）是无挠、与度规相容的；笔者参考文献[40]给出下述结果.

设有李群 G 上的左不变切标架 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m\}$，$X$、$Y$、$Z$ 是这些基矢场的常系数线性组合，故它们也是左不变的. 李代数 $\mathscr{G}$ 中的任意两个左不变矢量的标量积都是常数，故由例8.7中的 Koszul 公式可得一个简化版的 Koszul 公式：

$$2\langle\nabla_X Y,Z\rangle=\langle Y,[Z,X]\rangle+\langle Z,[X,Y]\rangle-\langle X,[Y,Z]\rangle\,. \tag{13.13-2}$$

令 $X=\boldsymbol{e}_i$、$Y=\boldsymbol{e}_j$、$Z=\boldsymbol{e}_k$，由式(13.13-2)得（注 $g_{kl}=\langle\boldsymbol{e}_k,\boldsymbol{e}_l\rangle$ 为常数方阵）

$$\Gamma^n_{ji}=\frac{1}{2}\left(C^n_{ij}+C^l_{ki}g_{jl}g^{nk}+C^l_{kj}g_{il}g^{nk}\right). \tag{13.13-3}$$

借用式(6.3-22)，可得标架场 $\{\boldsymbol{e}_i,\cdots,\boldsymbol{e}_m\}$ 上的黎曼曲率分量公式：

$$R^n{}_{kij}=\boldsymbol{e}_i(\Gamma^n_{kj})-\boldsymbol{e}_j(\Gamma^n_{ki})+\Gamma^l_{kj}\Gamma^n_{li}-\Gamma^l_{ki}\Gamma^n_{lj}-\left\langle\boldsymbol{e}^{*l},\,[\boldsymbol{e}_i,\boldsymbol{e}_j]\right\rangle\Gamma^n_{kl} \tag{6.3-22}$$

$$\overset{\Gamma^k_{ij}\text{为常数}}{=\!=\!=}\Gamma^l_{kj}\Gamma^n_{li}-\Gamma^l_{ki}\Gamma^n_{lj}-C^l_{ij}\Gamma^n_{kl}. \tag{13.13-4}$$

虽然在李群 G 上，曲率的每个分量都是常数（每个 $R^n{}_{kij}$ 是常数），但是不同分量之间未必相等，故一般情形下此曲率不是常曲率. 有了式(13.13-3)和(13.13-4)，便可编写符号演算程序来计算曲率了.

13.13.2 双不变

定理 13.114 连通李群 G 上有左不变度规场 $\langle\cdot,\cdot\rangle$，则下面各条陈述相互等价.

(1) $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 同时还是右不变的，因此它是双不变的；

(2) $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 $\mathrm{Ad}(G)$ 不变的；

(3) 逆映射 $I^h(x)\equiv hx^{-1}h$ 是 G 上等距变换，固定的 $h\in G$，$\forall x\in G$；

(4) $\langle X,[Y,Z]\rangle=\langle[X,Y],Z\rangle$ 对任意的 $X,Y,Z\in\mathfrak{g}$ 成立；

(5) $\nabla_X Y=\frac{1}{2}[X,Y]$ 对任意的 $X,Y\in\mathfrak{g}$ 成立；

(6) $\nabla_X X=0$ 对任意的 $X\in\mathfrak{g}$ 成立；

(7) 初始点是单位元 $e\in G$ 的测地线 $\alpha(t)$ 是 G 的单参数子群.

证明 . 整个证明过程中需注意：因李群 G 的李代数 $\mathfrak{g}$ 是左不变切矢量场，故左移动在 $\mathfrak{g}$ 上的切映射为 $L_{a*}X=X,\ \forall X\in\mathfrak{g},\ \forall a\in G$；同时左移动切映射也是等距映射. 第 (1) 条是在说 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是双不变的.

(1) ⇔ (2). 先证“(1)⇒(2)”. $\forall X,Y\in T_eG$ 有

$$\begin{aligned}\langle\mathrm{Ad}_gX,\mathrm{Ad}_gY\rangle_g&=\big\langle(L_{g*})_{g^{-1}}\circ\big((R_{g^{-1}*})_eX\big),\quad(L_{g*})_{g^{-1}}\circ\big((R_{g^{-1}*})_eY\big)\big\rangle\\&=\langle(R_{g^{-1}*})_eX,\ (R_{g^{-1}*})_eY\rangle=\langle X,Y\rangle_e\,.\end{aligned}$$

这便证明了 $\langle X,Y\rangle$ 是 $\mathrm{Ad}(G)$ 不变的.

反之. 因左移动切映射是不变的，故我们只需证明右移动的不变性即可.

$$\begin{aligned}\langle X,Y\rangle_e=\langle\mathrm{Ad}_gX,\mathrm{Ad}_gY\rangle_g&=\big\langle(L_{g*})_{g^{-1}}\circ\big((R_{g^{-1}*})_eX\big),\ (L_{g*})_{g^{-1}}\circ\big((R_{g^{-1}*})_eY\big)\big\rangle\\&=\langle(R_{g^{-1}*})_eX,\ (R_{g^{-1}*})_eY\rangle\,.\end{aligned}$$

因 $g\in G$ 的任意性，由上式可说明度规场 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 也是右不变的；故是双不变的.

(1) ⇔ (3). 先证“(1)⇒(3)”. 因 $I^e(g)=g^{-1}$；对于任意单参数子群 $\alpha(t)$，$I^e\big(\alpha(t)\big)=\big(\alpha(t)\big)^{-1}=\alpha(-t)$；由此可知它的切映射是：$(I^e)_{*e}=-\mathrm{id}$；因此可知 I^e 是切空间 T_eG 上的（局部）等距映射. 由 $I^h(x)$ 的定义可知 $(I^e)_{*g}=(R_{g^{-1}*})_e\circ(I^e)_{*e}\circ(L_{g^{-1}*})_g$；因左右移动是等距的（度规场是双不变的），容易看出映射 $(I^e)_{*g}:T_gG\to T_{g^{-1}}G$ 同样是等距的. 因此可以得到 I^e 是等距映射. 很明显，I^e 会令通过单位元 $e\in G$ 的单参数子群反向（即参数 $t\to-t$）；而 $I^g=L_gI^eR_g$，故 I^g 同样会令通过 g 的单参数子群反向，并且 I^g 是等距的；用公式来表示便是：单参数子群积分曲线 $\gamma(t)$ 满足 $\gamma(0)=g$，$I^g\big(\gamma(t)\big)=\gamma(-t)$.

再证“(3)⇒(1)”. 我们已知度规场是左移动不变的. 容易看出 $R_g = I^g \circ L_{g^{-1}} \circ I^g$，因左移动和 I^g 都是等距，故右移动也是等距的；因此可知度规场是双不变的.

(2) ⇔ (4). 先证“(2)⇒(4)”. $\forall X,Y,Z \in \mathfrak{g}$ 有 $\left\langle \mathrm{Ad}_{\exp(tX)}Y, \mathrm{Ad}_{\exp(tX)}Z \right\rangle = \langle Y,Z\rangle$；对此式两边求单参数 t 的导数，并令 $t \to 0$，再参考式(13.9-11)可得（注意 $\langle Y,Z\rangle$ 是常数）：$0 = \langle \mathrm{ad}_X Y, Z\rangle + \langle Y, \mathrm{ad}_X Z\rangle = \langle [X,Y],Z\rangle + \langle Y,[X,Z]\rangle$. 将上式中 $X \leftrightarrow Y$ 对换可得 (4).

再证“(4)⇒(2)”. 略麻烦，可参见[45]第 11 章引理 3.

(4) ⇔ (5). 若 (4) 成立，将 (4) 中的 Y、Z 互换得 $\langle X,[Z,Y]\rangle = \langle [X,Z],Y\rangle$；则式(13.13-2)中的第一项、第三项相消，便可得到 (5).

反之，若 (5) 成立，经过轮换可得（注意 $\langle X,Z\rangle$ 等都是常数）

$$\langle X,[Y,Z]\rangle = 2\langle X,\nabla_Y Z\rangle = -2\langle \nabla_Y X, Z\rangle = -\langle [Y,X],Z\rangle = \langle [X,Y],Z\rangle .$$

(5) ⇔ (6). (5) ⇒ (6) 是显然的，现证明 (6) ⇒ (5). $\forall Z \in \mathfrak{g}$ 可以将其表示成 $Z = X + Y$，其中 $X \in \mathfrak{g}$ 也是任意的；并且有 $\nabla_X X = \nabla_Y Y = \nabla_Z Z = 0$. 则有

$$0 = \nabla_Z Z = \nabla_{X+Y}(X+Y) = \nabla_X X + \nabla_X Y + \nabla_Y X + \nabla_Y Y = \nabla_X Y + \nabla_Y X.$$

由上式和式(6.1-29)（$[X,Y] = \nabla_X Y - \nabla_Y X$）可知 (5) 是正确的.

(6) ⇔ (7). 先证 (6) ⇒ (7). 设 $\alpha(t)$ 是由 X 诱导的单参数子群，即 $\alpha'(t) = X$, $\forall t$. 因此 (6)（$\nabla_{\alpha'}\alpha' = 0$）意味着 $\alpha(t)$ 是测地线；这便证明了 (7) 成立.

反之. 若 α 是过单位元的测地线，则必有 $(\nabla_X X)|_\alpha = 0$，注意此式仅在曲线 $\alpha(t)$ 上成立，需要证明它还在整个流形上成立. 因左移动是等距映射，在左移动作用下 ∇ 保持不变（见定理8.29），故 $\nabla_X X = 0$ 在流形 G 上成立. ■

由定理13.114中的 (6) 和 (7) 立刻可得：

推论 13.115 当李群上存在双不变度规场时，李群的指数映射与黎曼几何中借用测地线定义的指数映射（见 §9.2.1）完全相同.

定理 13.116 设有广义黎曼群 G，其李代数是 $\mathfrak{g}$；其黎曼曲率及截面曲率是：

(1) $R(X,Y)Z = -\frac{1}{4}\big[[X,Y],Z\big]$；$\forall X,Y,Z \in \mathfrak{g}$.

(2) 如果 $\mathfrak{g}$ 中矢量 X、Y 张成非退化的二维平面，则

$$K(X,Y) = +\frac{1}{4}\frac{\langle [X,Y],\ [X,Y]\rangle}{\langle X,X\rangle\langle Y,Y\rangle - \langle X,Y\rangle^2}. \tag{13.13-5}$$

证明 . (1) 由定理13.114中的 (5) 可知

$$\begin{aligned} R(X,Y)Z =& \nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]}Z \\ =& \frac{1}{4}\big[X,[Y,Z]\big] - \frac{1}{4}\big[Y,[X,Z]\big] - \frac{1}{2}\big[[X,Y],Z\big] \\ \overset{4.58(3)}{=\!=\!=} & -\frac{1}{4}\big[Z,[X,Y]\big] - \frac{1}{2}\big[[X,Y],Z\big] = -\frac{1}{4}\big[[X,Y],Z\big]. \end{aligned}$$

(2) 由截面曲率公式(8.9-5)、定理13.114中的 (4) 和本定理的 (1) 可知

$$K(X,Y) = \frac{\langle R(X,Y)Y,X\rangle}{\langle X,X\rangle\langle Y,Y\rangle - \langle X,Y\rangle^2} = \frac{1}{4}\frac{\langle [X,Y],\ [X,Y]\rangle}{\langle X,X\rangle\langle Y,Y\rangle - \langle X,Y\rangle^2}.$$

这里 $K(X,Y)$ 是一个纯数. ■

13.14 李变换群

S. Lie 最早研究的连续群就是今天称为李变换群（Lie transformation group）的内容. 在物理和几何中，空间或对象的对称性表明它们容许有一定的群的作用. 本节主要参考了[71]§6.5和[37]§9.3.

定义 13.117 设有 m 维光滑流形 M，r 维 G 李群. 若 $\theta : M\times G\to M$ 是光滑映射，记为

$$\theta(x,g) = x\cdot g,\quad \forall (x,g)\in M\times G,\ \text{式中“}\cdot\text{”是指群}G\text{中元素右作用在}M\text{上}$$

使得 **(1)** $\forall x\in M$ 有 $x\cdot e = x$，$e\in G$ 是幺元；**(2)** $\forall x\in M$，$\forall g,h\in G$ 有 $(x\cdot g)\cdot h = x\cdot(gh)$；则称 G 是**右作用在 M 上的李变换群**.

很明显，它还有对偶定义.

定义 13.118 设有 m 维光滑流形 M，r 维 G 李群. 若 $\sigma : G\times M\to M$ 是光滑映射，记为

$$\sigma(g,x) = g\cdot x,\quad \forall (g,x)\in G\times M,\ \text{式中“}\cdot\text{”是指群}G\text{中元素左作用在}M\text{上}$$

使得 **(1)** $\forall x\in M$ 有 $e\cdot x = x$，$e\in G$ 是幺元；**(2)** $\forall x\in M$，$\forall g,h\in G$ 有 $g\cdot(h\cdot x) = (gh)\cdot x$；则称 G 是**左作用在 M 上的李变换群**.

请读者注意：本节所有定义、定理都有左、右对偶的叙述，绝大多数情况下只描述一种，请读者仿照已给出的内容补全对偶情形.

对任意固定 $g \in G$，记

$$L_g(x) = g \cdot x = \sigma(g, x), \tag{13.14-1}$$

则 $L_g : M \to M$ 是光滑映射. 需要注意的是这里的 L_g 的作用对象是流形 M；而李群左移动作用对象是李群自身. 由定义13.118中的条件 (1)、(2) 可得

$$L_e = \mathrm{id}, \qquad L_{g\cdot h} = L_g \circ L_h. \tag{13.14-2}$$

令 $h = g^{-1}$，则有 $L_{g^{-1}} \circ L_g = L_e = \mathrm{id}$，因此 $(L_g)^{-1} = L_{g^{-1}} : M \to M$. 这意味着光滑映射 $L_g : M \to M$ 有光滑逆映射 $L_{g^{-1}} : M \to M$；故 L_g 是光滑流形 M 到自身的光滑**同胚**.

对任意固定的 $g \in G$，令 $R_g(x) = \theta(x, g)$，则与左作用一样，$R_g : M \to M$ 也是光滑同胚. 论证过程留给读者当练习.

如果把光滑流形 M 到它自身的所有光滑同胚的集合记为 $\mathrm{Diff}(M)$，则 $\mathrm{Diff}(M)$ 关于映射的合成显然构成一个群，称为 M 的光滑**同胚群**（或可微同胚群）. 这样，对于左作用在 M 上的李变换群 $\sigma : G \times M \to M$ 而言，$\{L_g = \sigma(g, \cdot),\ \forall g \in G\}$ 是 $\mathrm{Diff}(M)$ 的一个子群. 式(13.14-2)表明：对应 $g \to L_g$ 给出了从群 G 到 $\mathrm{Diff}(M)$ 的一个同态. 同理，$R_g \in \mathrm{Diff}(M)$，并且 $g \to R_g$ 也是从群 G 到 $\mathrm{Diff}(M)$ 的同态.

李群 G 在 M 上的左作用和右作用是可以互相转换的. 实际上，若有李群 G 在 M 上的右作用 $\theta : M \times G \to M$，定义映射 $\sigma : G \times M \to M$ 如下:

$$\sigma(g, x) \overset{def}{=} \theta(x, g^{-1}), \quad \forall (g, x) \in G \times M, \tag{13.14-3}$$

则 σ 是光滑的，并且对任意的 $g, h \in G, x \in M$ 有

$$\begin{aligned} \sigma(g, \sigma(h, x)) =& \theta\left(\sigma(h, x), g^{-1}\right) = \theta\left(\theta\left(x, h^{-1}\right), g^{-1}\right) \\ =& \theta\left(x, h^{-1} \cdot g^{-1}\right) = \theta\left(x, (g \cdot h)^{-1}\right) = \sigma(g \cdot h, x); \end{aligned}$$

且 $\sigma(e, x) = \theta(x, e) = x$. 故 $\sigma : G \times M \to M$ 是李群 G 在流形 M 上的左作用.

例 13.119 单参数可微变换群. 对照 §4.10中的定义4.81，左作用在光滑流形 M 上的单参数可微变换群是一维李群 $\mathbb{R}$ 在 M 上的左作用，同时它又可看作 $\mathbb{R}$ 在 M 上的右作用. 可见：李变换群是单参数可微变换群向高维的推广. ■

例 13.120 *李群 G 作为 G 上的李变换群.*

设 $\varphi: G\times G\to G$ 是李群的乘法运算，则它既可看作李群 G 在它自身的右作用，也可看作李群 G 在它自身的左作用，即

$$R_g=\varphi(\cdot,g),\quad L_g=\varphi(g,\cdot),\quad \forall g\in G. \tag{13.14-4}$$

无论按哪一种看法，G 都是作用在 G 上的李变换群. ■

例 13.121 *$GL(m)$ 是左作用在 m 维矢量空间 V 上的李变换群.*

在 V 中取定一个基底 $\{\boldsymbol{e}_i\}$，则 V 中任意一个元素可以表示成 $x=x^i\boldsymbol{e}_i$. 将 x 等同于一个“列矢量”，即 $x=(x^1,\cdots,x^m)^T$. 令 $G=GL(m)$，定义映射 $\sigma: G\times V\to V$ 如下：

$$\sigma(A,x)=A\cdot x=\begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_m^1\\ \vdots & & \vdots\\ a_1^m & \cdots & a_m^m\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} x^1\\ \vdots\\ x^m\end{pmatrix},\qquad A\in G.$$

这是一个光滑映射，并且 $\forall\, A,B\in G$ 有

$$\sigma(I,x)=x;\qquad \sigma(A,\sigma(B,x))=(A\cdot B)\cdot x=\sigma(A\cdot B,x).$$

所以 $G=GL(m)$ 是左作用在 V 上的李变换群. ■

例 13.122 *设 $\mathscr{B}$ 是 m 维矢量空间 V 的所有基底构成的集合，$GL(m)$ 是右作用在 $\mathscr{B}$ 上的李变换群. 注：本书中分量和基矢的左右作用如上例和本例所示.*

在 V 中取定一个基底，记为 $\{\boldsymbol{e}_i\}$，用“行”表示，即 $\boldsymbol{e}=(\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m)\in\mathscr{B}$.

定义映射 $\theta:\mathscr{B}\times G\to\mathscr{B}$，其中 $G=GL(m)$，使得

$$\theta(\boldsymbol{e},A)=(\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m)\cdot A\in\mathscr{B},\qquad A\in G.$$

这样，对于任意的 $\boldsymbol{e}\in\mathscr{B},\ A,B\in G$ 有

$$\theta(\boldsymbol{e},I)=\boldsymbol{e},\qquad \theta\big(\theta(\boldsymbol{e},B),A\big)=\theta(\boldsymbol{e},B\cdot A).$$

所以 $GL(m)$ 是右作用在 $\mathscr{B}$ 上的李变换群. ■

定义 13.123 *设 G 是左作用在光滑流形 M 上的李变换群. 若对 G 中任意一个非单位元素 g，都有 M 中一点 x，使得 $g\cdot x\neq x$，则称 G 在 M 上的作用是*<u>**有效的**</u>（effective）.

即，若 G 在 M 上的作用是有效的，则 $\forall g \neq e, L_g : M \to M$ 不是恒同映射.

定义 13.124 设 G 是左作用在光滑流形 M 上的李变换群. 若对 G 中任意一个非单位元素 g，光滑同胚 $L_g : M \to M$ 都没有不动点，即 $\forall x \in M$ 都有 $L_g(x) = g \cdot x \neq x$；则称 G 在 M 上的作用是**自由的**（free）.

很明显，李群 G 在光滑流形 M 上的自由作用必定是有效的.

定义 13.125 设 G 是左作用在流形 M 上的李变换群，若 $\forall x, y \in M$，必存在一个元素 $g \in G$ 使得 $y = g \cdot x$；则称 G 在 M 上的作用是**可迁的**（transitive）.

定义 13.126 设 G 是左作用在光滑流形 M 上的李变换群，则 $x \in M$ 点的**轨道**（orbit）定义为：$\mathcal{O}(x) \overset{def}{=} \{g \cdot x \mid g \in G\}$.

定义 13.127 设 G 是左作用在光滑流形 M 上的李变换群，则 $x \in M$ 点的**迷向子群**（isotropy，也译成**各向同性**）定义为：$G_x \overset{def}{=} \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$.

例 13.128 设李群 G 是实直线上的加法群 $(\mathbb{R}, +)$，它按平移左作用在 $M = \mathbb{R}$ 上，即 $\sigma : G \times M \to M, \quad \sigma(s, x) = x + s$. 那么 $\forall x \in M \equiv \mathbb{R}$ 有 $\mathcal{O}(x) = \mathbb{R}$. 不难判断出左作用 σ 是可迁的、自由的. ■

例 13.129 设 $G = SO(3), M = \mathbb{R}^3. \forall x \in M, \forall A \in G$，考虑左作用 $\sigma(A, x) = A \cdot x$，即矩阵 A 乘以列矢量 x. 很容易得到 $\mathcal{O}(x) = \{y \in \mathbb{R}^3 \mid \|y\| = \|x\|\}$，即轨道 $\mathcal{O}(x)$ 是半径为 $\|x\|$ 的二维球面. 由于这个左作用有一个不动点 $0 \in \mathbb{R}^3$，故它不是自由的. ■

设 G 是左作用在光滑流形 M 上的李变换群. 取 $X \in T_eG$，用 $\exp(tX)$ 记由 X 在 G 中产生的单参数子群，于是 $L_{\exp(tX)} : M \to M$ 给出左作用在 M 上的单参数可微变换群，用 $\widetilde{X}$ 表示它所诱导的切矢量场，$\widetilde{X} \in \mathfrak{X}(M)$. 根据式(4.10-6)，$\forall f \in C^\infty(M)$ 有

$$\big(\widetilde{X}(f)\big)(p) = \left.\frac{\mathrm{d} f\left(L_{\exp(tX)}(p)\right)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \lim_{t \to 0} \frac{f\big(\exp(tX) \cdot p\big) - f(p)}{t}. \qquad (13.14\text{-}5)$$

定义 13.130 设 G 是左作用在流形 M 上的李变换群. $\forall X \in T_eG$，由左作用在 M 上的单参数可微变换群 $L_{\exp(tX)}$ 诱导的切矢量场 $\widetilde{X} \in \mathfrak{X}(M)$（见式(13.14-5)）称为切矢量 $X \in T_eG$ 在流形 M 上决定的**左基本矢量场**（或**无穷小左变换**）.

例 13.131 若把李群 G 看作左作用在它自身的李变换群，则由 $X \in T_eG$ 在 G 上决定的基本矢量场恰好就是 X 在李群 G 上生成的右不变切矢量场. 实际上，

有

$$L_{\exp(tX)}\circ R_g = R_g\circ L_{\exp(tX)},\qquad \forall g\in G. \tag{13.14-6}$$

故由命题4.84可知，单参数可微变换群 $L_{\exp(tX)}$ 所诱导的切矢量场 $\widetilde{X}$ 是 R_g 不变的，即 $\widetilde{X}$ 是 G 的右不变切矢量场. ■

定理 13.132 设 G 是左作用在光滑流形 M 上的李变换群，则 M 上全体左基本矢量场构成一个李代数；它是李群 G 的李代数 $\mathscr{G}\equiv T_eG$ 的反同态像. 若李群 G 在 M 上的作用是有效的，则 M 上左基本矢量场的李代数反同构于李群 G 的左不变切矢量场构成的李代数.

证明 . 已知：流形 M 上光滑切矢量场的集合 $\mathfrak{X}(M)$ 关于 Poisson 括号构成一个无穷维李代数（参见例题13.18）. 现要证明：由式(13.14-5)给出的映射

$$\alpha: T_eG\to\mathfrak{X}(M),\qquad \alpha(X)=\widetilde{X},\quad \forall X\in T_eG, \tag{13.14-7}$$

是 G 上的左不变切矢量场构成的李代数的反同态像.

从式(13.14-5)来看，映射 α 的线性性质不是一目了然的. 为此，先给出映射 α 的另一种表示. 任意选定 M 上一点 p，定义映射 $\gamma_p: G\to M$ 为：$\gamma_p(g)=L_g(p)=g\cdot p,\ \forall g\in G$. 我们断言：在任意一点 $p\in M$（但固定不变）有

$$(\gamma_p)_{*e}X=\widetilde{X}(p)=\big(\alpha(X)\big)(p),\quad \forall X\in T_eG. \tag{13.14-8}$$

通过直接计算可证明上述断言. 任取 $f\in C^\infty_p$，则从式(13.14-5)得到

$$\begin{aligned}\big((\gamma_p)_{*e}X\big)(f)=&X(f\circ\gamma_p)=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}\Big(f\circ\gamma_p\big(\exp(tX)\big)\Big)\\ =&\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}\big(f\circ L_{\exp(tX)}(p)\big)=\big(\widetilde{X}(p)\big)f.\end{aligned}$$

因 f 是任意的，故 $(\gamma_p)_{*e}X=\widetilde{X}(p)$ 成立，也就是式(13.14-8)正确.

我们利用 $(\gamma_p)_{*e}$ 的线性性来证明 α 的线性性. 任选 M 中的点 p，然后令 p 固定不变；$\forall X,Y\in T_eG$，$\forall\lambda\in\mathbb{R}$，有

$$\begin{aligned}\big(\alpha(\lambda\cdot X+Y)\big)(p)=&(\gamma_p)_{*e}(\lambda\cdot X+Y)=\lambda\cdot(\gamma_p)_{*e}(X)+(\gamma_p)_{*e}(Y)\\ =&\lambda\cdot\big(\alpha(X)\big)(p)+\big(\alpha(Y)\big)(p)=\big(\lambda\cdot\alpha(X)+\alpha(Y)\big)(p).\end{aligned}$$

因此 $\alpha: T_eG\to\mathfrak{X}(M)$ 是线性的. 请读者注意：线性性的证明是必不可少的！

为了证明映射 $\alpha : T_eG \to \mathfrak{X}(M)$ 保持 Poisson 括号积，把 G 的李代数 $\mathscr{G}_r \cong T_eG$ 重新看成李群 G 上右不变切矢量场所组成的空间．设 X 是李群 G 上的右不变切矢量场，则 $X(g) = (R_g)_{*e}\big(X(e)\big)$, $\forall g \in G$．于是 $\forall g \in G$ 有

$$(\gamma_p)_{*g}\big(X(g)\big) = (\gamma_p)_{*g} \circ (R_g)_{*e}\big(X(e)\big) = (\gamma_{g\cdot p})_{*e}\big(X(e)\big) = \widetilde{X}(g \cdot p).$$

这意味着，李群 G 上的右不变切矢量场 X 与光滑流形 M 上由 $X(e)$ 决定的左基本矢量场 $\widetilde{X}$ 是 γ_p-相关的．若 Y 是 G 上另一个右不变切矢量场，则由定理4.65可知 $[X, Y]$ 和 $[\widetilde{X}, \widetilde{Y}]$ 也是 γ_p-相关的，即 $\forall p \in M$ 有

$$\big(\alpha\left([X(e),\ Y(e)]_r\right)\big)(p) = (\gamma_p)_{*e}\big([X, Y](e)\big) = [\widetilde{X},\ \widetilde{Y}](p), \tag{13.14-9}$$

式(13.14-9)中的下角标 “$_r$” 表示 T_eG 中李代数对易关系是**右**不变切矢量场诱导出来的；式(13.14-9)表明 M 上左基本矢量场与李群 G 的右不变切矢量场是**正同态**关系．然而，我们通常用的李群 G 李代数是左不变切矢量场构成的；根据式(13.4-36)可知左右互换多一个负号；所以对于左不变切矢量场构成的李代数 $\mathscr{G}_l$ 而言，式(13.14-9)变为如下关系：

$$\alpha\big([X(e),\ Y(e)]_l\big) = -\big[\alpha\big(X(e)\big),\ \alpha\big(Y(e)\big)\big] = -[\widetilde{X},\ \widetilde{Y}], \tag{13.14-10}$$

即 $\alpha : T_eG \to \mathfrak{X}(M)$ 是李代数的**反同态**（“反”是指负号）．式(13.14-10)中的下角标 “$_l$” 表示 T_eG 中李代数对易关系是**左**不变切矢量场诱导出来的．由定义，M 上的基本矢量场的集合是 T_eG 在这个反同态下的像，因而它是一个李代数．

现设 $X \in T_eG$，且它在 M 上决定的左基本矢量场为 $\widetilde{X}$．假定 $\widetilde{X} = 0$，即在 M 上对应的单参数可微变换群 $L_{\exp(tX)}$ 是平凡的，即对于任意的 $p \in M$ 有 $\exp(tX) \cdot p = p$．由于 G 在 M 上的作用是有效的，所以 $\exp(t \cdot X) = e,\ X = 0$．由此得到映射 $\alpha : T_eG \to \mathfrak{X}(M)$ 是单一的，即 M 上基本矢量场的李代数与李群 G 的李代数反同构． ■

定理 13.133 *设 G 是左作用在光滑流形 M 上的李变换群．如果李群 G 在 M 上的作用是自由的，则任意一个非零切矢量 $X \in T_eG$ 在 M 上所诱导的左基本矢量场 $\widetilde{X}$ 处处不为零，因而在 M 上存在 $r(= \dim G)$ 个处处线性无关的左基本矢量场，而其它的左基本矢量场只是它们的常系数线性组合．*

证明 . 设 $0 \neq X \in T_eG$，$\widetilde{X}$ 是由 X 诱导的左基本矢量场，即 $\forall p \in M$ 有

$$\widetilde{X}(p) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0}\big(\exp(tX) \cdot p\big). \tag{13.14-11}$$

若 M 上有点 q 使得 $\widetilde{X}(q)=0$，即 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\big|_{s=0}\big(l(s)\big)=0$，其中 $l(s)=\exp(sX)\cdot q$. 则

$$l(t+s)=\exp\big((t+s)X\big)\cdot q=\exp(tX)\cdot\exp(sX)\cdot q=L_{\exp(tX)}\big(l(s)\big).$$

因此 $\forall t\in\mathbb{R}$ 有

$$l'(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\bigg|_{s=0}l(t+s)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\bigg|_{s=0}\Big(L_{\exp(tX)}\big(l(s)\big)\Big)=(L_{\exp(tX)})_{*l(0)}\big(l'(0)\big)=0.$$

上面的最后一个等号是因为 $l'(0)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\big|_{s=0}\big(\exp(tX)\cdot q\big)=0$. 由此可见，$l(t)$ 是常值映射，即 $l(t)=\exp(tX)\cdot q=l(0)=q$；因为 G 在 M 上的作用没有不动点，故 $\exp(tX)=e$，即 $X=0$，这与假设 $X\neq 0$ 相矛盾. 所以定理前半部分得证.

在 T_eG 中取定一个基底 $\{\boldsymbol{e}_i\}$，用 $\widetilde{X}_i$ 表示由 $\boldsymbol{e}_i$ 在 M 上诱导的左基本矢量场，则 $\widetilde{X}_i(1\leqslant i\leqslant r)$ 必定是处处线性无关的. ■

定理 13.134 设 G 是左作用在光滑流形 M 上的李变换群，令

$$K=\bigcap_{x\in M}K_x=\{k\in G\mid k\cdot x=x,\ \forall x\in M\}. \tag{13.14-12}$$

则 K 是 G 的闭正规子群，称为左作用 G 的**核**（kernel）.

证明 . 显然 K 是 G 的子群. 任取 $g\in G,\ h\in K$，则对任意的 $x\in M$ 有

$$\big(g\cdot h\cdot g^{-1}\big)\,x=(g)\cdot h\cdot\big(g^{-1}x\big)=g\cdot\big(g^{-1}x\big)=x, \tag{13.14-13}$$

所以 $g\cdot h\cdot g^{-1}\in K$，即 K 是 G 的正规子群.

下面证明 K 是 G 的闭子集.若 $g\in G\backslash K$,则存在点 $x\in M$ 使得 $g\cdot x\neq x$.由于 M 是 Hausdorff 空间,且 G 在 M 上的作用是光滑的;故有 g 在 G 中的开邻域 U 以及 x 在 M 中的开邻域 V,使得 $(U\cdot V)\cap V=\varnothing$,其中 $U\cdot V=\{h\cdot y\mid h\in U,y\in V\}$. 这意味着，$\forall h\in U$ 及 $\forall y\in V\subset M$，有 $h\cdot y\neq y$，故 $h\in G\backslash K$. 因此 $U\subset G\backslash K$，故 $G\backslash K$ 是开子集，K 是 G 的闭子集. ■

定义 13.135 设 M 和 N 是光滑流形，G 是李变换群. $\forall g\in G$，有 $\sigma_g\equiv\sigma(g,\cdot):M\to M$ 左作用在 M 上，同时有 $\pi_g\equiv\pi(g,\cdot):N\to N$ 左作用在 N 上. 称光滑映射 $f:M\to N$ 关于这些作用是**等变的**是指：$\forall g\in G$，$\forall x\in M$ 有

$$f\circ\sigma(g,\cdot)=\pi(g,\cdot)\circ f\quad\Leftrightarrow\quad f\big(\sigma(g,x)\big)=\pi\big(g,f(x)\big). \tag{13.14-14}$$

即有交换图13.5成立.

记 $g=\exp(tX)$，并对式(13.14-14)在 $t=0$ 处取 t 的导数，得到 $f_*X_M=X_N\circ f$；这说明 X_M 和 X_N 是 f-相关的.




图 13.5: 等变性交换图

13.15 李群 $I(M)$

已知 S^n_ν、H^n_ν 和 $\mathbb{R}^n_\nu$ 的等距群都是李群（见命题14.37和例题13.108）. 其实任意广义黎曼流形 (M,g) 的等距群 $I(M)$ 也是李群，这就是 Myers–Steenrod 定理，定理证明是艰深的，可参考[45]定理 9.32、或文献[47]第四章.

定理 13.136 （Myers–Steenrod 定理）若 (M,g) 是一个广义黎曼流形，则有唯一的途径使得 $I(M)$ 成为微分流形，并且使它满足：**(1)** $I(M)$ 是李群；**(2)** 左作用 $I(M)\times M\to M$ 是 C^∞ 的；**(3)** 若映射 $\mathbb{R}\times M\to M$（具体来说 $(t,p)\to\beta(t)\cdot p$）是 C^∞ 的，那么同态映射 $\beta:\mathbb{R}\to I(M)$ 也是 C^∞ 的.

定理 13.137 完备、广义黎曼流形的任一个 Killing 切矢量场是完备的.

证明 . 见[45]命题 9.30. 非完备流形的 Killing 场可能完备、也可能不完备. ■

我们把等距群 $I(M)$ 群定义成广义黎曼流形 (M,g) 的左作用李变换群，它的李代数是 $\mathfrak{I}(M)\cong T_e\big(I(M)\big)$（$\mathfrak{I}(M)$ 由左不变切矢量场构成）. 请先参见式(13.14-5)及定义13.130；$\forall X\in T_e\big(I(M)\big)$，$\exp(tX)$，$t\in\mathbb{R}$ 是 $I(M)$ 的单参数子群；式(13.14-5)中定义的 $\widetilde{X}$ 为 M 上的左基本矢量场. 群 $\exp(tX)$ 可以看成 $I(M)$ 的单参数可微变换群，它自然是等距子群；依照 Killing 场定义8.37可知由 $I(M)$ 的单参数可微变换子群 $\exp(tX)$ 诱导得到的左基本矢量场 $\widetilde{X}$ 是 M 上的 Killing 矢量场.

我们将广义黎曼流形 M 上所有 Killing 场的集合记为 $\mathfrak{K}(M)$. 设 $I(M)$ 是 M 的有效左作用，依定理13.132可知 $\mathfrak{K}(M)$ 构成李代数，并且与 $\mathfrak{I}(M)$ 存在某种同态关系，具体表现在如下定理中. 把广义黎曼流形 M 上所有完备 Killing 矢量场记为 $\mathfrak{CK}(M)$，则有如下定理：

定理 13.138 **(1)** $\mathfrak{CK}(M)$ 是 $\mathfrak{K}(M)$ 的李子代数.

(2) 存在反同构映射$\psi:\mathfrak{I}(M)\to\mathfrak{CK}(M)$，具体表达为 $\psi(X)=\widetilde{X}$；则有

$$[\widetilde{X},\widetilde{Y}]=\big[\psi(X),\psi(Y)\big]=-\psi\big([X,Y]\big);\quad X,Y\in\mathfrak{I}(M),\quad \widetilde{X},\widetilde{Y}\in\mathfrak{CK}(M).$$

(3) 若 M 是完备的，则 $\mathfrak{CK}(M)$ 就是 $\mathfrak{K}(M)$，$\mathfrak{I}(M)$ 与 $\mathfrak{K}(M)$ 反同构.

证明 . 第 (1) 条证明请参考[45]定理 9.33.第 (2) 条中的反同构可以由定理13.132中式(13.14-10)直接得到. 第 (3) 条是定理13.137和 (2) 的推论. ■

注 13.139 由定理8.44、13.138可知 m 维广义黎曼流形 (M,g) 的等距群 $I(M)$ 的最高维数是 $m(m+1)/2$；$I(M)$ 最少包含一个元素——恒等变换（此时是零维）.

闵氏时空 §8.5.3中讨论了广义闵氏空间的 Killing 矢量场，为了明确物理意义，我们只讨论 $\mathbb{R}^4_1$ 空间的问题. 我们已经知道 $\mathbb{R}^4_1$ 的等距群 $I(R^4_1)$ 是 Poincaré 群（见13.11.5），$I(R^4_1)$ 的李代数是 Poincaré 代数（生成元是(13.11-57)）；对比 $\mathbb{R}^4_1$ 的 Killing 场和 Poincaré 代数生成元，我们发现它们同构. 既然同构，那么 Killing 场的物理意义就清晰了，分别是：平移、转动、伪转动. Killing 场对易关系的系数自然与 Poincaré 代数的结构常数本质相同.

欧氏空间 正定度规的欧几里得空间 $\mathbb{R}^m$ 的等距群是 $ISO(m)$，$(\mathbb{R}^m,\delta)$ 上全体 Killing 场同构于李代数 $\mathfrak{iso}(m)$. §13.11.3.1中给出 $ISO(2)$ 的相关内容；$ISO(3)$ 群可参见[60]§9.6.

例 13.140 已知二维平面 $\mathbb{R}^2$ 是完备空间，其上有三个 Killing 矢量场，就是 $\mathfrak{iso}(2)$ 的三个生成元. 若把下半平面挖掉，那么剩余的二维空间不再是完备的，完备 Killing 矢量场只剩下沿 x 轴的平移；沿 y 轴的平移和绕 z 轴的转动都不再是完备 Killing 矢量场.

二维球面 正定度规的欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中的二维球面 S^2 的等距群是 $O(3)$ 群，S^2 是紧致、完备的，它上的 Killing 场同构于李代数 $\mathfrak{o}(3)$. $\mathfrak{o}(3)$ 是（式(15.2-46)）

$$\hat{L}_1=-\mathbb{i}(y\partial_z-z\partial_y),\quad \hat{L}_2=-\mathbb{i}(z\partial_x-x\partial_z),\quad \hat{L}_3=-\mathbb{i}(x\partial_y-y\partial_x).$$

为简单起见，去掉虚数单位；把它们变成球坐标的形式（参考式(8.1-4)），

$$\xi_1=\sin\phi\frac{\partial}{\partial\theta}+\cot\theta\cos\phi\frac{\partial}{\partial\phi},\ \xi_2=-\cos\phi\frac{\partial}{\partial\theta}+\cot\theta\sin\phi\frac{\partial}{\partial\phi},\ \xi_3=-\frac{\partial}{\partial\phi}.\qquad(13.15\text{-}1)$$

把上式代入 Killing 方程可验证它们是 Killing 场. 它们的对易关系是

$$[\xi_1,\xi_2]=\xi_3,\quad [\xi_2,\xi_3]=\xi_1,\quad [\xi_3,\xi_1]=\xi_2. \tag{13.15-2}$$

13.16 复化与实形

我们已经定义过复李代数、实李代数，本节叙述它们两者的关系.

在 §12.3.2中，我们通过定义12.20将实线性空间复化，只需再略加修改便可得到实李代数的复化. 设有 m 维实李代数 $\mathfrak{g}$，其基矢为 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m\}$；在 §12.3.2中，我们已论证过复化过程与基矢选取无关. 作为线性空间，$\mathfrak{g}$ 复化后的空间记为 $\mathfrak{g}^{\mathbb{C}}$；在 $\mathfrak{g}^{\mathbb{C}}$ 中，定义李积关系为（下式中 $1\leqslant i,j\leqslant m$，$a$、$b$、$c$、$d$ 为实数）：

$$\big[(a+\mathbb{i}b)\boldsymbol{e}_i,\ (c+\mathbb{i}d)\boldsymbol{e}_j\big]\overset{def}{=}(ac-bd)[\boldsymbol{e}_i,\boldsymbol{e}_j]+\mathbb{i}(ad+bc)[\boldsymbol{e}_i,\boldsymbol{e}_j]. \tag{13.16-1}$$

满足上述李积关系的 $\mathfrak{g}^{\mathbb{C}}$（$m$ 维）称为实李代数 $\mathfrak{g}$（m 维）的**复化**.

反之，设 $\mathfrak{h}$ 是一个复李代数，$\mathfrak{h}_0$ 为实李代数；如果 $\mathfrak{h}_0$ 的复化 $(\mathfrak{h}_0)^{\mathbb{C}}=\mathfrak{h}$，则称 $\mathfrak{h}_0$ 是 $\mathfrak{h}$ 的**实形式**. 我们知道任何复线性空间都有对应的实形式，但复李代数可能没有对应的实形式（参见[26]$^{\text{p.88}}$例 5.1.24）. 复李代数 $\mathfrak{h}$ 有实形式的充要条件是它存在一组基矢 $\{\boldsymbol{e}_i\}$ 使得这组基的结构常数恰好都是实数.

如果 $2m$ 维实李代数 $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$ 存在复结构 $\mathbb{J}$（参见 §12.3），那么存在 m 维复李代数 $\mathfrak{h}$ 与其对应（见定理12.17）. 则 $\forall x\in\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$ 有 $\mathbb{J}x=\mathbb{i}x$，利用此式可得

$$\mathbb{J}[x,y]=\mathbb{i}[x,y]=[\mathbb{i}x,y]=[\mathbb{J}x,y]=[x,\mathbb{J}y]=[x,\mathbb{i}y]. \tag{13.16-2}$$

设 $\mathfrak{h}_0$ 为实李代数，其复化是复李代数 $\mathfrak{h}$；设 $\mathfrak{h}_0$、$\mathfrak{h}$ 的基矢为 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m\}$. 由命题12.1可知复线性空间 $\mathfrak{h}$ 对应一个实线性空间 $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$，实线性空间 $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$ 的基矢为 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m;\mathbb{J}\boldsymbol{e}_1,\cdots,\mathbb{J}\boldsymbol{e}_m\}$. 由复李代数 $\mathfrak{h}$ 的李积可以得到 $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$ 基矢间的李积，只不过 $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$ 的结构常数未必是实数.

命题 13.141 设在上述基矢下，我们将 $\mathfrak{h}_0$、$\mathfrak{h}$、$\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$ 的 Killing 型分别记为 $(\cdot,\cdot)_0$、$(\cdot,\cdot)$、$(\cdot,\cdot)_{\mathbb{R}}$；则它们的 Killing 型有如下关系：

$$(x,y)_0=(x,y),\qquad \forall x,y\in\mathfrak{h}_0. \tag{13.16-3}$$

$$(x,y)_{\mathbb{R}}=2\mathrm{Re}\big((x,y)\big),\qquad \forall x,y\in\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}. \tag{13.16-4}$$

证明 . 若 $x,y\in\mathfrak{h}_0$，则 $\mathrm{ad}_x\mathrm{ad}_y(\boldsymbol{e}_k)\in\mathfrak{h}_0$；故 $\mathrm{ad}_x\mathrm{ad}_y$ 作为 $\mathfrak{h}_0$ 的线性变换与作为 $\mathfrak{h}$ 的线性变换，对基 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m\}$ 有相同的矩阵. 故式(13.16-3)成立.

又 $\forall x,y\in\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$，有 $(\mathbb{J}\circ\mathrm{ad}_x)y=\mathbb{J}[x,y]=[x,\mathbb{J}y]=(\mathrm{ad}_x\circ\mathbb{J})y$. 由命题12.19知 ad_x 亦是复线性空间 $\mathfrak{h}$ 的线性变换. 设 $\mathrm{ad}_x\mathrm{ad}_y$ 作为 $\mathfrak{h}$ 的线性变换对基 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m\}$ 的矩阵为 $B+\mathrm{i}C$，其中 B、C 是 m 阶实方阵. 则 $\mathrm{ad}_x\mathrm{ad}_y$ 作为 $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$ 的线性变换对基 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m;\mathbb{J}\boldsymbol{e}_1,\cdots,\mathbb{J}\boldsymbol{e}_m\}$ 的矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}B&-C\\C&B\end{smallmatrix}\right)$（参见命题12.18）. 而 Killing 型是矩阵求迹运算，故可得式(13.16-4). ■

命题 13.142 $\mathfrak{h}_0$、$\mathfrak{h}$、$\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$ 的 Killing 型同时退化或同时非退化.

证明 . 我们分三步完成证明.

(1)：若 $(x,y)_0$（其中 $x,y\in\mathfrak{h}_0$）非退化，而 $x+\mathrm{i}y\in\mathfrak{h}$ 使得 $(x+\mathrm{i}y,\mathfrak{h})=0$；则有 $(x,\mathfrak{h}_0)+\mathrm{i}(y,\mathfrak{h}_0)=0$. 又 $x,y\in\mathfrak{h}_0$，$(x,\mathfrak{h}_0)=(x,\mathfrak{h}_0)_0\in\mathbb{R}$，$(y,\mathfrak{h}_0)=(y,\mathfrak{h}_0)_0\in\mathbb{R}$. 故 $(x,\mathfrak{h}_0)_0=(y,\mathfrak{h}_0)_0=0$，于是 $x+\mathrm{i}y=0$，即 (x,y) 非退化.

(2)：若 (x,y) 非退化，不难证明：$\mathrm{ad}_{\mathbb{J}x}\mathrm{ad}_y=\mathbb{J}\mathrm{ad}_x\mathrm{ad}_y$. 由式(12.3-4)可知 $\mathbb{J}$ 对基矢 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m;\mathbb{J}\boldsymbol{e}_1,\cdots,\mathbb{J}\boldsymbol{e}_m\}$ 的矩阵是 $\left(\begin{smallmatrix}0&-I_m\\I_m&0\end{smallmatrix}\right)$. 故对 $x,y\in\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$，由命题12.18可得 $\mathrm{ad}_{\mathbb{J}x}\mathrm{ad}_y$ 对此基的矩阵是

$$\begin{pmatrix}0&-I_m\\I_m&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B&-C\\C&B\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-C&-B\\B&-C\end{pmatrix}.\tag{13.16-5}$$

因而 $(\mathbb{J}x,y)_{\mathbb{R}}=2\mathrm{Re}(\mathrm{i}x,y)=-2\mathrm{Im}(x,y)$. 若 $(y,x)_{\mathbb{R}}=0$，$\forall x\in\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$，则 $(y,x)_{\mathbb{R}}=2\mathrm{Re}(x,y)=0$，故 $\mathrm{Re}(x,y)=0$. 又 $\mathrm{Im}(x,y)=-\frac{1}{2}(y,\mathbb{J}x)_{\mathbb{R}}=0$，故 $(x,y)=\mathrm{Re}(x,y)+\mathrm{i}\mathrm{Im}(x,y)=0$，$\forall x\in\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$，从而 $(y,\mathfrak{h}_{\mathbb{R}})=0$，即 $(y,\mathfrak{h})=0$，故 $y=0$. 因而 $(y,x)_{\mathbb{R}}$ 非退化.

(3)：设 $(x,y)_{\mathbb{R}}$ 非退化. 若 $(x,\mathfrak{h}_0)_0=0$，则有 $(x,\mathfrak{h})=(x,\mathfrak{h}_0)_0=0$. 因而 $(x,\mathfrak{h})=0$，即 $(x,y)=0$，$\forall y\in\mathfrak{h}$. 故 $(x,y)_{\mathbb{R}}=2\mathrm{Re}(x,y)=0$，$\forall y\in\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$. 故 $x=0$. 所以 $(x,y)_0$ 非退化.

因而 $(x,y)_0$、(x,y)、$(x,y)_{\mathbb{R}}$ 之一非退化，则它们同时非退化. ■

例 13.143 实形、复化典型例子.

$$\big(\mathfrak{gl}(m,\mathbb{R})\big)^{\mathbb{C}}\cong\mathfrak{gl}(m,\mathbb{C}),\quad\big(\mathfrak{sl}(m,\mathbb{R})\big)^{\mathbb{C}}\cong\mathfrak{sl}(m,\mathbb{C}),\quad\big(\mathfrak{so}(m,\mathbb{R})\big)^{\mathbb{C}}\cong\mathfrak{so}(m,\mathbb{C}),$$
$$\big(\mathfrak{sp}(m,\mathbb{R})\big)^{\mathbb{C}}\cong\mathfrak{sp}(m,\mathbb{C}),\quad\big(\mathfrak{u}(m,\mathbb{C})\big)^{\mathbb{C}}\cong\mathfrak{gl}(m,\mathbb{C}),\quad\big(\mathfrak{su}(m,\mathbb{C})\big)^{\mathbb{C}}\cong\mathfrak{sl}(m,\mathbb{C}).$$

实李代数 $\mathfrak{su}(m,\mathbb{C})$ 是 $\mathfrak{sl}(m,\mathbb{C})$ 的紧致实形式；实李代数 $\mathfrak{sl}(m,\mathbb{R})$ 也是 $\mathfrak{sl}(m,\mathbb{C})$ 的实形式，但不是紧致实形式．这个证明可参见[88]p.266． ■

13.17 半单李代数

定理 13.144 数域 $\mathbb{F}$ 上李代数 $\mathfrak{g}$ 是半单的充要条件是其 Killing 型非退化，即 $\det(g_{\mu\nu})=\det\left(C^{\tau}_{\mu\rho}C^{\rho}_{\nu\tau}\right)\neq 0$．（证明可参考[54]§6.2第 44 页定理 2.1）

上述定理称为 **Cartan 判据**．大多数书籍证明上述定理时会用到可解李代数以及李定理13.51，这必须要求基域是复数域；实数域上李定理一般不成立，故不能使用．上面定理中所列文献的证明过程没有用到李定理（故不要求代数闭域），因此定理13.144同时适用于实数域和复数域．

由命题13.142还可以得到实半单李代数的一个判据：实李代数是半单的充要条件是其复化李代数的 Killing 型非退化，即其复化李代数是半单的．

定理 13.145 复半单李代数必有紧致实形式．（证明可参考[91]p.109定理 2.1.10）

定理 13.146 实数域 $\mathbb{R}$ 上李代数为**紧致半单纯**的充分必要条件是其 Killing 型负定．（证明可参考[91]p.113定理 2.1.12）

定理 13.147 半单李代数 $\mathfrak{g}$（其 Killing 型自然非退化）可分解为单纯理想的直和，除这些单纯理想的次序外，这种分解是唯一的．

证明 . 若 $\mathfrak{g}$ 是单李代数，结论自然成立．

下面考虑 $\mathfrak{g}$ 是半单李代数．设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的非平凡理想．令

$$\mathfrak{h}^{\perp}=\{x\in\mathfrak{g}\mid (x,y)=0,\ \forall y\in\mathfrak{h}\}. \tag{13.17-1}$$

$\forall x\in\mathfrak{h}^{\perp}$，$\forall y\in\mathfrak{h}$，$\forall z\in\mathfrak{g}$；因 $\mathfrak{h}$ 是理想，故有 $[z,y]\in\mathfrak{h}$．利用定理13.88中的属性，有 $\big([x,z],y\big)=\big(x,[z,y]\big)=0$；于是得到 $[x,z]\in\mathfrak{h}^{\perp}$，这说明 $\mathfrak{h}^{\perp}$ 也是 $\mathfrak{g}$ 的理想．那么它们两者的交集 $\mathfrak{a}=\mathfrak{h}\cap\mathfrak{h}^{\perp}$ 同是 $\mathfrak{g}$ 的理想．$\forall u,v\in\mathfrak{a}$，$\forall z\in\mathfrak{g}$，有 $\big([u,v],z\big)=-\big(v,[u,z]\big)=0$（注意 u、v 既属于 $\mathfrak{h}$ 又属于 $\mathfrak{h}^{\perp}$）．注意 Killing 型的非退化性，于是可得 $\mathfrak{a}$ 是可交换的；又由 $\mathfrak{g}$ 的半单性可知 $\mathfrak{a}=\mathfrak{h}\cap\mathfrak{h}^{\perp}=\{0\}$．

设 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ 为 $\mathfrak{h}$ 的基；再设 $y\in\mathfrak{g}$ 并且 $y\notin\mathfrak{h}$．于是 $m+1$ 个未知数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m,\lambda_{m+1}$ 的齐次线性方程组

$$\sum\nolimits_{j=1}^{m}\big(x_j,x_i\big)\lambda_j+\big(y,x_i\big)\lambda_{m+1}=0,\quad i=1,2,\cdots,m \tag{13.17-2}$$

有非零解（未知量个数比方程个数多一个）；将解仍记为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_{m+1}$. 于是有 $z=\sum_{j=1}^{m}\lambda_j x_j+\lambda_{m+1}y\in\mathfrak{h}^\perp$. 我们用反证法证明上式中的 $\lambda_{m+1}\neq 0$. 假设 $\lambda_{m+1}=0$，则 $z\in\mathfrak{a}=\{0\}$，故有 $\lambda_i=0(1\leqslant i\leqslant m+1)$（全为零），产生矛盾. 由此可知 $\lambda_{m+1}\neq 0$. 于是

$$y=\frac{1}{\lambda_{m+1}}z-\frac{1}{\lambda_{m+1}}\sum_{j=1}^{m}\lambda_j x_j\in\mathfrak{h}+\mathfrak{h}^\perp. \tag{13.17-3}$$

由于 y 是任取的，故 $\mathfrak{g}=\mathfrak{h}\oplus\mathfrak{h}^\perp$（直和），并且 $[\mathfrak{h},\mathfrak{h}^\perp]=0$、$\mathfrak{h}\cap\mathfrak{h}^\perp=\{0\}$. 注意 $\mathfrak{g}$ 的 Killing 型在理想 $\mathfrak{h}$、$\mathfrak{h}^\perp$ 的限制就是它们的诱导 Killing 型，并且诱导 Killing 型也是非退化的（见命题13.91）. 如果 $\mathfrak{h}$ 或者 $\mathfrak{h}^\perp$ 不是单纯的，那么继续分解；经过有限步后可知半单纯李代数 $\mathfrak{g}$ 可以分解为有限个的单纯理想的直和：$\mathfrak{g}=\mathfrak{h}_1\oplus\mathfrak{h}_2\oplus\cdots\oplus\mathfrak{h}_r$.

设 $\mathfrak{b}$ 是非零的极小理想，若 $\mathfrak{b}\neq\mathfrak{h}_i,i=1,2,\cdots,r$，则 $[\mathfrak{b},\mathfrak{h}_i]\subseteq\mathfrak{b}\cap\mathfrak{h}_i=\{0\}$，$i=1,2,\cdots,r$. 因此 $[\mathfrak{b},\mathfrak{g}]=\{0\}$. 这是不可能的. 因此有 i 使得 $\mathfrak{b}=\mathfrak{h}_i$. 由此知分解的唯一性. ■

设有数域 $\mathbb{F}$ 上的半单李代数 $\mathfrak{g}$，其 Killing 型(13.9-19)自然非退化，那么可以看作线性空间 $\mathfrak{g}$（李代数本身是线性空间）上的度规. 我们将其逆记为 $g^{\mu\nu}$，并且有 $g_{\mu\nu}g^{\nu\rho}=\delta_\mu^\rho$. 设半单李代数 $\mathfrak{g}$ 的结构常数为 C_{ij}^l，定义

$$C_{ijk}\overset{def}{=}g_{kl}C_{ij}^l. \qquad \text{人为约定上指标降在最后位置} \tag{13.17-4}$$

这个新定义的结构常数关于下标全反对称，即

$$C_{ijk}=-C_{ikj}=-C_{jik}=-C_{kji}. \tag{13.17-5}$$

证明如下：$C_{ijk}=g_{kl}C_{ij}^l=C_{kq}^pC_{lp}^qC_{ij}^l\overset{13.7-4}{=\!=\!=}C_{qk}^pC_{li}^qC_{jp}^l-C_{kq}^pC_{lj}^qC_{pi}^l$. 由此式，利用指标代换以及式(13.7-4)中的反对称性可以得到反对称式(13.17-5).

设半单李代数 $\mathfrak{g}$ 的基矢为 $\{X_l\}$，其中 $1\leqslant l\leqslant m$. 因 $\mathfrak{g}$ 的 Killing 型非退化，借助于它可定义 n 阶 **Casimir 算子**：

$$C_n\overset{def}{=}\sum_{\{i\}\{j\}\{k\}}C_{i_1j_1}^{j_2}C_{i_2j_2}^{j_3}\cdots C_{i_nj_n}^{j_1}\times g^{i_1k_1}\cdots g^{i_nk_n}X_{k_1}\cdots X_{k_n}. \tag{13.17-6}$$

定理 13.148 *C_n 与 $\mathfrak{g}$ 的任意基矢 X_ρ 都对易，即 $[C_n,X_\rho]=0$.*

证明 . 先计算如下式子.

$$\begin{aligned}[X_{k_1}\cdots X_{k_n},X_\rho]&=\sum_{l=1}^{n}X_{k_1}\cdots X_{k_{l-1}}[X_{k_l},X_\rho]X_{k_{l+1}}\cdots X_{k_n}\\&=\sum_{l=1}^{n}\sum_{p}C^{p}_{k_l\,\rho}\,X_{k_1}\cdots X_{k_{l-1}}X_pX_{k_{l+1}}\cdots X_{k_n}.\end{aligned}$$

交换上式中求和指标 k_l 和 p；然后把与 i_l 和 p 相关项提出来

$$\begin{aligned}&\sum_{p,i_l}C^{j_{l+1}}_{i_lj_l}C^{k_l}_{p\rho}g^{i_lp}=\sum_{p,i_l,\pi}C^{j_{l+1}}_{i_lj_l}C_{p\rho\pi}g^{\pi k_l}g^{i_lp}\overset{13.17-5}{=\!=\!=}\sum_{i_l,\pi}C^{j_{l+1}}_{i_lj_l}C^{i_l}_{\rho\pi}g^{\pi k_l}\\\overset{13.7-4}{=\!=\!=}&\sum_{i_l,\pi}\left(C^{j_{l+1}}_{i_l\rho}C^{i_l}_{j_l\pi}-C^{j_{l+1}}_{i_l\pi}C^{i_l}_{j_l\rho}\right)g^{\pi k_l}\overset{\text{交换}}{=\!=\!=}\sum_{i_l,\pi}\left(C^{j_{l+1}}_{\pi\rho}C^{\pi}_{j_li_l}-C^{j_{l+1}}_{\pi i_l}C^{\pi}_{j_l\rho}\right)g^{i_lk_l}.\end{aligned}$$

有了这些准备，便可继续计算我们需要的式子了：

$$\begin{aligned}[C_n,X_\rho]=\sum_{l=1}^{n}\sum_{\{i\}\{j\}\{k\}}&C^{j_2}_{i_1j_1}\cdots C^{j_l}_{i_{l-1}j_{l-1}}\left(C^{j_{l+1}}_{\pi\rho}C^{\pi}_{j_li_l}-C^{j_{l+1}}_{\pi i_l}C^{\pi}_{j_l\rho}\right)\times\\&\times C^{j_{l+2}}_{i_{l+1}j_{l+1}}\cdots C^{j_1}_{i_nj_n}g^{i_1k_1}\cdots g^{i_nk_n}X_{k_1}\cdots X_{k_n}.\end{aligned}$$

将上式展开，并对 l 求和，所有项相互抵消. 最终，有 $[C_n,X_\rho]=0$. ■

小结

本章主要参考了[21, 45, 75, 91]相应章节.

§13.11.4、§13.11.5适用于 Lorentz 度规. §13.10.4.1、§13.11.3、§13.12 适用于正定度规. 其它内容对度规没有特别要求.

第十四章　对称空间与齐性空间

本章主要描述广义黎曼流形的对称性．首先引入局部对称空间概念，在该节叙述数条重要定理．然后初步介绍整体对称空间，并讨论它与局域对称的异同．接着引入齐性空间，陪集空间；进而讨论了常曲率的空间型式．最后讨论了具有空间型式子空间的流形．

14.1　局部对称空间

定义 14.1 给定广义黎曼流形 (M,g)，R 是 $\binom{1}{3}$ 型黎曼曲率．若 $\forall Z\in\mathfrak{X}(M)$ 有 $\nabla_Z R=0$，则称 M 是**局部对称**的（locally symmetric）．

很明显，常曲率空间是局部对称的．

定理 14.2 设有广义黎曼流形 (M,g)，则下述条件相互等价：**(1)** M 局部对称．**(2)** $\nabla R=0$．**(3)** 若 X,Y,Z 是沿曲线 $\alpha(t)\in M$ 的平行移动不变矢量场，则矢量场 $R(X,Y)Z$ 也是沿 $\alpha(t)$ 平行移动不变矢量场．**(4)** 截面曲率沿曲线 $\alpha(t)$ 平行移动不变．

证明 ．任取 M 中正则曲线 $\alpha(t)$，它没有自交点，且处处光滑．

(1) $\Leftrightarrow$ (2)．M 是局部对称意味着 $\forall V\in\mathfrak{X}(M)$ 都有 $\nabla_V R=0$，因 V 的任意性，自然可以得到 $\nabla R=0$．反之；$\nabla R=0\Rightarrow\nabla_V R=0$ 是自然的．用抽象指标表示便是：$\forall V\in\mathfrak{X}(M)$，$\nabla_V R^d_{cab}=0\ \Leftrightarrow\ \nabla_e R^d_{cab}=0$．

(1) $\Rightarrow$ (3)．继续用上面的记号；既然 V 是任意的，我们把它取成曲线 $\alpha(t)$ 的切线切矢量．再设 X,Y,Z 是沿曲线 $\alpha(t)$ 的平行移动矢量场，即 $\nabla_V X=0$，$\nabla_V Y=0$，$\nabla_V Z=0$；那么有

$$0=(\nabla_V R)(X,Y)Z$$

$$\begin{aligned}&=\nabla_V\big(R(X,Y)Z\big)-R(\nabla_V X,Y)Z-R(X,\nabla_V Y)Z-R(X,Y)(\nabla_V Z)\\&=\nabla_V\big(R(X,Y)Z\big).\end{aligned}$$

这说明 $R(X,Y)Z$ 也是沿 $\alpha(t)$ 平行移动不变的．上式用抽象指标表示为

$$\begin{aligned}0=&(\nabla_V R^d_{cab})X^aY^bZ^c\\=&\nabla_V(R^d_{cab}X^aY^bZ^c)-R^d_{cab}(\nabla_V X^a)Y^bZ^c-R^d_{cab}X^a(\nabla_V Y^b)Z^c-R^d_{cab}X^aY^b(\nabla_V Z^c)\\=&\nabla_V(R^d_{cab}X^aY^bZ^c).\end{aligned}$$

读者可以对比一下抽象指标与普通指标的异同．

(3) $\Rightarrow$ (1)．把上面的式子倒着推回去，得到 $0=(\nabla_V R)(X,Y)Z$，其中 V 是 $\alpha(t)$ 的切线切矢量，X,Y,Z 是沿 α 平行移动不变的矢量场．这样可以得到限制在曲线 $\alpha(t)$ 上有 $(\nabla_V R)|_{\alpha(t)}=0$；因曲线 $\alpha(t)$ 也是任意取定的，故可得到对于任意矢量场 V 有 $\nabla_V R=0$．

(2) $\Rightarrow$ (4)．截面曲率 Π 沿曲线 $\alpha(t)$ 平行移动是指：截面 Π 上有两个不共线的矢量 u,v，且 u,v 沿曲线 $\alpha(t)$ 平行移动不变；同时截面曲率沿 α 导数为零．

由式(8.9-5)可得 $\nabla_V K([u\wedge v])=\nabla_V\frac{\langle u,\,R(u,v)v\rangle}{Q(u,v)}$；其中 $Q(u,v)=\langle u,u\rangle\langle v,v\rangle-\langle u,v\rangle^2$，因 u,v 沿曲线 $\alpha(t)$ 平行移动不变的，故 $\nabla_V Q(u,v)=0$．进而，截面曲率的导数是

$$\nabla_V K([u\wedge v])=\nabla_V\frac{\langle u,\,R(u,v)v\rangle}{Q(u,v)}=\frac{1}{Q(u,v)}\nabla_V\langle u,\,R(u,v)v\rangle=0.\qquad(14.1\text{-}1)$$

即截面曲率沿 $\alpha(t)$ 平行移动不变．

(4) $\Rightarrow$ (2)．由 (4) 可得：沿 $\alpha(t)$ 有 $\langle u,\,R(u,v)v\rangle=c$，其中 c 是非零实常数；因 v 沿 $\alpha(t)$ 平行移动不变，故由前面的内积可知 $R(u,v)v$ 沿 $\alpha(t)$ 平行移动不变，即沿 $\alpha(t)$ 是常数．将沿 $\alpha(t)$ 平行移动不变的矢量 v 分解成 $v=X+Y$，并要求 X,Y 沿 $\alpha(t)$ 平行移动不变；代入上式有

$$c'=R(u,v)v=R(u,X+Y)(X+Y)=R(u,X)X+R(u,X)Y+R(u,Y)X+R(u,Y)Y.$$

利用黎曼曲率对称性可以得到（参见定理8.62的证明过程）：$R(u,X)Y$ 是沿 $\alpha(t)$ 平行移动不变的；这便是 (3)，进而得到 (2)． ■

由上面定理中的 (4) 可以直接得到：

推论 14.3 *若广义黎曼流形 M 的截面曲率是常数，则 M 是局部对称的.*

下面讨论法邻域上的局部等距映射. 设有两个维数相同的广义黎曼流形 M 和 N，它们的度规号差也相同. 令 $p\in M$，$q\in N$，给定一个从 $T_p(M)$ 到 $T_q(N)$ 的局部等距同构映射；目标是寻找一个局部等距同胚，它将 $p\in M$ 点法邻域等距映射到 $q\in N$ 点法邻域.

定义 14.4 *令 $\mathrm{L}:T_p(M)\to T_q(N)$ 是线性同构等距；再取 $p\in M$ 点足够小的法邻域 $\mathscr{U}\subset M$ 使得 N 上指数映射 $\exp_q$ 在集合 $\mathrm{L}\big(\exp_p^{-1}(\mathscr{U})\big)$ 上有定义. 则映射*

$$\phi_{\mathrm{L}}=\exp_q\circ\mathrm{L}\circ\exp_p^{-1}:\mathscr{U}\to N, \tag{14.1-2}$$

*称为 $\mathscr{U}$ 上关于 L 的***极映射***（polar map）.*

简单来说，$\forall v\in T_pM$，ϕ_{L} 将 $\exp_p(v)$ 映射成 $\exp_q(\mathrm{L}v)$.

数学上可以证明只要法邻域 $\mathscr{U}$ 取得足够小，极映射就存在.

命题 14.5 **(1)** *ϕ_{L} 将测地线映射为测地线.*

(2) *ϕ_{L} 的切映射（推前映射）是 L，即 $\forall v\in T_pM$，$\phi_{\mathrm{L}*}(v)=\mathrm{L}v$.*

(3) *若 $\mathscr{U}$ 足够小，则 ϕ_{L} 是局部微分同胚.*

(4) *若 M 是完备的，则 ϕ_{L} 在 $p\in M$ 的每个法邻域都有定义.*

证明 . (1) 设 $v\in T_pM$，有 M 中测地线 $\gamma(t;p,v)=\exp_p(tv)$，则有

$$\phi_{\mathrm{L}}\big(\gamma(t;p,v)\big)=\exp_q\circ\mathrm{L}\circ\exp_p^{-1}\circ\gamma(t;p,v)=\exp_q\big(t(\mathrm{L}v)\big). \tag{14.1-3}$$

指数映射 $\exp_q\big(t(\mathrm{L}v)\big)$ 本身就是 N 中测地线；故 ϕ_{L} 将测地线映射为测地线.

(2) 对式(14.1-3)求 t 的导数，得

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}\phi_{\mathrm{L}}\big(\gamma(t;p,v)\big)=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}\exp_q\big(t(\mathrm{L}v)\big)\overset{4.5-8}{\Longrightarrow}\phi_{\mathrm{L}*}(v)=\mathrm{L}v. \tag{14.1-4}$$

(3) 流形中任意一点都存在包含该点的测地凸邻域（测地球），见 §9.2.2讨论以及所列参考文献；在测地球内指数映射有着良好定义. 由于 ϕ_{L} 是连续映射，故只要缩小 $\mathscr{U}$，那么 $\phi_{\mathrm{L}}(\mathscr{U})$ 一定可以小到完全属于点 $N\ni q=\phi_{\mathrm{L}}(p)$ 的测地球内，即 $\phi_{\mathrm{L}}(\mathscr{U})\subset\mathscr{B}_q(\delta)$ （见(9.4-15)式）. 在 p、q 局部 $\exp_p$、$\exp_q$ 分别是局部微分同胚的；L 是局部线性同构；又因 ϕ_{L} 是这三个映射的组合，故 ϕ_{L} 是局部微分同胚的. 注：微分同胚是流形上的术语，线性同构是矢量空间上的术语，两者都是双射.

(4) 若 M 完备，则测地线可以延拓至整个实数轴，指数映射在任一点都有定义，那么 ϕ_{L} 在 $p\in M$ 的每个法邻域都有定义. ■

设有两个广义黎曼流形 M、N，两者间存在局部等距映射 $f:M\to N$；由定理8.35可知：其切映射 $\mathrm{L}=f_*$ 保黎曼曲率不变，即

$$\mathrm{L}\big(R^M(X,Y)Z\big)=R^N(\mathrm{L}X,\mathrm{L}Y)(\mathrm{L}Z),\qquad \forall X,Y,Z\in T_pM. \tag{14.1-5}$$

由上式容易得到 L 也保 M 和 N 的截面曲率不变.

现在考虑反问题.设有两个广义黎曼流形 M、N,若存在微分同胚 $f:M\to N$ 使得 $\forall p\in M$ 以及 $v,w\in T_pM$；当 v,w 不共线时，有截面曲率间的关系

$$K^M(v,w)=K^N\big(f_*(v),f_*(w)\big)\quad \text{成立}. \tag{14.1-6}$$

那么，映射 f 是否局部等距呢？一般情形下答案是否定的，一个反例见下.

例 14.6 设有二维曲面 S 和 $\tilde S$，它们的参数方程分别是：

$$\boldsymbol{r}=\left(au,\ bv,\ \frac{1}{2}\left(au^2+bv^2\right)\right);\qquad \tilde{\boldsymbol{r}}=\left(\tilde a\tilde u,\ \tilde b\tilde v,\ \frac{1}{2}\left(\tilde a\tilde u^2+\tilde b\tilde v^2\right)\right).$$

并且非零实参数满足 $ab=\tilde a\tilde b$. 请证明：曲面 S 和 $\tilde S$ 在对应点 $\tilde u=u$, $\tilde v=v$ 有相同的黎曼曲率（也就是 Gauss 曲率）；但是当 $(a^2,b^2)\neq(\tilde a^2,\tilde b^2)$ 以及 $(a^2,b^2)\neq(\tilde b^2,\tilde a^2)$ 时，在曲面 S 和 $\tilde S$ 之间不存在等距映射.

证明 . 经直接计算得到曲面 S 的第一、第二基本形式是

$$\mathrm{I}=a^2(1+u^2)(\mathrm{d}u)^2+2abuv\mathrm{d}u\mathrm{d}v+b^2(1+v^2)(\mathrm{d}v)^2, \tag{14.1-7}$$

$$\mathrm{II}=\frac{a}{\sqrt{1+u^2+v^2}}(\mathrm{d}u)^2+\frac{b}{\sqrt{1+u^2+v^2}}(\mathrm{d}v)^2. \tag{14.1-8}$$

可得度规行列式和曲面 S 的 Gauss 曲率（式(1.5-3)）为：

$$\det g=a^2b^2(1+u^2+v^2),\qquad K=\frac{1}{ab\left(1+u^2+v^2\right)^2}. \tag{14.1-9}$$

因 $\tilde S$ 和 S 的参数方程相同，只是系数不同，故曲面 $\tilde S$ 的总曲率为：

$$\tilde K=\frac{1}{\tilde a\tilde b\left(1+\tilde u^2+\tilde v^2\right)^2}\overset{\text{应用已}}{\underset{\text{知条件}}{=\!=\!=}}\frac{1}{ab\left(1+\tilde u^2+\tilde v^2\right)^2}. \tag{14.1-10}$$

由此可见，曲面 S 和 $\tilde{S}$ 在对应点 $u=\tilde{u}, v=\tilde{v}$ 有相同的 Gauss 曲率.

用反证法证明剩余部分. 假设在曲面 S 和 $\tilde{S}$ 之间存在等距映射：

$$\tilde{u}=\tilde{u}(u,v), \quad \tilde{v}=\tilde{v}(u,v). \tag{14.1-11}$$

根据定理8.35等距映射(14.1-11)保二维曲面的黎曼曲率不变，也就是保 Gauss 曲率不变，即 S 和 $\tilde{S}$ 在对应点有相同的 Gauss 曲率，用公式表示便是：

$$\frac{1}{ab\left(1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2\right)^2}=\frac{1}{ab\left(1+u^2+v^2\right)^2} \Rightarrow \tilde{u}^2(u,v)+\tilde{v}^2(u,v)=u^2+v^2 \tag{14.1-12}$$

因此曲面 S 上的 $(u,v)=(0,0)$ 点必然对应着曲面 $\tilde{S}$ 上的 $(\tilde{u},\tilde{v})=(0,0)$ 点，即 $\tilde{u}(0,0)=0,\ \tilde{v}(0,0)=0$. 将式(14.1-12)分别对 u、v 求导得到：

$$\tilde{u}\frac{\partial\tilde{u}}{\partial u}+\tilde{v}\frac{\partial\tilde{v}}{\partial u}=u, \qquad \tilde{u}\frac{\partial\tilde{u}}{\partial v}+\tilde{v}\frac{\partial\tilde{v}}{\partial v}=v. \tag{14.1-13}$$

将上面的式子再次对 u、v 求导，并且让 $u=0=v$，则得到：

$$\left(\frac{\partial\tilde{u}}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial\tilde{v}}{\partial u}\right)^2=1, \quad \left(\frac{\partial\tilde{u}}{\partial v}\right)^2+\left(\frac{\partial\tilde{v}}{\partial v}\right)^2=1, \quad \frac{\partial\tilde{u}}{\partial u}\frac{\partial\tilde{u}}{\partial v}+\frac{\partial\tilde{v}}{\partial u}\frac{\partial\tilde{v}}{\partial v}=0.$$

令 $\quad J=\begin{pmatrix}\frac{\partial\tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial\tilde{v}}{\partial u}\\ \frac{\partial\tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial\tilde{v}}{\partial v}\end{pmatrix}.$

则上式表明 $J|_{(u,v)=(0,0)}$ 是正交矩阵，不妨设

$$J|_{(u,v)=(0,0)}=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\varepsilon\sin\theta & \varepsilon\cos\theta\end{pmatrix}; \qquad \text{其中}\varepsilon=\pm1 \tag{14.1-14}$$

因为映射(14.1-11)是等距映射，根据式(8.4-7)得到

$$\begin{pmatrix}a^2\left(1+u^2\right) & abuv\\ abuv & b^2\left(1+v^2\right)\end{pmatrix}=J\begin{pmatrix}\tilde{a}^2\left(1+\tilde{u}^2\right) & \tilde{a}\tilde{b}\tilde{u}\tilde{v}\\ \tilde{a}\tilde{b}\tilde{u}\tilde{v} & \tilde{b}^2\left(1+\tilde{v}^2\right)\end{pmatrix}J^{\mathrm{T}}. \tag{14.1-15}$$

让 $(u,v)=(0,0)$，则根据 $\tilde{u}(0,0)=0,\ \tilde{v}(0,0)=0$ 和式(14.1-14)，上式成为：

$$\begin{pmatrix}a^2 & 0\\ 0 & b^2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\varepsilon\sin\theta & \varepsilon\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\tilde{a}^2 & 0\\ 0 & \tilde{b}^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\theta & -\varepsilon\sin\theta\\ \sin\theta & \varepsilon\cos\theta\end{pmatrix}. \tag{14.1-16}$$

将上式展开得到三个方程式：

$$\tilde{a}^2\cos^2\theta+\tilde{b}^2\sin^2\theta=a^2, \quad \left(\tilde{b}^2-\tilde{a}^2\right)\sin\theta\cos\theta=0, \quad \tilde{a}^2\sin^2\theta+\tilde{b}^2\cos^2\theta=b^2.$$

若 $\tilde{b}^2=\tilde{a}^2$，则从上式得到 $\tilde{b}^2=\tilde{a}^2=b^2=a^2$. 若 $\tilde{b}^2\neq\tilde{a}^2$，则从上式的第二式得到或 $\theta=0$，或 $\theta=\pi/2$，即

$$\left(a^2,b^2\right)=\left(\tilde{a}^2,\tilde{b}^2\right)\quad\text{或者}\quad\left(a^2,b^2\right)=\left(\tilde{b}^2,\tilde{a}^2\right). \tag{14.1-17}$$

所以，当 $(a^2,b^2)\neq(\tilde{a}^2,\tilde{b}^2)$ 以及 $(a^2,b^2)\neq(\tilde{b}^2,\tilde{a}^2)$ 时，在曲面 S 和曲面 $\tilde{S}$ 之间不存在等距映射. ■

虽然两维空间的曲率不能决定度量，但在高维空间中有更强的定理描述了曲率与度量间的关系，若读者有兴趣可参阅文献[30].

下面叙述一个较简单的定理.

定理 14.7 设有局部对称的广义黎曼流形 M、N，令 $\mathrm{L}:T_p(M)\to T_q(N)$ 是保持黎曼曲率不变的线性同构等距映射. 则：**(1)** 若 $\mathscr{U}$ 是 p 足够小的法邻域，那么在 $\mathscr{U}$ 上存在唯一的局部等距映射 $\phi:\mathscr{U}\to\mathscr{V}$，它将 $\mathscr{U}$ 映射到 $q=\phi(p)$ 点的法邻域 $\mathscr{V}$ 中，并且 $\phi_{p*}=\mathrm{L}$. **(2)** 若 N 是完备的，则对 p 点任意的法邻域 $\mathscr{U}$，都存在唯一的局部等距 $\phi:\mathscr{U}\to N$ 使得 $\phi_{p*}=\mathrm{L}$.

证明 . 定理中两条内容中的唯一性证明可由命题13.99得到. 本定理主要内容是证明局部等距映射 ϕ 的存在性；其实极映射 $\phi_{\mathrm{L}}:\mathscr{U}\to N$ 就是我们要寻找的那个局部等距映射，令 $\phi=\phi_{\mathrm{L}}$. 因此，我们只需证明极映射是局部等距的，即证明：$\forall p\in\mathscr{U}$，$\forall v\in T_pM$ 有 $\langle v,v\rangle=\langle\phi_{\mathrm{L}*}v,\phi_{\mathrm{L}*}v\rangle=\langle\phi_*v,\phi_*v\rangle$. 我们的想法是使用推论9.29，并证明对应的 Jacobi 场在两个流形中以相同的速率增长. 下面，我们分几步来证明定理.

甲 T_pM 中有邻域 $\widetilde{\mathscr{U}}$，它对应于法邻域 $\mathscr{U}\subset M$. 存在唯一的 $x\in\widetilde{\mathscr{U}}$ 及 $y_x\in T_x(T_pM)$ 使得 $v=\exp_{*p}(y_x)$. 由推论9.29中的式(9.5-14)可得：$\langle v,v\rangle=\langle J(1),J(1)\rangle$，其中 J 是测地线 C_x 上的 Jacobi 场，它的初值是 $J(0)=0$，$J'(0)=y\in T_pM$.

乙 现在来看看 N 中的对应情形. 因 L 是线性的，故 $\mathrm{L}_*(y_x)=(\mathrm{L}y)_{\mathrm{L}x}$. 因此，根据极映射定义，有 $\phi_*(v)=\exp_{*p}\big((\mathrm{L}y)_{\mathrm{L}x}\big)$. 同样，由式(9.5-14)可得：$\langle\phi_*(v),\phi_*(v)\rangle=\big\langle\bar{J}(1),\bar{J}(1)\big\rangle$，其中 $\bar{J}$ 是 N 中的测地线 $C_{\mathrm{L}x}$ 上唯一 Jacobi 场，它使得 $\bar{J}(0)=0$，$\bar{J}'(0)=\mathrm{L}y\in T_q(N)$.

丙 令 $E_1,\cdots,E_m$ 和 $\bar{E}_1,\cdots,\bar{E}_m$ 分别是 C_x 和 $C_{\mathrm{L}x}$ 上的平行移动标架场，并且有 $\mathrm{L}\big(E_i(0)\big)=\bar{E}_i(0)$，$\forall i$. 为简单起见，我们将 E_1（$\bar{E}_1$）选为测地线 C_x（$C_{\mathrm{L}x}$）的切线切矢量. 由于 L 是线性同构的，我们可以认为与 $E_i(0)$ 相关的坐标 x、y

和 $\bar{E}_i(0)$ 相关的坐标 Lx、Ly 是相同的，即认为初始点坐标相同，$x^i(0)=\mathrm{L}x^i(0)$、$y^i(0)=\mathrm{L}y^i(0)$.

如果令 $J(s)=J^i(s)E_i(s)$、$\bar{J}(s)=\bar{J}^i(s)\bar{E}_i(s)$，那么它们满足的方程式为(9.5-7)，即

$$\frac{\mathrm{d}^2J^i(s)}{\mathrm{d}s^2}=R^i_{11j}\big(C_x(s)\big)J^j(s),\ J^i(0)=0,\quad \frac{\mathrm{d}J^i(0)}{\mathrm{d}s}=y^i(0); \tag{14.1-18}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\bar{J}^i(s)}{\mathrm{d}s^2}=\bar{R}^i_{11j}\big(C_{\mathrm{L}x}(s)\big)\bar{J}^j(s),\ \bar{J}^i(0)=0,\ \frac{\mathrm{d}\bar{J}^i(0)}{\mathrm{d}s}=\mathrm{L}y^i(0)=y^i(0). \tag{14.1-19}$$

丁 由定理中的条件可知线性同构 L 保黎曼曲率不变，即有 $R^i_{klj}(0)=\bar{R}^i_{klj}(0)$. 由于 M 是局部对称广义黎曼流形，故由定理14.2第 (3) 条可知：

$$\begin{aligned}R^i_{klj}(s)&=\big\langle R(E_l,E_j)E_k,\ E^{*i}\big\rangle(s)=\big\langle R(E_l,E_j)E_k,\ E^{*i}\big\rangle(0)=R^i_{klj}(0)=\bar{R}^i_{klj}(0)\\&=\big\langle \bar{R}(\bar{E}_l,\bar{E}_j)\bar{E}_k,\ \bar{E}^{*i}\big\rangle(0)=\big\langle \bar{R}(\bar{E}_l,\bar{E}_j)\bar{E}_k,\ \bar{E}^{*i}\big\rangle(s)=\bar{R}^i_{klj}(s).\end{aligned}$$

上式证明中用到了 E_i、$\bar{E}_i$ 沿测地线是平行移动不变的，以及它们的内积沿测地线也是不变的. 这样，便得到了沿测地线 $C_x(s)$、$C_{\mathrm{L}x}(s)$ 的黎曼曲率是相等的：$R^i_{klj}(s)=\bar{R}^i_{klj}(s)$.

戊 M 中 Jacobi 场 J 的分量 $J^i(s)$ 满足方程(14.1-18)，N 中 Jacobi 场 $\bar{J}$ 的分量 $\bar{J}^i(s)$ 满足方程(14.1-19)；因 $R^i_{klj}(s)=\bar{R}^i_{klj}(s)$，故这两个方程本身是相同的；它们的初始条件也是相同的. 因此，从常微分方程组解存在唯一性定理可知：$J^i(s)=\bar{J}^i(s)$，$1\leqslant i\leqslant m$. 综上，可以得到

$$\langle\phi_*(v),\phi_*(v)\rangle=\big\langle\bar{J}(1),\bar{J}(1)\big\rangle=\sum\bar{\eta}_{ij}\bar{J}^i(1)\bar{J}^j(1)=\sum\eta_{ij}J^i(1)J^j(1)=\langle v,v\rangle.$$

其中 η_{ij}、$\bar{\eta}_{ij}$ 是正交归一基矢下 M、N 的度规，它们的对角元是 ±1，非对角元是零；线性等距同构 L 保证了它们相等，即 $\eta_{ij}=\bar{\eta}_{ij}$. 最终证明了极映射 $\phi=\phi_{\mathrm{L}}$ 是局部等距的.

己 关于第 (2) 条. 由于 N 是完备的，故此流形中的任意测地线都可延拓至整个实数轴，也就是说 M 中 p 点任意法邻域 $\mathscr{U}$ 都不会令 N 中对应法邻域 $\mathscr{V}$ 上的测地线没有定义. 故第 (2) 条成立.

需注意 L 是流形切空间T_pM 和 T_qN 间的线性等距同构；而极映射 ϕ_{L} 是流形 M 上 p 点的法邻域 $\mathscr{U}$ 和 N 上 $q=\phi(p)$ 法邻域 $\mathscr{V}$ 间的局部等距同胚. ■

Cartan 等距定理的最初叙述形式与定理14.7相去甚远. 但因定理14.7的证明仍旧主要归功于 Cartan，故仍称定理14.7为 **Cartan 等距定理**. 定理14.7只在局部成立，把它推广到整体情形便是 **Cartan–Ambrose–Hicks 定理**.

定理 14.8 设有广义黎曼流形 M 和 N，它们是完备的、连通的、局部对称的；其中 M 还是单连通的. 如果 $\mathrm{L}: T_pM \to T_qN$ 是保黎曼曲率不变的线性等距同构映射，那么存在唯一的覆叠映射 $\phi: M \to N$ 使得 $\phi_{p*} = \mathrm{L}$.

证明 . 覆叠映射定义见2.86. 证明过程可参考[45]$^{8.17}$或 [68]$^{2.3.11}$. ■

定理 14.9 设有两个 m 维广义黎曼流形 M、N，它们度规号差相同，且两个流形的曲率都是常数 K；则任意点 $p \in \mathscr{U} \subset M$ 和任意点 $q \in \mathscr{V} \subset N$ 间都存在局部等距 $\phi: \mathscr{U} \to \mathscr{V}$.

证明 . 点 $p \in \mathscr{U} \subset M$、$q \in \mathscr{V} \subset N$ 的切空间分别是 T_pM 和 T_qN，$\mathscr{U}$、$\mathscr{V}$ 是法邻域. 已知切空间的维数相同，给 T_pM 选定正交归一基 $e_1, \cdots, e_m$，给 T_qN 选定正交归一基 $\epsilon_1, \cdots, \epsilon_m$. 由定理8.19可知存在等距线性同构 $\mathrm{L}: T_pM \to T_qN$.

又因 M、N 的黎曼曲率都是常数 K，故由定理14.7可知在点 $p \in M$ 法邻域 $\mathscr{U} \subset M$ 和点 $q \in N$ 法邻域 $\mathscr{V} \subset N$ 间存在唯一的局部等距映射 $\phi_{\mathrm{L}}: \mathscr{U} \to \mathscr{V}$.

此定理是在说：在局部等距同构意义下，定理中描述的空间是唯一的；即相同的维数、相同的度规号差、相同的曲率 K 决定了常曲率空间的惟一性. ■

14.2 整体对称空间初步

我们先从正定的欧几里得空间谈起. 设 $\mathbb{R}^m$ 为 m 维欧氏空间，它同时又是一个实线性空间. 在欧氏空间中任取两个不重合的固定点 p 和 q，我们取 $\overrightarrow{pq}$ 的中点为 c，那么 p、q 以点 c 为中心相互对称. 这种描述方式自然不够严谨，下面我们用略微严谨一点的语言来描述这种对称.

对于任意取定的一点 $p \in \mathbb{R}^m$，都有 $\mathbb{R}^m$ 关于点 p 的“中心对称” $\sigma_p: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$，它把任意一点 $q \in \mathbb{R}^m$ 映为点 $q_1 = \sigma_p(q)$，使得有向线段 $\overrightarrow{pq_1} = -\overrightarrow{pq}$. 从几何上来讲，关于点 p 的中心对称 σ_p 就是 $\mathbb{R}^m$ 关于点 p 的反射变换. 如果在 $\mathbb{R}^m$ 中取以点 p 为原点的笛卡尔直角坐标系 $\{x^i\}$，则上面引入的关于点 p 的中心对

称 σ_p 可以用坐标表示为：

$$\sigma_p\left(x^1,\cdots,x^m\right)=\left(-x^1,\cdots,-x^m\right).$$

可以总结出，中心对称 σ_p 具有下列性质：

(1) σ_p 是等距变换.

(2) $\sigma_p\circ\sigma_p=\mathrm{id}$，即 σ_p 是 $\mathbb{R}^m$ 上的一个对合变换.

(3) p 是 σ_p 的孤立不动点，即 $\sigma_p(p)=p$，并且在点 p 的一个邻域内除点 p 以外 σ_p 没有其他不动点.

我们已经总结出欧几里得空间对称需满足上述三条属性，下面把它们推广到广义黎曼流形上.

定义 14.10 设 M 是连通广义黎曼流形，$p\in M$，若有映射 $\sigma_p:M\to M$ 满足：

(1) σ_p 是广义黎曼流形 M 到它自身的等距变换；

(2) σ_p 是**对合**映射（involution），即 $\sigma_p\circ\sigma_p=\mathrm{id}$；

(3) p 是 σ_p 的孤立不动点，即 $\sigma_p(p)=p$，并且存在点 p 的一个邻域 U 使得 σ_p 在 U 内除点 p 以外，σ_p 没有其他不动点.

则称映射 σ_p 是 M 关于点 p 的**中心对称**，p 是 M 的**对称中心**.

定义 14.11 若广义黎曼流形 (M,g) 中每一点都是对称中心，则称 M 是**广义黎曼整体对称空间**（globally symmetric space），简称**对称空间**.

“整体”（或全局）二字的目的之一是为了区分“局部”对称14.1；在不引起混淆的情形下我们只用“对称空间”这个术语；而“局部对称”则不作任何省略.

例 14.12 正定欧几里得空间 $\mathbb{R}^m$ 是黎曼整体对称空间.

例 14.13 正定 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中 m 维单位球面 S^m.

设 S^m 是 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中以原点 O 为中心的单位球面，定义可见4.10. $\forall p\in S^m$，用 $\tilde{\sigma}_p$ 记 $\mathbb{R}^{m+1}$ 关于直线 Op 的对称，即 $\forall q\in\mathbb{R}^{m+1}$，$q_1=\tilde{\sigma}_p(q)$ 满足条件

$$\overrightarrow{Oq_1}=-\overrightarrow{Oq}+2\langle\overrightarrow{Oq},\overrightarrow{Op}\rangle\overrightarrow{Op},\tag{14.2-1}$$

则 $\tilde{\sigma}_p$ 是 $\mathbb{R}^{m+1}$ 到它自身的等距变换，并把 S^m 映到它自己.

令 $\sigma_p=\tilde{\sigma}_p|_{S^m}$，则 $\sigma_p:S^m\to S^m$ 仍是等距变换，且 $\sigma_p(p)=p$. 可验证 $\sigma_p\circ\sigma_p=\mathrm{id}$，故 σ_p 是对合的. 因 $\tilde{\sigma}_p$ 以直线 Op 为不动点集，故 σ_p 的不动点是 Op 与 S^m 的交点，也就是 p 点和其对径点 $-p$，因而 p 是 σ_p 的孤立不动点. 所以 σ_p 是 S^m 的关于点 p 的中心对称；因 p 是任选的，故 S^m 是对称空间. ■

定理 14.14 设 M 是广义黎曼整体对称空间，σ_p 是 M 关于点 $p\in M$ 的中心对称，则 $(\sigma_p)_{*p}=-\mathrm{id}\ :\ T_pM\to T_pM$.

证明 . 对称中心 p 是 σ_p 的孤立不动点. 因 $\sigma_p(p)=p$，故它的切映射 $(\sigma_p)_{*p}$ 是 T_pM 到它自身的等距线性同构. 由 $\sigma_p\circ\sigma_p=\mathrm{id}$ 可知 $(\sigma_p)_{*p}\circ(\sigma_p)_{*p}=\mathrm{id}$，即 $(\sigma_p)_{*p}$ 也是对合的. 令

$$V^+=\left\{v\in T_pM\mid (\sigma_p)_{*p}(v)=v\right\},\quad V^-=\left\{v\in T_pM\mid (\sigma_p)_{*p}(v)=-v\right\},$$

显然有 $V^+\cap V^-=\{0\}$.$\forall v\in T_pM$,利用 $(\sigma_p)_{*p}$ 的对合性容易看出 $v+(\sigma_p)_{*p}v\in V^+$，$v-(\sigma_p)_{*p}v\in V^-$. 因 $v=\frac{1}{2}\big(v+(\sigma_p)_{*p}(v)\big)+\frac{1}{2}\big(v-(\sigma_p)_{*p}(v)\big)$，故 $T_pM=V^+\oplus V^-$，并且 $V^\pm$ 是 $(\sigma_p)_{*p}$ 的不变子空间.

下面用反证法证明 $V^+=\{0\}$. 如若不然，则有 $v\in V^+$ 且 $v\neq 0$；考虑测地线 $\gamma(t)=\exp_p(tv)$. 由于 σ_p 是等距映射，故从定理8.36可知 $\sigma_p\big(\gamma(t)\big)$ 仍是 M 上一条测地线. 它的起始点和初始切矢量分别是：

$$\begin{aligned}\sigma_p\big(\gamma(0)\big)=&\sigma_p(p)=p=\gamma(0),\\ \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}\Big(\sigma_p\big(\gamma(t)\big)\Big)=&(\sigma_p)_{*p}\big(\gamma'(0)\big)=(\sigma_p)_{*p}(v)=v=\gamma'(0).\end{aligned}$$

因测地线是由其起始点和初始切矢量唯一确定的，所以有 $\sigma_p\big(\gamma(t)\big)=\gamma(t)$. 这说明 $\gamma(t)$ 上的点都是 σ_p 的不动点，与 p 是 σ_p 的孤立不动点相矛盾.

由此可见，$T_pM=V^-$，即 $(\sigma_p)_{*p}=-\mathrm{id}:T_pM\to T_pM$. ■

从上面的证明过程不程看出，σ_p 把每一条经过点 p 的测地线反向，即

$$\sigma_p\big(\exp_p(tv)\big)\xlongequal[13.78]{\text{定理}}\exp_p\big(t(\sigma_p)_{*p}v\big)=\exp_p(-tv).\tag{14.2-2}$$

指数映射本身就是测地线,为使公式简单令 $\gamma(t)=\exp_p(tv)$,则上式成为 $\sigma_p\big(\gamma(t)\big)=\gamma(-t)$. 设 $(U;x^i)$ 是点 p 处的法坐标系，则测地线 $\gamma(t)$ 的参数方程为

$$x^i(t)=x^i\big(\gamma(t)\big)=x^i\big(\exp_p(tv)\big)=tv^i.\tag{14.2-3}$$

因而 $\gamma(-t)$ 的参数方程是 $x^i(-t)=x^i\big(\gamma(-t)\big)=-tv^i=-x^i(t)$；故(14.2-2)为

$$\sigma_p\big(x^1(t),\cdots,x^m(t)\big)=\big(-x^1(t),\cdots,-x^m(t)\big).\tag{14.2-4}$$

上式便是中心对称 σ_p 在法坐标系 $(U;x^i)$ 的表达式.

局部对称空间定义14.1与整体对称空间定义14.11表观上来看相去甚远；其实局部对称空间也有类似于整体对称空间的叙述，请见下述定理.

定理 14.15 设 M 是局部对称黎曼空间，则 $\forall p\in M$，都有点 p 的一个开邻域 U 以及局部光滑等距 $\sigma_p:U\to U$，使得 $\sigma_p\circ\sigma_p=\mathrm{id}$ 是对合，并且以 p 为其唯一的不动点（这样的映射 σ_p 称为 M 关于点 p 的**局部中心对称**）.

证明 . 设 $p\in M$，取小正数 ε 使得指数映射 $\exp_p$ 在 $B_p(\varepsilon)\subset T_pM$ 上有定义，且 $\exp_p:B_p(\varepsilon)\to\mathscr{B}_p(\varepsilon)=\exp_p\big(B_p(\varepsilon)\big)$ 是光滑同胚；$B_p(\varepsilon)$、$\mathscr{B}_p(\varepsilon)$ 定义见第318页的式(9.4-14)、式(9.4-15). 令

$$\mathrm{L}=-\mathrm{id}:T_pM\to T_pM,\quad \sigma_p=\exp_p\circ\mathrm{L}\circ\exp_p^{-1}:\mathscr{B}_p(\varepsilon)\to\mathscr{B}_p(\varepsilon).\tag{14.2-5}$$

显然 L 是保曲率不变的. 则 σ_p 是从 $\mathscr{B}_p(\varepsilon)$ 到它自身的光滑同胚，以 p 为该邻域内仅有的不动点，并且 $\sigma_p\circ\sigma_p=\mathrm{id}:\mathscr{B}_p(\varepsilon)\to\mathscr{B}_p(\varepsilon)$. 根据定理14.5知 $\mathrm{L}=(\sigma_p)_{*p}$；取 $U=\mathscr{B}(\varepsilon)$，由 Cartan 等距定理14.7可知 σ_p 是 $U=\mathscr{B}_p(\varepsilon)$ 上局部等距映射.

式(14.2-4)指出，对称将测地线反向只在 p 点成立，本定理将其延拓至 p 点法邻域球 $\mathscr{B}_p(\varepsilon)$ 内成立；沿测地线任一点都是反向对称的正是“局部对称”的几何诠释. 需要指出的是：测地线反向对称是将测地线映射成自身的，从(14.2-11)式能更明显地看出此点. ■

定理 14.16 设 M 是广义黎曼整体对称空间，则 M 是局部对称的.

证明 . 设 R 是 M 的黎曼曲率张量，只需证明 $\forall V\in\mathfrak{X}(M)$ 有 $\nabla_V R=0$.

由协变导数定义知 R 和 $\nabla_V R$ 都是 $\binom{1}{3}$ 型张量场；$\forall X,Y,Z\in\mathfrak{X}(M)$ 有

$$\begin{aligned}(\nabla_V R)(X,Y)Z=&\nabla_V\big(R(X,Y)Z\big)-R(\nabla_V X,Y)Z\\&-R(X,\nabla_V Y)Z-R(X,Y)\nabla_V Z.\end{aligned}\tag{14.2-6}$$

设 σ 等距变换，则由定理8.35中式(8.4-16)可得

$$\sigma_*\big(R(X,Y)Z\big)=R\big((\sigma_*X),(\sigma_*Y)\big)(\sigma_*Z).\tag{8.4-16}$$

结合式(14.2-6)和(8.4-16)可以得到

$$(\nabla_{\sigma_*V}R)(\sigma_*X,\sigma_*Y)(\sigma_*Z)=\nabla_{\sigma_*V}\big(R(\sigma_*X,\sigma_*Y)(\sigma_*Z)\big)-R\big(\nabla_{\sigma_*V}(\sigma_*X),\sigma_*Y\big)\sigma_*Z$$

$$
\begin{aligned}
&\quad - R\big(\sigma_*X, \nabla_{\sigma_*V}(\sigma_*Y)\big)\sigma_*Z - R(\sigma_*X, \sigma_*Y)\big(\nabla_{\sigma_*V}(\sigma_*Z)\big) \\
&= \nabla_{\sigma_*V}\Big(\sigma_*\big(R(X,Y)Z\big)\Big) - \sigma_*\big(R(\nabla_V X, Y)Z\big) - \sigma_*\big(R(X, \nabla_V Y)Z\big) - \sigma_*\big(R(X,Y)\nabla_V Z\big) \\
&= \sigma_*\big((\nabla_V R)(X,Y)Z\big).
\end{aligned}
$$

即对于任意的 $X, Y, Z, V \in \mathfrak{X}(M)$，有

$$
\sigma_*^{-1} \circ \big((\nabla_{\sigma_*V} R)(\sigma_*X, \sigma_*Y)(\sigma_*Z)\big) = (\nabla_V R)(X,Y)Z. \tag{14.2-7}
$$

注意到 $(\nabla_V R)(X,Y)Z$ 关于四个自变量 $X, Y, Z, V \in \mathfrak{X}(M)$ 都是 $C^\infty(M)$-线性的，故 ∇R 是 M 上 $\binom{1}{4}$ 型光滑张量场．特别地，$\forall p \in M$ 及 $\forall X, Y, Z, V \in T_pM$，$(\nabla_V R)(X,Y)Z$ 是有定义的，并且是 T_pM 中的一个成员．取 $\sigma = \sigma_p$，则 $\sigma_{*p} = (\sigma_p)_{*p} = -\mathrm{id} : T_pM \to T_pM$；于是式(14.2-7)成为

$$
(\nabla_V R)(X,Y)Z = -(\nabla_V R)(X,Y)Z, \quad \forall X, Y, Z, V \in T_pM. \tag{14.2-8}
$$

上式中那个负号是这样得来的：σ_*^{-1} 和 σ_* 在 $X, Y, Z, V \in T_pM$ 上分别产生一个负号，两者相消了；$(\nabla_V R^a_{bcd})(X^c, Y^d)Z^b$ 也是一个切矢量（上指标 a），σ_*^{-1} 在它上面生成了这个负号．故 $(\nabla_V R)(X,Y)Z = 0$, $\forall X, Y, Z, V \in T_pM$；因 X, Y, Z, V 的任意性，可得 $\nabla R = 0$；这便证明了 M 是局部对称的． ■

整体对称空间必是局部对称空间，反之未必；因局部对称空间未必是测地完备的．然而有如下命题：

定理 14.17 *广义黎曼整体对称空间 M 是测地完备的．*

证明 . 证明 M 上测地线可延拓至整个实数轴即可；主要是运用定理14.15思想．在区间 $[0, l]$ 内部 l 点附近选择 q，设 σ_q 为 $\gamma(q)$ 处的整体中心对称映射．由式(14.2-4)可知 σ_q 通过 $\gamma(q)$ 反转测地线，$\sigma_q \circ \gamma$ 的重参数化将 γ 延拓至 l 之外；重复这个过程可将原 $[0, l]$ 延拓至整个实数轴．具体操作如下．

设 $\gamma(t)$, $0 \leqslant t \leqslant l$，是从 $p = \gamma(0)$ 出发的任意一条正规测地线，长度为 l．令 $q = \gamma(\frac{2}{3}l)$，$v = \gamma'(\frac{2}{3}l) \in T_qM$．用 σ_q 表示 M 关于点 q 的中心对称，则 $\sigma_q\big(\gamma(t)\big)$ 仍然是 M 上的一条正规测地线，并且

$$
\sigma_q\left(\gamma\left(\frac{2}{3}l\right)\right) = \sigma_q(q) = q.
$$

对测地线 $\sigma_q\big(\gamma(t)\big)$ 作参数变换 $t=\frac{4}{3}l-s$, $\frac{1}{3}l\leqslant s\leqslant\frac{4}{3}l$；并设

$$\tilde{\gamma}(s)=\sigma_q\left(\gamma\left(\frac{4}{3}l-s\right)\right),\qquad \frac{1}{3}l\leqslant s\leqslant\frac{4}{3}l. \tag{14.2-9}$$

则 $\tilde{\gamma}(s)$ 是 M 上的正规测地线，并且有

$$\begin{aligned}
\tilde{\gamma}\left(\frac{2}{3}l\right)=&\sigma_q\left(\gamma\left(\frac{2}{3}l\right)\right)=\gamma\left(\frac{2}{3}l\right)=q,\\
\tilde{\gamma}'\left(\frac{2}{3}l\right)=&(\sigma_q)_{*q}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\gamma\left(\frac{4}{3}l-s\right)\Big|_{s=\frac{2}{3}l}\right)=(\sigma_q)_{*q}\left(-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\gamma(t)\Big|_{t=\frac{2}{3}l}\right)\\
=&(\sigma_q)_{*q}\left(-\gamma'\left(\frac{2}{3}l\right)\right)=\gamma'\left(\frac{2}{3}l\right).
\end{aligned}$$

这意味着测地线 γ 和 $\tilde{\gamma}$ 都经过点 $q=\gamma(\frac{2}{3}l)$，且在该点有相同的切矢量 $\gamma'(\frac{2}{3}l)$. 故，由测地线的唯一性可知：γ 和 $\tilde{\gamma}$ 在公共的定义域内是重合的. 特别地有 $\gamma(t)=\tilde{\gamma}(t)$, $\frac{1}{3}l\leqslant t\leqslant l$. 于是可以定义新的映射 $\gamma_1:\big[0,\frac{4}{3}l\big]\to M$，使得

$$\gamma_1(t)=\begin{cases}\gamma(t), & 0\leqslant t\leqslant l;\\ \tilde{\gamma}(t), & \frac{1}{3}l\leqslant t\leqslant\frac{4}{3}l.\end{cases} \tag{14.2-10}$$

则 $\gamma_1(t)$ 是在 M 上从点 p 出发、长度为 $\frac{4}{3}l$ 的正规测地线. 显然 $\gamma_1(t)$ 是测地线 γ 的延拓. 继续此过程，测地线 γ 能够延伸至整个实数轴；故 M 是测地完备的广义黎曼流形. ■

从定理14.17的证明过程可以看出：设 $\gamma(t)(-\infty<t<\infty)$ 是广义黎曼流形 (M,g) 上一条测地线，任意取定 $t_0\in(-\infty,\infty)$，并令 $q=\gamma(t_0)$；则中心对称 σ_q 将测地线 γ 映射到它自身，同时 σ_q 在 γ 上的限制是 γ 关于点 q 的对称，即

$$\sigma_q\big(\gamma(2t_0-t)\big)=\gamma(t)\quad\Leftrightarrow\quad\sigma_q\big(\gamma(t_0-t)\big)=\gamma(t_0+t). \tag{14.2-11}$$

命题 14.18 测地完备、单连通、局部对称、广义黎曼流形 M 是整体对称的.

证明 . 见[45]命题 8.21，或[25]定理 4.5.6. ■

定理 14.19 设 (M,g) 是广义黎曼整体对称空间，$\gamma(t)(-\infty<t<\infty)$ 是 M 上一条正规测地线. 定义映射 $\varphi:\mathbb{R}\to I(M)$，使得 $\forall t\in\mathbb{R}$，$\varphi(t)=\sigma_{\gamma(\frac{t}{2})}\circ\sigma_{\gamma(0)}$，其中 $\sigma_{\gamma(0)}$、$\sigma_{\gamma(\frac{t}{2})}$ 分别是 M 关于 $\gamma(0)$ 和 $\gamma(\frac{t}{2})$ 的中心对称. 若记 $\varphi_t\equiv\varphi(t)$，则

(1) $\varphi_t\big(\gamma(s)\big)=\gamma(s+t)$;

(2) $(\varphi_t)_{*\gamma(s)}: T_{\gamma(s)}M\to T_{\gamma(s+t)}M$ 是沿测地线 γ 的平行移动;

(3) $\{\varphi_t;\ -\infty<t<\infty\}$ 是 $I(M)$ 单参数子群; φ_t 自然诱导出 Killing 场.

证明 . (1) 根据式(14.2-11)前面的讨论可知: $\sigma_{\gamma(0)}$ 在 γ 上的作用是 γ 关于点 $\gamma(0)$ 的对称, $\sigma_{\gamma(\frac{t}{2})}$ 在 γ 上的作用是 γ 关于点 $\gamma(\frac{t}{2})$ 的对称, 即有

$$\sigma_{\gamma(0)}\big(\gamma(s)\big)=\gamma(-s),\quad \sigma_{\gamma(\frac{t}{2})}\big(\gamma(s)\big)=\gamma(t-s),\quad \forall s\in(-\infty,\infty). \tag{14.2-12}$$

所以有

$$\varphi_t\big(\gamma(s)\big)=\sigma_{\gamma(\frac{t}{2})}\circ\sigma_{\gamma(0)}\big(\gamma(s)\big)=\sigma_{\gamma(\frac{t}{2})}\big(\gamma(-s)\big)=\gamma(t+s). \tag{14.2-13}$$

由此可见, φ_t 在测地线 γ 上的作用是沿测地线 γ 的位移.

(2) 设 X 是任意一个沿测地线 γ 平行移动不变的切矢量场. 取任意固定 $\tau\in(-\infty,\infty)$, 则 $\sigma_{\gamma(\tau)}: M\to M$ 是等距变换, 并且

$$\sigma_{\gamma(\tau)}\big(\gamma(s)\big)\overset{14.2-11}{=\!=\!=}\gamma(2\tau-s),\quad \forall s\in(-\infty,\infty). \tag{14.2-14}$$

因此, 存在等距线性同构 $(\sigma_{\gamma(\tau)})_{*\gamma(s)}: T_{\gamma(s)}M\to T_{\gamma(2\tau-s)}M$ 使得

$$(\sigma_{\gamma(\tau)})_{*\gamma(s)}\big(\gamma'(s)\big)=-\gamma'(2\tau-s),\quad \forall s\in(-\infty,\infty). \tag{14.2-15}$$

令
$$\tilde{X}(2\tau-s)\equiv\big(\sigma_{\gamma(\tau)}\big)_{*\gamma(s)}\big(X(s)\big),\quad \forall s\in\mathbb{R}, \tag{14.2-16}$$

则 $\tilde{X}$ 是沿测地线 γ 定义的切矢量场. 由于等距变换 $\sigma_{\gamma(\tau)}$ 保持 Levi-Civita 联络不变 (见定理8.29), 故由上两式得到

$$\nabla_{\gamma'(2\tau-s)}\tilde{X}=-\nabla_{(\sigma_{\gamma(\tau)})_{*\gamma(s)}(\gamma'(s))}\big((\sigma_{\gamma(\tau)})_{*\gamma(s)}X\big)=-(\sigma_{\gamma(\tau)})_{*\gamma(s)}(\nabla_{\gamma'(s)}X)=0,$$

所以 $\tilde{X}$ 仍然是沿 γ 平行的切矢量场. 因为在 τ 处有

$$\tilde{X}(\tau)=(\sigma_{\gamma(\tau)})_{*\gamma(\tau)}\big(X(\tau)\big)=-X(\tau), \tag{14.2-17}$$

故, 由 $\tilde{X}$、X 沿 γ 的平行性得到 $\tilde{X}(t)=-X(t),\forall t\in\mathbb{R}$, 再利用(14.2-16)得知

$$(\sigma_{\gamma(\tau)})_{*\gamma(s)}\big(X(s)\big)=\tilde{X}(2\tau-s)=-X(2\tau-s),\quad \forall\tau,s. \tag{14.2-18}$$

由此得到

$$(\varphi_t)_{*\gamma(s)}\big(X(s)\big)=(\sigma_{\gamma(\frac{t}{2})})_{*\gamma(-s)}\circ(\sigma_{\gamma(0)})_{*\gamma(s)}\big(X(s)\big)=(\sigma_{\gamma(\frac{t}{2})})_{*\gamma(-s)}\big(-X(-s)\big)=X(t+s).$$

这意味着 $(\varphi_t)_{*\gamma(s)}:T_{\gamma(s)}M\to T_{\gamma(s+t)}M$ 是沿测地线 γ 的平行移动.

(3) 由命题13.99可知 M 到它自身的等距变换是由它在任意一点的像以及在该点的切映射唯一确定的. 现在 $\varphi_t\circ\varphi_s$ 和 φ_{t+s} 都是 M 到它自身的等距变换, 所以要证明它们是同一个等距变换, 只要验证它们在点 $\gamma(0)$ 的像及其在点 $\gamma(0)$ 的切映射分别相同就可以了. 事实上, 由 (1) 得到

$$\varphi_t\circ\varphi_s\big(\gamma(0)\big)=\varphi_t\big(\gamma(s)\big)=\gamma(t+s)=\varphi_{t+s}\big(\gamma(0)\big). \tag{14.2-19}$$

再由 (2) 得到 $(\varphi_{t+s})_{*\gamma(0)}:T_{\gamma(0)}M\to T_{\gamma(t+s)}M$ 是沿测地线 γ 的平行移动. 此外

$$(\varphi_t\circ\varphi_s)_{*\gamma(0)}=(\varphi_t)_{*\gamma(s)}\circ(\varphi_s)_{*\gamma(0)}, \tag{14.2-20}$$

而 $(\varphi_s)_{*\gamma(0)}$ 和 $(\varphi_t)_{*\gamma(s)}$ 依次是沿测地线 γ 从 $T_{\gamma(0)}M$ 到 $T_{\gamma(s)}M$ 以及从 $T_{\gamma(s)}M$ 到 $T_{\gamma(t+s)}M$ 的平行移动. 所以由平行移动的传递性得知

$$(\varphi_t\circ\varphi_s)_{*\gamma(0)}=(\varphi_{t+s})_{*\gamma(0)}. \tag{14.2-21}$$

因此 $\varphi_t\circ\varphi_s=\varphi_{t+s}$; 这是单参数子群的主要特征. 再有 $\varphi_0=\sigma_{\gamma(0)}\circ\sigma_{\gamma(0)}=\mathrm{id}$, 因此 $\varphi_t\circ\varphi_{-t}=\varphi_0=\mathrm{id}$; 故有 $\varphi_{-t}=(\varphi_t)^{-1}$. 所以 $\{\varphi_t;\ -\infty<t<\infty\}$ 是 M 等距群 $I(M)$ 的单参数子群; 单参数等距子群 φ_t 的切线切矢量是 Killing 场. ■

14.3 齐性空间

14.3.1 基本属性

定义 14.20 设 (M,g) 是广义黎曼流形, 存在左(或右)作用在 M 的可迁的李变换群 G; 如果 G 还是等距群 $I(M)$ 的子群, 则称 M 是**均匀空间**或**齐性空间**(Homogeneous).

在纯数学上, 齐性空间的定义一般并不要求 G 是等距群. 本书是给物理学写的, 故要求 G 是等距群. 后文中, 如无明显标识, 皆指物理上的齐性空间, 即要求 G 是等距群.

定义 14.21 设 (M,g) 是广义黎曼流形，$p\in M$. 对于任意非零矢量 $v,w\in T_pM$，如果有 $\langle v,v\rangle=\langle w,w\rangle$ 成立，那么就存在等距映射 $\phi\in I(M)$ 使得 $\phi_*v=w$；此时，称 p 点是**各向同性的**. 若 M 上任意点都是各向同性的，则称 M 是**各向同性空间**（isotropic space）.

齐性空间是一类十分重要的光滑流形，许多常见的空间都是齐性空间.

例 14.22 m 维欧氏空间 E^m 是齐性空间.

需要指出的是：E^m 是点的空间，$\mathbb{R}^m$ 是矢量空间.

E^m 中任意两点 x,y，很明显可以通过平移操作使它们重合，即 $y=\boldsymbol{T}\cdot x$，$\boldsymbol{T}$ 是平移群中的元素. 平移操作构成李群，可看作是左作用在 E^m 上的李变换群；这说明了 E^m 是可迁的，故它是齐性空间. ■

例 14.23 单位球面 $S^2\in\mathbb{R}^3$ 是齐性空间.

我们已知二维球面 S^2 的等距群是 $O(3)$. 根据欧拉定理13.96可知 $O(3)$ 子群 $SO(3)$ 是绕某轴转动某个角度的操作；单位球面 S^2 上任意一点和原点相连是一个单位矢量；根据 §13.10.4.2可知：通过三次欧拉角的转动可将单位矢量旋转到任意角度. 这便说明了通过三次转动可将二维单位球面上任意两点都联系起来，即单位球面是可迁的，李变换群是 $SO(3)$；故单位球面 S^2 是齐性空间. 一般情形见 §14.3.3. ■

命题 14.24 广义黎曼整体对称空间 (M,g) 是广义黎曼均匀空间.

证明 . 设 $\gamma:[-1,1]\to M$ 为测地线. 由定理14.15可设 σ_0 是一个关于点 $\gamma(0)$ 的反向测地线的等距映射，σ_0 将 $\gamma(-1)$ 对称成 $\gamma(+1)$. 因对称空间定义要求 M 必须是连通的，故 $\forall p,q\in M$，都可以被一条分段测地线连接起来. 因此通过有限的、如上所述等距映射 σ_0 的组合可以得到从 p 到 q 的等距，记为 σ. σ 便是 M 的可迁的等距群. ■

度规正定的黎曼均匀空间是完备的；度规不定的黎曼均匀空间可能完备，也可能不完备；证明可见[45]$^{9.37}$. 因广义均匀空间未必完备，故它也未必是广义黎曼整体对称空间. 对于度规不定的黎曼空间，Marsden [36]证明了如下定理：

定理 14.25 若 M 是紧致、广义黎曼齐性空间，则 M 是测地完备的.

命题 14.26 广义黎曼均匀空间的任意切矢量都可以延拓成 Killing 切矢量场.

证明 . 可参考[45]推论 9.38. ■

命题 14.27 若广义黎曼流形是各向同性空间，则它是整体对称空间且测地完备.

证明 . 因 M 是各向同性的，故可以令 M 上任意点的任意测地线反向，此反向是等距操作，符合定义14.10中的要求，故 M 必然是整体对称空间. 由定理14.17可知其测地完备. ■

命题 14.28 若广义黎曼流形 M 是连通各向同性空间，则 M 是均匀空间.

证明 . 由命题14.27可知 M 是整体对称空间，再由命题14.24可知其均匀. ■

强各向同性流形 定义14.21给出了各向同性流形的定义，还有一个性质更强的定义. 对于广义黎曼流形 (M,g) 来说，§7.7.1给出了正交切标架丛 $\mathcal{O}(TM)$ 的定义；对于任意点 $p,q\in M$，在 T_pM 和 T_qM 上任意各选一个正交归一切标架（它们自然属于 $\mathcal{O}(TM)$），如果存在等距映射 $\phi\in I(M)$ 将两个正交切标架同构，那么称 M 是**强各向同性流形**（strongly isotropic; 或 frame-homogeneous ）.

强各向同性流形是完备的齐性流形.（[68]引理 11.6.6）

强各向同性流形等价于它是各向同性的、且是常曲率的.（[68]推论 11.6.10）

强各向同性流形的等距群具有最高的对称性.（[68]定理 11.6.7、11.6.8）

14.3.2 陪集流形

定理 14.29 设 G 为李群，H 为 G 的闭子群，令 $G/H\equiv\{gH\mid\forall g\in G\}$ 是 H 的左陪集空间；再设 $\pi(g)=gH$ 是从 G 到 G/H **自然投影映射**. 那么：**(1)** G/H 上存在一个唯一的微分结构，使之成为光滑流形，称 G/H 是**陪集流形**；**(2)** π 是 C^∞ 的淹没映射；**(3)** G 是 G/H 的李变换群；**(4)** $\dim G=\dim H+\dim G/H$.

证明 . 请参考[25]定理 2.4.2；或[63]定理 3.58；或[68]§1.5定理 1.5.6. 若还要求 H 是正规闭子群（见2.11），则还可证明（[63]定理 3.64）G/H 是李群. ■

例 14.30 G 左作用在 G/H 上总是可迁的.

由定理14.29可知 G 是作用在 G/H 上的李变换群；设有 G/H 中任意两个元素 gH 和 $g'H$，其中 $g,g'\in G$；那么，因为 $g'g^{-1}\in G$ 使得 $(g'g^{-1})(gH)=g'H$ 成立；所以 G/H 是（纯数学上）可迁的. ■

定理 14.31 设 M 是一个 m 维广义齐性流形，G 是可迁地左作用在 M 上的李变换群. 任意取定一点 $x\in M$，再取 G 的迷向子群 K_x（定义见13.127）. 则有：**(1)** K_x 是 G 的闭子群；**(2)** M 与光滑流形 G/K_x 是光滑同胚的，记为 $\jmath: G/K_x\to M$；**(3)** G/K_x 是齐性流形.

证明 . 前两条证明请参考[25]定理 2.4.3，或[63]定理 3.62. 由例14.30可知：G 可迁地作用在 G/K_x 上；故 G/K_x 是纯数学上的齐性流形. ■

定理14.31表明：齐性流形 M 可以由流形 G/K_x 来确定，我们可以通过研究李变换群 G 和迷向子群 K_x 来描述齐性流形 M. 定理14.31中的光滑同胚映射是一个**自然映射**，它将 gK_x 变成 $g\cdot x$；具体表达为

$$\jmath(gK_x)\overset{def}{=} g\cdot x,\qquad \forall g\in G,\quad \forall x\in M. \tag{14.3-1}$$

上述定义的自变宗量是左陪集，不是元素 g；可以这样验证. 如果有 $g'\in gK_x$，则必然存在 $k\in K_x$ 使得 $g'=gk$ 成立；故有 $g'\cdot x=gk\cdot x=g\cdot x\in M$.

定理13.134表明式(13.14-12)（G 的核 K）是正规闭子群，故 G/K 是李群.

14.3.3 标准球面例子

实数域 由命题14.37可知标准球面 $S^m(1)$ 的等距群是 $O(m+1)$；由例题13.121可知可以把 $GL(m+1,\mathbb{R})$ 看成左作用在 $\mathbb{R}^{m+1}$ 上的李变换群. 而 $O(m+1)$ 是 $GL(m+1,\mathbb{R})$ 的闭李子群，$S^m(1)$ 是 $\mathbb{R}^{m+1}$ 的闭子集；故可以得到 $O(m+1)$ 是左作用在 $S^m(1)$ 上的可迁的等距群，验证过程大致如下. 为此，我们先验证 $GL(m+1,\mathbb{R}):\mathbb{R}^{m+1}\to\mathbb{R}^{m+1}$ 是双射；对于 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中任意两个非零矢量 $y=(y^1,\cdots,y^{m+1})^T$、$x=(x^1,\cdots,x^{m+1})^T$，因 $\forall A\in GL(m+1,\mathbb{R})$ 是可逆矩阵，它必然是单射，由命题3.23可知它还是满射，故是双射；因此必然存在一个可逆矩阵 A 使得 $y=A\cdot x$ 成立. 也就是说 $GL(m+1,\mathbb{R})$ 可迁的左作用在 $\mathbb{R}^{m+1}$ 上. 当我们把 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中矢量限制在单位球面上时，就得到 $S^m(1)$；矩阵 A 也被限制在 $O(m+1)$ 中了，同时 A 仍是可迁的. 也就是说标准球面 S^m 是均匀流形，其左作用等距群是 $O(m+1)$.

$O(m+1)$ 中具有如下形式

$$A=\begin{pmatrix}(\tilde{A}) & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & 1\end{pmatrix} \tag{14.3-2}$$

的矩阵的集合构成 $O(m+1)$ 的一个闭子集，出现在上式中的矩阵 $\tilde{A}$ 恰好是 $O(m)$ 中的矩阵，所以 $O(m)$ 作为这个自然的闭子群就在 $O(m+1)$ 中．不难判断 $(0,\cdots,0,1)\in S^m$ 的迷向子群是形如式(14.3-2)的矩阵（本质上是 $O(m)$），由定理14.31可知 $O(m+1)/O(m)$ 微分同胚于齐性流形 S^m，即（见式(14.3-1)，注意 $\jmath$ 是光滑双射）

$$\jmath^{-1}(S^m)=O(m+1)/O(m)=SO(m+1)/SO(m). \tag{14.3-3}$$

上式在忽略掉正交群行列式正负号前提下成立．

复数域 与实数域类似，我们讨论复数域上的情形．以把 $GL(m+1,\mathbb{C})$ 看成左作用在 $\mathbb{C}^{m+1}$ 上的李变换群．而 $U(m+1)$ 是 $GL(m+1,\mathbb{C})$ 的闭李子群，$S^{2m+1}(1)$ 是 $\mathbb{C}^{m+1}$ 的闭子集；经过类似过程可以得到 $U(m+1)$ 是左作用在 S^{2m+1} 上的可迁的等距群．

$U(m+1)$ 中具有如下形式

$$B=\begin{pmatrix}(\tilde{B}) & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & 1\end{pmatrix} \tag{14.3-4}$$

的矩阵的集合构成 $U(m+1)$ 的一个闭子集，出现在上式中的矩阵 $\tilde{B}$ 恰好是 $U(m)$ 中的矩阵，所以 $U(m)$ 作为这个自然的闭子群就在 $U(m+1)$ 中．不难判断 $(0,\cdots,0,1)\in S^{2m+1}$ 的迷向子群是形如式(14.3-4)的矩阵（本质上是 $U(m)$），由定理14.31可知 $U(m+1)/U(m)$ 微分同胚于齐性流形 S^{2m+1}，即

$$\jmath^{-1}(S^{2m+1})=U(m+1)/U(m)=SU(m+1)/SU(m). \tag{14.3-5}$$

上式在忽略掉幺正群行列式位相前提下成立．特别地，由于 $SU(1)$ 是 1×1 的单位矩阵，故 S^3 光滑同胚于 $SU(2)$；进而 S^3 具有与 $SU(2)$ 相同的李群结构．

更多例子请参考[45]§11.14-11.20和[63]3.65．

14.4 空间型式

我们先叙述一下广义黎曼覆叠流形的概念．设有广义黎曼流形 (M,g) 和单连通C^∞ 流形 $\widetilde{M}$，如果 $\pi:\widetilde{M}\to M$ 是覆叠映射（定义见2.86），那么 π 必是局

部微分同胚的；所以可以把 $\tilde{g}=\pi^*(g)$ 看成 $\widetilde{M}$ 上的度规场，称为 $\widetilde{M}$ 上的**覆叠度规场**．于是 $(\widetilde{M},\tilde{g})$ 成为广义黎曼流形，并且覆叠映射 $\pi:(\widetilde{M},\tilde{g})\to(M,g)$ 是局部等距同胚的．此时，称 $(\widetilde{M},\tilde{g})$ 是 (M,g) 的**广义黎曼覆叠空间**．再次提醒：复叠空间是单连通的．

定义 14.32 单连通、完备的、常曲率广义黎曼流形称为**空间型式**（space form）．

可以认为空间型式是最简单的一类流形，也是极其重要的一类．

定理 14.33 空间型式 M、N 整体等距同胚充要条件是：它们都是单连通的、完备的，且具有相同的维数、相同的度规号差和相同曲率的常曲率空间．

证明 ．“⇒”是显然的．

“⇐”．首先，常曲率空间必然是局部对称的，由命题14.18可知空间型式 M 和 N 必然各自整体对称．其次，由 M 和 N 有相同的维数、度规号差和曲率常数，再结合定理14.9可知：M 和 N 之间存在局部等距同胚 $\phi:M\to N$．最后，由单连通和完备条件，从定理14.8可知 ϕ 是整体等距同胚． ■

定理 14.34 设 (M,g) 是 $m(>1)$ 维的广义黎曼流形，令 C 为实常数．则下面命题等价：

(1) M 是常曲率空间，曲率是 C．

(2) 如果 $x\in M$，则存在 x 点附近邻域 U，U 局部等距同胚于 $S^m_\nu(r)$ 若 $C>0$，或者 $\mathbb{R}^m_\nu$ 若 $C=0$，或者 $H^m_\nu(r)$ 若 $C<0$ 中的一个开子集．

(3) 若 $x\in M$，则存在 x 点附近邻域 $(U;u^i)$，使得度规可表示为

$$\mathrm{d}s^2=\frac{e_1\mathrm{d}u^1\otimes\mathrm{d}u^1+\cdots+e_m\mathrm{d}u^m\otimes\mathrm{d}u^m}{\left(1+\frac{C}{4}\sum_{i=1}^m e_i(u^i)^2\right)^2},\qquad e_i=\pm1. \tag{14.4-1}$$

证明 ．我们已知：$\mathbb{R}^m_\nu$ 曲率恒为零，伪球面 $S^m_\nu(r)$ 是曲率大于零（见例10.18）的常曲率空间，伪双曲面 $H^m_\nu(r)$ 是曲率小于零（见例10.20）的常曲率空间．由定理14.33可以看出 (1)、(2) 的等价性．

(3)⇔(1)．只需验证式(14.4-1)中局部坐标 u^i 使得黎曼曲率是常数．为使表达式简洁一些，令 $\sigma(u)=-\ln\left(1+\frac{C}{4}\sum_{i=1}^m e_i(u^i)^2\right)$．那么 $\{e^{-\sigma}(\frac{\partial}{\partial u^i})^a\}$ 是一个正交归一活动标架场，它的对偶基矢场为 $\{(\theta^i)_a\equiv e^\sigma(\mathrm{d}u^i)_a\}$．可通过 $(\theta^i)_a$ 的 Cartan 结构方程来求取黎曼曲率，经过繁琐计算可得黎曼曲率等于 C． ■

因此，在等距同胚意义下，至多存在一个维数为 m，度规负惯性指数个数为 ν，曲率常数为 C 的空间型式 $M(m,\nu,C)$. 在 $C=0$ 时，广义欧几里德空间 $\mathbb{R}^m_\nu$ 便是我们要寻找的空间型式. 定理14.34还说明：对 $C>0$ 是伪球面；$C<0$ 是伪双曲空间；具体表达式见 §10.6.

定理14.34只是局部情形，下面把它推广到大范围情形. 由于一维流形的黎曼曲率恒为零，此时的空间型式只有实直线 $\mathbb{R}$. 故只讨论维数大于一的空间型式. 大范围的、常曲率空间型式可作如下分类：

定理 14.35 $m\geqslant 2$ 的空间型式可以表示为：

$$M(m,\nu,C)=\begin{cases} S^m_\nu(r) & \text{当 } C=1/r^2,\quad 0\leqslant\nu\leqslant m-2,\\ \mathbb{R}^m_\nu & \text{当 } C=0,\\ H^m_\nu(r) & \text{当 } C=-1/r^2,\quad 2\leqslant\nu\leqslant m.\end{cases}\tag{14.4-2}$$

讨论上面定理中没有涉及的几个特殊情形如下.

$M(m,m,1/r^2)=cS^m_m(r)$，$cS^m_m(r)$ 是 $S^m_m(r)$ 中的一叶.

$M(m,m-1,1/r^2)=\widetilde{S}^m_{m-1}(r)$，$\widetilde{S}^m_{m-1}(r)$ 是 $S^m_{m-1}(r)$ 的覆叠空间.

$M(m,0,-1/r^2)=H^m_+(r)$，$H^m_+(r)$ 是双曲空间中的上叶，见 §10.6.5.

$M(m,1,-1/r^2)=\widetilde{H}^m_1(r)$，$\widetilde{H}^m_1(r)$ 是 $H^m_1(r)$ 的覆叠空间.

由于 $\mathbb{R}^m$ 是 $S^1\times\mathbb{R}^{m-1}$ 的覆叠流形，上述四种特殊情形都微分同胚于 $\mathbb{R}^m$.

若流形 M 不是单连通，则常曲率空间分类要复杂的多，请参考[68]第 11 章.

定理 14.36 完备、单连通、广义 Lorentz 度规、常曲率空间等距同胚于：

$$S^m_1(r)\text{ 当 }C=1/r^2,\quad m\geqslant 3;\qquad \widetilde{S}^2_1(r)\text{ 当 }C=1/r^2,\quad m=2.$$
$$\mathbb{R}^m_1\text{ 当 }C=0,\quad m\geqslant 2;\qquad \widetilde{H}^m_1(r)\text{ 当 }C=-1/r^2,\quad m\geqslant 2.$$

$S^4_1(r)$ 是 **de Sitter 时空**，$\widetilde{H}^4_1(r)$ 是**反 de Sitter 时空**的覆叠空间.

命题 14.37 伪球面的等距群：$I(S^m_\nu)=O(\nu,m+1-\nu)$，$\nu<m$；及 $I(cS^m_m)=O^{++}(m,1)\cup O^{-+}(m,1)$. 伪双曲面的等距群：$I(H^m_\nu)=O(\nu+1,m-\nu)$，$\nu>0$；及 $I(H^m_+)=O^{++}(1,m)\cup O^{+-}(1,m)$. 平直流形 $\mathbb{R}^m_\nu$ 的等距群：$\hat{T}(m)\rtimes O(\nu,m-\nu)$.

证明 . 请参考[45]命题 9.8、9.9. 本书例13.108. ■

命题 14.38 若 (M,g) 是空间型式，则 M 是各向同性的，且是整体对称空间.

证明 . 由命题14.37可知空间型式中的等距群包含旋转群. 而该旋转群能够将它所对应的空间型式切空间 T_pM 中的任意非零矢量旋转为 T_pM 中任意其它方向的矢量（但矢量长度不变），也就是可将 T_pM 内任意两个等长切矢量进行等距变换. 又因 p 是任意的，故 M 是各向同性的. 由命题14.27可知 M 是整体对称空间. 整体对称空间自然测地完备. ■

上面介绍了不定度规空间型式的一些基本属性. 历史上，自然是先解决正定度规的空间型式，然后才是不定度规；为此，单独介绍一个正定度规的定理（[68]定理 8.12.2）：

定理 14.39 设 (M,g) 是 m 维、度规正定的、实数域上的整体对称空间. “M 是**各向同性流形**”这一论断等价于：或者 **(1)** M 等距同胚于 $\mathbb{R}^m$；或者 **(2)** M 等距同胚于 S^m（超球面，见10.6.2）；或者 **(3)** M 等距同胚于 H^m（双曲空间，见§10.6.5）；或者 **(4)** M 等距同胚于 $\mathbb{RP}^m$（实射影空间）.

实射影空间 $\mathbb{RP}^m$ 可以看作把超球面 S^m 的对径点粘合起来得到的空间，故超球面是其通用（正定）黎曼覆叠空间（[68]§2.5）；$\mathbb{RP}^m$ 曲率与超球面相同. 虽然定理14.39中的流形都是常曲率；但是空间 M 是各向同性的，并不意味其它数域上的空间也是常曲率的，比如复射影空间 $\mathbb{CP}^m$ 就不是；详见[68]第 12 章，或[82]§4.1例 3. 由定理14.39可知，在实流形上：强各向同性等同于各向同性.

若 M 是局部或整体对称空间，也不意味着 M 是常曲率空间（[68]Ch.12）.

14.4.1 最大对称空间

定义 14.40 当 m 维、连通的、完备的广义黎曼流形 (M,g) 上有 $m(m+1)/2$ 个线性独立的 Killing 矢量场时，称 (M,g) 为**最大对称空间**.

因强各向同性流形的等距群具有最高的对称性，故强各向同性流形和最大对称空间本质相同，只不过是不同领域的不同叫法罢了.

由定理13.138可知：若 M 不完备，则完备的 Killing 矢量场个数会少于 M 的对称群 $I(M)$ 的李群李代数 $\mathfrak{I}(M)$ 独立矢量的个数（见例13.140，此例的空间曲率恒为零，但空间不完备）. 故对于 M 而言完备的 Killing 场和李代数 $\mathfrak{I}(M)$ 都需要研究.

由命题10.14可知：伪球面、伪双曲空间是测地完备的；平直的 $\mathbb{R}^m_\nu$ 自然也是测地完备的. 若 M 是空间型式，则 M 是测地完备的；命题14.37中的 $O(\nu,m+$

$1-\nu$) 实维数是 $m(m+1)/2$，它左作用在 M 上，依据定理13.138第 (3) 条可知：$O(\nu,m+1-\nu)$（或 $O(\nu+1,m-\nu)$）的李代数与空间型式的 Killing 矢量场反同构，故它们的个数都是 $m(m+1)/2$ 个；所以：空间型式 M 是最大对称空间.

命题 14.41 若 m 维的 (M,g) 是最大对称空间，则 M 是常曲率空间.

证明 . 任取 M 的非零 Killing 矢量场 ξ^a；黎曼曲率 R_{abcd} 沿 ξ^a 的李导数恒为零（参见式(8.5-13)，$\pounds_\xi R_{abcd}=0$），则其分量方程是：

$$0=\xi^n R_{ijkl;n}+\big(R^n{}_{jkl}\delta^o_i+R_i{}^n{}_{kl}\delta^o_j+R_{ij}{}^n{}_l\delta^o_k+R_{ijk}{}^n\delta^o_l\big)\xi_{n;o}. \tag{14.4-3}$$

最大对称空间上任意点 $p\in M$ 都有 $m(m+1)/2$ 个独立的 Killing 矢量场. 上式中的 Killing 场 ξ^a 的分量 ξ^n、$\xi_{n;o}$（反对称）恰好是 $m(m+1)/2$ 个. 注意曲率 R_{ijkl} 与 Killing 场 ξ^a 没有任何关系. 由263页的式(8.5-17)可知：该式左端的系数矩阵是满秩的，秩为 $m(m+1)/2$；行秩等于列秩. 故由上式可以得到：

$$R_{ijkl;n}=0. \tag{14.4-4}$$

$$R^o{}_{jkl}\delta^n_i+R_i{}^o{}_{kl}\delta^n_j+R_{ij}{}^o{}_l\delta^n_k+R_{ijk}{}^o\delta^n_l=R^n{}_{jkl}\delta^o_i+R_i{}^n{}_{kl}\delta^o_j+R_{ij}{}^n{}_l\delta^o_k+R_{ijk}{}^n\delta^o_l. \tag{14.4-5}$$

令式(14.4-5)中的 i、n 缩并，并把上指标降下来，再利用式(6.2-12)，有

$$(m-1)R_{ojkl}=R_{jl}g_{ko}-R_{jk}g_{lo}. \tag{14.4-6}$$

交换上式中的 o、j 有 $(m-1)R_{jokl}=R_{ol}g_{kj}-R_{ok}g_{lj}$；利用 R_{jokl} 关于 o、j 反对称，有

$$-R_{ol}g_{kj}+R_{ok}g_{lj}=R_{jl}g_{ko}-R_{jk}g_{lo}. \tag{14.4-7}$$

缩并上式中的 o、l，有 $R_{jk}=\frac{1}{m}Rg_{kj}$. 将此式代入式(14.4-6)，有

$$R_{ijkl}=\frac{1}{m(m-1)}R(g_{jl}g_{ki}-g_{kj}g_{li}). \tag{14.4-8}$$

把上式代入式(14.4-4)可知 R 是常数，令 $R=m(m-1)K$；故最终有

$$R_{ijkl}=K(g_{jl}g_{ki}-g_{kj}g_{li}).\qquad K\text{是实常数} \tag{14.4-9}$$

这便证明了 M 是常曲率空间. ■

已知最大对称空间 M 是连通的、完备常曲率空间，但未必单连通的．我们知道 M 的覆叠空间一定是单连通的，那么最大对称空间 M 的覆叠空间 $\widetilde{M}$ 是空间型式．不那么严谨地说，最大对称空间就是空间型式．

由定理14.34可知：对实流形而言，最大对称空间等价于各向同性流形．

常曲率空间未必是最大对称空间．比如例13.140，此例的空间曲率恒为零，但空间不完备，只有一个完备的 Killing 场，显然不是最大对称空间．

14.5 具有最大对称子空间的空间

本节取自[64]的 §13.5.

我们着眼于局部坐标，用对称性化简度规．先看一个例子．

例 14.42 将欧几里得空间 $\mathbb{R}^3$ 分成无穷多层二维球面 S^2.

参考例8.9，$\mathbb{R}^3$ 球坐标系的度规场为：

$$g_{ab}=(\mathrm{d}r)_a(\mathrm{d}r)_b+r^2\left[(\mathrm{d}\theta)_a(\mathrm{d}\theta)_b+\sin^2\theta(\mathrm{d}\phi)_a(\mathrm{d}\phi)_b\right]. \tag{14.5-1}$$

当半径 r 是常数时，二维球面 S^2 的三个线性独立 Killing 场为式(13.15-1)．

对上述公式做点解释．我们将三维欧几里得空间 $\mathbb{R}^3$ 分解为一族中心在原点的球面，其中的每一个球面 S^2 均是二维最大对称空间；这样我们就把三维欧氏空间分解为无穷多个最大对称子空间（二维球面）的并集．这种分解有一个假奇点：原点．因为换另外一点当新原点，旧原点便不再是奇点了． ■

与上述例题类似;在许多有重大物理意义的情形中,整个空间(或时空)(M,g) 不是最大对称的，但它可分解为许多最大对称子空间 Σ_α（α 是描述这族子空间的指标）的并集．我们将看到，最大对称子空间族的存在给整个空间的度规以很强的约束．如果空间 M 是 m 维，它的开子集 V（自然也是 m 维）上的最大对称子空间族 $U_\alpha=V\cap\Sigma_\alpha$ 是 n 维的；根据假设，在 n 维开子集 $U_\alpha(\subset\Sigma_\alpha\subset M)$ 中存在 $n(n+1)/2$ 个 Killing 矢量场．我们在最大对称子空间的开子集 U_α 上建立局部坐标 $(U_\alpha;u^i)$，其中 $1\leqslant i\leqslant n$；这 n 个坐标自然也是开子集 V 上的部分坐标．比如在上面例题14.42中，θ、ϕ 便是这类 $\{u\}$ 坐标．V 中其它坐标可以用 $(m-n)$ 个坐标 $\{v^{\mathfrak{a}}\}$ 来标记，其中 $n+1\leqslant\mathfrak{a}\leqslant m$．在例14.42中，半径 r 便是 $\{v\}$ 坐标，但只有一个，其它流形的 $\{v\}$ 坐标可能不止一个．同时，还假设子流形 Σ_α 可以用 $v^{\mathfrak{a}}=const$ （$n+1\leqslant\mathfrak{a}\leqslant m$）来描述．

本节中，求和约定要求 $\mathfrak{a},\mathfrak{b}\cdots$ 遍历 $m-n$ 个 $\{v\}$ 坐标；$i,j,k,l,\cdots$ 遍历 n 个 $\{u\}$ 坐标；$\mu,\nu,\cdots$ 遍历所有坐标．需注意，开集 V 的局部坐标是 $(V;u^i,v^{\mathfrak{a}})$．

需要强调一下，在物理上，整个流形 M 可能不是完备的、不是单连通的，比如有奇点（黑洞）．但物理学不可能顾忌这么多数学的要求，我们只能采取折中观点，只要求 M 上的开子集 V 是局部完备的、局部单连通的（笔者杜撰的两个概念）；这样上节有关空间型式的诸多定理在 V 上都能用．或者直接假定空间型式的内容在 U_α 上都成立．

由例14.42可猜测出如下**定理**：最大对称子空间 Σ_α 上的 Killing 矢量场使得我们可以选择适当的 $\{u\}$ 坐标和 $\{v\}$ 坐标，这些坐标令开子集 V 上的度规场取如下线元形式：

$$\mathrm{d}s^2=\sum_{\mathfrak{ab}=n+1}^{m}g_{\mathfrak{ab}}(v)\mathrm{d}v^{\mathfrak{a}}\mathrm{d}v^{\mathfrak{b}}+f(v)\sum_{ij=1}^{n}\tilde{g}_{ij}(u)\mathrm{d}u^i\mathrm{d}u^j. \tag{14.5-2}$$

式中 $g_{\mathfrak{ab}}(v)$ 与 $f(v)$ 仅是 $\{v\}$ 坐标的函数，而 $\tilde{g}_{ij}(u)$ 仅是 $\{u\}$ 坐标的函数，它本身是 n 维最大对称空间的度规．本节就是要证明式(14.5-2)中的分解是允许的．

14.5.1 定理证明

根据假设，在开子集 U_α 上存在 $n(n+1)/2$ 个线性独立的、完备的 Killing 矢量场，度规场对这些 Killing 场的李导数恒为零（$\pounds_\xi g_{ab}=0$），由式(6.1-32)得分量形式：

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\xi^k\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial u^k}+g_{k\nu}\frac{\partial\xi^k}{\partial x^\mu}+g_{\mu k}\frac{\partial\xi^k}{\partial x^\nu}\right)=0. \tag{14.5-3}$$

其中 Killing 场只是 U 上的矢量场，它在 U 外的分量恒为零，即

$$\xi^{\mathfrak{a}}(u,v)=0,\qquad n+1\leqslant\mathfrak{a}\leqslant m. \tag{14.5-4}$$

但现在需假设 $\xi^k(u,v)$ 是 $\{u,v\}$ 的函数；我们需要证明 ξ^k 只是 $\{u\}$ 的函数．

将式(14.5-3)分为三组．对 $\mu=i$、$\nu=j$，可得第一组方程

$$\xi^k(u,v)\frac{\partial g_{ij}(u,v)}{\partial u^k}+\frac{\partial\xi^k(u,v)}{\partial u^i}g_{kj}(u,v)+\frac{\partial\xi^k(u,v)}{\partial u^j}g_{ki}(u,v)=0. \tag{14.5-5}$$

对 $\mu=i$、$\nu=\mathfrak{a}$，可得第二组方程

$$\xi^k(u,v)\frac{\partial g_{i\mathfrak{a}}(u,v)}{\partial u^k}+\frac{\partial\xi^k(u,v)}{\partial u^i}g_{k\mathfrak{a}}(u,v)+\frac{\partial\xi^k(u,v)}{\partial v^{\mathfrak{a}}}g_{ik}(u,v)=0. \tag{14.5-6}$$

对 $\mu=\mathfrak{a}$、$\nu=\mathfrak{b}$，可得第三组方程

$$\xi^k(u,v)\frac{\partial g_{\mathfrak{ab}}(u,v)}{\partial u^k}+\frac{\partial \xi^k(u,v)}{\partial v^{\mathfrak{a}}}g_{k\mathfrak{b}}(u,v)+\frac{\partial \xi^k(u,v)}{\partial v^{\mathfrak{b}}}g_{k\mathfrak{a}}(u,v)=0. \tag{14.5-7}$$

第一个方程组(14.5-5)只告诉我们，对于每一组固定的 $v^{\mathfrak{a}}$，矩阵 $g_{ij}(u,v)$ 必是一个 n 维空间的度规，其坐标是 u^i，而且允许有 Killing 矢量 ξ^i（大于 n 分量指标都是零）．我们这里假设存在 $n(n+1)/2$ 个独立 Killing 矢量，故这就意味着对每一组固定的 $v^{\mathfrak{a}}$，子度规 $g_{ij}(u,v)$ 本身是一个最大对称空间的度规．根据之前约定，V 的子空间 U 是最大对称空间，也就是空间型式，因此定理14.35是适用的；这样，结合定理14.39可知：度规 $g_{ij}(u,v)$ 对每个固定的 v 来说既是 u 均匀的又是点点各向同性的．

另外两组方程包括了有关其它元素 $g_{\mathfrak{a}i}$ 与 $g_{\mathfrak{ab}}$ 的信息，也说明了 Killing 矢量的 v 依赖性．这种 v 依赖性不是完全任意的．比方说，我们重新定义 u 坐标，总能使得度规 $g_{ij}(u,v)$ 有与 v 无关的 Killing 矢量 $\bar{\xi}^i(u)$；这种操作仅在 U 上成立．但是 V 的 Killing 矢量 $\xi^i(u,v)$ 一般是 $\bar{\xi}^i(u)$ 的线性组合，而线性组合的系数可能与 v 坐标有关．

为了把包含在(14.5-6)与(14.5-7)中的不同信息解开，最好是选择最大对称子空间的一组新的坐标 $u'^i(u,v)$ 使得 g'_{ja} 为零．设有新坐标 u'^i 及 $v'^{\mathfrak{a}}$ 为

$$u^i=U^i\left(v';u'\right);\qquad v^{\mathfrak{a}}=v'^{\mathfrak{a}}. \tag{14.5-8}$$

在新坐标系中，度规分量是（见式(4.4-19)）

$$\begin{aligned}g'_{j\mathfrak{a}}\left(u',v'\right)=&\frac{\partial u^l}{\partial u'^j}\frac{\partial u^k}{\partial v'^{\mathfrak{a}}}g_{lk}(u,v)+\frac{\partial u^l}{\partial u'^j}g_{l\mathfrak{a}}(u,v)\\ =&\frac{\partial U^l\left(v';u'\right)}{\partial u'^j}\left\{\frac{\partial U^k\left(v';u'\right)}{\partial v'^{\mathfrak{a}}}g_{lk}\left(U,v'\right)+g_{l\mathfrak{a}}\left(U,v'\right)\right\}.\end{aligned} \tag{14.5-9}$$

如果我们能找到一组函数 $U^k\left(v;u_0\right)$，它满足微分方程

$$g_{lk}(U,v)\frac{\partial U^k}{\partial v^{\mathfrak{a}}}=-g_{l\mathfrak{a}}(U,v);\ \text{及在点}\ {v_0}^{\mathfrak{a}}\ \text{的初条件}\ U^k\left(v_0;u_0\right)\equiv {u_0}^k \tag{14.5-10}$$

那么，由式(14.5-10)便得到新的坐标系，度规在这组新坐标下交叉项 $g'_{j\mathfrak{a}}=0$．这样一来，只要我们能找到带任意初始条件微分方程(14.5-10)的解，就可以构造 u' 坐标使得 $g'_{j\mathfrak{a}}=0$．我们可以把式(14.5-10)中的微分方程改写为它的等价形式

$$\frac{\partial U^k}{\partial v^{\mathfrak{a}}}=-F^k{}_{\mathfrak{a}}(U,v);\qquad F^k{}_{\mathfrak{a}}(U,v)\equiv\bar{g}^{ki}(U,v)g_{i\mathfrak{a}}(U,v) \tag{14.5-11}$$

而 $\bar{g}^{ij}$ 是 g_{ij} 的逆矩阵，即 $\bar{g}^{ij}g_{jk}=\delta^i_k$. 一横杠提醒我们，$\bar{g}^{ij}$ 是 g_{ij} 的逆矩阵的 ij 元素，它不同于 $g_{\mu\nu}$ 的逆矩阵 $g^{\mu\nu}$ 中的 ij 元素 g^{ij}. 若 v 坐标只有一个（常微分方程），式(14.5-11)显然对任意初始条件都有解（需符合常微分方程解存在性条件：Lipschitz 条件. 坐标变换都符合这一要求）. 在一般情况下（偏微分方程），式(14.5-11)有解的条件是 Frobenius 定理5.14，它可积的条件为式(5.3-2)，即

$$\frac{\partial F^k_{\ \mathfrak{a}}(u,v)}{\partial u^l}F^l_{\ \mathfrak{b}}(u,v)-\frac{\partial F^k_{\ \mathfrak{a}}(u,v)}{\partial v^{\mathfrak{b}}}=\frac{\partial F^k_{\ \mathfrak{b}}(u,v)}{\partial u^l}F^l_{\ \mathfrak{a}}(u,v)-\frac{\partial F^k_{\ \mathfrak{b}}(u,v)}{\partial v^{\mathfrak{a}}}. \tag{14.5-12}$$

下面验证 Killing 矢量场条件(14.5-5)至(14.5-7)确实能令式(14.5-12)成立. 将式(14.5-6)乘以 $\bar{g}^{il}$，有

$$\frac{\partial\xi^l}{\partial v^{\mathfrak{a}}}=-\bar{g}^{il}\frac{\partial\xi^o}{\partial u^i}g_{o\mathfrak{a}}-\bar{g}^{il}\xi^k\frac{\partial g_{i\mathfrak{a}}}{\partial u^k}. \tag{14.5-13}$$

式(14.5-5)乘以 $\bar{g}^{il}\bar{g}^{jo}$，得

$$\bar{g}^{il}\frac{\partial\xi^o}{\partial u^i}+\bar{g}^{jo}\frac{\partial\xi^l}{\partial u^j}=-\xi^k\bar{g}^{il}\bar{g}^{jo}\frac{\partial g_{ij}}{\partial u^k}\xlongequal[\bar{g}^{jo}g_{ij}=\delta^o_i]{\text{利用}}\xi^k\frac{\partial\bar{g}^{lo}}{\partial u^k}. \tag{14.5-14}$$

利用上式，将上上式改为：

$$\frac{\partial\xi^l}{\partial v^{\mathfrak{a}}}=\bar{g}^{jo}\frac{\partial\xi^l}{\partial u^j}g_{o\mathfrak{a}}-\xi^k\frac{\partial\bar{g}^{lo}}{\partial u^k}g_{o\mathfrak{a}}-\xi^k\bar{g}^{lo}\frac{\partial g_{o\mathfrak{a}}}{\partial u^k}. \tag{14.5-15}$$

考虑到式(14.5-11)中 F 的表达式，我们可以把上式改写为

$$\frac{\partial\xi^l}{\partial v^{\mathfrak{a}}}=F^j_{\ \mathfrak{a}}\frac{\partial\xi^l}{\partial u^j}-\xi^k\frac{\partial F^l_{\ \mathfrak{a}}}{\partial u^k}. \tag{14.5-16}$$

对上式求 $v^{\mathfrak{b}}$ 的导数，有

$$\frac{\partial^2\xi^l}{\partial v^{\mathfrak{b}}\partial v^{\mathfrak{a}}}=F^j_{\ \mathfrak{a}}\frac{\partial}{\partial u^j}\left(\frac{\partial\xi^l}{\partial v^{\mathfrak{b}}}\right)+\frac{\partial F^j_{\ \mathfrak{a}}}{\partial v^{\mathfrak{b}}}\frac{\partial\xi^l}{\partial u^j}-\frac{\partial\xi^k}{\partial v^{\mathfrak{b}}}\frac{\partial F^l_{\ \mathfrak{a}}}{\partial u^k}-\xi^k\frac{\partial^2F^l_{\ \mathfrak{a}}}{\partial v^{\mathfrak{b}}\partial u^k}. \tag{14.5-17}$$

将式(14.5-16)代入上式等号右端，有

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2\xi^l}{\partial v^{\mathfrak{b}}\partial v^{\mathfrak{a}}}=&F^j_{\ \mathfrak{a}}F^i_{\ \mathfrak{b}}\frac{\partial^2\xi^l}{\partial u^j\partial u^i}+F^j_{\ \mathfrak{a}}\frac{\partial F^i_{\ \mathfrak{b}}}{\partial u^j}\frac{\partial\xi^l}{\partial u^i}-F^j_{\ \mathfrak{a}}\frac{\partial F^l_{\ \mathfrak{b}}}{\partial u^k}\frac{\partial\xi^k}{\partial u^j}-F^j_{\ \mathfrak{a}}\frac{\partial^2F^l_{\ \mathfrak{b}}}{\partial u^k\partial u^j}\xi^k\\&+\frac{\partial F^j_{\ \mathfrak{a}}}{\partial v^{\mathfrak{b}}}\frac{\partial\xi^l}{\partial u^j}-F^i_{\ \mathfrak{b}}\frac{\partial F^l_{\ \mathfrak{a}}}{\partial u^k}\frac{\partial\xi^k}{\partial u^i}+\frac{\partial F^k_{\ \mathfrak{b}}}{\partial u^i}\frac{\partial F^l_{\ \mathfrak{a}}}{\partial u^k}\xi^i-\frac{\partial^2F^l_{\ \mathfrak{a}}}{\partial v^{\mathfrak{b}}\partial u^k}\xi^k.\end{aligned}$$

但上式一定是对 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 对称的，故

$$0=\left\{F^j_{\ \mathfrak{a}}\frac{\partial F^i_{\ \mathfrak{b}}}{\partial u^j}-F^j_{\ \mathfrak{b}}\frac{\partial F^i_{\ \mathfrak{a}}}{\partial u^j}+\frac{\partial F^i_{\ \mathfrak{a}}}{\partial v^{\mathfrak{b}}}-\frac{\partial F^i_{\ \mathfrak{b}}}{\partial v^{\mathfrak{a}}}\right\}\frac{\partial\xi^l}{\partial u^i}+\left\{-F^j_{\ \mathfrak{a}}\frac{\partial^2F^l_{\ \mathfrak{b}}}{\partial u^k\partial u^j}\right.$$

$$+F^j_{\ \mathfrak{b}}\frac{\partial^2 F^l_{\ \mathfrak{a}}}{\partial u^k\partial u^j}+\frac{\partial F^i_{\ \mathfrak{b}}}{\partial u^k}\frac{\partial F^l_{\ \mathfrak{a}}}{\partial u^i}-\frac{\partial F^i_{\ \mathfrak{a}}}{\partial u^k}\frac{\partial F^l_{\ \mathfrak{b}}}{\partial u^i}-\frac{\partial^2 F^l_{\ \mathfrak{a}}}{\partial v^{\mathfrak{b}}\partial u^k}+\frac{\partial^2 F^l_{\ \mathfrak{b}}}{\partial v^{\mathfrak{a}}\partial u^k}\Big\}\xi^k. \tag{14.5-18}$$

我们已经说过，存在 $n(n+1)/2$ 个线性独立 Killing 矢量场的假设，便有 263页式(8.5-17)的左端的系数矩阵为满秩；那么上式中“$\frac{\partial\xi^l}{\partial u^i}$”、“$\xi^k$”前的系数必须都是零．故可得

$$F^j_{\ \mathfrak{a}}\frac{\partial F^i_{\ \mathfrak{b}}}{\partial u^j}-F^j_{\ \mathfrak{b}}\frac{\partial F^i_{\ \mathfrak{a}}}{\partial u^j}=\frac{\partial F^i_{\ \mathfrak{b}}}{\partial v^{\mathfrak{a}}}-\frac{\partial F^i_{\ \mathfrak{a}}}{\partial v^{\mathfrak{b}}}. \tag{14.5-19}$$

这就是我们希望得到的 (14.5-12)．“ξ^k”前的系数对本问题无用．

既然已经证明了(14.5-12)，我们知道了 (14.5-11) 是可积的，故我们可以构造由 (14.5-8) 定义的坐标 u'^i 与 $v'^{\mathfrak{a}}$ 使得度规分量 $g'_{i\mathfrak{a}}$ 为零．做到这点后，我们取消撇号，即

$$g_{i\mathfrak{a}}=0;\qquad 1\leqslant i\leqslant n,\quad n+1\leqslant\mathfrak{a}\leqslant m. \tag{14.5-20}$$

现在 Killing 矢量的条件 (14.5-6) 与 (14.5-7) 变为

$$\frac{\partial\xi^k}{\partial v^{\mathfrak{a}}}g_{ik}=0,\qquad \xi^k\frac{\partial g_{\mathfrak{ab}}}{\partial u^k}=0;\quad 1\leqslant i,k\leqslant n,\quad n+1\leqslant\mathfrak{a},\mathfrak{b}\leqslant m. \tag{14.5-21}$$

因为 g_{ik} 的行列式不等于零，从(14.5-21)第一式得出

$$\frac{\partial\xi^k}{\partial v^{\mathfrak{a}}}=0;\qquad 1\leqslant k\leqslant n,\quad n+1\leqslant\mathfrak{a}\leqslant m. \tag{14.5-22}$$

上式说明 ξ^k 与 $\{v^{\mathfrak{a}}\}$ 无关，只是 $\{u\}$ 的函数．此外，我们已经知道，263页式(8.5-17)的左端的系数矩阵为满秩；故(14.5-21)第二式中 ξ^k 的系数必为零：

$$\frac{\partial g_{\mathfrak{ab}}}{\partial u^k}=0;\quad 1\leqslant k\leqslant n,\quad n+1\leqslant\mathfrak{a},\mathfrak{b}\leqslant m. \tag{14.5-23}$$

上式说明 $g_{\mathfrak{ab}}$ 与 $\{u\}$ 无关，只是 $\{v^{\mathfrak{a}}\}$ 的函数．

剩下要做的事情是说明最大对称子空间上的度规场 $g_{ij}(u,v)$ 是可变量分离的，即 u、v 不耦合．本节初始假定了 M 可以分解为最大对称空间 Σ_α 的并集，在每一个 $U_\alpha=\Sigma_\alpha\cap V$ 上只需要 $\{u\}$ 坐标，$\{v\}$ 坐标都是常数．当然对不同的 α 来说，$\{v\}$ 的常数数值可能不同．由定理14.34第三条可知最大对称子空间度规可以写为式(14.4-1)的形式；这说明最大对称子空间的度规由空间自身决定，唯一的参数是空间的曲率；V 只能以几何不变量的形式影响 U_α，不能以坐标的形式 U_α 的度规．则 M 上度规式(14.5-2)可写为：

$$\mathrm{d}s^2=\sum_{\mathfrak{ab}=n+1}^{m}g_{\mathfrak{ab}}(v)\mathrm{d}v^{\mathfrak{a}}\mathrm{d}v^{\mathfrak{b}}+f(v)\left\{\frac{\sum_{ij=1}^n\eta_{ij}\mathrm{d}u^i\otimes\mathrm{d}u^j}{\left(1+\frac{K}{4}\sum_{i=1}^n\eta_{ij}u^iu^j\right)^2}\right\}. \tag{14.5-24}$$

其中 $\eta_{ij}=\mathrm{diag}(-1,\cdots,-1,+1,\cdots,+1)$，$\pm1$ 个数总和是 n；K 是最大对称子空间的曲率．当把度规(14.5-24)限制在某个最大对称子空间 Σ_α 的时候，必然要得到式(14.4-1)；故上式中的 $f(v)\equiv1$．式(14.5-24)的 $\{u\}$ 坐标未必是我们需要的，对 $\{u\}$ 坐标进行变换，将最大对称子空间的度规变成 $\tilde{g}_{ij}(u)$ 形式，此时其前面的系数不再是 1，仍只与最大对称子空间曲率相关的函数，将其记为 $f(v)$．这便证明了式(14.5-2)的分解是允许的．

14.5.2 应用

本节仅限四维闵氏时空及其子流形．我们先给球对称下个定义．

定义 14.43 *若四维闵氏流形 (M,g) 的等距群 $I(M)$ 中包含 $SO(3)$ 作为其子群，且此子群的轨道是类空二维曲面；则称 M 是***球对称的***（spherically symmetric）.*

在有实际重要应用的全部情形中，最大对称子空间是度规正定的流形，而不是度规不定的时空．此时，定理14.34可知正定度规的空间型式分别为：超球面、平直空间、双曲空间．在 §10.6.5中，计算过双曲空间的度规，我们选取式(10.6-36)中间那个式子，即

$$\mathrm{d}\hat{s}_H^2=\sum_{ij=1}^n\left(\delta_{ij}-\frac{x^ix^j}{r^2+\sum_{k=1}^n(x^k)^2}\right)\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j\xlongequal{x=ru}r^2\sum_{ij=1}^n\left(\delta_{ij}-\frac{u^iu^j}{1+\sum_{k=1}^n(u^k)^2}\right)\mathrm{d}u^i\mathrm{d}u^j.$$

与上式类似，可得超球面的线元表达式

$$\mathrm{d}\hat{s}_S^2=\sum_{ij=1}^n\left(\delta_{ij}+\frac{x^ix^j}{r^2-\sum_{k=1}^n(x^k)^2}\right)\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j\xlongequal{x=ru}r^2\sum_{ij=1}^n\left(\delta_{ij}+\frac{u^iu^j}{1-\sum_{k=1}^n(u^k)^2}\right)\mathrm{d}u^i\mathrm{d}u^j.$$

我们已知超球面曲率是 $1/r^2$，双曲面曲率是 $-1/r^2$．故，式(14.5-2)可以写为

$$\mathrm{d}s^2=\sum_{\mathfrak{ab}=n+1}^m g_{\mathfrak{ab}}(v)\mathrm{d}v^{\mathfrak{a}}\mathrm{d}v^{\mathfrak{b}}+f(v)\sum_{ij=1}^n\left\{\delta_{ij}+\frac{k\,u^iu^j}{1-k\sum_{k=1}^n(u^k)^2}\right\}\mathrm{d}u^i\mathrm{d}u^j.\tag{14.5-25}$$

其中 $f(v)$ 是正的，以及

$$k=\begin{cases}+1 & \text{当最大对称子空间的曲率恒正，即超球面或}\mathbb{RP}^n\\ -1 & \text{当最大对称子空间的曲率恒负，即双曲空间}\\ 0 & \text{当最大对称子空间的曲率恒零，即超平面}\end{cases}.\tag{14.5-26}$$

已经把出现在超球面、双曲空间中的常数 $|K|^{-1}=r^2$ 吸收到函数 $f(v)$ 中去了．

现在让我们用这些公式去处理列入表14.1中的那些特殊情形．

表 14.1: 具有最大对称子空间的空间的例子

例子	v 坐标	u 坐标
球对称空间	r	θ,ϕ
球对称时空	r,t	θ,ϕ
均匀各向同性时空	t	r,θ,ϕ
定态轴对称时空	x^2,x^3	t,ϕ

球对称空间 假设整个空间的维数是 $m=3$，其度规的所有惯性指数都是正的，而且它有最大对称的二维正曲率子空间. 于是，v 坐标只有一个，我们叫它 r. u 坐标有 2 个，我们用 θ,ϕ 表示它们，定义是

$$u^1=\sin\theta\cos\phi,\qquad u^2=\sin\theta\sin\phi. \tag{14.5-27}$$

于是当 $k=1$ 时由式(14.5-25)得

$$\mathrm{d}s^2=g(r)\mathrm{d}r^2+f(r)\left\{\mathrm{d}\theta^2+\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2\right\}. \tag{14.5-28}$$

式中 $f(r)$ 与 $g(r)$ 为 r 的正函数.

本例与本节开头的例子不同点在于：此例中的空间可能是弯曲的.

球对称时空 假设整个时空的维数是 $m=4$，其度规的惯性指数三正一负，它有最大对称的二维子空间，子度规有正惯性指数与正曲率. 于是 v 坐标有 2 个，我们称它们为 r 与 t. u 坐标 2 个，如同式(14.5-27)那样可把它们换为 θ 与 ϕ. 则由 $k=1$ 的度规(14.5-25)得出

$$\mathrm{d}s^2=g_{tt}(r,t)\mathrm{d}t^2+2g_{rt}(r,t)\mathrm{d}r\mathrm{d}t+g_{rr}(r,t)\mathrm{d}r^2+f(r,t)\left\{\mathrm{d}\theta^2+\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2\right\}. \tag{14.5-29}$$

式中 $f(r,t)$ 是正函数；$g_{ij}(r,t)$ 是惯性指数一正一负的 2×2 矩阵.

均匀各向同性时空 假设整个时空的维数是 $m=4$，其度规的惯性指数三正一负，它有最大对称的三维子空间. 子度规的惯性指数是正的，而曲率是任意的. 于是有一个 v 坐标和三个 u 坐标；由(14.5-25)得

$$\mathrm{d}s^2=g(v)\mathrm{d}v^2+f(v)\sum_{ij=1}^{3}\left\{\delta_{ij}+\frac{ku^iu^j}{1-k\sum_{k=1}^{3}(u^k)^2}\right\}\mathrm{d}u^i\mathrm{d}u^j. \tag{14.5-30}$$

式中 $f(v)$ 是正函数，$g(v)$ 是 v 的负函数．我们用

$$t \equiv \int \sqrt{-g(v)}\mathrm{d}v, \quad u^1 \equiv r\sin\theta\cos\phi, \quad u^2 \equiv r\sin\theta\sin\phi, \quad u^3 \equiv r\cos\theta.$$

来定义新坐标 t, r, θ, ϕ；且 $\mathrm{d}s^2 \to -\mathrm{d}\tau^2$，$R(t) \equiv \sqrt{f(v)}$．于是，有

$$\mathrm{d}\tau^2 = \mathrm{d}t^2 - R^2(t)\left\{\frac{\mathrm{d}r^2}{1-kr^2} + r^2\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2\right\}. \tag{14.5-31}$$

定态轴对称时空 设四维闵氏时空 (M, g) 有一个类空 Killing 场 ψ^a，其积分曲线是 M 中闭合类空曲线（对称群为 $SO(2)$）；则称 M 是**轴对称的**（axis-symmetric）．再假设 M 上存在一个类时 Killing 场 ξ^a；并且 $[\psi, \xi]^a = 0$，即两个 Killing 场对易．利用这些，可以给 M 选局部坐标系 $\{t \equiv x^0,\ \phi = x^1,\ x^2, x^3\}$ 使得 $\xi^a = (\frac{\partial}{\partial t})^a$、$\psi^a = (\frac{\partial}{\partial \phi})^a$．将 t、ϕ 选为适配坐标系，由式(14.5-2)可知度规线元可表示为

$$\mathrm{d}s^2 = \sum_{\mathfrak{a},\mathfrak{b}=2}^{3} g_{\mathfrak{a}\mathfrak{b}}(x^2, x^3)\mathrm{d}x^{\mathfrak{a}}\mathrm{d}x^{\mathfrak{b}} + \sum_{i,j=0}^{1} \tilde{g}_{ij}(x^2, x^3)\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j.$$

由 x^2、x^3 描述的二维流形的度规 $g_{\mathfrak{a}\mathfrak{b}}$ 是正定的，经过适当的坐标变换可以将度规分量 $g_{\mathfrak{a}\mathfrak{b}}$ 变成对角形式（见存在性定理8.67）．这样，有两个 Killing 场 ξ^a 和 ψ^a 的轴对称度规独立分量只剩下四个，见下式中的 ν、ω、ψ、μ，且都只是 x^2、x^3 的标量函数．

$$\mathrm{d}s^2 = -(e^{\nu}\mathrm{d}t)^2 + \left(e^{\psi}(\mathrm{d}\phi - \omega\mathrm{d}t)\right)^2 + (e^{\mu}\mathrm{d}x^2)^2 + (e^{\mu}\mathrm{d}x^3)^2. \tag{14.5-32}$$

小结

本章直接取自[45, 64, 68, 73]的相应章节．

文献 Wolf [68]是常曲率空间的权威专著．

虽然 Helgason [25]的著作成书于 1960 年代，但是该书仍是对称空间领域的最权威、最全面的专著．其它类似书籍或直接或间接取自此书；比如[73]$^{\text{Ch.9}}$取自[82]，而[82]直接取自该书．文献[45]相应章节的内容也是取自该书．

对黎曼对称空间的分类需要更多李代数知识，如读者有兴趣可参考[25, 82]．

第十五章　李群与李代数（续）

本章是第十三章的续篇，内容仍是初级的.

我们先叙述李群、李代数表示论的一般性定理. 再讲述 $SU(2)$ 群与 $SO(3)$ 群的关系；然后给出 $SU(2)$ 群的表示，进而给出 $SO(3)$ 的表示；之后讨论它们的李代数. 接下来阐述了略微复杂一些的 $SL(2,\mathbb{C})$ 群（Lorentz 群的通用覆盖群）；进而叙述了 $SL(2,\mathbb{C})$ 群决定的旋量代数. 最后阐述量子场论中的 Poincaré 群.

15.1　李群表示论概要

15.1.1　Schur 引理

定理15.1、15.2分别称为 Schur 第一、第二引理，它们是群表示论中重要的定理. 两个定理适用于有限群、拓扑群，表述方式没有显著差异. Schur 引理可以推广至表示方阵为无穷维的情形，但证明超出了本书范畴，可参见[83]§6.9.10.

定理 15.1 设群 G 在有限维矢量空间 V_A 和 V_B 上有不可约表示 A 和 B. 将 V_A 映入 V_B 的线性映射 M 如果满足 $B(g)M = MA(g)$，$\forall g \in G$；则 **(1)** 当表示 A 和 B 不等价时，必有 $M \equiv 0$；**(2)** 当 $M \neq 0$ 时，表示 A 和 B 必等价.

证明. 作 V_A 的子空间

$$N = \{x \in V_A \mid Mx = 0\}.$$

N 是由 V_A 中满足 $Mx = 0$ 的矢量 x 组成的集合，称为 V_A 的关于 M 的零空间. 容易验证 N 是 G 不变的，因对 $\forall x \in N$，有

$$MA(g)x = B(g)Mx = 0, \quad \forall g \in G.$$

故 $A(g)x \in N$，也就是 N 是 G 不变的. 而 A 又是 G 的不可约表示，故 V_A 的不变子空间 N 只可能是零矢量 $\{0\}$ 或 V_A 本身，即 $N = \{0\}$ 或 $N = V_A$.

当 $N=V_A$ 时，则只有 M 为零映射满足要求，即 $M\equiv 0$.

当 $M\neq 0$ 时，$N=\{0\}$，即不变子空间 N 只有零矢量．这时线性映射 M 是从 V_A 到 V_B 的单射．我们用反证法验证之．设 M 可能将 V_A 中两个不同矢量 x_1 和 x_2 映为 V_B 中同一个矢量 y.

$$\text{由 } Mx_1=y=Mx_2;\quad \text{易得 } M\left(x_1-x_2\right)=0,\quad \left(x_1-x_2\right)\in N.$$

若 $x_1\neq x_2$，则与 $N=\{0\}$ 矛盾，因此 M 是从 V_A 到 V_B 的单射．同时 M 也是从 V_A 到 V_B 的满映射．同样用反证法．设 R 是 M 作用于 V_A 而得到的空间，

$$R=\left\{y\in V_B\mid y=Mx,\ x\in V_A\right\}.$$

R 是 V_B 的子空间，而且也是 G 不变的．因对任意 $y\in R$ ，有

$$B\left(g\right)y=B\left(g\right)Mx=MA\left(g\right)x=Mx',$$

其中 $x'\in V_A$，故 $B\left(g\right)y\in R$．由于表示 B 是不可约的，故 R 只能是零矢量或 V_B 本身．但 $M\neq 0$，故 $R=V_B$．因此 M 是从 V_A 到 V_B 的满映射．故有：当 M 不是零映射时，M 是双射．

由 M 是从 V_A 到 V_B 的双射，可知 M 必有逆 M^{-1} 存在．而且

$$B\left(g\right)=MA\left(g\right)M^{-1},\qquad \forall g\in G.$$

即不可约表示 A 和 B 等价．

若不可约表示 A 和 B 不等价，即不存在非奇异方阵 X 使得 $B(g)=XA(g)X^{-1}$；而定理前提中有 $B(g)M=MA(g)$；那么必有 $M\equiv 0$．这时 V_A 和 V_B 的维数 S_A 和 S_B 不一定相同，M 是 $S_B\times S_A$ 维矩阵． ■

定理 15.2 *设 A 是群 G 在有限维复表示空间 V 的不可约表示．$\forall g\in G$，若 V 上线性变换 M 满足 $A\left(g\right)M=MA\left(g\right)$；则 $M=\lambda I$，即 M 是 V 上恒等变换 I 乘上复常数 λ.*

证明 . 因复空间线性变换 M 最少有一个本征矢，即存在非零复矢量 y 使得

$$My=\lambda y,\qquad \lambda\in\mathbb{C}.$$

上式在实数域中未必成立，即可能不存在非零的实数矢量 y 使上式成立．

考虑 V 的子空间

$$V_\lambda = \{y \in V \mid My = \lambda y\},$$

即由 M 的本征值为 λ 的全体本征矢量组成的空间．容易看出 V_λ 是 G 不变的，因为 $\forall y \in V_\lambda$、$\forall g \in G$，有

$$M\big(A(g)y\big) = A(g)My = \lambda\big(A(g)y\big) \quad \Rightarrow \quad A(g)y \in V_\lambda.$$

而线性表示 $A(g)$ 是不可约的，并且 $V_\lambda \neq \{0\}$；故 $V_\lambda = V$．因此对任意 $x \in V$，有 $Mx = \lambda x$，故 $M = \lambda I$． ■

这里将 Schur 引理分成两个的原因是：定理15.1对实数域、复数域均成立．定理15.2只对复数域成立（可弱化至特征为零的代数闭域），对实数域不成立．

将两个 Schur 引理中的“群”换成“李代数”，即可得到李代数表示论中的 Schur 引理；内容没有本质区别，就不单独列出了．

15.1.2 紧致李群表示正交定理与特征函数

定理 15.3 设有紧致李群 G，它有两个有限维不等价不可约幺正表示 $\phi : G \to GL(V)$、$\psi : G \to GL(W)$．将表示矩阵记成：$\phi(g) = \big(\phi_{ij}(g)\big)$（$m$ 维）、$\psi(g) = \big(\psi_{kl}(g)\big)$（$n$ 维）．那么，它们满足如下关系：

$$\int_G \overline{\phi_{ji}(g)}\psi_{kl}(g)\mathrm{d}g = 0. \tag{15.1-1}$$

$$\int_G \overline{\phi_{ji}(g)}\phi_{kl}(g)\mathrm{d}g = \frac{1}{m}\delta_{jk}\delta_{il}. \tag{15.1-2}$$

证明．根据定理13.112，我们只讨论幺正表示，而不会失去一般性．

任取一个 $m \times n$ 维的复矩阵 (c_{jk})，构造

$$\tilde{c}_{il} \equiv \int_G \sum_{jk} \overline{\phi_{ji}(g)} c_{jk} \psi_{kl}(g)\mathrm{d}g. \tag{15.1-3}$$

由幺正性可知：$\overline{\phi_{ji}(g)} = \phi_{ij}^{-1}(g)$．$\forall x \in G$，有（下式中重复指标需要求和）

$$\overline{\phi_{ih}(x)}\tilde{c}_{il}\psi_{lo}(x) = \int_G \overline{\phi_{jh}(gx)} c_{jk}\psi_{ko}(gx)\mathrm{d}g \xlongequal[\text{正属性}]{\text{利用幺}} \int_G \phi_{hj}^{-1}\big(gx\big) c_{jk}\psi_{ko}(gx)\mathrm{d}g$$

$$\xlongequal{13.12\text{–}4} \int_G \phi_{hj}^{-1}(g) c_{jk}\psi_{ko}(g)\mathrm{d}g = \int_G \overline{\phi_{jh}(g)} c_{jk}\psi_{ko}(g)\mathrm{d}g = \tilde{c}_{ho}. \tag{15.1-4}$$

利用式(15.1-4)和 Schur 引理15.1可知，若 ϕ 和 ψ 不等价，则必有 $\tilde{c}_{ho}=0$. 此时，我们取 $c_{jk}=\delta_{jk}$（j、k 是固定不变的），由(15.1-3)便可证明式(15.1-1).

当 $\psi=\phi$ 时，由 Schur 引理15.2可知 $\tilde{c}_{ho}$ 正比于单位矩阵，即 $\tilde{c}=\lambda I$，下面我们来确定常数 λ. 对式(15.1-3)两边取迹，有

$$\begin{aligned} m\lambda &= \int_G \sum_{ijk} \overline{\phi_{ji}(g)} c_{jk}\phi_{ki}(g)\mathrm{d}g \xlongequal[\text{正属性}]{\text{利用幺}} \int_G \sum_{ijk} c_{jk}\phi_{ki}(g)\phi_{ij}^{-1}(g)\mathrm{d}g \\ &= \int_G \sum_{jk} c_{jk}\delta_{kj}\mathrm{d}g = \sum_j c_{jj} = Tr(c). \end{aligned}$$

同样，我们取 $c_{jk}=\delta_{jk}$（j、k 是固定不变的），那么有 $Tr(c)=\sum_l c_{ll}=\delta_{jk}$. 带回式(15.1-3)便可证明结论. ■

定义 15.4 对于给定的有限维复（实）表示 $\phi: G\to GL(V)$，令

$$\chi_\phi(g)=Tr\big(\phi(g)\big),\quad g\in G. \qquad \text{注意 } \phi(g) \text{ 是方阵} \tag{15.1-5}$$

我们称 χ_ϕ 为线性表示 ϕ 的**特征函数**.

不难看出，如果表示 ϕ 等价于 ψ，则必有 $\chi_\phi=\chi_\psi$.

定理 15.5 若 ϕ、ψ 是紧致李群 G 的两个有限维不等价不可约复表示，则

$$\int_G \overline{\chi_\phi(g)}\cdot\chi_\psi(g)\mathrm{d}g=0, \tag{15.1-6}$$

$$\int_G \overline{\chi_\phi(g)}\cdot\chi_\phi(g)\mathrm{d}g=1. \tag{15.1-7}$$

证明. 证明过程很简单，直接将特征函数的定义代入定理中的公式，并利用式(15.1-1)、(15.1-2)即可. 具体计算过程留给读者当练习. ■

定理 15.6 紧致李群 G 的任意有限维幺正表示 (ϕ,V) 或者是完全可约的，或者是不可约的.

证明. 如果 (ϕ,V) 是不可约的，已满足定理要求.

现假设 (ϕ,V) 是可约的（定义在22页）. 也就是说存在 V 的非平凡子空间 V_1 是 $\phi(g)$ 的不变子空间. 根据 Weyl 定理13.111可知，V 中存在不变内积(13.12-7)；再由线性代数中的基本知识可得：我们可以将 V 分解为 V_1 和它的正交补 $V_1^\perp$ 的直和. 由内积(13.12-7)容易验证正交补 $V_1^\perp$ 也是 $\phi(g)$ 的不变子空间. 从而可知

(ϕ, V) 是完全可约的．如 V_1（或 $V_1^{\perp}$）仍有非平凡不变子空间，则可继续分解下去．由于 V 是有限维的，故此种分解一定可以穷尽． ■

我们不加证明地引入两条定理：

定理 15.7 紧致李群的幺正表示是有限维不可约子表示的直和．（证明见[83]$^{\text{p.346}}$）

定理 15.8 紧致李群的不可约幺正表示是有限维的．（证明见[83]$^{\text{p.349}}$）

紧致李群也可以有无穷维幺正表示，但一定是可约的，它可以表示成有限维不可约幺正表示的直和．下面我们就讨论这种分解．设 ρ 是 G 的一个任意的幺正表示．因为紧致李群的任何表示或者是完全可约的，或者是不可约的，所以我们可以把 ρ 表示为不可约表示的直和：

$$\rho = \bigoplus_i m_i(\rho)\phi_i. \tag{15.1-8}$$

其中 ϕ_i 遍历 G 的所有相互不等价、不可约幺正表示．$m_i(\rho)$ 是 ρ 的完全分解中含有的与 ϕ_i 等价的不可约表示的重数；在不引起误解的情况下，将 $m_i(\rho)$ 简记为 m_i．当然，对于有限维表示来说只有有限个 m_i 不等于零．

定理 15.9 设 ρ、ρ_1、ρ_2 是紧致李群 G 的有限维幺正表示．则

(1) $m_i(\rho) = \int_G \overline{\chi_\rho(g)} \cdot \chi_{\phi_i}(g)\mathrm{d}g$ ．

(2) $\rho_1 \cong \rho_2$ 的充要条件是：$\chi_{\rho_1}(g) = \chi_{\rho_2}(g),\ \forall g \in G$．

(3) ρ 是不可约的充要条件是：$\int_G |\chi_\rho(g)|^2\,\mathrm{d}g = 1$．

证明 ．表示 ρ、ρ_1、ρ_2 有类似的分解式(15.1-8)．显然有

$$\chi_\rho(g) = \sum_i m_i(\rho)\chi_{\phi_i}(g).$$

设 ϕ_k 是 G 的一个任意给定的不可约幺正表示（即 k 是确定的），则

$$\int_G \overline{\chi_\rho(g)} \cdot \chi_{\phi_k}(g)\mathrm{d}g = \sum_i m_i(\rho) \int_G \overline{\chi_{\phi_i}(g)} \cdot \chi_{\phi_k}(g)\mathrm{d}g.$$

由定理15.5可知，上述和式中的诸积分中，只有当 $\phi_i = \phi_k$ 时为 1，其他各项均为零．所以有

$$\int_G \overline{\chi_\rho(g)} \cdot \chi_{\phi_k}(g)\mathrm{d}g = m_k(\rho).$$

第 (1) 条证明完毕．

第 (2) 条必要性是显然的；下面证明充分性．如果 $\chi_{\rho_1}(g)=\chi_{\rho_2}(g)$，那么由第 (1) 条可知 $m_i(\rho_1)=m_i(\rho_2)$，再加上 ϕ_i 为 G 的任给定的不可约幺正表示，便说明 ρ_1、ρ_2 对不可约不等价表示 ϕ_i 的分解完全相同；故可断言第 (2) 条正确．

不难由定理15.5算出

$$\int_G \overline{\chi_\rho(g)}\cdot\chi_\rho(g)\mathrm{d}g=\sum_i[m_i(\rho)]^2. \tag{15.1-9}$$

若 ρ 是不可约的，则上式中只有一个 $m_i(\rho)$ 非零，并且它的数值等于 1；因此 ρ 是不可约幺正表示的充分必要条件是：

$$\int_G \overline{\chi_\rho(g)}\cdot\chi_\rho(g)\mathrm{d}g=\int_G|\chi_\rho(g)|^2\,\mathrm{d}g=1.$$

至此，定理三条内容全部证完． ■

15.1.3 非紧致李群表示

非紧致李群的相关理论不像紧致李群那样完备，比如能否定义不变积分都是问题．关于非紧致李群，我们只引用如下定理[74]p.163：

定理 15.10 非紧致、半单、线性李群的非平凡不可约幺正表示是无穷维的．

15.1.4 例：可对易李群

设 G 为一个可对易李群（紧致或非紧致），又设 ϕ 是 G 的一个有限维不可约复表示；我们要证明如下定理：G 的线性表示 ϕ 一定是复 1 维的．

任意给定 G 中元素 g，有

$$\phi(g)\cdot\phi(h)=\phi(g\cdot h)\xlongequal[\text{可对易}]{\text{因群}G}\phi(h\cdot g)=\phi(h)\cdot\phi(g),\quad\forall h\in G.$$

取 Schur 引理15.2中的 $M=\phi(g)$；则可知，存在一个复常数 $\lambda(g)$，使得 $\phi(g)=\lambda(g)\cdot I$，其中 I 是表示空间上的恒等变换．换句话说，

$$\phi(G)=\{\phi(g)\mid g\in G\}\subset\{\lambda I\mid\lambda\in\mathbb{C}\}.$$

另一方面，显然有：表示空间 V 的任何子空间都是 $\{\lambda I\mid\lambda\in\mathbb{C}\}$ 的不变子空间，当然也是它的一部分——$\phi(G)=\{\phi(g)\mid g\in G\}$——的不变子空间．但已

假设 ϕ 为复不可约的，所以 V 除了 $\{0\}$ 和本身之外，不能再有其他的不变子空间了．这种情形只有一种可能，那就是 $\dim\phi = \dim_{\mathbb{C}} V = 1$．

下面给出几个关于可对易群的例题．

例 15.11 紧致李群 $U(1) \equiv SO(2) = \left\{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \mid 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi\right\}$ 的不可约幺正表示．

$U(1)$ 的一维复表示 ϕ 是 $U(1)$ 到乘法群 $(\mathbb{C}^*, \times)$（见例13.34）的一个映射．由于 $U(1)$ 以 2π 为周期，故表示矩阵也必须以 2π 为周期．令 $\phi_n\left(U(1)\right) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$，其中 n 是一个取定的整数．容易看出，ϕ_n 是一个满足复表示要求的同态映射．另一方面，设 $\psi : U(1) \to (\mathbb{C}^*, \times)$ 是任意的以 2π 为周期的同态映射，则不难证明：ψ 必然与上述 ϕ_n 之一等价．由于是一维表示，没有办法再次约化，故是不可约表示．故 $U(1)$ 群的不可约幺正表示为：$\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$, $n \in \mathbb{Z}$（幺正性是显然的）． ■

例 15.12 非紧致实数加法群 $(\mathbb{R}, +)$ 的一维实表示．

$(\mathbb{R}, +)$ 的一维实表示 ϕ 是 $(\mathbb{R}, +)$ 到乘法群 $(\mathbb{R}^*, \times)$ （见例题13.33）的一个映射，并且满足 $\phi(t+u) = \phi(t)\phi(u)$, $\forall t, u \in \mathbb{R}$．容易想到指数映射具有这些属性．对于任意给定的实数 $a \in \mathbb{R}$，令

$$\phi_a(x) = e^{ax}, \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

那么 ϕ_a 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}^*$ 的映射，并且满足同态关系

$$\phi_a(x+y) = e^{a(x+y)} = e^{ax}e^{ay} = \phi_a(x)\phi_a(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

因此 ϕ_a 是 $(\mathbb{R}, +)$ 的一维实表示．由此得到实数加法群 $(\mathbb{R}, +)$ 有无穷多个一维实表示（每个实数 a 都是一个表示，a 有无穷多种取法）． ■

例 15.13 非紧致实数加法群 $(\mathbb{R}, +)$ 的不可约复表示．

根据本小节开始论述，$(\mathbb{R}, +)$ 的不可约复表示必是（复）一维的．$(\mathbb{R}, +)$ 的一维复表示 ψ 是 $(\mathbb{R}, +)$ 到乘法群 $(\mathbb{C}^*, \times)$ （见例13.34）的一个映射．参见上例，对于任意给定的复数 $c \in \mathbb{C}$，令

$$\psi_c(x) = e^{cx} = e^{x\mathrm{Re}(c) + \mathrm{i}x\mathrm{Im}(c)}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

那么 ψ_c 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{C}^*$ 的映射，并且是同态映射，验证过程同上例（略）．因此 ψ_c 是 $(\mathbb{R}, +)$ 的一维复表示．由此得到 $(\mathbb{R}, +)$ 有无穷多个一维复表示． ■

练习 15-1 试证明定理15.5．

15.2 $SU(2)$ 群

$SO(3)$ 群是紧致、道路连通的；但不是单连通的，它是两度连通的．它的通用覆盖群是 $SU(2)$，此群是紧致、单连通的．我们再次给出 $SU(2)$ 的定义：行列式为 1 的 2×2 复幺正矩阵群，其一般形式为

$$u=\begin{pmatrix} a & b\\ c & d\end{pmatrix},\qquad u^{\dagger}=\begin{pmatrix} a^{*} & c^{*}\\ b^{*} & d^{*}\end{pmatrix}. \tag{15.2-1}$$

行列式等于 1，以及幺正条件（$u^{\dagger}u=I=uu^{\dagger}$）导致

$$ad-bc=1;\qquad a^{*}a+b^{*}b=1=c^{*}c+d^{*}d,\quad c^{*}a+d^{*}b=0. \tag{15.2-2}$$

在上述条件约束下，$SU(2)$ 群元只由三个实参数决定；其一般形式为

$$u=\begin{pmatrix} a & b\\ -b^{*} & a^{*}\end{pmatrix},\qquad aa^{*}+bb^{*}=1,\quad a,b\in\mathbb{C}. \tag{15.2-3}$$

15.2.1 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的同态关系

下面，我们来寻找两个群的同态关系．先给出二维单位矩阵和 Pauli 矩阵：

$$\sigma_0=\begin{pmatrix} 1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix};\ \sigma_x=\begin{pmatrix} 0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix},\ \sigma_y=\begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i}\\ \mathrm{i} & 0\end{pmatrix},\ \sigma_z=\begin{pmatrix} 1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}. \tag{15.2-4}$$

其中 σ_0（偶尔也被记为 σ_4）是二维单位矩阵；Pauli 矩阵是无迹、厄米、幺正的；很多时候把 σ_x 记成 σ_1，σ_y 记成 σ_2，σ_z 记成 σ_3．它们有如下关系：

$$\sigma_1\sigma_2=\mathrm{i}\sigma_3,\quad \sigma_2\sigma_3=\mathrm{i}\sigma_1,\quad \sigma_3\sigma_1=\mathrm{i}\sigma_2;\quad (\sigma_i)^2=\sigma_0,\quad i=1,2,3. \tag{15.2-5}$$

$$\sigma_1\sigma_2-\sigma_2\sigma_1=2\mathrm{i}\sigma_3,\quad \sigma_2\sigma_3-\sigma_3\sigma_2=2\mathrm{i}\sigma_1,\quad \sigma_3\sigma_1-\sigma_1\sigma_3=2\mathrm{i}\sigma_2. \tag{15.2-6}$$

任意一个二维复数矩阵都可以由式(15.2-4)组合得到．任意一个无迹、厄米矩阵都能由三个 Pauli 矩阵组合得到．我们定义一个无迹厄米矩阵 h

$$h=\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\sigma}=\begin{pmatrix} z & x-\mathrm{i}y\\ x+\mathrm{i}y & -z\end{pmatrix};\qquad \boldsymbol{r}=(x,y,z),\quad x,y,z\in\mathbb{R}. \tag{15.2-7}$$

我们将借助 h 来找到 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的同态关系．

当 $SU(2)$ 中的群元 u（式(15.2-3)）对 h 作幺正变换时，有

$$h' = uhu^{-1}. \tag{15.2-8}$$

新得到的 h' 与位型空间的一个新点 $\boldsymbol{r}' = (x', y', z')$ 相对应，并且

$$h' = \boldsymbol{r}' \cdot \boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} z' & x' - \mathrm{i}y' \\ x' + \mathrm{i}y' & -z' \end{pmatrix}. \tag{15.2-9}$$

容易得到

$$x^2 + y^2 + z^2 = -\det h = -\det(uhu^{-1}) = -\det h' = x'^2 + y'^2 + z'^2. \tag{15.2-10}$$

由上式可以看到任一个 $SU(2)$ 的群元 u，作用在 h 上的效果是把 $\boldsymbol{r}$ 变为 $\boldsymbol{r}'$，并且保持 $|\boldsymbol{r}| = |\boldsymbol{r}'|$. 这个结果说明 u 与 $SO(3)$ 中的某一个元素等价，我们把它记为 R_u. 也就是式(15.2-8)–(15.2-10)的变换过程，可以转化为

$$\boldsymbol{r}' = R_u \boldsymbol{r} \quad \Leftrightarrow \quad (x', y', z')^T = R_u (x, y, z)^T. \tag{15.2-11}$$

由式(15.2-8)–(15.2-11)以及式(15.2-3)可以导出 R_u 的表达式

$$R_u = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(a^2 - b^2 + a^{*2} - b^{*2}) & \frac{\mathrm{i}}{2}(a^{*2} + b^{*2} - a^2 - b^2) & -ab - a^* b^* \\ \frac{\mathrm{i}}{2}(a^2 - b^2 - a^{*2} + b^{*2}) & \frac{1}{2}(a^2 + b^2 + a^{*2} + b^{*2}) & \mathrm{i}(a^* b^* - ab) \\ ba^* + ab^* & \mathrm{i}(ba^* - ab^*) & aa^* - bb^* \end{pmatrix} \tag{15.2-12}$$

请读者验证 R_u 是实正交矩阵（即 $R_u^T R_u = I$）. 取 u 为单位矩阵（即 $a = 1, b = 0$），此时 R_u 也是单位矩阵，可见 R_u 是 $SO(3)$ 中的元素.

借助 h，我们找到了映射关系 $h : SU(2) \to SO(3)$；有关 h 的运算只有加法和乘法，故它是光滑的. 下面验证此变换保持群乘法不变，$\forall u, v \in SU(2)$

$$(uv)h(uv)^{-1} = uv(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{r})v^{-1}u^{-1} = u(\boldsymbol{\sigma} \cdot R_v \boldsymbol{r})u^{-1} = \boldsymbol{\sigma} \cdot R_u R_v \boldsymbol{r} \tag{15.2-13}$$

显然还有 $(uv)h(uv)^{-1} = \boldsymbol{\sigma} \cdot R_{uv}\boldsymbol{r}$，故可以得到映射 h 保群乘法不变，即 $R_{uv} = R_u R_v$. 所以 $h : SU(2) \to SO(3)$ 是同态映射.

同态映射 h 将 $SU(2)$ 中单位矩阵映射为 $SO(3)$ 中的单位矩阵. 除此以外，h 还将负的单位矩阵映射为 $SO(3)$ 中的单位矩阵；即取 $a = -1, b = 0$（式(15.2-3)），

代入式(15.2-12)中立即可知. $\{I_2,-I_2\}$ 是同态核（令 $R_u=I_3$ 即可证明），由二维单位矩阵和负单位矩阵组成；由定理2.15可知商群 $SU(2)/\{\pm I_2\}\cong SO(3)$.

我们省略了 $SU(2)$ 单连通性的证明，请查阅李群的专门书籍.

取式(15.2-3)中 $a=\cos\frac{\alpha}{2},\ b=-\mathrm{i}\sin\frac{\alpha}{2}$，记为 $J_1(\alpha)$；代入式(15.2-12)，有

$$J_1(\alpha)=\begin{pmatrix}\cos\frac{\alpha}{2} & -\mathrm{i}\sin\frac{\alpha}{2}\\ -\mathrm{i}\sin\frac{\alpha}{2} & \cos\frac{\alpha}{2}\end{pmatrix}\ \leftrightarrow\ R_{J_1(\alpha)}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha\\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}. \tag{15.2-14}$$

这是绕 x 轴转动. 再取 $a=\cos\frac{\beta}{2},\ b=-\sin\frac{\beta}{2}$，有

$$J_2(\beta)=\begin{pmatrix}\cos\frac{\beta}{2} & -\sin\frac{\beta}{2}\\ \sin\frac{\beta}{2} & \cos\frac{\beta}{2}\end{pmatrix}\quad\leftrightarrow\quad R_{J_2(\beta)}=\begin{pmatrix}\cos\beta & 0 & \sin\beta\\ 0 & 1 & 0\\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta\end{pmatrix}. \tag{15.2-15}$$

这是绕 y 轴转动. 再取 $a=\exp(-\mathrm{i}\frac{\gamma}{2}),\ b=0$，有

$$J_3(\gamma)=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\gamma/2} & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{\mathrm{i}\gamma/2}\end{pmatrix}\quad\leftrightarrow\quad R_{J_3(\gamma)}=\begin{pmatrix}\cos\gamma & -\sin\gamma & 0\\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}. \tag{15.2-16}$$

这是绕 z 轴转动.

15.2.2 $S^3(1)\cong SU(2)$

我们证明三维单位球面群 $S^3(1)\equiv S^3$ 与 $SU(2)$ 同构. 三维单位球面 $S^3\equiv\{(t,x,y,z)\in\mathbb{R}^4\mid t^2+x^2+y^2+z^2=1\}$ 可通过四元数乘法（见24页的例2.29）建立李群. 我们将流形 S^3 上两点 (t_1,x_1,y_1,z_1)、(t_2,x_2,y_2,z_2) 间的群乘法定义为四元数乘法，这个群乘法是封闭的（略显繁琐的乘法验证过程，请读者补齐）、满足结合律、不对易. 将 S^3 的单位元选成 $(1,0,0,0)$；在四元数乘法下，(t,x,y,z) 的逆元是 $(+t,-x,-y,-z)$. 上述所列条件满足群的定义，又因群乘法、求逆运算是 C^∞ 的，故 S^3 是李群.

设想二维平面上有实心圆盘，将圆盘的外边界圆捏合成一点（类似于包饺子），那么便得到了嵌入到 E^3 中的二维球面 S^2；这便是二维球面的拓扑. 我们

借助上述的拓扑描述来阐述 S^3 的拓扑；设想有 E^3 空间的三维实心球，将此实心球的外边界二维球面捏合成一点，便得到了嵌入到 E^4 中的三维球面 S^3.

E^4 中的三维球面 S^3 不容易想像，我们借用如下坐标变换简单阐述它，

$$t=\cos\psi,\ x=\sin\psi\sin\theta\cos\phi,\ y=\sin\psi\sin\theta\sin\phi,\ z=\sin\psi\cos\theta. \tag{15.2-17}$$

对于 S^3 群来说参数取值范围是：$0\leqslant\psi\leqslant\pi$、$0\leqslant\theta\leqslant\pi$、$0\leqslant\phi<2\pi$. 明显有 $t^2+x^2+y^2+z^2=1$，故它是三维单位球面. 当 $0\leqslant\psi\leqslant\pi$ 时，有 $-1\leqslant\cos\psi\leqslant1$、$0\leqslant\sin\psi\leqslant1$，不难看出坐标域 $\{(\psi,\theta,\phi)\}$ 能够覆盖流形 S^3；此时(15.2-17)式中的 x、y、z 描述单位半径的三维实心球. 需注意当 $\sin\psi=0$ 时，式(15.2-17)的多个参数值对应 S^3 上同一点，这无非反映了一个坐标域在覆盖流形 S^3 的同时无法满足微分流形定义而已；全面的坐标域可参见例4.10、4.11.

S^3 和 $SU(2)$ 间的微分同胚可表示成如下形式：

$$S^3\ni t\mathbb{1}+x\mathbb{i}+y\mathbb{j}+z\mathbb{k}\ \cong\ \begin{pmatrix}t+z\sqrt{-1} & \sqrt{-1}x+y\\ \sqrt{-1}x-y & t-z\sqrt{-1}\end{pmatrix}\in SU(2). \tag{15.2-18}$$

$$\text{即 }\mathbb{1}\cong\left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&1\end{smallmatrix}\right),\ \mathbb{i}\cong\begin{pmatrix}0&\sqrt{-1}\\ \sqrt{-1}&0\end{pmatrix},\ \mathbb{j}\cong\left(\begin{smallmatrix}0&1\\-1&0\end{smallmatrix}\right),\ \mathbb{k}\cong\begin{pmatrix}\sqrt{-1}&0\\0&-\sqrt{-1}\end{pmatrix}. \tag{15.2-19}$$

基矢(15.2-19)与 Pauli 矩阵关系为：$\mathbb{i}\cong\sqrt{-1}\sigma_x$、$\mathbb{j}\cong\sqrt{-1}\sigma_y$、$\mathbb{k}\cong\sqrt{-1}\sigma_z$.

我们把上述对应关系用到(15.2-17)式上，为此，先定义三维空间的单位矢量 $\boldsymbol{n}=(\sin\theta\cos\phi,\ \sin\theta\sin\phi,\ \cos\theta)$；有

$$\begin{aligned}&\mathbb{1}\cos\psi+(n_x\mathbb{i}+n_y\mathbb{j}+n_z\mathbb{k})\sin\psi\\ =&\begin{pmatrix}\cos\psi+\sqrt{-1}\cos\theta\sin\psi & \sin\psi\sin\theta(\sqrt{-1}\cos\phi+\sin\phi)\\ \sin\psi\sin\theta(\sqrt{-1}\cos\phi-\sin\phi) & \cos\psi-\sqrt{-1}\cos\theta\sin\psi\end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{15.2-20}$$

再令 $(x,y,z)\equiv\boldsymbol{r}=\boldsymbol{n}\sin\psi$，那么可以看到 S^3 对应半径为 $\boldsymbol{r}$ 的实心球；但需要把 $|\boldsymbol{r}|=1$ 的所有点看成同一点，这样才是 S^3 的拓扑.

15.2.3 $SU(2)$ 群上的积分

我们借用 S^3 的拓扑引入 $SU(2)$ 群上的积分. 由式(13.10-16)、(15.2-15)、(15.2-16)可得欧拉角形式的 $SU(2)$ 群元表达式

$$u(\alpha\beta\gamma)=\begin{pmatrix}e^{-\mathbb{i}\frac{\alpha+\gamma}{2}}\cos\frac{\beta}{2} & -e^{-\mathbb{i}\frac{\alpha-\gamma}{2}}\sin\frac{\beta}{2}\\ e^{\mathbb{i}\frac{\alpha-\gamma}{2}}\sin\frac{\beta}{2} & e^{\mathbb{i}\frac{\alpha+\gamma}{2}}\cos\frac{\beta}{2}\end{pmatrix}. \tag{15.2-21}$$

对于 $SU(2)$ 群来说参数取值范围是：$-2\pi \leqslant \alpha < 2\pi$、$0 \leqslant \beta < \pi$、$0 \leqslant \gamma < 2\pi$. 对于 $SO(3)$ 群来说参数取值范围是：$0 \leqslant \alpha < 2\pi$、$0 \leqslant \beta < \pi$、$0 \leqslant \gamma < 2\pi$.

对比式(15.2-18)，取式(15.2-21)中矩阵元的相应部分，有

$$\begin{aligned} t &= \cos\frac{\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\gamma}{2}, \quad y = -\sin\frac{\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\gamma}{2}, \\ x &= \sin\frac{\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\gamma}{2}, \quad z = -\cos\frac{\beta}{2}\sin\frac{\alpha+\gamma}{2}. \end{aligned} \tag{15.2-22}$$

我们已证明 S^3 微分同构于 $SU(2)$，故可利用 S^3 上的线元表达式来计算 $SU(2)$ 群（以及 $SO(3)$ 群）的度规场. 经过复杂的计算可得

$$\begin{aligned} \mathrm{d}s^2 =& \left((\mathrm{d}t)^2+(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2+(\mathrm{d}z)^2\right)\big|_{t^2+x^2+y^2+z^2=1} \\ =& \frac{1}{4}(\mathrm{d}\alpha)^2+\frac{1}{4}(\mathrm{d}\beta)^2+\frac{1}{4}(\mathrm{d}\gamma)^2+\frac{1}{4}\cos\beta\,\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\gamma+\frac{1}{4}\cos\beta\,\mathrm{d}\gamma\mathrm{d}\alpha. \end{aligned} \tag{15.2-23}$$

通过计算上式的度规行列式，可以得到 S^3（也就是 $SU(2)$）的 Haar 测度是

$$\Omega_{S^3} = \Omega_{SU(2)} = \frac{1}{2}\Omega_{SO(3)} = \frac{1}{16\pi^2}\sin\beta\ \mathrm{d}\alpha\wedge\mathrm{d}\beta\wedge\mathrm{d}\gamma. \tag{15.2-24}$$

归一化因子 $\frac{1}{16\pi^2}$ 其实是指 S^3 的体积是 $16\pi^2$. S^3 到 $SO(3)$ 是 2 对 1 的同态关系，故 $SO(3)$ 的体积是 $8\pi^2$，所以 $SO(3)$ 的归一化因子是 $\frac{1}{8\pi^2}$；此时 $0 \leqslant \alpha < 2\pi$，其它积分元范围不变. 由于积分边界的测度为零，故包含积分边界值与否（即包含 $\alpha = 2\pi$、$\beta = \pi$、$\gamma = 2\pi$ 与否）是无关紧要的.

例 15.14 S^3 上的积分的另一常用表述（非欧拉角）.

借用式(15.2-17)，经过不那么复杂的计算可得 S^3 上的线元表达式

$$\begin{aligned} \mathrm{d}s^2 =& \left((\mathrm{d}t)^2+(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2+(\mathrm{d}z)^2\right)\big|_{t^2+x^2+y^2+z^2=1} \\ =& (\mathrm{d}\psi)^2+(\sin\psi\mathrm{d}\theta)^2+(\sin\psi\sin\theta\mathrm{d}\phi)^2. \end{aligned}$$

由上式容易看出 S^3（也就是 $SU(2)$）的 Haar 测度是

$$\Omega_{S^3} = \Omega_{SU(2)} = \frac{1}{2}\Omega_{SO(3)} = \frac{1}{2\pi^2}\sin^2\psi\sin\theta\ \mathrm{d}\psi\wedge\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi. \tag{15.2-25}$$

在上述参数表述中 S^3 的体积是 $2\pi^2$. 这也说明，用不同参数体系表示紧致李群积分时需要归一化，否则可能会得到不同积分值. 积分式(15.2-25)参数取值范围：对于 S^3、$SU(2)$ 群见(15.2-17)式，对于 $SO(3)$ 群是：$0 \leqslant \psi \leqslant \pi/2$、$0 \leqslant \theta \leqslant \pi$、$0 \leqslant \phi < 2\pi$. 同理，包含积分边界与否不影响最终积分值. ■

15.2.4 $SU(2)$ 群表示

$SU(2)$ 群比 $SL(2,\mathbb{C})$ 少一个幺正条件，故 $SU(2)$ 是 $SL(2,\mathbb{C})$ 的子群；两者的线性表示求解过程类似，所以我们直接借用 $SL(2,\mathbb{C})$ 群表示(15.4-28)，并令其中的 $c=-b^*$、$d=a^*$，有

$$D^j_{ts}(u)=\sum_{p=0}^{2j}\frac{\sqrt{(j-s)!(j+s)!(j-t)!(j+t)!}}{(j-p+t)!(s+p-t)!p!(j-s-p)!}\times \\ \times a^{j-p+t}(-b)^{*s+p-t}b^p a^{*j-s-p}. \tag{15.2-26}$$

从式(15.2-26)可以看出，当 j 是整数时，$D^j(u)=D^j(-u)$；我们称此时的表示 $D^j(u)$ 为 $SU(2)$ 的**偶表示**，例如 D^0,D^1. 当 j 是半奇数时，$D^j(u)=-D^j(-u)$；我们称此时的表示 $D^j(u)$ 为 $SU(2)$ 的**奇表示**，例如 $D^{\frac12},D^{\frac32}$.

先给出几个特例. 令 $j=0$，则 $s=t=p=0$；表示为 $D^0(u)=(1)$.

令 $j=1/2$，表示为 $D^{\frac12}=\begin{pmatrix}a & b\\ -b^* & a^*\end{pmatrix}$.

令 $j=1$，表示为

$$D^1=\begin{pmatrix}a^2 & \sqrt{2}ab & b^2\\ -\sqrt{2}ab^* & aa^*-bb^* & \sqrt{2}ba^*\\ b^{*2} & -\sqrt{2}a^*b^* & a^{*2}\end{pmatrix}.$$

以上矩阵的指标都是从大排到小，比如 $j=1$ 时，s,t 的排列顺序是 $1,0,-1$.

一般说来，通过上述方式得到的子群表示未必是不可约的；但这次很幸运[1]，利用 §15.1中的定理可以证明此表示为 $SU(2)$ 群的全部不等价、不可约、有限维幺正表示. 由于证明它是全部复表示过程需要用到空间完备性以及 Peter–Weyl 定理等较多数学知识，我们将略去这部分证明，具体可参阅[83]§6.6.4.

读者可先跳过下面的证明，在了解完 $SL(2,\mathbb{C})$ 群表示(15.4-28)之后再看.

15.2.4.1 表示的幺正性

为了便于叙述，写出后面才出现的公式（见(15.4-25)），并重新编号：

$$\boldsymbol{B}^j_s=\frac{u^{j+s}v^{j-s}}{\sqrt{(j+s)!(j-s)!}},\quad s=-j,-j+1,\cdots,j-1,j. \tag{15.2-27}$$

[1]本质原因是 $\mathfrak{su}(2)$ 是 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 的实形式. 省略详细讨论.

在 $S=\left(\begin{smallmatrix}a & b\\ -b^* & a^*\end{smallmatrix}\right)\in SU(2)$ 变换下，有

$$\begin{pmatrix}u' & v'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}u & v\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a & b\\ -b^* & a^*\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}au-b^*v & bu+a^*v\end{pmatrix}.$$

并且，有（利用矩阵 $S\in SU(2)$ 的幺正性(15.2-3)，即 $aa^*+bb^*=1$）

$$|u'|^2+|v'|^2=|u|^2+|v|^2.$$

我们将基矢(15.2-27)作如下运算：

$$\sum_s\left|\boldsymbol{B}_s^j\right|^2=\sum_s\frac{\left|u^{j+s}v^{j-s}\right|^2}{(j+s)!(j-s)!}\overset{\substack{15.4-26\\ \text{第560页}}}{=\!=\!=}\frac{1}{(2j)!}\left(|u|^2+|v|^2\right)^{2j}. \tag{15.2-28}$$

因此，在 $S\in SU(2)$ 变换前后，有

$$\sum_s\left|\boldsymbol{B}_s'^j\right|^2=\frac{1}{(2j)!}\left(|u'|^2+|v'|^2\right)^{2j}=\frac{\left(|u|^2+|v|^2\right)^{2j}}{(2j)!}=\sum_s\left|\boldsymbol{B}_s^j\right|^2. \tag{15.2-29}$$

又因为（参见式(15.2-26)）

$$\begin{aligned}\sum_s\left|\boldsymbol{B}_s'^j\right|^2&=\sum_s\boldsymbol{B}_s'^j\overline{\boldsymbol{B}_s'^j}=\sum_s\left(\sum_t\boldsymbol{B}_t^jD_{ts}^j\right)\left(\sum_q\overline{\boldsymbol{B}_q^j}\,\overline{D_{qs}^j}\right)\\&=\sum_{t,q}\left(\sum_sD_{ts}^j\overline{D_{qs}^j}\right)\boldsymbol{B}_t^j\overline{\boldsymbol{B}_q^j}.\end{aligned}$$

由式(15.2-29)，必然要求

$$\sum_sD_{ts}^j\overline{D_{qs}^j}=\delta_{qt}\quad\Leftrightarrow\quad(D^j)^\dagger=(D^j)^{-1}. \tag{15.2-30}$$

所以由式(15.2-27)定义的基 $\boldsymbol{B}_s^j$ 负载的表示是幺正表示，在这里我们看到 $\boldsymbol{B}_s^j$ 中因子 $1/\sqrt{(j+s)!(j-s)!}$ 的引入主要为了保证表示的幺正性（见(15.2-28)式中用到二项式公式那步的推导）.

15.2.4.2 表示的特征函数、不等价性、不可约性

我们先给出绕 z 轴转动的 $SU(2)$ 群元的表示矩阵，在求特征函数时会用到. 参见式(15.2-16)，令 $a=e^{\mathrm{i}\alpha/2}$、$b=0$；由于 $b=0$，表示(15.2-26)中只有 $p=0$ 且

$s+p-t=0$ 的项才有非零（因 0 的非 0 次幂一定恒为 0，详细讨论见 §15.2.7），所以表示(15.2-26)矩阵非零元为

$$D^j_{ts}\left(\begin{bmatrix} e^{\mathrm{i}\alpha/2} & 0 \\ 0 & e^{-\mathrm{i}\alpha/2} \end{bmatrix}\right) = e^{\mathrm{i}\alpha s}\delta_{ts}. \tag{15.2-31}$$

下面先给出表示(15.2-26)的特征函数．由定理12.12可知 $SU(2)$ 的矩阵一定相似于对角矩阵 $\mathrm{diag}\{e^{\mathrm{i}\alpha_1}, e^{\mathrm{i}\alpha_2}\}$．对角化后的矩阵也必须是 $SU(2)$ 矩阵，故有

$$P^{-1}UP = P^{\dagger}UP = \begin{pmatrix} e^{\mathrm{i}\alpha/2} & 0 \\ 0 & e^{-\mathrm{i}\alpha/2} \end{pmatrix}. \tag{15.2-32}$$

由于表示同态于群乘法，故有（由定理12.12知下式中 P 也是幺正的）

$$\begin{aligned} &D^j(P^{-1}UP) = D^j(P^{-1})D^j(U)D^j(P) = \big(D^j(P)\big)^{-1}D^j(U)D^j(P) \\ \Rightarrow\ &Tr\big(D^j(P^{-1}UP)\big) = Tr\Big(\big(D^j(P)\big)^{-1}D^j(U)D^j(P)\Big) = Tr\big(D^j(U)\big). \end{aligned}$$

上式最后一步用到了有限维矩阵求迹运算公式：$Tr(ABC)=Tr(BCA)$．由上式可知，$SU(2)$ 的任意群元 U 的表示(15.2-26)的特征函数为

$$\begin{aligned} \chi^j(U) =& Tr\big(D^j(U)\big) = Tr\big(D^j(P^{-1}UP)\big) \overset{15.2-32}{=\!=\!=} Tr\left(D^j\begin{bmatrix} e^{\mathrm{i}\alpha/2} & 0 \\ 0 & e^{-\mathrm{i}\alpha/2} \end{bmatrix}\right) \\ \overset{15.2-31}{=\!=\!=}& \sum_{s=-j}^{+j} e^{\mathrm{i}\alpha s} = \frac{\sin(j+\frac{1}{2})\alpha}{\sin\alpha/2}. \qquad \text{其中 } 0\leqslant\alpha\leqslant 4\pi \end{aligned} \tag{15.2-33}$$

有了特征函数，便可用定理15.9来证明表示的不可约性和不等价性．先证不可约性．我们采用式(15.2-20)中的参数 (ψ,θ,ϕ) 来描述 $SU(2)$，由(15.2-20)式可知 $SU(2)$ 任意群元 g 的特征方程为

$$\begin{aligned} &\begin{vmatrix} \cos\psi+\sqrt{-1}\cos\theta\sin\psi-\lambda & \sin\psi\sin\theta(\sqrt{-1}\cos\phi+\sin\phi) \\ \sin\psi\sin\theta(\sqrt{-1}\cos\phi-\sin\phi) & \cos\psi-\sqrt{-1}\cos\theta\sin\psi-\lambda \end{vmatrix} = 0 \\ \Rightarrow\ &\lambda^2-2\lambda\cos\psi+1=0. \end{aligned}$$

上式的惯性指数为：$e^{\mathrm{i}\psi}$、$e^{-\mathrm{i}\psi}$. 我们知道相似变换是不改变惯性指数的；故由定理12.12可知 $\forall g\in SU(2)$，一定存在一个幺正矩阵 P 使得 g 满足

$$P^{-1}gP = \begin{pmatrix} e^{\mathrm{i}\psi} & 0 \\ 0 & e^{-\mathrm{i}\psi} \end{pmatrix} \equiv H(\psi). \tag{15.2-34}$$

所以由(15.2-33)式可得

$$\chi^j(g)=\chi^j\big(H(\psi)\big)\xlongequal[\psi\text{ 的偶函数}]{\text{特征函数为}}\chi^j\big(H(-\psi)\big). \tag{15.2-35}$$

由 $SU(2)$ 的 Haar 测度(15.2-25)可得（需令式(15.2-33)中的 $\alpha=2\psi$）

$$\begin{aligned}\int_g\overline{\chi^j(g)}\chi^j(g)\Omega_{SU(2)}=&\frac{1}{2\pi^2}\int_g\overline{\chi^j\big(H(\psi)\big)}\chi^j\big(H(\psi)\big)\sin^2\psi\sin\theta\,\mathrm{d}\psi\wedge\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi\\=&\frac{1}{2\pi^2}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\psi\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\frac{\sin^2(2j+1)\psi}{\sin^2\psi}\sin^2\psi\sin\theta\\=&\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\psi\sin^2(2j+1)\psi=1-\frac{2}{\pi}\frac{\sin(4\pi j)}{8j+4}.\end{aligned}$$

在 $SU(2)$ 群表示中 j 或是整数或是半奇数，故上式最终结果为：

$$\int_g\overline{\chi^j(g)}\chi^j(g)\Omega_{SU(2)}=1. \tag{15.2-36}$$

由定理15.9可知表示(15.2-26)为不可约的.

下面阐述表示(15.2-26)的不等价性. 继续采用式(15.2-20)中的参数 (ψ,θ,ϕ) 来描述 $SU(2)$，同时令式(15.2-33)中的 $\alpha=2\psi$. $\forall g\in SU(2)$，当 $j\neq j'$ 时，有

$$\chi^j(g)=\frac{\sin(2j+1)\psi}{\sin\psi}\neq\frac{\sin(2j'+1)\psi}{\sin\psi}=\chi^{j'}(g).$$

由定理15.9可知，当 $j\neq j'$ 时，$D^j(g)$ 不等价于 $D^{j'}(g)$；当 $j=j'$ 时，$D^j(g)$ 一定等价于 $D^{j'}(g)$. 这说明 $SU(2)$ 群的 $2j+1$ 维复表示都等价于式(15.2-26).

15.2.5 $SO(3)$ 群表示

$SU(2)$ 群中的两个元素（$\pm u$）对应 $SO(3)$ 群中的一个元素，见式(15.2-12)；这种同态关系使得 $SO(3)$ 群的任意表示 $A(R_u)$ 都是 $SU(2)$ 群的表示 $D(u)$，即 $A(R_u)=D(u)$.

$$D(u)D(v)=A(R_u)A(R_v)=A(R_{uv})=D(uv). \tag{15.2-37}$$

可见此表示保群乘法不变.

反之，则未必．$SU(2)$ 群的元素 $\pm u$ 对应 $SO(3)$ 群中的元素 R_u．$SU(2)$ 群的偶表示有 $D^j(u)=D^j(-u)$（j 是整数）；此时可令 $SO(3)$ 群的表示 $A^j(R_u)=D^j(\pm u)$，则有

$$A^j(R_u)A^j(R_v)=D^j(\pm u)D^j(\pm v)=D^j(\pm uv)=A^j(R_{uv})=A^j(R_uR_v).$$

由上式可见：偶表示保持 $SO(3)$ 的群乘法不变，是它的表示．可以证明[83]§6.6.4这是 $SO(3)$ 群的全部不等价、不可约、有限维幺正表示．

当 j 是半奇数时，$SU(2)$ 群的奇表示 $D^j(u)=-D^j(-u)$，很明显 $D^j(u)\neq D^j(-u)$；而根据对应关系，$D^j(u)$ 和 $D^j(-u)$ 都与 $SO(3)$ 群的 $A^j(R_u)$ 对应，此时有 $A^j(R_u)=\pm D^j(u)=D^j(\pm u)$；得到了双值表示，它不能保持乘法不变

$$A^j(R_u)A^j(R_v)=D^j(\pm u)D^j(\pm v)=\pm D^j(\pm uv)=\pm A^j(R_{uv})=\pm A^j(R_uR_v).$$

它与群乘法规律差一个负号，故从纯数学角度来说它不是 $SO(3)$ 的群表示；然而物理上通常会说它是“双值表示”；采取双值表示概念是为了描述半奇数自旋（如电子自旋）．我们不打算引入双值表示这一概念（纯数学中没有此概念），而用另外一个变通的方式来处理此问题，见 §15.3．

15.2.6 李代数 $\mathfrak{su}(2)$ 和 $\mathfrak{so}(3)$

我们将给出 $SU(2)$ 和 $SO(3)$ 群的李代数，并将看到它们是同构的．先找到 $SU(2)$ 李代数的具体表达式，由式(13.10-32)可知其李代数是全部二维无迹反厄米矩阵，它可由三个独立实参数描述；下式即可表示全部二维无迹反厄米矩阵

$$A=\begin{pmatrix} z\mathrm{i} & y+x\mathrm{i} \\ -y+x\mathrm{i} & -z\mathrm{i} \end{pmatrix},\qquad \forall x,y,z\in\mathbb{R}. \tag{15.2-38}$$

可用 Pauli 矩阵(15.2-4)将其写成

$$A=x\,\mathrm{i}\sigma_x+y\,\mathrm{i}\sigma_y+z\,\mathrm{i}\sigma_z=-2xs_x-2ys_y-2zs_z. \tag{15.2-39}$$

最后一步已令 $s_i=\sigma_i/(2\mathrm{i})$．$\{s_i\}$ 的李积关系（此处是矩阵相乘后再相减）是

$$[s_x,s_y]=s_z,\qquad [s_y,s_z]=s_x,\qquad [s_z,s_x]=s_y. \tag{15.2-40}$$

这样，全部二维无迹反厄米矩阵可由基矢量 $\{s_i\}$ 生成，即 $A=\mathrm{Span}\{s_i\}$；连同对易关系(15.2-40)，$A=\mathrm{Span}_{\mathbb{R}}\{s_i\}$ 就是李代数 $\mathfrak{su}(2)$.

再求 $SO(3)$ 群的李代数，由式(13.10-10)可知它是全体三维反对称矩阵组成的集合．为了让它的几何意义更明显一些，我们通过单参数子群方式来求取．我们通过绕 x,y,z 轴的转动来寻找单参数子群，三个转动为（见式(13.10-17)、(13.10-19)）

$$C_x(\beta)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\cos\beta&-\sin\beta\\0&\sin\beta&\cos\beta\end{pmatrix},C_y(\beta)=\begin{pmatrix}\cos\beta&0&\sin\beta\\0&1&0\\-\sin\beta&0&\cos\beta\end{pmatrix},C_z(\beta)=\begin{pmatrix}\cos\beta&-\sin\beta&0\\\sin\beta&\cos\beta&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

容易验证它们都是单参数子群，比如 $C_x(\alpha)C_x(\beta)=C_x(\alpha+\beta)$．每个子群在单位元（即单位矩阵 I）处的切矢量就给出了李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 的一个元素；绕 x 轴的李代数生成元是

$$r_x=\left.\frac{\mathrm{d}C_x(\beta)}{\mathrm{d}\beta}\right|_{\beta=0}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{pmatrix}. \tag{15.2-41}$$

绕 y,z 轴的李代数生成元是

$$r_y=\left.\frac{\mathrm{d}C_y(\beta)}{\mathrm{d}\beta}\right|_{\beta=0}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\-1&0&0\end{pmatrix},\quad r_z=\left.\frac{\mathrm{d}C_z(\beta)}{\mathrm{d}\beta}\right|_{\beta=0}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

很明显这三个都是反对称矩阵，它们的对易关系是

$$[r_x,r_y]=r_z,\qquad [r_y,r_z]=r_x,\qquad [r_z,r_x]=r_y. \tag{15.2-42}$$

虽然 $\mathfrak{su}(2)$ 和 $\mathfrak{so}(3)$ 生成元的具体矩阵形式不同；但肉眼可见的，它们之间存在线性双射 $\Psi(s_i)=r_i,\ i=x,y,z$；并且映射 Ψ 保李积不变，故它是线性同构映射．这便说明了 $\mathfrak{su}(2)$ 和 $\mathfrak{so}(3)$ 是同构的．但 $SU(2)$ 和 $SO(3)$ 不是同构的，它们是 2 对 1 的同态．

物理学上较喜欢用厄米矩阵来表示生成元，即作如下变换 $J_i=\mathrm{i}r_i$：

$$J_x=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&-\mathrm{i}\\0&\mathrm{i}&0\end{pmatrix},\quad J_y=\begin{pmatrix}0&0&\mathrm{i}\\0&0&0\\-\mathrm{i}&0&0\end{pmatrix},\quad J_z=\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}&0\\\mathrm{i}&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}. \tag{15.2-43}$$

那么对易关系(15.2-42)变成

$$[J_x, J_y] = \mathbb{i} J_z, \quad [J_y, J_z] = \mathbb{i} J_x, \quad [J_z, J_x] = \mathbb{i} J_y. \tag{15.2-44}$$

在李代数基矢同构前提下，李代数基矢是矩阵还是偏导数算符没有差别. 式(15.2-43)和式(15.2-44)是矩阵形式；下面给出 $\mathfrak{so}(3)$ 李代数微分形式的基矢量. 我们已知平移算符基矢量的微分形式是(13.11-7)，即 $\hat{\boldsymbol{P}} = -\mathbb{i}\nabla$. 而无穷小的旋转为(13.10-12)，即 $\boldsymbol{x}' = \hat{Q}(\boldsymbol{n}\mathrm{d}\theta)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x} + \mathrm{d}\theta\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{x}$. 我们要求三维空间是各向同性的，那么标量函数场 $f(\boldsymbol{x})$ 在固有旋转作用下需遵循式(13.11-4)的规则，有

$$\begin{aligned} f'(\boldsymbol{x}) =& \hat{R}(\boldsymbol{n}\mathrm{d}\theta) f(\boldsymbol{x}) = f\big(\hat{Q}^{-1}(\boldsymbol{n}\mathrm{d}\theta)\boldsymbol{x}\big) = f(\boldsymbol{x} - \mathrm{d}\theta\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{x}) \\ =& f(\boldsymbol{x}) - \mathrm{d}\theta\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{x} \cdot \nabla f(\boldsymbol{x}) + \frac{1}{2!}(\mathrm{d}\theta\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{x})(\mathrm{d}\theta\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{x}) : \nabla\nabla f(\boldsymbol{x}) + o\big((\mathrm{d}\theta)^3\big) \\ =& \exp\left(-\mathbb{i}\mathrm{d}\theta\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{L}}\right) f(\boldsymbol{x}); \qquad \hat{\boldsymbol{L}} \equiv \boldsymbol{x} \times \hat{\boldsymbol{P}} = \boldsymbol{x} \times (-\mathbb{i}\nabla). \end{aligned}$$

上式最后一行利用了 $\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{x} \cdot \nabla = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{x} \times \nabla$；并定义了算符 $\hat{\boldsymbol{L}}$，它具有轨道角动量的物理意义. 这样便得到了转动算符的微分表达式

$$\hat{R}(\boldsymbol{n}\theta) = \exp\left(-\mathbb{i}\theta\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{L}}\right), \qquad \hat{\boldsymbol{L}} \equiv \boldsymbol{x} \times \hat{\boldsymbol{P}} = \boldsymbol{x} \times (-\mathbb{i}\nabla). \tag{15.2-45}$$

下面建立 $\mathfrak{so}(3)$ 李代数微分形式和矩阵形式间的同构关系 Ψ：

$$\begin{aligned} \Psi(J_x) =& \hat{L}_x = -\mathbb{i}(y\partial_z - z\partial_y), \\ \Psi(J_y) =& \hat{L}_y = -\mathbb{i}(z\partial_x - x\partial_z), \\ \Psi(J_z) =& \hat{L}_z = -\mathbb{i}(x\partial_y - y\partial_x). \end{aligned} \tag{15.2-46}$$

通过偏微分计算可直接验证，$\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$ 满足如下对易关系：

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = \mathbb{i}\hat{L}_z, \quad [\hat{L}_y, \hat{L}_z] = \mathbb{i}\hat{L}_x, \quad [\hat{L}_z, \hat{L}_x] = \mathbb{i}\hat{L}_y. \tag{15.2-47}$$

可见 Ψ 是 $\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$ 和 J_x, J_y, J_z 间同构映射，并且 Ψ 保 $\mathfrak{so}(3)$ 李积不变；从而不必再严格区分 $\mathfrak{so}(3)$ 李代数微分形式基矢量和矩阵形式的基矢量.

$SO(3)$ 群是连通、紧致李群，根据命题13.93可知指数映射可将李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 满射到 $SO(3)$ 上. 根据式(13.10-16)和式(15.2-45)可得

$$R(\alpha\beta\gamma) = e^{-\mathbb{i}\alpha\hat{L}_z} e^{-\mathbb{i}\beta\hat{L}_y} e^{-\mathbb{i}\gamma\hat{L}_z} = e^{-\mathbb{i}\alpha J_z} e^{-\mathbb{i}\beta J_y} e^{-\mathbb{i}\gamma J_z} = e^{\alpha r_z} e^{\beta r_y} e^{\gamma r_z}. \tag{15.2-48}$$

上式中的 J_i 是矩阵(15.2-43)，可以把它们直接代入上式，经过计算可求矩阵的指数（可借助符号演算软件），从而便可验证：式(15.2-48)就是式(13.10-16).

例 15.15 $\mathfrak{so}(3)$ 的 Killing 型、Casimir 算子.

由式(15.2-42)可得 $\mathfrak{so}(3)$ 的 Killing 型、Casimir 算子（矩阵形式）为

$$g_{\alpha\beta}=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-2&0\\0&0&-2\end{pmatrix};\qquad C_2=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}.$$

经过计算，还能得到算符形式的 Casimir 算子：$\hat{C}_2=\hat{L}^2=\hat{L}_x^2+\hat{L}_y^2+\hat{L}_z^2$. ■

15.2.7 角动量

$SU(2)$ 群的表示是幺正的，可以作用在粒子的 Hilbert 空间上（即波函数）. 下面我们寻找这些表示的基矢（式(15.2-27)）的物理意义，我们把 $\boldsymbol{B}_m^j(\xi,\zeta)$ 记成 $|jm\rangle$. 我们采用式(15.2-44)的记号，但作替换 $J\to\hat{J}$.

我们取 $a=\exp(-\mathrm{i}\frac{\gamma}{2})$、$b=0$（式(15.2-16)），即绕 z 轴转动；我们来看看此时的群表示有什么特征. 此时 $SU(2)$ 群表示(15.2-26)变为：

$$D^j_{m'm}(00\gamma)=\sum_{p=0}^{2j}\frac{(-)^p\sqrt{(j-m)!(j+m)!(j-m')!(j+m')!}}{p!(j+m-p)!(j-m'-p)!(m'+p-m)!}e^{-\mathrm{i}(m+m')\gamma/2}0^{m'-m+2p}.$$

由于 $b=0$，故只有 $m'-m+2p=0$ 的项才有贡献，否则为零. 继续计算有

$$D^j_{m'm}(00\gamma)=\frac{(-)^{(m-m')/2}\sqrt{(j-m)!(j+m)!(j-m')!(j+m')!}e^{-\mathrm{i}(m+m')\gamma/2}}{\frac{m-m'}{2}!(j+m-\frac{m-m'}{2})!(j-m'-\frac{m-m'}{2})!(m'-m+\frac{m-m'}{2})!}.$$

因已规定负数的阶乘是无穷大，故上式只有在 $m=m'$ 时才不为零，所以有

$$D^j_{m'm}(00\gamma)=\delta_{m'm}e^{-\mathrm{i}m\gamma}. \tag{15.2-49}$$

由式(15.2-48)可知

$$\hat{R}(00\gamma)|jm\rangle=e^{-\mathrm{i}\gamma\hat{J}_z}|jm\rangle=\sum_{m'}|jm'\rangle D^j_{m'm}(00\gamma)=e^{-\mathrm{i}m\gamma}|jm\rangle. \tag{15.2-50}$$

对上式的 γ 求取导数，并令 $\gamma=0$，得（即取李代数 $\mathfrak{su}(2)$）

$$\hat{J}_z|jm\rangle=m|jm\rangle. \tag{15.2-51}$$

我们取 $a=\cos\frac{\beta}{2}$、$b=-\sin\frac{\beta}{2}$（式(15.2-15)），即绕 y 轴转动；此时 $SU(2)$ 群表示(15.2-26)为

$$D^j_{m'm}(u)=\sum_{p=0}^{2j}\frac{(-)^{m'-m+3p}\sqrt{(j-m)!(j+m)!(j-m')!(j+m')!}}{p!(j+m-p)!(j-m'-p)!(m'+p-m)!}\times\left(\cos\frac{\beta}{2}\right)^{2j-2p+m-m'}\left(\sin\frac{\beta}{2}\right)^{m'-m+2p}.$$

对上式取 β 的导数，有

$$\partial_\beta D^j_{m'm}(u)=\sum_{p=0}^{2j}\frac{(-)^{m'-m+3p}\sqrt{(j-m)!(j+m)!(j-m')!(j+m')!}}{p!(j+m-p)!(j-m'-p)!(m'+p-m)!}\times$$
$$\times\left(\frac{1}{2}\sin^{m'-m+2p-1}\left(\frac{\beta}{2}\right)\cos^{2j-m'+m-2p-1}\left(\frac{\beta}{2}\right)(j\cos\beta-j+m'-m+2p)\right).$$

我们只关心 $\beta\to 0$ 的情形，此时只有 $2p=m-m'+1$ 项有贡献，其余项都为零（因 $\sin\frac{\beta}{2}\xrightarrow{\beta\to0}0$）．继续计算有

$$\partial_\beta D^j_{m'm}(u)=\frac{(-)^{\frac{m-m'+3}{2}}\frac{1}{2}\sqrt{(j-m)!(j+m)!(j-m')!(j+m')!}}{\frac{m-m'+1}{2}!(j+\frac{m+m'-1}{2})!(j-\frac{m+m'+1}{2})!(\frac{m'-m+1}{2})!}.$$

因已规定负数的阶乘是无穷大，故上式分母每项都不能是负的．由分母第一项和最后一项给出：$m-1\leqslant m'\leqslant m+1$．所以有：或者 $m'=m+1$，或者 $m'=m-1$，或者 $m'=m$．当 $m'=m$ 时，分子出现“$(-)^{\frac{3}{2}}$”，这是虚数；因此时的 a、b 都是实数，故矩阵元也都必须是实数，因此抛弃 $m'=m$ 项．只剩下 $m'=m+1$ 和 $m'=m-1$ 项；继续计算有

$$\begin{aligned}\partial_\beta D^j_{m'm}(u)=&\frac{-1}{2}\frac{\sqrt{(j-m)!(j+m)!(j-m-1)!(j+m+1)!}}{(0)!(j+m)!(j-m-1)!(1)!}\delta_{m',m+1}\\&+\frac{1}{2}\frac{\sqrt{(j-m)!(j+m)!(j-m+1)!(j+m-1)!}}{(1)!(j+m-1)!(j-m)!(0)!}\delta_{m',m-1}\\=&-\frac{1}{2}\sqrt{(j-m)(j+m+1)}\delta_{m',m+1}\\&+\frac{1}{2}\sqrt{(j+m)(j-m+1)}\delta_{m',m-1}.\end{aligned}$$

由式(15.2-48)可知（$\partial_\beta\hat{R}(0\beta0)\xrightarrow{\beta\to0}-\mathrm{i}\hat{J}_y$）

$$\mathrm{i}\hat{J}_y|jm\rangle=+\frac{1}{2}\sqrt{(j-m)(j+m+1)}|j,m+1\rangle$$

$$-\frac{1}{2}\sqrt{(j+m)(j-m+1)}|j,m-1\rangle. \tag{15.2-52}$$

与上式类似，可得

$$\begin{aligned}\hat{J}_x|jm\rangle =&+\frac{1}{2}\sqrt{(j-m)(j+m+1)}|j,m+1\rangle\\&+\frac{1}{2}\sqrt{(j+m)(j-m+1)}|j,m-1\rangle.\end{aligned} \tag{15.2-53}$$

我们定义

$$\hat{J}_\pm \equiv \hat{J}_x \pm \mathbb{i}\hat{J}_y. \tag{15.2-54}$$

则有

$$\hat{J}_\pm|jm\rangle = \sqrt{(j\mp m)(j\pm m+1)}\ |j,m\pm 1\rangle. \tag{15.2-55}$$

上式便是角动量磁量子数的升降算符.

请与任一本量子力学教材（例如[76]§22-4、[87]§11.5）比对，可发现上述给出的 $SU(2)$ 群表示空间基矢量为粒子的角动量，包括轨道角动量和自旋角动量.

我们通过求取 $SU(2)$ 群表示(15.2-26)导数的方式给出了李代数 $\mathfrak{su}(2)$ 作用在基矢上的表达式，它们为式(15.2-51)和(15.2-55). 从例题15.15可知 Casimir 算子在基矢上的作用为：

$$\hat{J}^2|jm\rangle = j(j+1)\ |jm\rangle. \tag{15.2-56}$$

由式式(15.2-51)、(15.2-55)和(15.2-56)出发，左作用对偶基矢 $\langle jm'|$，便可得到李代数 $\mathfrak{su}(2)$ 的线性表示矩阵 $\mathfrak{D}^{(j)}$.

当 $j=0$ 时，表示矩阵为：$J_z=J_\pm=(0)$.

当 $j=\frac{1}{2}$ 时，表示矩阵为：

$$J_z=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0\\0&-\frac{1}{2}\end{pmatrix},\quad J_+=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\quad J_-=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}. \tag{15.2-57}$$

由此易得

$$J_x=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad J_y=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&-\mathbb{i}\\\mathbb{i}&0\end{pmatrix},\quad J_z=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}. \tag{15.2-58}$$

当 $j=1$ 时，表示矩阵为：

$$J_z=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix},\ J_+=\begin{pmatrix}0&\sqrt{2}&0\\0&0&\sqrt{2}\\0&0&0\end{pmatrix},\ J_-=\begin{pmatrix}0&0&0\\\sqrt{2}&0&0\\0&\sqrt{2}&0\end{pmatrix}. \tag{15.2-59}$$

由此易得

$$J_x=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\ J_y=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}&0\\\mathrm{i}&0&-\mathrm{i}\\0&\mathrm{i}&0\end{pmatrix},\ J_z=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}. \tag{15.2-60}$$

例 15.16 式(15.2-60)与式(15.2-43)间的等价变换.

命

$$U=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1&0&1\\-\mathrm{i}&0&-\mathrm{i}\\0&\sqrt{2}&0\end{pmatrix},\qquad U^{-1}=U^{\dagger}. \tag{15.2-61}$$

我们将式(15.2-43)中矩阵改记为 J_i^s，则有

$$UJ_iU^{-1}=J_i^s,\qquad i=x,y,z. \tag{15.2-62}$$

请读者完成上式中的计算. ■

练习 15-2 试证明 §15.2.2中 S^3 群乘法是封闭的.

练习 15-3 试证明 S^3 的群元 (t,x,y,z)、$(+t,-x,-y,-z)$ 互逆.

练习 15-4 试证明式(15.2-23).

练习 15-5 试证明式(15.2-53).

15.3 经典到量子的实用性约定

群 $SO^+(p,q;\mathbb{R})$ 不是单连通的，它的双重通用覆盖群 $Spin(p,q)$ 是单连通的. 然而要完整描述 $Spin(p,q)$ 群需要 Clifford 代数知识[32]，这超出了本书范畴.

用不那么确切的数学语言来说：$Spin(p,q)$ 群有一类特殊的表示，它们不是来自 $SO^+(p,q)$ 的线性表示，而是真正属于自旋群的. 承载这类特殊表示的空间 S 被称为**旋量空间**，S 中的元素被称为 $Spin(p,q)$ 群的**旋量**（Spinor）.

一些低维的 $Spin(p,q)$ 群有同构群，我们只讨论两个：旋转群 $SO(3)$ 的双重通用覆盖群是单连通的 $Spin(3)\cong SU(2)$（见 §15.2.1），Lorentz 群 $SO^+(1,3)$ 的双重通用覆盖群是单连通的 $Spin(1,3)\cong SL(2,\mathbb{C})$.

在经典宏观物理中，描述自然运动的数域是实数域 $\mathbb{R}$；比如牛顿力学、电磁动力学、广义相对论等等．可能为了描述方便会引入虚数，但这些不是必要的，可以通过其它方式予以规避掉．

在量子世界中，描述物理的是复数域 $\mathbb{C}$；不论量子力学还是量子场论皆如此．量子物理中，描述粒子处于何种状态需用复 Hilbert 空间的复态矢量（参见第十六章）；所以量子物理从定义伊始就是复数，不是实数．描述物质运动的方程，比如薛定谔方程等，也无法避免地引入了虚数单位 $\mathbb{i}$．

在经典物理中，描述转动的是 $SO(3)$ 群；在宏观物理中此群的表示完全够用．当我们把 $SO(3)$ 群推广到量子物理时；前面说了 $SO(3)$ 在纯粹的数学上只有整数维表示，没有半奇数维表示，这导致 $SO(3)$ 无法描述半奇数自旋粒子（比如电子）．必须引入数学上不存在“双值表示”才能描述．这多少有些不便！

用不那么准确的数学语言来说复数域比实数域大两倍；$SU(2)$ 群是 $SO(3)$ 群的双重通用覆盖群，两个 $SU(2)$ 群元同态于一个 $SO(3)$ 群元．根据 Weinberg [65, §2.7]文末的评述，我们引入一个人为约定：*在量子物理中描述转动的是 $SU(2)$ 群，不再是 $SO(3)$ 群*．有此约定就无需引入数学上不存在“双值表示”了．

与此类似还可约定：*在量子物理中描述 Lorentz 变换的是 $SL(2,\mathbb{C})$ 群，不再是 $SO^+(1,3)$ 群*．这两个群的关系见 §15.4．

如果愿意，还可进一步约定：*在经典物理中用 $SO^+(p,q)$ 群描述的现象，推广到量子物理时，采用 $SO^+(p,q)$ 群的双重通用覆盖群 $Spin(p,q)$*．

15.4 $SL(2,\mathbb{C})$ 群

15.4.1 $SL(2,\mathbb{C})$ 与 $SO^+(1,3)$ 的同态关系

单连通的 $SL(2,\mathbb{C})$ 群是行列式为 1 的全体二维复矩阵，可由六个实参数来描述．$SL(2,\mathbb{C})$ 群是固有正时 Lorentz 群 $SO^+(1,3)$ 的双重通用覆盖群，我们来证明这个命题．借助式(15.2-4)，任意二维厄米矩阵 h 可表示成如下形式

$$h = x^\mu \sigma_\mu = \begin{pmatrix} t+z & x-\mathbb{i}y \\ x+\mathbb{i}y & t-z \end{pmatrix}; \qquad x^\mu = (t,x,y,z) \in \mathbb{R}^4. \tag{15.4-1}$$

我们将通过 h 来找到 $SL(2,\mathbb{C})$ 与 $SO^+(1,3)$ 的同态关系．设 $S\in SL(2,\mathbb{C})$，则

$$S=\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \gamma & \delta\end{pmatrix}\in SL(2,\mathbb{C});\quad \alpha\delta-\beta\gamma=1;\quad \alpha,\beta,\gamma,\delta\in\mathbb{C}. \tag{15.4-2}$$

h 本身是厄米矩阵；容易看到 $h'=ShS^\dagger$ 也是厄米矩阵，我们将其记为

$$h'=\begin{pmatrix}t'+z' & x'-\mathrm{i}y'\\ x'+\mathrm{i}y' & t'-z'\end{pmatrix}=ShS^\dagger;\qquad x'^\mu=(t',x',y',z')\in\mathbb{R}^4. \tag{15.4-3}$$

因为（因 $S\in SL(2,\mathbb{C})$，故 $\det S=1$，$\det S^\dagger=1$）

$$-x'^\mu x'_\mu=\det h'=\det S\cdot\det h\cdot\det S^\dagger=\det h=-x^\mu x_\mu. \tag{15.4-4}$$

从上式可知，因变换 $h'=ShS^\dagger$ 引起的 $x^\mu\to x'^\mu$ 变换是保持 $\mathbb{R}^4$ 中矢量的 Lorentz 间隔不变的；这也就说明此变换是 Lorentz 变换．经过繁琐的推演（可借助计算机符号运算软件），可以得到这个 Lorentz 变换如下：

$$x'^\mu=\Lambda x^\mu;\qquad \text{其中 Lorentz 矩阵 } \Lambda= \tag{15.4-5}$$

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}
\begin{pmatrix}\alpha\alpha^*+\beta\beta^*\\ +\gamma\gamma^*+\delta\delta^*\end{pmatrix} & \begin{pmatrix}\beta\alpha^*+\alpha\beta^*\\ +\delta\gamma^*+\gamma\delta^*\end{pmatrix} & \mathrm{i}\begin{pmatrix}\beta\alpha^*-\alpha\beta^*\\ +\delta\gamma^*-\gamma\delta^*\end{pmatrix} & \begin{pmatrix}\alpha\alpha^*-\beta\beta^*\\ +\gamma\gamma^*-\delta\delta^*\end{pmatrix}\\
\begin{pmatrix}\gamma\alpha^*+\alpha\gamma^*\\ +\delta\beta^*+\beta\delta^*\end{pmatrix} & \begin{pmatrix}\delta\alpha^*+\alpha\delta^*\\ +\gamma\beta^*+\beta\gamma^*\end{pmatrix} & \mathrm{i}\begin{pmatrix}\delta\alpha^*-\alpha\delta^*\\ +\beta\gamma^*-\gamma\beta^*\end{pmatrix} & \begin{pmatrix}\gamma\alpha^*+\alpha\gamma^*\\ -\delta\beta^*-\beta\delta^*\end{pmatrix}\\
\mathrm{i}\begin{pmatrix}\alpha\gamma^*-\gamma\alpha^*\\ +\beta\delta^*-\delta\beta^*\end{pmatrix} & \mathrm{i}\begin{pmatrix}\alpha\delta^*-\delta\alpha^*\\ +\beta\gamma^*-\gamma\beta^*\end{pmatrix} & \begin{pmatrix}\delta\alpha^*+\alpha\delta^*\\ -\gamma\beta^*-\beta\gamma^*\end{pmatrix} & \mathrm{i}\begin{pmatrix}\alpha\gamma^*-\gamma\alpha^*\\ +\delta\beta^*-\beta\delta^*\end{pmatrix}\\
\begin{pmatrix}\alpha\alpha^*+\beta\beta^*\\ -\gamma\gamma^*-\delta\delta^*\end{pmatrix} & \begin{pmatrix}\beta\alpha^*+\alpha\beta^*\\ -\delta\gamma^*-\gamma\delta^*\end{pmatrix} & \mathrm{i}\begin{pmatrix}\beta\alpha^*-\alpha\beta^*\\ +\gamma\delta^*-\delta\gamma^*\end{pmatrix} & \begin{pmatrix}\alpha\alpha^*-\beta\beta^*\\ -\gamma\gamma^*+\delta\delta^*\end{pmatrix}
\end{pmatrix}$$

可通过 $\Lambda^T\eta\Lambda=\eta$（见式(13.10-21)）来验证上式是 Lorentz 变换．此处 Lorentz 变换 Λ 的零零分量是 ${\Lambda^0}_0=\alpha\alpha^*+\beta\beta^*+\gamma\gamma^*+\delta\delta^*>0$；再加上此处的 Λ 是一般的 Lorentz 变换，故有 ${\Lambda^0}_0\geqslant 1$；由此可知此处的 $\Lambda\in L^\uparrow_\pm$（见表13.3）．可以计算出 Λ 的行列式为 1（可借助计算机符号运算软件），故最终确定此处的 $\Lambda\in L^\uparrow_+$．

这样，通过 h（式(15.4-1)），我们找到了一个从 $SL(2,\mathbb{C})$ 到 Lorentz 变换 $SO^+(1,3)$（$L^\uparrow_+$ 分片就是 $SO^+(1,3)$）的映射，记为 h．我们还需验证此映射保持群乘法不变．每一个 $x^\mu\in\mathbb{R}^4$ 与厄米矩阵 h（式(15.4-1)）间存在双射关系．由式(15.4-5)有如下变换，$x'=\Lambda_{A_1}x$，以及 $x''=\Lambda_{A_2}x'=\Lambda_{A_2}\Lambda_{A_1}x$．令 $h''=x''^\mu\sigma_\mu$，$h'=x'^\mu\sigma_\mu$．用 x^μ 与 h 间的双射关系将“$x''=\Lambda_{A_2}x'=\Lambda_{A_2}\Lambda_{A_1}x$”翻译成

$$h''=x''^\mu\sigma_\mu=A_2(x'^\mu\sigma_\mu)A_2^\dagger=A_2\big(A_1(x^\mu\sigma_\mu)A_1^\dagger\big)A_2^\dagger=A_2A_1(x^\mu\sigma_\mu)(A_2A_1)^\dagger.$$

上式说明了 $h: SL(2,\mathbb{C}) \to SO^+(1,3)$ 保持群乘法不变

$$\Lambda_{A_2}\Lambda_{A_1} \quad \overset{h}{\longleftrightarrow} \quad A_2A_1 \quad \overset{h}{\longleftrightarrow} \quad \Lambda_{A_2A_1}. \tag{15.4-6}$$

此式说明了 $h: SL(2,\mathbb{C}) \to SO^+(1,3)$ 是同态映射.

下面寻找同态核. 本质上就是寻找有哪些 $S \in SL(2,\mathbb{C})$ 使得式(15.4-5)中的 Λ 是单位矩阵 I; 由 ${\Lambda^0}_3 = 0$ 和 ${\Lambda^3}_0 = 0$ 可得

$$\alpha\alpha^* = \delta\delta^*, \qquad \beta\beta^* = \gamma\gamma^*. \tag{15.4-7}$$

再由 ${\Lambda^0}_0 = 1$ 和 ${\Lambda^3}_3 = 1$ 可得

$$\alpha\alpha^* + \beta\beta^* = 1, \quad \alpha\alpha^* - \beta\beta^* = 1. \tag{15.4-8}$$

结合上两式，可得

$$\alpha\alpha^* = 1 = \delta\delta^*, \quad \beta = 0 = \gamma. \tag{15.4-9}$$

将式(15.4-9)带回式(15.4-5)中的 Λ 可得

$$\delta\alpha^* + \alpha\delta^* = 2 \quad \text{和} \quad \delta\alpha^* = \alpha\delta^* \quad \underset{15.4-8}{\overset{15.4-7}{\Longrightarrow}} \quad \alpha = \delta. \tag{15.4-10}$$

把以上结果带回式(15.4-5)中的 Λ 自然得到单位矩阵 I. 结合以上诸式，由 $1 = \det S = \alpha\delta$，最终我们得到

$$\alpha^2 = 1; \qquad \delta = \alpha, \quad \beta = 0 = \gamma. \tag{15.4-11}$$

与式(15.4-5)中 $\Lambda = I$ 相对应的 $S \in SL(2,\mathbb{C})$ 是（即同态核）

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad \bar{I}_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{15.4-12}$$

由定理2.15可知商群 $SL(2,\mathbb{C})/\{I_2, -I_2\}$ 微分同胚于 $SO^+(1,3)$; 这说明 $SL(2,\mathbb{C})$ 是双重同态于 $SO^+(1,3)$，即两个 $SL(2,\mathbb{C})$ 元素对应一个 $SO^+(1,3)$ 元素.

我们省略了 $SL(2,\mathbb{C})$ 单连通性的证明，请查阅李群的专门书籍.

其实 $SL(2,\mathbb{C})$ 的正规子群只有 $\{I_2, \bar{I}_2\}$、$\{I_2\}$ 和 $SL(2,\mathbb{C})$，下面证明之.

命题 15.17 *$SL(2,\mathbb{C})$ 的非平凡正规子群只有 $\{I_2, \bar{I}_2\}$.*

证明．设 N 是 $SL(2,\mathbb{C})$ 的非平凡正规子群，且 $N \neq \{I_2, \bar{I}_2\}$．取 $S = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in N$，不失一般性设 $c \neq 0$．若 $c = 0$，则作如下变换

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -x & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ x & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+bx & b \\ c-x(a-d+bx) & d-bx \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}.$$

其中 $c' = c - x(a-d+bx)$，那么总存在 $x \in \mathbb{C}$ 使得 $c' \neq 0$．

取 $B = \left(\begin{smallmatrix} 1 & y \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，则

$$B^{-1}SB = \begin{pmatrix} a-cy & b-y(-a+d+cy) \\ c & d+cy \end{pmatrix} \in N.$$

选取 y 使 $b - y(-a+d+cy) = 0$，由于 $\det(B^{-1}SB) = (\det B^{-1})(\det S)\det B = \det S = 1$，故对于这样选定的 y 而言，$a-cy$ 与 $d+cy$ 互为倒数，从而得

$$B^{-1}SB = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ c & \alpha^{-1} \end{pmatrix} \in N, \quad \text{其中 } c \neq 0.$$

若 $\alpha = +1$，则得 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{smallmatrix}\right) \in N$．

若 $\alpha = -1$，则得 $\left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ c & -1 \end{smallmatrix}\right) \in N$，从而有 $\left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ c & -1 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ c & -1 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ -2c & 1 \end{smallmatrix}\right) \in N$．

若 $\alpha \neq \pm 1$，则在

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -x & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ c & \alpha^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ x & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ c + x\left(\alpha^{-1} - \alpha\right) & \alpha^{-1} \end{pmatrix}.$$

中取 $x = \frac{c}{\alpha - \alpha^{-1}}$，得 $\left(\begin{smallmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha^{-1} \end{smallmatrix}\right) \in N$，从而又得

$$\begin{pmatrix} \alpha^{-1} & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ c & \alpha^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c\alpha & 1 \end{pmatrix} \in N, \quad c \neq 0.$$

这就证得：总有 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ c_0 & 1 \end{smallmatrix}\right) \in N$，其中 $c_0 \neq 0$．

由 $\begin{pmatrix} y^{-1} & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c_0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y & 0 \\ 0 & y^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c_0 y^2 & 1 \end{pmatrix}$ 可知

$\forall x \neq 0$，只要令上式中的 $y = \sqrt{c_0^{-1}x}$，就可以得到：$\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ x & 1 \end{smallmatrix}\right) \in N$ ．

同样可得：$\forall y \neq 0$，有 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & y \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right) \in N$ ．

因为 $SL(2,\mathbb{C})$ 的任一矩阵均可表为若干个形如 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ x & 1 \end{smallmatrix}\right)$ 和 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & y \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ 的乘积，从而得 $N = SL(2,\mathbb{C})$．这就证得 $SL(2,\mathbb{C})$ 的非平凡正规子群只有 $\{I_2, \bar{I}_2\}$． ■

我们取式(15.4-2)中的 $\alpha=\cosh\frac{\psi}{2}=\delta$、$\beta=-\sinh\frac{\psi}{2}=\gamma$，记为 $K_1(\psi)$；代入式(15.4-5)，有

$$K_1(\psi)=\begin{pmatrix}\cosh\frac{\psi}{2} & -\sinh\frac{\psi}{2}\\ -\sinh\frac{\psi}{2} & \cosh\frac{\psi}{2}\end{pmatrix}\leftrightarrow\Lambda_{K_1}=\begin{pmatrix}\cosh(\psi) & -\sinh(\psi) & 0 & 0\\ -\sinh(\psi) & \cosh(\psi) & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}. \tag{15.4-13}$$

这是沿 x 轴的伪转动．再取 $\alpha=\cosh\frac{\psi}{2}=\delta$、$\beta=\mathrm{i}\sinh\frac{\psi}{2}=-\gamma$，有

$$K_2(\psi)=\begin{pmatrix}\cosh\frac{\psi}{2} & \mathrm{i}\sinh\frac{\psi}{2}\\ -\mathrm{i}\sinh\frac{\psi}{2} & \cosh\frac{\psi}{2}\end{pmatrix}\leftrightarrow\Lambda_{K_2}=\begin{pmatrix}\cosh(\psi) & 0 & -\sinh(\psi) & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ -\sinh(\psi) & 0 & \cosh(\psi) & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}. \tag{15.4-14}$$

这是沿 y 轴的伪转动．再取 $\alpha=\exp(-\frac{\psi}{2})$、$\delta=\exp(\frac{\psi}{2})$、$\beta=0=\gamma$，有

$$K_3(\psi)=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-\psi/2} & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{\psi/2}\end{pmatrix}\quad\leftrightarrow\quad\Lambda_{K_3}=\begin{pmatrix}\cosh(\psi) & 0 & 0 & -\sinh(\psi)\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ -\sinh(\psi) & 0 & 0 & \cosh(\psi)\end{pmatrix}. \tag{15.4-15}$$

这是沿 z 轴的伪转动．

15.4.2 $SL(2,\mathbb{C})$ 群有限维复表示

不难验证 $SU(2)$ 群元与其复共轭矩阵

$$U=\begin{pmatrix}a & b\\ -b^* & a^*\end{pmatrix}\in SU(2)\quad\text{和}\quad\bar{U}=\begin{pmatrix}a^* & b^*\\ -b & a\end{pmatrix}$$

满足如下关系 $\bar{U}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}U\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}^{-1}U\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$.

所以 $SU(2)$ 自身及其复共轭的表示是等价的．

但 $SL(2,\mathbb{C})$ 群比 $SU(2)$ 少了一个幺正条件，这导致

$$\text{矩阵}\ \begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \gamma & \delta\end{pmatrix}\in SL(2,\mathbb{C})\quad\text{和其复矩阵}\ \begin{pmatrix}\alpha^* & \beta^*\\ \gamma^* & \delta^*\end{pmatrix} \tag{15.4-16}$$

的表示是不等价的．因此对于 $SL(2,\mathbb{C})$ 群，我们必须引入两套空间．

$$\text{设}\ SL(2,\mathbb{C})\ni S=\begin{pmatrix}a^0{}_0 & a^0{}_1\\ a^1{}_0 & a^1{}_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}. \tag{15.4-17}$$

上式中，我们已经令 $a^0{}_0=a$、$a^0{}_1=b$、$a^1{}_0=c$、$a^1{}_1=d$；这是一种通用的记法. 我们构造一个具有两个分量的复元素 $(\phi^0,\phi^1)^T$，$\phi^0,\phi^1\in\mathbb{C}$；矩阵 S 作用在它上面，将其变为 $(\phi'^0,\phi'^1)^T$，具体表示为

$$\begin{pmatrix}\phi'^0\\ \phi'^1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a^0{}_0 & a^0{}_1\\ a^1{}_0 & a^1{}_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\phi^0\\ \phi^1\end{pmatrix}\quad\Leftrightarrow\quad \phi'^A=\sum_{B=0}^{1}a^A{}_B\phi^B. \tag{15.4-18}$$

称服从 $SL(2,\mathbb{C})$ 变换规则的 $(\phi^0,\phi^1)^T$ 是**基本二分量旋量**或 **Weyl 左手旋量**.

例 15.18 进一步理解旋量定义(15.4-18).

设有建立在复数域 $\mathbb{C}$ 上的二维复线性空间 V；设 o^A、ι^A 是 V 中两个线性无关的矢量，那么 $\{o^A,\iota^A\}$ 可以看成 V 的基矢. 很明显，任意一对复数不能称为旋量，它需要满足一定规则. 设 $SL(2,\mathbb{C})\ni S=\left(\begin{smallmatrix}a & b\\ c & d\end{smallmatrix}\right)$；当旧基矢 $\{o^A,\iota^A\}$ 经 S^{-1} 变成新基矢 $\{o'^A,\iota'^A\}$ 时，即 $\{o^A,\iota^A\}\overset{S^{-1}}{\to}\{o'^A,\iota'^A\}$；旧复数对 $(\xi,\zeta)^T$ 经 S 变成新复数对 $(\xi',\zeta')^T$，即 $(\xi,\zeta)^T\overset{S}{\to}(\xi',\zeta')^T$；那么，我们称复数对 $(\xi,\zeta)^T$ 是基本二分量旋量. 也就是

$$\left(o^A,\ \iota^A\right)\begin{pmatrix}\xi\\ \zeta\end{pmatrix}=\left(\left(o^A,\ \iota^A\right)S^{-1}\right)\cdot\left[S\begin{pmatrix}\xi\\ \zeta\end{pmatrix}\right]=\left(o'^A,\ \iota'^A\right)\begin{pmatrix}\xi'\\ \zeta'\end{pmatrix}. \tag{15.4-19}$$

这其实就是矢量的分量定义方式，见式(3.7-6)；故我们把二分量旋量称为遵循 $SL(2,\mathbb{C})$ 变换的二维复矢量. 而 $SL(2,\mathbb{C})$ 变换可以看成复 Lorentz 变换（参见式(15.4-5)），故二分量旋量也就是四维 Lorentz 实矢量；它俩就是一回事儿. 遵循 $SL(2,\mathbb{C})$ 变换的二维复线性空间 V 称为旋量空间，用下面即将介绍的记号就是 $V\cong\mathfrak{S}^A$. ■

$SL(2,\mathbb{C})$ 的复共轭矩阵表示与其自身并不等价；为此，我们引入一套带点的记号来标记复共轭：$\bar\phi^{\dot0}\equiv\bar\phi^0$，$\bar\phi^{\dot1}\equiv\bar\phi^1$. 则复共轭情形下的变换规律是

$$\begin{pmatrix}\bar\phi'^{\dot0}\\ \bar\phi'^{\dot1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\bar a^{\dot0}{}_{\dot0} & \bar a^{\dot0}{}_{\dot1}\\ \bar a^{\dot1}{}_{\dot0} & \bar a^{\dot1}{}_{\dot1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\bar\phi^{\dot0}\\ \bar\phi^{\dot1}\end{pmatrix}\quad\Leftrightarrow\quad \bar\phi'^{\dot A}=\sum_{\dot B=\dot0}^{\dot1}\bar a^{\dot A}{}_{\dot B}\bar\phi^{\dot B}. \tag{15.4-20}$$

我们称 $(\bar\phi^{\dot0},\bar\phi^{\dot1})^T$ 是**带点的基本二分量旋量**或 **Weyl 右手旋量**. 数字以及角标上的圆点只是为了区分式(15.4-18)而加的，没有其它含义；矩阵 $\{\bar a^{\dot A}{}_{\dot B}\}$ 是矩阵 $\{a^A{}_B\}$ 的复共轭.

我们以左手二分量旋量为例给出**旋量空间**明确定义，记为 $\mathfrak{S}$，它包含所有的左手二分量旋量；在其中定义加法、数乘如下

$$(\phi^0,\phi^1)^T+(\psi^0,\psi^1)^T\overset{def}{=}(\phi^0+\psi^0,\ \phi^1+\psi^1)^T,\qquad \text{变元}\ \phi^0,\phi^1,\psi^0,\psi^1\in\mathbb{C};$$

$$\lambda(\phi^0,\phi^1)^T \overset{def}{=}(\lambda\phi^0,\lambda\phi^1)^T, \qquad \text{常数}\,\lambda\in\mathbb{C}. \tag{15.4-21}$$

由上式构建的加法和数乘满足线性空间的八条公理（验证过程留给读者），故 $\mathfrak{S}$ 是数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间，其中元素称为旋量矢量（spin-vector）. 需要指出的是：$\mathfrak{S}$ 中只包含二分量旋量，不包含高阶旋量. 为了表明旋量的阶数，将其记为 $\mathfrak{S}^A$；它自然有对偶空间 $\mathfrak{S}_A$.

引入带点、不带点表示方式的学者是荷兰数学家 B. L. Van der Waerden（1903-1996），他是最早将群论引入量子物理的知名学者之一. 为使行文流畅一些，我们把高阶旋量的定义放到 §15.5.2；但下面的表示要用到高阶旋量（就是旋量的张量积）：

$$\Phi^{A_1\cdots A_m\dot B_1\cdots\dot B_n}=\phi^{A_1}\cdots\phi^{A_m}\bar\phi^{\dot B_1}\cdots\bar\phi^{\dot B_n}, \quad \{A\},\ \{\dot B\}\ \text{取值}\ 0,1 \tag{15.4-22}$$

我们需要 $\Phi^{A_1\cdots A_m\dot B_1\cdots\dot B_n}$ 对角标 $A_1,\cdots,A_m$ 全对称，以及对 $\dot B_1\cdots\dot B_n$ 全对称. 由于指标全对称，$A_1,\cdots,A_m$ 独立的取值为：$0,\cdots,0$、$0,\cdots,0,1$、$0,\cdots,0,1,1$、……、$0,1,\cdots,1$、$1,\cdots,1$；共有 $m+1$ 个. $\dot B_1\cdots\dot B_n$ 的独立指标有 $n+1$ 个，故这个空间维数是 $(m+1)(n+1)$. 在全对称约定下，式(15.4-22)可以被写成

$$\Phi^{\{A_i\dot B_j\}}=\left(\phi^0\right)^k\left(\phi^1\right)^{m-k}\left(\bar\phi^{\dot 0}\right)^l\left(\bar\phi^{\dot 1}\right)^{n-l},\ 0\leqslant k\leqslant m,\ 0\leqslant l\leqslant n. \tag{15.4-23}$$

我们先用旋量的两个分量构造全对称的张量积，然后把它写成了齐次多项式形式（即(15.4-23)）. 全对称旋量 $\Phi^{\{A_i\dot B_j\}}$ 在 $SL(2,\mathbb{C})$ 群元作用下仍是同阶旋量，具有封闭性，可构成该群的表示空间.

用左手旋量来构造 $SL(2,\mathbb{C})$ 群表示空间，但为了表示简洁（省去角标），我们将左手二分量旋量记为 (u,v). 对于矩阵(15.4-17)（矩阵 S），矩阵 S 右作用在 (u,v)（其中 u、v 是复数）上的结果是：

$$\begin{pmatrix}u' & v'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}u & v\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}au+cv & bu+dv\end{pmatrix}. \tag{15.4-24}$$

令式(15.4-23)中 $m=2j_1$、$n=0$，并改变指标范围后，选择被变换的基矢为：

$$\boldsymbol{B}^{j_1}_{s_1}=\frac{u^{j_1+s_1}v^{j_1-s_1}}{\sqrt{(j_1+s_1)!(j_1-s_1)!}},\quad s_1=-j_1,-j_1+1,\cdots,j_1-1,j_1. \tag{15.4-25}$$

将基矢写成上述形式的主要目的是：当 $SL(2,\mathbb{C})$ 群表示约化到 $SU(2)$ 群表示时，式(15.4-25)中的分母可保证 $SU(2)$ 群表示(15.2-26)为幺正的.

下面需用二项式展开定理：

$$(x+y)^r=\sum_{s=0}^{r}\frac{r!}{s!(r-s)!}x^s y^{r-s}. \tag{15.4-26}$$

将映射 $S\xrightarrow{\varphi}\hat{D}_S$ 直接作用在基矢 $\boldsymbol{B}_{s_1}^{j_1}$ 上，并用上式，有

$$\begin{aligned}\hat{D}_S\boldsymbol{B}_{s_1}^{j_1}=&\frac{u'^{j_1+s_1}v'^{j_1-s_1}}{\sqrt{(j_1+s_1)!(j_1-s_1)!}}=\frac{(au+cv)^{j_1+s_1}(bu+dv)^{j_1-s_1}}{\sqrt{(j_1+s_1)!(j_1-s_1)!}}\\=&\sum_{p=0}^{j_1-s_1}\sum_{q=0}^{j_1+s_1}\frac{\sqrt{(j_1-s_1)!(j_1+s_1)!}}{p!(j_1-s_1-p)!q!(j_1+s_1-q)!}(au)^q(cv)^{j_1+s_1-q}(bu)^p(dv)^{j_1-s_1-p}\\=&\sum_{p=0}^{j_1-s_1}\sum_{q=0}^{j_1+s_1}\frac{\sqrt{(j_1-s_1)!(j_1+s_1)!}}{p!(j_1-s_1-p)!q!(j_1+s_1-q)!}a^q c^{j_1+s_1-q}b^p d^{j_1-s_1-p}u^{q+p}v^{2j_1-q-p}.\end{aligned}$$

对上式最后一行的求和指标作代换 $-t=j_1-p-q$，继续计算有

$$\hat{D}_S\boldsymbol{B}_{s_1}^{j_1}=\sum_{p=0}^{j_1-s_1}\sum_{t=j_1}^{-j_1}\frac{\sqrt{(j_1-s_1)!(j_1+s_1)!}\;a^{j_1-p+t}c^{s_1+p-t}b^p d^{j_1-s_1-p}}{p!(j_1-s_1-p)!(j_1-p+t)!(s_1+p-t)!}u^{j_1+t}v^{j_1-t}.$$

将上式的求和符号作调换，即

$$\sum\nolimits_{p=0}^{j_1-s_1}\sum\nolimits_{t=j_1}^{-j_1}=\sum\nolimits_{t=j_1}^{-j_1}\sum\nolimits_{p=0}^{2j_1}.$$

规定负整数阶乘是正无穷大，则作调换之后 p 的求和范围是 $0\leqslant p\leqslant 2j_1$．有

$$\begin{aligned}\hat{D}_S\boldsymbol{B}_{s_1}^{j_1}=&\sum_{t=j_1}^{-j_1}\sum_{p=0}^{2j_1}\frac{\sqrt{(j_1-s_1)!(j_1+s_1)!(j_1-t)!(j_1+t)!}}{p!(j_1-s_1-p)!(j_1-p+t)!(s_1+p-t)!}\times\\&\times a^{j_1-p+t}c^{s_1+p-t}b^p d^{j_1-s_1-p}\boldsymbol{B}_t^{j_1}.\end{aligned} \tag{15.4-27}$$

计算到这里，需要补充一个前面未曾提及的问题，即由基矢 $\boldsymbol{B}_t^{j_1}$ 张成的空间 $\mathrm{Span}\{\boldsymbol{B}_t^{j_1}\}$ 能否成为 $SL(2,\mathbb{C})$ 群的表示空间．式(15.4-27)表明，在映射 $S\xrightarrow{\varphi}\hat{D}_S$ 作用下，空间 $\mathrm{Span}\{\boldsymbol{B}_t^{j_1}\}$ 是封闭的，故可以作为群表示空间．式(15.4-27)可以写成：$\hat{D}_S\boldsymbol{B}_{s_1}^{j_1}=\sum_t\boldsymbol{B}_t^{j_1}D_{ts_1}^{j_1}(S)$，其中 $D_{ts_1}^{j_1}(S)$ 是 $SL(2,\mathbb{C})$ 群的表示矩阵

$$\begin{aligned}D_{ts_1}^{j_1}(S)=&\sum_{p=0}^{2j_1}\frac{\sqrt{(j_1-s_1)!(j_1+s_1)!(j_1-t)!(j_1+t)!}}{(j_1-p+t)!(s_1+p-t)!p!(j_1-s_1-p)!}\times\\&\times a^{j_1-p+t}c^{s_1+p-t}b^p d^{j_1-s_1-p}.\end{aligned} \tag{15.4-28}$$

如果，我们还有另外一个群元 T 继续作用在上述映射上，则有

$$\begin{aligned}\hat{D}_{TS}\boldsymbol{B}^{j_1}_{s_1} =&\hat{D}_T\circ\hat{D}_S\boldsymbol{B}^{j_1}_{s_1}=\hat{D}_T\left(\sum_t \boldsymbol{B}^{j_1}_t D^{j_1}_{ts_1}(S)\right)=\sum_t\left(\hat{D}_T\boldsymbol{B}^{j_1}_t\right)D^{j_1}_{ts_1}(S)\\ =&\sum_{u,t}\boldsymbol{B}^{j_1}_u D^{j_1}_{ut}(T)D^{j_1}_{ts_1}(S)=\sum_u \boldsymbol{B}^{j_1}_u D^{j_1}_{us_1}(TS).\end{aligned}\tag{15.4-29}$$

上式说明，我们所选的映射关系保持群乘法不变.

仿照 S 的基矢，令式(15.4-23)中 $m=0$、$n=2j_2$，构造其复共轭基矢：

$$\overline{\boldsymbol{B}}^{j_2}_{s_2}=\frac{\bar{u}^{j_2+s_2}\bar{v}^{j_2-s_2}}{\sqrt{(j_2+s_2)!(j_2-s_2)!}},\quad s_2=-j_2,-j_2+1,\cdots,j_2-1,j_2.\tag{15.4-30}$$

那么，复共轭矩阵 $\overline{S}$ 的表示为：$\overline{D}^{j_2}_{ts_2}(\overline{S})=\overline{D^{j_2}_{ts_2}(S)}$ （即式(15.4-28)的复共轭）.

最终，由线性空间 $\mathrm{Span}\{\boldsymbol{B}^{j_1}_{s_1}\otimes\overline{\boldsymbol{B}}^{j_2}_{s_2}\}$ （后面将省略张量积符号“$\otimes$”；此式与(15.4-23)存在双射关系）负载的 $SL(2,\mathbb{C})$ 群表示记为 $\boxed{D^{(j_1j_2)}}$：

$$D^{(j_1j_2)}=D^{j_1}_{t_1s_1}(S)\otimes\overline{D}^{j_2}_{t_2s_2}(\overline{S}).\qquad\text{“}\otimes\text{”是两矩阵张量积}\tag{15.4-31}$$

式中 $2j_1$、$2j_2$ 是从 0 算起的非负整数；表示(15.4-31)中行（t）、列（s）指标都从 j 递减到 $-j$ 排列. 很明显，$\mathrm{Span}\{\boldsymbol{B}^{j_1}_{s_1}\overline{\boldsymbol{B}}^{j_2}_{s_2}\}$ 的维数是：$(2j_1+1)(2j_2+1)$. 前面介绍的带点、不带点基本二分量旋量是构成线性空间 $\mathrm{Span}\{\boldsymbol{B}^{j_1}_{s_1}\overline{\boldsymbol{B}}^{j_2}_{s_2}\}$ 的基本元素.

当 j_1+j_2 为整数时，式(15.4-31)是 Lorentz 群的（单值）表示. 当 j_1+j_2 为半奇数时，式(15.4-31)对应 Lorentz 群*双值表示*；依照 §15.3约定，我们不采用双值表示这一术语.

关于 $SL(2,\mathbb{C})$ 群表示，可以证明（参见[5]附录 A3，或类似文献）：**(1)** 复表示(15.4-31)都是不可约的. **(2)** 任意有限维不可约复表示都等价于表示(15.4-31). **(3)** 所有非平庸的有限维表示都不是幺正的（见定理15.10）.

给出几个例子. 当 $j_1=0=j_2$ 时，表示是一维单位矩阵，即 $D^{(00)}=(1)$.

当 $2j_1=1,\ 2j_2=0$ 及 $2j_1=0,\ 2j_2=1$ 时，有

$$D^{(\frac{1}{2}0)}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix},\qquad D^{(0\frac{1}{2})}=\begin{pmatrix}\bar{a}&\bar{b}\\\bar{c}&\bar{d}\end{pmatrix}.\tag{15.4-32}$$

当 $2j_1=2,\ 2j_2=0$ 时，有

$$D^{(10)}=\begin{pmatrix}a^2&\sqrt{2}ab&b^2\\\sqrt{2}ac&bc+ad&\sqrt{2}bd\\c^2&\sqrt{2}cd&d^2\end{pmatrix}.\tag{15.4-33}$$

当 $2j_1=1=2j_2$ 时，有

$$D^{(\frac12\frac12)}=D^{(\frac12 0)}\otimes D^{(0\frac12)}=\begin{pmatrix} a\bar a & a\bar b & b\bar a & b\bar b\\ a\bar c & a\bar d & b\bar c & b\bar d\\ c\bar a & c\bar b & d\bar a & d\bar b\\ c\bar c & c\bar d & d\bar c & d\bar d\end{pmatrix}. \tag{15.4-34}$$

15.4.3 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 二维实形式李代数

Lorentz 群有三个单参数子群分别是绕 x、y、z 轴转动；在式(15.2-14)–(15.2-16)中，我们已然找到它们在 $SL(2,\mathbb{C})$ 群中的对应表达式为：

$$J_1=\begin{pmatrix}\cos\frac{\psi}{2} & -\mathbb{i}\sin\frac{\psi}{2}\\ -\mathbb{i}\sin\frac{\psi}{2} & \cos\frac{\psi}{2}\end{pmatrix},\ J_2=\begin{pmatrix}\cos\frac{\psi}{2} & -\sin\frac{\psi}{2}\\ \sin\frac{\psi}{2} & \cos\frac{\psi}{2}\end{pmatrix},\ J_3=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-\mathbb{i}\psi/2} & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{\mathbb{i}\psi/2}\end{pmatrix}.$$

Lorentz 群还有三个单参数子群分别是沿 x、y、z 轴的伪转动；在式(15.4-13)–(15.4-15)中，我们已然找到它们在 $SL(2,\mathbb{C})$ 群中的对应表达式为：

$$K_1=\begin{pmatrix}\cosh\frac{\psi}{2} & -\sinh\frac{\psi}{2}\\ -\sinh\frac{\psi}{2} & \cosh\frac{\psi}{2}\end{pmatrix},K_2=\begin{pmatrix}\cosh\frac{\psi}{2} & \mathbb{i}\sinh\frac{\psi}{2}\\ -\mathbb{i}\sinh\frac{\psi}{2} & \cosh\frac{\psi}{2}\end{pmatrix},K_3=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-\psi/2} & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{\psi/2}\end{pmatrix}.$$

符号 J、K 是借用了 Lorentz 代数中的生成元的符号.

对上两式求 ψ 的导数并令 $\psi=0$，即可得到 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 代数及对易关系：

$$r_1=-\frac{\mathbb{i}}{2}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad r_2=-\frac{\mathbb{i}}{2}\begin{pmatrix}0&-\mathbb{i}\\ \mathbb{i}&0\end{pmatrix},\quad r_3=-\frac{\mathbb{i}}{2}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix};\tag{15.4-35a}$$

$$b_1=-\frac12\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad b_2=-\frac12\begin{pmatrix}0&-\mathbb{i}\\ \mathbb{i}&0\end{pmatrix},\quad b_3=-\frac12\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}.\tag{15.4-35b}$$

$$[r_i,r_j]=\sum_k\epsilon_{ijk}r_k,\quad [b_i,r_j]=\sum_k\epsilon_{ijk}b_k,\quad [b_i,b_j]=-\sum_k\epsilon_{ijk}r_k.\tag{15.4-35c}$$

其中 $i,j,k=1,2,3$；$\epsilon_{ijk}=\delta^{123}_{ijk}$，定义见式(3.8-12)．式(15.4-35a)、(15.4-35b)连同对易关系(15.4-35c)构成了 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 代数；不难看出它与 Lorentz 代数是同构的，即 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})\cong\mathfrak{so}^+(1,3)$．$r$ 代表转动（rotation），b 代表伪转动（boost）.

通过矩阵的指数映射计算可得：$J_k(\psi)=\mathrm{e}^{\psi r_k}$，$K_k(\psi)=\mathrm{e}^{\psi b_k}$.

常数矩阵 r_k 和 b_k 还可以用 Pauli 矩阵来表示：$r_k=-\mathbb{i}\sigma_k/2$、$b_k=-\sigma_k/2$.

$\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 实形式的 Killing 型：$g_{\alpha\beta}=\mathrm{diag}(-2,-2,-2,2,2,2)$；故半单.

15.4.4 $(\mathfrak{su}(2))^{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$

本小节给出 $\mathfrak{su}(2)$ 复化为 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 的具体过程；这个过程展示了如何通过扩展李代数基域，将一个实李代数提升为复李代数．需先参阅 §12.3.2、§13.16．

我们已知：

$$\mathfrak{su}(m) = \left\{ X \in \mathfrak{gl}(m,\mathbb{C}) \mid X + \bar{X}^T = 0 \text{ 且 } \mathrm{Tr}X = 0 \right\}, \tag{15.4-36}$$

$$\mathfrak{sl}(m,\mathbb{C}) = \left\{ X \in \mathfrak{gl}(m,\mathbb{C}) \mid \mathrm{Tr}X = 0 \right\}. \tag{15.4-37}$$

虽然 $\mathfrak{su}(m)$ 的基矢矩阵可以包含复数，但是 $\mathfrak{su}(m)$ 不能看作复数域 $\mathbb{C}$ 上的李代数，它是一个定义在实数域 $\mathbb{R}$ 上的李代数．具体原因如下．如果我们尝试将 $\mathfrak{u}(m)$（包含 $\mathfrak{su}(m)$）视为复线性空间，那么它必须对乘以虚数单位 $\mathbb{i}$ 封闭．然而，对于任意 $X \in \mathfrak{u}(m)$，有 $(\mathbb{i}X)^\dagger = -\mathbb{i}X^\dagger = -\mathbb{i}(-X) = \mathbb{i}X$．这意味着 $\mathbb{i}X$ 是厄米矩阵，而不是反厄米矩阵；故 $\mathbb{i}X \notin \mathfrak{u}(m)$．所以 $\mathfrak{u}(m)$ 只能是实李代数．

下面，我们给出具体的复化过程．

$\mathfrak{su}(2)$ 由反厄米、无迹的 2×2 矩阵组成．我们选取一组基底：$e_k = \sigma_k/(2\mathbb{i})$；其中 σ_k 是 Pauli 矩阵．很明显 e_k 是反厄米的．计算它们的李括号：$[e_1,e_2] = e_3$、$[e_2,e_3] = e_1$、$[e_3,e_1] = e_2$．这正是 $\mathfrak{su}(2)$ 的对易关系．

从 §12.3.2内容可知，我们只需要将基域由实数域变为复数域，就可以得到复化的线性空间 $(\mathfrak{su}(2))^{\mathbb{C}}$．为了更好的与李代数 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 比较，我们通过如下非退化线性变换构造三个新的元素：

$$H = 2\mathbb{i}e_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \tag{15.4-38a}$$

$$X = \mathbb{i}e_1 - e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \tag{15.4-38b}$$

$$Y = \mathbb{i}e_1 + e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{15.4-38c}$$

因为允许复系数，故 H、X、Y 都是 $(\mathfrak{su}(2))^{\mathbb{C}}$ 中的合法元素．对易关系为：

$$[H,X] = 2X, \quad [H,Y] = -2Y, \quad [X,Y] = H. \tag{15.4-39}$$

请读者验证上述对易关系满足式(13.16-1)．由 H、X、Y 在复数域上张成的空间 $\mathrm{Span}_{\mathbb{C}}\{H,X,Y\}$，结合对易关系(15.4-39)，就得到了复化的李代数 $(\mathfrak{su}(2))^{\mathbb{C}}$．

不难验证：**(1)** 式(15.4-38)给出的 H、X、Y 在复数域上线性无关；**(2)** 它们都是零迹的；**(3)** 任何零迹复二维矩阵都可以由它们的线性组合给出；**(4)** 已知 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 是复数域上的三维线性空间. 故 H、X、Y 及对易关系(15.4-39)可当作 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 的基底，一般称它们为 Chevalley 基. 这正是 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 的标准结构关系. 式(15.4-38)为复数域上 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 的对易关系；式(15.4-35)为实数域上 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 的对易关系；请读者验证，两者可以相互导出.

很明显，式(15.4-38)中给出的由 $\{e_1,e_2,e_3\}$ 到 $\{H,X,Y\}$ 的映射是线性的，其系数属于复数域；并且此映射有线性逆映射，故它是双射；记之为 Φ. 因此 Φ 是复线性的李代数同构映射，即：$\mathfrak{su}(2)\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}=(\mathfrak{su}(2))^{\mathbb{C}}\cong\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$.

注 15.19 量子力学中角动量算符 $J_k=\frac{\hbar}{2}\sigma_k$ 是厄米的，不在 $\mathfrak{su}(2)$（反厄米）中，而在 $\mathbb{i}\mathfrak{su}(2)$（厄米）中. 升降算符 $J_\pm=J_1\pm iJ_2$ 本质上就是复化操作，对应上面的 X、Y（参见式(15.2-57)）. 虽然角动量算符也属于 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$，但不够精确；原因是 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 中包含了太多的非厄米矩阵，对于量子力学来说它太大了.

注 15.20 复化：无论从基 $\{e_1,e_2,e_3\}$ 出发，还是从基 $\{H,X,Y\}$ 出发，只要组合系数为复数，那么我们就得到 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 李代数. 反之，若从 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 李代数得到实形式，不同的基将给出不同的实形式；基 $\{e_1,e_2,e_3\}$ 给出紧致实李代数 $\mathfrak{su}(2)$，基 $\{H,X,Y\}$ 给出非紧致实李代数 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$. 这回应了 §12.3.2末尾的阐述.

15.4.5 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})\cong\mathfrak{su}(2)\oplus\mathfrak{su}(2)$

§15.4.3只给出了二维表示，本节给出全部有限维复表示.

非紧致李群 $SL(2,\mathbb{C})$ 不可能同胚于紧致的 $SU(2)\times SU(2)$ 群；但是它们的李代数却是同构的，即 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})\cong\mathfrak{su}(2)\oplus\mathfrak{su}(2)$；下面论证此点. 由于 $SL(2,\mathbb{C})/\{I_2,-I_2\}$ 微分同胚于正时固有 Lorentz 群 $SO^+(1,3)$，从定理13.64可知：$\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})\cong\mathfrak{so}^+(1,3)$. 已知 Lorentz 代数 $\mathfrak{so}^+(1,3)$（即(13.11-45)）为：

$$[J_i,J_j]=\mathbb{i}\epsilon_{ijk}J_k,\quad [J_i,K_j]=\mathbb{i}\epsilon_{ijk}K_k,\quad [K_i,K_j]=-\mathbb{i}\epsilon_{ijk}J_k. \tag{13.11-45}$$

由 Lorentz 生成元 J_l,K_l 构造两个新的生成元如下

$$M_l\equiv(J_l+\mathbb{i}K_l)/2,\qquad N_l\equiv(J_l-\mathbb{i}K_l)/2;\qquad l=1,2,3 \tag{15.4-40}$$

用上式重新表述式(13.11-45)中对易关系，有（其中 $k,l=1,2,3$）

$$[M_k,M_l]=\mathbb{i}\epsilon_{kln}M_n,\quad [N_k,N_l]=\mathbb{i}\epsilon_{kln}N_n,\quad [M_k,N_l]=0. \tag{15.4-41}$$

很明显式(15.4-41)中李代数对易关系同构于李代数张量积 $\mathfrak{su}(2)_M \oplus \mathfrak{su}(2)_N$，这也就证明了：$\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \cong \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$.

例 15.21 参考例15.15可知 $\mathfrak{su}(2)_M \oplus \mathfrak{su}(2)_N$（$\cong \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \cong \mathfrak{so}(1,3)$）有两个独立的 Casimir 算子：$C_1 = M^2 = M_x^2 + M_y^2 + M_z^2$ 和 $C_2 = N^2 = N_x^2 + N_y^2 + N_z^2$.

我们已得到 $\mathfrak{su}(2)$ 的不可约表示（见 §15.2.7）；由同构关系 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \cong \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$ 可知 $\mathfrak{su}(2)_M$、$\mathfrak{su}(2)_N$ 表示可给出李代数 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 的有限维表示. 需要说明的是，李代数 $\mathfrak{su}(2)$ 的复共轭表示等价于自身，这与 $SL(2,\mathbb{C})$ 群不同；为了与式(15.4-31)表观对应，可以将上述同构关系记为 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \cong \mathfrak{su}(2) \oplus \overline{\mathfrak{su}(2)}$. 我们设 $\mathfrak{su}(2)_M \oplus \mathfrak{su}(2)_N$ 的表示空间基矢为 $|j_M m_M\rangle \otimes |j_N m_N\rangle$，为了简洁起见，将其记为 $|m_M m_N\rangle$. 利用式(15.4-40)的逆变换容易求得

$$
\begin{aligned}
J_\pm|m_M m_N\rangle &= (M_\pm + N_\pm)|m_M m_N\rangle \\
&= +\sqrt{(j_M \mp m_M)(j_M \pm m_M + 1)}|m_M \pm 1, m_N\rangle \\
&\quad + \sqrt{(j_N \mp m_N)(j_N \pm m_N + 1)}|m_M, m_N \pm 1\rangle. \qquad \text{(15.4-42a)} \\
K_\pm|m_M m_N\rangle &= \mathrm{i}(N_\pm - M_\pm)|m_M m_N\rangle \\
&= +\mathrm{i}\sqrt{(j_N \mp m_N)(j_N \pm m_N + 1)}|m_M, m_N \pm 1\rangle \\
&\quad - \mathrm{i}\sqrt{(j_M \mp m_M)(j_M \pm m_M + 1)}|m_M \pm 1, m_N\rangle. \qquad \text{(15.4-42b)} \\
J_3|m_M m_N\rangle &= (M_3 + N_3)|m_M m_N\rangle = (m_M + m_N)|m_M m_N\rangle. \qquad \text{(15.4-42c)} \\
K_3|m_M m_N\rangle &= \mathrm{i}(N_3 - M_3)|m_M m_N\rangle = \mathrm{i}(+m_N - m_M)|m_M m_N\rangle. \qquad \text{(15.4-42d)}
\end{aligned}
$$

由上式可得李代数 $\mathfrak{su}(2)_M \oplus \mathfrak{su}(2)_N$（即 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$）的表示矩阵，记为 $\mathfrak{D}^{(j_M j_N)}$.

式(15.4-42)给出的几个低维表示如下（下面的 σ_i 是 Pauli 矩阵）：

$$
\begin{aligned}
&\mathfrak{D}^{(00)} : J_i = (0) = K_i. && \text{(15.4-43)} \\
&\mathfrak{D}^{(\frac{1}{2}0)} : J_i = \sigma_i/2, \quad K_i = -\mathrm{i}\sigma_i/2; \quad \text{Weyl 左手旋量.} && \text{(15.4-44)} \\
&\mathfrak{D}^{(0\frac{1}{2})} : J_i = \sigma_i/2, \quad K_i = +\mathrm{i}\sigma_i/2; \quad \text{Weyl 右手旋量.} && \text{(15.4-45)} \\
&\mathfrak{D}^{(\frac{1}{2}\frac{1}{2})} : J_i = (I_2 \otimes \sigma_i + \sigma_i \otimes I_2)/2, \quad K_i = \mathrm{i}(I_2 \otimes \sigma_i - \sigma_i \otimes I_2)/2. && \text{(15.4-46)}
\end{aligned}
$$

例 15.22 $\mathfrak{D}^{(\frac{1}{2}\frac{1}{2})}$ 表示（式(15.4-46)）与式(13.11-44)的等价关系.

令

$$U=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&-1&1&0\\1&0&0&-1\\ \mathbb{i}&0&0&\mathbb{i}\\0&-1&-1&0\end{pmatrix},\qquad U^{-1}=U^{\dagger}. \tag{15.4-47}$$

我们将第473页式(13.11-44)中的 J_i、K_i 记为 J_i^s、K_i^s．则有

$$J_i=U^{-1}J_i^sU,\quad K_i=U^{-1}K_i^sU,\quad i=1,2,3. \tag{15.4-48}$$

请读者完成上式中的计算． ■

式(15.4-42)较为清晰地展示了 M 与 N 的地位并不相同．下面的表述中，我们略微含混一下 M 与 N 的地位．我们可以利用 Clebsch–Gordan 系数将 $\mathfrak{su}(2)\oplus\mathfrak{su}(2)$ 的表示空间基矢 $|j_Mm_M\rangle\otimes|j_Nm_N\rangle$ 转换为 $|jm\rangle$（即两个角动量之和）．这样，就可以将 $\mathfrak{su}(2)\oplus\mathfrak{su}(2)$（即 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$）的可约表示 $\mathfrak{D}^{(j_Mj_N)}$ 化为 $\mathfrak{su}(2)$ 不可约表示 $\mathfrak{D}^{(j)}$ 的直和（可参见[87]的 §11.6，或类似文献）：

$$\mathfrak{D}^{(j_Mj_N)}\cong\mathfrak{D}^{(j_M)}\otimes\mathfrak{D}^{(j_N)}\cong\mathfrak{D}^{(|j_M-j_N|)}\oplus\mathfrak{D}^{(|j_M-j_N|+1)}\oplus\cdots\oplus\mathfrak{D}^{(j_M+j_N)}. \tag{15.4-49}$$

虽然李群 $SL(2,\mathbb{C})$ 的表示与复共轭表示并不等价，但 $SU(2)$ 群的表示与复共轭表示等价；这便导致了在李代数 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})\cong\mathfrak{su}(2)\oplus\mathfrak{su}(2)$ 的表示中有：$\mathfrak{D}^{(j_Mj_N)}$ 表示等价于（不是等于）$\mathfrak{D}^{(j_Nj_M)}$ 表示．$\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 的几个低维表示的直和分解：

$$\mathfrak{D}^{(00)}\cong\mathfrak{D}^{(0)}=(0). \tag{15.4-50}$$

$$\mathfrak{D}^{(\frac12 0)}\cong\mathfrak{D}^{(0\frac12)}\cong\mathfrak{D}^{(\frac12)}. \tag{15.4-51}$$

$$\mathfrak{D}^{(10)}\cong\mathfrak{D}^{(01)}\cong\mathfrak{D}^{(1)}. \tag{15.4-52}$$

$$\mathfrak{D}^{(\frac12\frac12)}\cong\mathfrak{D}^{(0)}\oplus\mathfrak{D}^{(1)}. \tag{15.4-53}$$

$$\mathfrak{D}^{(\frac12 1)}\cong\mathfrak{D}^{(1\frac12)}\cong\mathfrak{D}^{(\frac12)}\oplus\mathfrak{D}^{(\frac32)}. \tag{15.4-54}$$

例 15.23 $SL(2,\mathbb{C})$ 群表示．

有了 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 的 6 个生成元（式(15.4-42)），再结合 6 个实变数 θ_i、ϕ_i，由指数映射便可得到 $SL(2,\mathbb{C})$ 群的表示．

$$D^{(j_1j_2)}=\exp\left(-\mathbb{i}\sum\nolimits_{i=1}^{3}(\theta_iJ_i+\phi_iK_i)\right). \tag{15.4-55}$$

例 15.24 李群 $SO(4,\mathbb{R})$ 的通用覆盖群 $SU(2)\times SU(2)$ 的群表示.

设有 6 个实变数 α_l、β_l，由指数映射便可得到 $SU(2)\times SU(2)$ 群的表示：

$$\begin{aligned}D^{(j_1j_2)}=&\exp\left(-\mathbb{i}\sum\nolimits_{l=1}^{3}(\alpha_l M_l+\beta_l N_l)\right)\\=&\exp\left(-\mathbb{i}\sum\nolimits_{l=1}^{3}\left(\tfrac{1}{2}(\alpha_l+\beta_l)J_l+\tfrac{\mathbb{i}}{2}(\alpha_l-\beta_l)K_l\right)\right).\end{aligned}$$

可以看出上式中 J_l 前的参数（$\frac{1}{2}(\alpha_l+\beta_l)$）为实数，$K_l$ 前的参数（$\frac{\mathbb{i}}{2}(\alpha_l-\beta_l)$）为纯虚数（或为〇）. 虽然两个群（$SL(2,\mathbb{C})$、$SU(2)\times SU(2)$）的李代数是同构的，但由于它们的全局拓扑结构根本不同（一个非紧、一个紧致），这导致我们在用指数映射从同一个李代数构造这两个群时，必须对生成元的参数施加不同的约束（对比式(15.4-55)）；上述指数映射形式的差异是拓扑差异的数学反映.

例 15.25 由 $\mathfrak{D}^{(\frac{1}{2}0)}\oplus\mathfrak{D}^{(0\frac{1}{2})}$ 生成的可约表示.

我们将 Weyl 左手旋量 $\mathfrak{D}^{(\frac{1}{2}0)}$ 生成的表示矩阵记为（其中 $\theta_i,\phi_i\in\mathbb{R}$）：

$$D^{(\frac{1}{2}0)}=\exp\left(-\frac{\mathbb{i}}{2}\sum\nolimits_{i=1}^{3}(\theta_i-\mathbb{i}\phi_i)\sigma_i\right)=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}. \tag{15.4-56}$$

上式中变量 $a,b,c,d\in\mathbb{C}$ 且 $ad-bc=1$. 不难验证有：

$$(\overline{\sigma_i})^T=\sigma_i^\dagger=(\sigma_i)^{-1}=\sigma_i,\quad \sigma_2\sigma_i\sigma_2=-(\sigma_i)^T,\quad i=1,2,3. \tag{15.4-57}$$

那么 Weyl 右手旋量 $\mathfrak{D}^{(0\frac{1}{2})}$ 生成的表示矩阵为（注意应用上式）：

$$\begin{aligned}D^{(0\frac{1}{2})}=&\exp\left(-\frac{\mathbb{i}}{2}\sum\nolimits_{i=1}^{3}(\theta_i+\mathbb{i}\phi_i)\sigma_i\right)=\exp\left(-\frac{\mathbb{i}}{2}\sum\nolimits_{i}(\theta_i+\mathbb{i}\phi_i)(\overline{\sigma_i})^T\right)\\=&\overline{\sigma_2\exp\left(-\frac{\mathbb{i}}{2}\sum\nolimits_{i}(\theta_i-\mathbb{i}\phi_i)\sigma_i\right)\sigma_2}=\begin{pmatrix}\bar{d}&-\bar{c}\\-\bar{b}&\bar{a}\end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{15.4-58}$$

以上两个表示的直和为：

$$D^{(\frac{1}{2}0)}\oplus D^{(0\frac{1}{2})}=\begin{pmatrix}a&b&0&0\\c&d&0&0\\0&0&\bar{d}&-\bar{c}\\0&0&-\bar{b}&\bar{a}\end{pmatrix}. \tag{15.4-59}$$

15.5 旋量代数

在 §15.4.2中，我们引入了 $SL(2,\mathbb{C})$ 群的左右手二分量旋量，它们是构建高维表示的基，现在具体研究一下．本节主要参考了[49]的相应章节．

用斜体大写拉丁字母 ABC 等表示旋量的抽象指标记号，抽象指标用法与张量的情形类似．用拉丁字母 $\mathcal{ABC}$ 等表示旋量分量，角标取值范围是：0、1．

15.5.1 旋量度规

在不带点旋量空间 $\mathfrak{S}^A$ 中定义**旋量内积**如下：

$$\left\{(\phi^0,\phi^1),\ (\psi^0,\psi^1)\right\} \overset{def}{=} \phi^0\psi^1-\phi^1\psi^0=\begin{vmatrix}\phi^0 & \phi^1\\ \psi^0 & \psi^1\end{vmatrix};\quad \forall\boldsymbol{\psi},\boldsymbol{\phi}\in\mathfrak{S}^A. \tag{15.5-1}$$

设 $\boldsymbol{\psi},\boldsymbol{\phi}$ 是左手旋量，则它们的内积对 $S\in SL(2,\mathbb{C})$ 变换不变：

$$\begin{vmatrix}\phi'^0 & \phi'^1\\ \psi'^0 & \psi'^1\end{vmatrix} \overset{\substack{S\text{表达式见}\\ 15.4-18}}{=\!=} \left|\begin{pmatrix}a^0{}_0 & a^0{}_1\\ a^1{}_0 & a^1{}_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\phi^0 & \phi^1\\ \psi^0 & \psi^1\end{pmatrix}\right| \overset{\substack{S\in SL(2,\mathbb{C})\\ \det S=1}}{=\!=} \begin{vmatrix}\phi^0 & \phi^1\\ \psi^0 & \psi^1\end{vmatrix}. \tag{15.5-2}$$

由上两式可以定义旋量空间上的**旋量度规**ϵ_{AB}，它使得 $\epsilon_{AB}\phi^A\psi^B$ 在幺模矩阵 S 变换下保持不变，并且与旋量的缩并等于旋量的内积，定义式为

$$\epsilon_{AB}\phi^A\psi^B \overset{def}{=} \{\boldsymbol{\phi},\ \boldsymbol{\psi}\},\qquad \forall\boldsymbol{\psi},\boldsymbol{\phi}\in\mathfrak{S}^A. \tag{15.5-3}$$

由上式能得到 ϵ_{AB} 是反对称的，即

$$\epsilon_{AB}=-\epsilon_{BA}. \tag{15.5-4}$$

然而一般意义下的度规是对称的，ϵ_{AB} 与之不同．现在可以将上指标降下来

$$\phi_A=\phi^B\epsilon_{BA}\quad\Leftrightarrow\quad \phi_0=-\phi^1,\ \phi_1=\phi^0. \tag{15.5-5}$$

需要注意：$\phi^B\epsilon_{BA}\neq\epsilon_{AB}\phi^B$，两者差一负号，即 $\phi^B\epsilon_{BA}=-\epsilon_{AB}\phi^B=-\phi^B\epsilon_{AB}$．

标量积(15.5-1)还可以表示为

$$\phi^0\psi^1-\phi^1\psi^0=\epsilon_{AB}\phi^A\psi^B=\phi_B\psi^B=\psi^B\phi_B=-\phi^A\psi_A=-\psi_A\phi^A. \tag{15.5-6}$$

由上式或式(15.5-1)容易得到：$\phi^A\phi_A=0$．

既然 ϵ_{AB} 是度规，那么它自然有逆：

$$\delta_A^C = \epsilon_{AB}\epsilon^{CB} = \epsilon^{CB}\epsilon_{AB} = \epsilon_A{}^C = -\epsilon^C{}_A. \tag{15.5-7}$$

注意上式中指标位置．同样也可以将下指标升上去

$$\phi^A = \epsilon^{AB}\phi_B \quad \Leftrightarrow \quad \phi^1 = -\phi_0,\ \phi^0 = \phi_1. \tag{15.5-8}$$

例 15.26 由于旋量空间 $\mathfrak{S}^A$ 是二维的，那么任意三个旋量一定线性相关．

设有 $\kappa^A, \omega^A, \tau^A \in \mathfrak{S}^A$；那么必然有

$$a\kappa^A + b\omega^A + c\tau^A = 0, \qquad \text{其中 } a, b, c \text{ 是复系数} \tag{15.5-9}$$

下面求出这些复系数．用 κ_A、ω_A、τ_A 缩并式(15.5-9)，有

$$\begin{aligned}
0 =& a\kappa_A\kappa^A + b\kappa_A\omega^A + c\kappa_A\tau^A = b\kappa_A\omega^A + c\kappa_A\tau^A,\\
0 =& a\omega_A\kappa^A + c\omega_A\tau^A = -a\kappa_A\omega^A + c\omega_A\tau^A,\\
0 =& a\tau_A\kappa^A + b\tau_A\omega^A = -a\kappa_A\tau^A - b\omega_A\tau^A.
\end{aligned}$$

不失一般性，假设 $\kappa_A\tau^A \neq 0$、$b \neq 0$；由上面三式可以得到 $a = -\frac{\omega_B\tau^B}{\kappa_A\tau^A}b$、$c = -\frac{\kappa_B\omega^B}{\kappa_A\tau^A}b$．将此式带回式(15.5-9)，并整理，有

$$(\omega_B\tau^B)\kappa^A + (\tau_B\kappa^B)\omega^A + (\kappa_B\omega^B)\tau^A = 0. \tag{15.5-10}$$

换一种方式来表达式(15.5-10)，有

$$(\epsilon_{BC}\epsilon_D{}^A + \epsilon_{CD}\epsilon_B{}^A + \epsilon_{DB}\epsilon_C{}^A)\tau^B\omega^C\kappa^D = 0. \tag{15.5-11}$$

因 τ^B、ω^C、κ^D 的任意性，有

$$\epsilon_{BC}\epsilon_D{}^A + \epsilon_{CD}\epsilon_B{}^A + \epsilon_{DB}\epsilon_C{}^A = 0 \tag{15.5-12}$$

式(15.5-12)是关于 $SL(2,\mathbb{C})$ 群旋量度规的一个重要恒等式． ■

与上面公式类似，带点的旋量也有相应公式，只需用 $\epsilon_{\dot A\dot B}$ 即可．

15.5.2 高阶旋量

右手旋量空间记号是 $\mathfrak{S}^{\dot{A}}$，它是左手旋量空间 $\mathfrak{S}^{A}$ 的复共轭．根据 $\mathfrak{S}^{A}$ 空间的加法、数乘，我们定义 $\mathfrak{S}^{\dot{A}}$ 空间的加法、数乘如下（其中 $\kappa^A,\omega^A,\tau^A\in\mathfrak{S}^A$、$\bar\kappa^{\dot A},\bar\omega^{\dot A},\bar\tau^{\dot A}\in\mathfrak{S}^{\dot A}$）：

$$a\kappa^A+b\omega^A=\tau^A \quad\Leftrightarrow\quad \bar a\bar\kappa^{\dot A}+\bar b\bar\omega^{\dot A}=\bar\tau^{\dot A},\qquad a,b\in\mathbb{C}. \tag{15.5-13}$$

取复共轭运算意味着带点指标和不带点指标互换．

$$\begin{aligned}&\overline{\tau^A}=\bar\tau^{\dot A},\quad \overline{\tau_A}=\bar\tau_{\dot A};\quad \overline{\tau^A\kappa_A}=\bar\tau^{\dot A}\bar\kappa_{\dot A};\quad \overline{\overline{\tau^A}}=\tau^A,\quad \overline{\overline{\tau_A}}=\tau_A;\\ &\overline{a\kappa^A+b\omega^A}=\bar a\bar\kappa^{\dot A}+\bar b\bar\omega^{\dot A},\quad \overline{a\kappa_A+b\omega_A}=\bar a\bar\kappa_{\dot A}+\bar b\bar\omega_{\dot A},\quad a,b\in\mathbb{C}.\end{aligned} \tag{15.5-14}$$

有了式(15.5-13)中的加法、数乘定义，不难验证 $\mathfrak{S}^{\dot A}$ 也是线性空间，并且它反同构于 $\mathfrak{S}^{A}$；反同构是指式(15.5-13)中的复共轭．

有了这些准备，我们开始构建 $SL(2,\mathbb{C})$ 群的**旋量系统**，将其记为 $\chi^{A\cdots D\dot P\cdots\dot R}_{L\cdots N\dot U\cdots\dot W}$，指标的型数（valence 或 rank）是 $\left[\begin{smallmatrix}p&q\\r&s\end{smallmatrix}\right]$，它被定义为一个多重线性映射[49]p.108：

$$\mathfrak{S}_A\times\cdots\times\mathfrak{S}_D\times\mathfrak{S}_{\dot P}\times\cdots\times\mathfrak{S}_{\dot R}\times\mathfrak{S}^{L}\times\cdots\times\mathfrak{S}^{N}\times\mathfrak{S}^{\dot U}\times\cdots\times\mathfrak{S}^{\dot W}\xrightarrow{\chi}\mathbb{C}.$$

特别地，$\mathfrak{S}^{A}$、$\mathfrak{S}_{A}$ 分别是 $\left[\begin{smallmatrix}1&0\\0&0\end{smallmatrix}\right]$、$\left[\begin{smallmatrix}0&0\\1&0\end{smallmatrix}\right]$ 型（无点）旋量；$\mathfrak{S}^{\dot A}$、$\mathfrak{S}_{\dot A}$ 分别是 $\left[\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix}\right]$、$\left[\begin{smallmatrix}0&0\\0&1\end{smallmatrix}\right]$ 型带点旋量；简称为一阶旋量．为了更好地理解旋量定义，我们用分量语言再叙述一遍，其实就是重复式(3.7-6)的表述．

$$\begin{aligned}\tilde\chi^{A'\cdots D'\dot P'\cdots\dot R'}{}_{L'\cdots N'\dot U'\cdots\dot W'}=&\chi^{A\cdots D\dot P\cdots\dot R}{}_{L\cdots N\dot U\cdots\dot W}\alpha^{A'}{}_{A}\cdots\alpha^{D'}{}_{D}\times\\ &\times\bar\alpha^{\dot P'}{}_{\dot P}\cdots\bar\alpha^{\dot R'}{}_{\dot R}\beta_{L'}{}^{L}\cdots\beta_{N'}{}^{N}\bar\beta_{\dot U'}{}^{\dot U}\cdots\bar\beta_{\dot W'}{}^{\dot W}.\end{aligned} \tag{15.5-15}$$

其中 $\alpha^{A'}{}_{A}\in SL(2,\mathbb{C})$，$\beta$ 是 α 的转置逆，$\bar\alpha^{\dot P'}{}_{\dot P}$ 是 $\alpha^{P'}{}_{P}$ 的复共轭．

高阶旋量 $\mathfrak{S}^{A\cdots D\dot P\cdots\dot R}_{L\cdots N\dot U\cdots\dot W}$ 中的加法、数乘定义与式(15.5-13)十分类似，不再赘述．在式(15.4-21)前后的文字中，我们已经指出旋量空间是一种线性空间，既然如此可以通过张量积来得到更高阶的旋量；但为了与之有所区别，我们称这种张量积为**旋量积**（文献[49]p.83,108,109称为 outer multiplication）；如

$$\Phi^{A_1\ \dot B_1}_{A_2\ \dot B_2}=\phi^{A_1}\cdot\phi_{A_2}\cdot\bar\phi^{\dot B_1}\cdot\bar\phi_{\dot B_2},\quad \text{所有角标取值范围是}0,1 \tag{15.5-16}$$

这样的旋量积还需要满足结合律、加法交换律以及分配律，不再单独列出公式．

还需指几点：带点指标和不带点指标之间没有先后顺序，可随意混排．为使理论具有不变性，每个旋量方程等号两边必须包含相同数目的带点、不带点指标；否则在参考系变换时，等式将会被破坏．旋量指标间的缩并只能在同类指标内部进行，绝不能令带点指标和不带点指标缩并．

15.5.3 旋量基

由于基本二分量旋量是二维的，因此它可用任意两个线性无关的旋量 ι^A、o^A 来生成全部基本二分量旋量．ι^A、o^A 线性相关是指存在非零常复数 c 使得 $\iota^A = co^A$ 成立，很明显此时 $\epsilon_{AB}\iota^A o^B = c\epsilon_{AB}o^A o^B = 0$．由此可判断 ι^A、o^A 线性独立的充要条件是 $\epsilon_{AB}\iota^A o^B \neq 0$．

我们选定两个线性独立的二分量基本旋量 ι^A、o^A，它们满足正交条件，即

$$1 = \epsilon_{AB}o^A\iota^B = o_B\iota^B = o^0\iota^1 - o^1\iota^0; \qquad \text{很明显 } o_B o^B = 0 = \iota_B\iota^B. \tag{15.5-17}$$

一般的四维矢量可以用四个基矢的线性组合来表示．与此类似，一般的旋量可以用两个基旋量的线性组合来表示；对于任意旋量 ω^A，它可以表示成

$$\omega^A = ao^A + b\iota^A, \qquad a, b \in \mathbb{C}. \tag{15.5-18}$$

利用基旋量的正交性可以导出式(15.5-18)中的系数为 $a = -\omega^A\iota_A$，$b = o_A\omega^A$．把它们带回式(15.5-18)，有

$$\omega^A = -\omega^B\iota_B o^A + o_B\omega^B\iota^A = (-\iota_B o^A + o_B\iota^A)\omega^B = (o^A\iota^B - \iota^A o^B)\omega_B. \tag{15.5-19}$$

对比 $\omega^A = \epsilon^{AB}\omega_B$ 可知

$$\epsilon^{AB} = o^A\iota^B - \iota^A o^B \;\Leftrightarrow\; \epsilon_B{}^A = -o^A\iota_B + \iota^A o_B \;\Leftrightarrow\; \epsilon_{AB} = o_A\iota_B - \iota_A o_B. \tag{15.5-20}$$

$\{o^A, \iota^B\}$ 称为**旋量标架**（Spin-frame）．旋量标架在局部上总是存在的，在整个四维时空中未必存在．在旋量标架上，o^A 分量是 $(1,0)^T$，ι^A 分量是 $(0,1)^T$．

下面来寻找式(15.5-3)在正交旋量标架 $\{o^A, \iota^B\}$ 下的分量数值．与四维闵氏时空完全类似，在正交归一基矢下，度规是对角的；在正交基矢(15.5-17)下，旋量度规是反对称的．

$$\epsilon_{00} = \epsilon_{AB}o^A o^B = 0, \epsilon_{11} = \epsilon_{AB}\iota^A\iota^B = 0, \epsilon_{01} = \epsilon_{AB}o^A\iota^B = 1, \epsilon_{10} = \epsilon_{AB}\iota^A o^B = -1.$$

也就是说，在正交旋量标架 $\{o^A,\iota^B\}$ 下，旋量度规分量是：

$$\epsilon_{\mathcal{AB}}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}=\epsilon^{\mathcal{AB}}\quad 和\quad \delta^{\mathcal{B}}_{\mathcal{A}}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=\epsilon_{\mathcal{A}}{}^{\mathcal{B}}=-\epsilon^{\mathcal{B}}{}_{\mathcal{A}}. \tag{15.5-21}$$

上式与二维 Levi-Civita 记号相同，是反对称的．旋量度规用基矢展开的抽象指标形式就是(15.5-20)．

取式(15.5-20)的复共轭，可得带点旋量度规的抽象指标展开式：

$$\epsilon^{\dot A\dot B}=o^{\dot A}\iota^{\dot B}-\iota^{\dot A}o^{\dot B}\ \Leftrightarrow\ \epsilon_{\dot B}{}^{\dot A}=-o^{\dot A}\iota_{\dot B}+\iota^{\dot A}o_{\dot B}\ \Leftrightarrow\ \epsilon_{\dot A\dot B}=o_{\dot A}\iota_{\dot B}-\iota_{\dot A}o_{\dot B}. \tag{15.5-22}$$

其中 $o^{\dot A}=\bar o^{\dot A}=\overline{o^A}$、$\iota^{\dot A}=\bar\iota^{\dot A}=\overline{\iota^A}$ 和 $\epsilon^{\dot A\dot B}=\bar\epsilon^{\dot A\dot B}=\overline{\epsilon^{AB}}$.

约定：在没有歧义情形下，我们省略带点旋量上的复共轭记号，即把 $\bar o^{\dot A}$、$\bar\epsilon^{\dot A\dot B}$ 记为 $o^{\dot A}$、$\epsilon^{\dot A\dot B}$；只用“点”来标记复共轭．

很明显有 $o_{\dot A}\iota^{\dot A}=1=-o^{\dot A}\iota_{\dot A}$；在标架 $\{o^{\dot A},\iota^{\dot B}\}$ 下，带点旋量度规分量是：

$$\epsilon_{\dot{\mathcal{A}}\dot{\mathcal{B}}}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}=\epsilon^{\dot{\mathcal{A}}\dot{\mathcal{B}}}\quad 和\quad \delta^{\dot{\mathcal{B}}}_{\dot{\mathcal{A}}}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=\epsilon_{\dot{\mathcal{A}}}{}^{\dot{\mathcal{B}}}=-\epsilon^{\dot{\mathcal{B}}}{}_{\dot{\mathcal{A}}}. \tag{15.5-23}$$

通过分量形式计算可得：$\epsilon_A{}^A=2=-\epsilon^A{}_A$ 和 $\epsilon_{\dot A}{}^{\dot A}=2=-\epsilon^{\dot A}{}_{\dot A}$.

我们还会将正交基矢记为：

$$\epsilon_A{}^0=-\iota_A=\epsilon_{A1},\epsilon_A{}^1=o_A=\epsilon_{0A},\epsilon_0{}^A=o^A=\epsilon^{A1},\epsilon_1{}^A=\iota^A=\epsilon^{0A}. \tag{15.5-24}$$

不难验证 $SL(2,\mathbb{C})\ni S=\begin{pmatrix}a^0{}_0&a^0{}_1\\a^1{}_0&a^1{}_1\end{pmatrix}$ 满足

$$\begin{aligned}&S\epsilon S^T=\epsilon\ \Leftrightarrow\ a^A{}_C\epsilon^{CD}a^B{}_D=\epsilon^{AB}\ \Leftrightarrow\ \epsilon^TS^{-1}\epsilon=S^T=\epsilon S^{-1}\epsilon^T\\&\Leftrightarrow\quad \epsilon^TS^\dagger\epsilon=\overline{S}^{-1}=\epsilon S^\dagger\epsilon^T\quad\Leftrightarrow\quad \epsilon^T\overline{S}\epsilon=(S^\dagger)^{-1}=\epsilon\overline{S}\epsilon^T.\end{aligned} \tag{15.5-25}$$

对于旋量标架 $\{o^A,\iota^A\}$，我们讨论如下变换

$$o^A_{new}=o^A,\ \iota^A_{new}=\iota^A+co^A;\ 或\ o^A_{new}=o^A+c\iota^A,\ \iota^A_{new}=\iota^A;\ c\in\mathbb{C} \tag{15.5-26}$$

并不改变正交性，即 $(o_A\iota^A)_{new}=o_A(\iota^A+co^A)=o_A\iota^A=1$．因此，对于旋量标架而言，$\{o^A_{new},\iota^A_{new}\}$ 仍可以当成基矢．换句话说，归一化条件（$o_A\iota^A=1$）只把基矢确定到可以相差一个变换(15.5-26)的程度，并未完全确定基矢．

15.6 $SL(2,\mathbb{C})$ 旋量与 Lorentz 张量

下面来寻找四维闵氏时空上 Lorentz 实数四矢量与二分量旋量之间的联系.

出发点为式(15.4-3)；我们把式(15.4-3)略作改写，其中 $x^\mu=(t,x,y,z)^T\in\mathbb{R}^4$、$x'^\mu=(t',x',y',z')^T\in\mathbb{R}^4$ 都是四维 Lorentz 实数矢量.

$$\begin{pmatrix} t'+z' & x'-\mathrm{i}y' \\ x'+\mathrm{i}y' & t'-z' \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} t+z & x-\mathrm{i}y \\ x+\mathrm{i}y & t-z \end{pmatrix} S^\dagger; \qquad S\in SL(2,\mathbb{C}). \tag{15.6-1}$$

上式满足式(15.5-15)的变换；因式(15.6-1)中既有 S 又有 $S^\dagger$，故二维厄米矩阵对应一个 $\left[\begin{smallmatrix}1&0\\1&0\end{smallmatrix}\right]$ 型旋量. 我们将上式中任意二维厄米矩阵表示成

$$X^{\mathcal{A}\dot{\mathcal{A}}} \overset{def}{=} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} t+z & x-\mathrm{i}y \\ x+\mathrm{i}y & t-z \end{pmatrix} = x^\mu \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sigma_\mu\right)^{\mathcal{A}\dot{\mathcal{A}}}. \tag{15.6-2}$$

引入 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 因子是为了把后面很多公式前的系数调整为 ±1. 写成分量形式为

$$\begin{aligned} t&=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(X^{0\dot{0}}+X^{1\dot{1}}\right), \quad z=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(X^{0\dot{0}}-X^{1\dot{1}}\right), \\ x&=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(X^{1\dot{0}}+X^{0\dot{1}}\right), \quad y=\frac{1}{\mathrm{i}\sqrt{2}}\left(X^{1\dot{0}}-X^{0\dot{1}}\right). \end{aligned} \tag{15.6-3}$$

式(15.6-2)、(15.6-3)已经指明如何从 Lorentz 矢量导出相对应的 $\left[\begin{smallmatrix}1&0\\1&0\end{smallmatrix}\right]$ 型旋量.

参考式(15.6-2)，定义在正交归一（$o_A\iota^A=1$）旋量标架 $\{o^A,\iota^A\}$ 下的 **Infeld–van der Waerden 记号**如下：

$$\begin{aligned} (\sigma^0)_{\mathcal{A}\dot{\mathcal{B}}} &= \frac{-1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix} = -(\sigma_0)^{\mathcal{A}\dot{\mathcal{B}}}, \ (\sigma^1)_{\mathcal{A}\dot{\mathcal{B}}} = \frac{-1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix} = -(\sigma_1)^{\mathcal{A}\dot{\mathcal{B}}}, \\ (\sigma^2)_{\mathcal{A}\dot{\mathcal{B}}} &= \frac{+1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}\\\mathrm{i}&0\end{pmatrix} = (\sigma_2)^{\mathcal{A}\dot{\mathcal{B}}}, \ (\sigma^3)_{\mathcal{A}\dot{\mathcal{B}}} = \frac{-1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix} = -(\sigma_3)^{\mathcal{A}\dot{\mathcal{B}}}. \end{aligned} \tag{15.6-4}$$

式(15.6-4)中指标在上、在下的矩阵有如下关系式：

$$(\sigma^\mu)_{\mathcal{A}\dot{\mathcal{B}}} = \eta^{\mu\nu}(\sigma_\nu)^{\mathcal{C}\dot{\mathcal{C}}}\epsilon_{\mathcal{A}\mathcal{C}}\epsilon_{\dot{\mathcal{B}}\dot{\mathcal{C}}}, \qquad \eta_{\mu\nu}=\mathrm{diag}\{-+++\}. \tag{15.6-5}$$

通过矩阵计算可知 Infeld–van der Waerden 符号满足:

$$\epsilon_{\mathcal{A}\mathcal{C}}\epsilon_{\dot{\mathcal{A}}\dot{\mathcal{C}}}(\sigma_\mu)^{\mathcal{A}\dot{\mathcal{A}}}(\sigma_\nu)^{\mathcal{C}\dot{\mathcal{C}}} = -\eta_{\mu\nu}, \tag{15.6-6}$$

$$\eta_{\mu\nu}(\sigma^{\mu})_{\mathcal{A}\dot{\mathcal{A}}}(\sigma^{\nu})_{\mathcal{C}\dot{\mathcal{C}}} = -\epsilon_{\mathcal{A}\mathcal{C}}\epsilon_{\dot{\mathcal{A}}\dot{\mathcal{C}}}, \tag{15.6-7}$$

$$(\sigma_{\mu})^{\mathcal{A}\dot{\mathcal{A}}}(\sigma^{\nu})_{\mathcal{A}\dot{\mathcal{A}}} = -\delta_{\mu}^{\nu}, \tag{15.6-8}$$

$$(\sigma^{\mu})_{\mathcal{A}\dot{\mathcal{A}}}(\sigma_{\mu})^{\mathcal{B}\dot{\mathcal{B}}} = -\epsilon_{\mathcal{A}}{}^{\mathcal{B}}\epsilon_{\dot{\mathcal{A}}}{}^{\dot{\mathcal{B}}}. \tag{15.6-9}$$

有了这样的记号后，联系 Lorentz 矢量和旋量的关系式(15.6-2)可以写为：

$$X^{\mathcal{A}\dot{\mathcal{A}}} = x^{\alpha}(\sigma_{\alpha})^{\mathcal{A}\dot{\mathcal{A}}}. \tag{15.6-10}$$

进而可以推广至 Lorentz 张量和旋量记号间的关系（注意等号右端的正负号）：

$$T_{\mathcal{A}\dot{\mathcal{A}}\cdots\mathcal{B}\dot{\mathcal{B}}}{}^{\mathcal{C}\dot{\mathcal{C}}\cdots\mathcal{D}\dot{\mathcal{D}}} = +T_{\alpha\cdots\beta}{}^{\gamma\cdots\delta}(\sigma^{\alpha})_{\mathcal{A}\dot{\mathcal{A}}}\cdots(\sigma^{\beta})_{\mathcal{B}\dot{\mathcal{B}}}\,(\sigma_{\gamma})^{\mathcal{C}\dot{\mathcal{C}}}\cdots(\sigma_{\delta})^{\mathcal{D}\dot{\mathcal{D}}}. \tag{15.6-11a}$$

$$T_{\alpha\cdots\beta}{}^{\gamma\cdots\delta} = (-)^{\pi}\,T_{\mathcal{A}\dot{\mathcal{A}}\cdots\mathcal{B}\dot{\mathcal{B}}}{}^{\mathcal{C}\dot{\mathcal{C}}\cdots\mathcal{D}\dot{\mathcal{D}}}(\sigma_{\alpha})^{\mathcal{A}\dot{\mathcal{A}}}\cdots(\sigma_{\beta})^{\mathcal{B}\dot{\mathcal{B}}}\,(\sigma^{\gamma})_{\mathcal{C}\dot{\mathcal{C}}}\cdots(\sigma^{\delta})_{\mathcal{D}\dot{\mathcal{D}}}. \tag{15.6-11b}$$

其中分量指标间的对应关系是：$\alpha \leftrightarrow \mathcal{A}\dot{\mathcal{A}}$、$\beta \leftrightarrow \mathcal{B}\dot{\mathcal{B}}$、$\gamma \leftrightarrow \mathcal{C}\dot{\mathcal{C}}$、$\delta \leftrightarrow \mathcal{D}\dot{\mathcal{D}}$. 式(15.6-11b)中的系数 $(-)^{\pi}$ 中的因子 π 是张量 $T_{\alpha\cdots\beta}{}^{\gamma\cdots\delta}$ 上下指标个数之和；比如 $T_{\alpha\beta}{}^{\gamma\delta\sigma}$ 共有 5 个指标，故 $\pi = 5$. 这个负号的来源是(15.6-8)中的负号.

号差？ 由于我们选择的 Lorentz 度规的号差是 $+2$，这导致 $SL(2,\mathbb{C})$ 旋量与 Lorentz 张量之间的很多关系式多出一个负号，参见式(15.6-11)．此负号会使旋量计算出错的概率大大增加，故笔者觉得这些运算（旋量与张量关系，旋量导数等）使用号差为 -2 的 Lorentz 度规更合适（此时，相应公式全是正号[49]）.

15.7 量子场论中的 Poincaré 群

绝大部分量子场论书籍采用的 Lorentz 度规是 $(+---)$. 而本节又是为量子场论所写，故采用号差为“-2”的 Lorentz 度规. 这是全书中唯一采用号差为“-2”的章节，其它章节对度规要么没要求，要么正定，要么号差为“$+2$”.

15.7.1 Poincaré 代数 II

§13.11.5.1是通过直接计算生成元的对易关系来得到 Poincaré 代数的. 本节采用另一种方法[60]§10.2[65]§2.4再次得到这组对易关系.

非紧致半单 Lorentz 群没有有限维非平庸不可约幺正表示（见定理15.10）；因 Poincaré 群是平移群和 Lorentz 群的半直积，故其非平凡不可约幺正表示都

是无穷维的．粒子的 Hilbert 空间是无穷维的，正好可以当成 Poincaré 群的表示空间．我们需要把 Poincaré 群同态到 Hilbert 空间的算符．设 $\hat{U}(\Lambda,a)$ 是作用在 Hilbert 空间上的与 Poincaré 群同态的无穷维幺正矩阵，那么 $\hat{U}(\Lambda,a)$ 便是 Poincaré 群的表示；其中 Λ 表示 Lorentz 变换，a 表示平移．根据 Wigner 定理[65]§2.2可知 Hilbert 空间态矢量的对称变换或者是幺正且线性的，或者是反幺正且反线性的．我们只考虑单位元（即恒等变换）附近的变换，故下式中的 $\hat{U}(\Lambda,a)$ 是幺正且线性的．我们将 $\hat{U}(\Lambda,a)$ 在单位元附近展开（只保留到线性项）：

$$\hat{U}(1+\omega,\epsilon)=1-\frac{1}{2}\mathrm{i}\omega^{\rho}{}_{\sigma}\widehat{M}_{\rho}{}^{\sigma}+\mathrm{i}\epsilon^{\rho}\hat{P}_{\rho}+\cdots. \tag{15.7-1}$$

$\omega^{\rho}{}_{\sigma}$ 是用来描述 Lorentz 变换的六个无穷小反对称实变数（见(13.11-20)），$\widehat{M}_{\rho}{}^{\sigma}$ 是其六个生成元；ϵ^{ρ} 是描述平移的四个无穷小实变数，$\hat{P}_{\rho}$ 是其生成元．后面，我们将看到 $\widehat{M}_{\rho}{}^{\sigma}$ 包含角动量，$\hat{P}_{\rho}$ 是四动量．为配合 $\omega^{\rho}{}_{\sigma}$ 的反对称性，我们令

$$\widehat{M}^{\rho\sigma}=-\widehat{M}^{\sigma\rho};\qquad \text{其中 } \widehat{M}^{\rho\sigma}=\eta^{\rho\pi}\widehat{M}_{\pi}{}^{\sigma}. \tag{15.7-2}$$

为了保证 $\hat{U}(\Lambda,a)$ 的幺正性，我们要求 $\widehat{M}_{\rho\sigma}$、$\hat{P}_{\rho}$ 是自伴的，即

$$\widehat{M}_{\rho\sigma}=\widehat{M}^{\dagger}_{\rho\sigma},\qquad \hat{P}_{\rho}=\hat{P}^{\dagger}_{\rho}. \tag{15.7-3}$$

式(15.7-1)中展开系数的符号选择原因：**(1)**$\hat{P}_{\rho}$ 前的正号可以保证 $\hat{P}^{0}=\hat{H}$ 是正定的．**(2)**$\widehat{M}_{\rho}{}^{\sigma}$ 的负号可以保证 Lorentz 变换中的纯空间转动是符合右手螺旋定则的（或称为主动模式；见式(13.10-12)、(13.10-17)）．

Poincaré 群元素乘积关系(13.11-55)可以同态到 $\hat{U}(\Lambda,a)$ 上，有

$$\hat{U}(\Lambda,a)\hat{U}(1+\omega,\epsilon)\hat{U}^{-1}(\Lambda,a)=\hat{U}\big(1+\Lambda\omega\Lambda^{-1},\ \Lambda\epsilon-\Lambda\omega\Lambda^{-1}a\big). \tag{15.7-4}$$

式(15.7-4)左端为（只保留到线性项）

$$\begin{aligned}LHS=&\hat{U}(\Lambda,a)\left(1-\frac{1}{2}\mathrm{i}\omega^{\rho}{}_{\sigma}\widehat{M}_{\rho}{}^{\sigma}+\mathrm{i}\epsilon^{\rho}\hat{P}_{\rho}\right)\hat{U}^{-1}(\Lambda,a)\\ =&1-\frac{1}{2}\mathrm{i}\omega^{\rho}{}_{\sigma}\hat{U}(\Lambda,a)\widehat{M}_{\rho}{}^{\sigma}\hat{U}^{-1}(\Lambda,a)+\mathrm{i}\epsilon^{\rho}\hat{U}(\Lambda,a)\hat{P}_{\rho}\hat{U}^{-1}(\Lambda,a).\end{aligned}$$

式(15.7-4)右端为（只保留到线性项）

$$RHS=1-\frac{1}{2}\mathrm{i}\Lambda^{\mu}{}_{\pi}\omega^{\pi}{}_{\kappa}(\Lambda^{-1})^{\kappa}{}_{\nu}\widehat{M}_{\mu}{}^{\nu}+\mathrm{i}\big(\Lambda^{\mu}{}_{\pi}\epsilon^{\pi}-\Lambda^{\mu}{}_{\pi}\omega^{\pi}{}_{\kappa}(\Lambda^{-1})^{\kappa}{}_{\tau}a^{\tau}\big)\hat{P}_{\mu}.$$

式(15.7-4)左右两端与 ω、ϵ 相关项各自相等，得

$$\begin{aligned}\omega^{\rho}{}_{\sigma}\hat{U}(\Lambda,a)\widehat{M}_{\rho}{}^{\sigma}\hat{U}^{-1}(\Lambda,a) =&\omega^{\rho}{}_{\sigma}\eta^{\pi}_{\rho}\eta^{\sigma}_{\kappa}\left(\Lambda^{\mu}{}_{\pi}(\Lambda^{-1})^{\kappa}{}_{\nu}\widehat{M}_{\mu}{}^{\nu}+2\Lambda^{\mu}{}_{\pi}(\Lambda^{-1})^{\kappa}{}_{\nu}a^{\nu}\hat{P}_{\mu}\right),\\ \epsilon^{\rho}\hat{U}(\Lambda,a)\hat{P}_{\rho}\hat{U}^{-1}(\Lambda,a) =&\epsilon^{\rho}\Lambda^{\mu}{}_{\rho}\hat{P}_{\mu}.\end{aligned}$$

无限小量 ω、ϵ 前的系数相等，参考式(13.11-19)，通过求和指标代换，有

$$\hat{U}(\Lambda,a)\widehat{M}^{\rho\sigma}\hat{U}^{-1}(\Lambda,a) =\Lambda_{\mu}{}^{\rho}\Lambda_{\nu}{}^{\sigma}\left(\widehat{M}^{\mu\nu}+a^{\nu}\hat{P}^{\mu}-a^{\mu}\hat{P}^{\nu}\right), \tag{15.7-5}$$

$$\hat{U}(\Lambda,a)\hat{P}^{\rho}\hat{U}^{-1}(\Lambda,a) =\Lambda_{\mu}{}^{\rho}\hat{P}^{\mu}. \tag{15.7-6}$$

虽然我们假设 $\hat{U}(\Lambda,a)$ 是无穷维的，但推导式(15.7-5)、(15.7-6)过程中并未实际使用无穷维这个要素，故这两式对有限维的表示矩阵 $\hat{U}(\Lambda,a)$ 同样正确；此时 $\widehat{M}^{\rho\sigma}$、$\hat{P}^{\mu}$ 是与 $\hat{U}(\Lambda,a)$ 维数相同的表示矩阵. 我们令上两式中的 $\Lambda^{\mu}{}_{\nu}=\delta^{\mu}_{\nu}+\bar{\omega}^{\mu}{}_{\nu}$、$\Lambda_{\mu}{}^{\rho}=(\Lambda^{-1})^{\rho}{}_{\mu}=\delta^{\rho}_{\mu}-\bar{\omega}^{\rho}{}_{\mu}$；以及令 $a^{\mu}\xrightarrow{\text{变为}}\bar{\epsilon}^{\mu}\to 0$.

$$\begin{aligned}&\left(1-\frac{1}{2}\mathrm{i}\bar{\omega}^{\mu}{}_{\nu}\widehat{M}_{\mu}{}^{\nu}+\mathrm{i}\bar{\epsilon}^{\pi}\hat{P}_{\pi}\right)\widehat{M}^{\rho\sigma}\left(1+\frac{1}{2}\mathrm{i}\bar{\omega}^{\alpha}{}_{\beta}\widehat{M}_{\alpha}{}^{\beta}-\mathrm{i}\bar{\epsilon}^{\gamma}\hat{P}_{\gamma}\right)\\ &\quad=\left(\delta^{\rho}{}_{\mu}-\bar{\omega}^{\rho}{}_{\mu}\right)\left(\delta^{\sigma}{}_{\nu}-\bar{\omega}^{\sigma}{}_{\nu}\right)\left(\widehat{M}^{\mu\nu}+\bar{\epsilon}^{\nu}\hat{P}^{\mu}-\bar{\epsilon}^{\mu}\hat{P}^{\nu}\right),\\ &\left(1-\frac{1}{2}\mathrm{i}\bar{\omega}^{\mu}{}_{\nu}\widehat{M}_{\mu}{}^{\nu}+\mathrm{i}\bar{\epsilon}^{\pi}\hat{P}_{\pi}\right)\hat{P}^{\rho}\left(1+\frac{1}{2}\mathrm{i}\bar{\omega}^{\alpha}{}_{\beta}\widehat{M}_{\alpha}{}^{\beta}-\mathrm{i}\bar{\epsilon}^{\gamma}\hat{P}_{\gamma}\right)=\left(\delta^{\rho}{}_{\mu}-\bar{\omega}^{\rho}{}_{\mu}\right)\hat{P}^{\mu}.\end{aligned}$$

展开，并只保留线性项，得

$$\begin{aligned}&\widehat{M}^{\rho\sigma}-\frac{1}{2}\mathrm{i}\bar{\omega}^{\mu}{}_{\nu}\widehat{M}_{\mu}{}^{\nu}\widehat{M}^{\rho\sigma}+\mathrm{i}\bar{\epsilon}^{\pi}\hat{P}_{\pi}\widehat{M}^{\rho\sigma}+\frac{1}{2}\mathrm{i}\bar{\omega}^{\alpha}{}_{\beta}\widehat{M}^{\rho\sigma}\widehat{M}_{\alpha}{}^{\beta}-\mathrm{i}\bar{\epsilon}^{\gamma}\widehat{M}^{\rho\sigma}\hat{P}_{\gamma}\\ &\quad=\widehat{M}^{\rho\sigma}+\bar{\epsilon}^{\sigma}\hat{P}^{\rho}-\bar{\epsilon}^{\rho}\hat{P}^{\sigma}-\bar{\omega}^{\rho}{}_{\mu}\widehat{M}^{\mu\sigma}-\bar{\omega}^{\sigma}{}_{\nu}\widehat{M}^{\rho\nu},\\ &\hat{P}^{\rho}-\frac{1}{2}\mathrm{i}\bar{\omega}^{\mu}{}_{\nu}\widehat{M}_{\mu}{}^{\nu}\hat{P}^{\rho}+\mathrm{i}\bar{\epsilon}^{\pi}\hat{P}_{\pi}\hat{P}^{\rho}+\frac{1}{2}\mathrm{i}\bar{\omega}^{\alpha}{}_{\beta}\hat{P}^{\rho}\widehat{M}_{\alpha}{}^{\beta}-\mathrm{i}\bar{\epsilon}^{\gamma}\hat{P}^{\rho}\hat{P}_{\gamma}=\hat{P}^{\rho}-\bar{\omega}^{\rho}{}_{\mu}\hat{P}^{\mu}.\end{aligned}$$

整理，有

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}\mathrm{i}\bar{\omega}_{\mu\nu}\left(\widehat{M}^{\rho\sigma}\widehat{M}^{\mu\nu}-\widehat{M}^{\mu\nu}\widehat{M}^{\rho\sigma}\right)+\mathrm{i}\bar{\epsilon}_{\mu}\left(\hat{P}^{\mu}\widehat{M}^{\rho\sigma}-\widehat{M}^{\rho\sigma}\hat{P}^{\mu}\right)\\ &\quad=\bar{\epsilon}_{\mu}\left(\eta^{\sigma\mu}\hat{P}^{\rho}-\eta^{\rho\mu}\hat{P}^{\sigma}\right)-\bar{\omega}_{\mu\nu}\left(\eta^{\mu\rho}\widehat{M}^{\nu\sigma}+\eta^{\mu\sigma}\widehat{M}^{\rho\nu}\right),\\ &\frac{1}{2}\mathrm{i}\bar{\omega}_{\mu\nu}\left(\hat{P}^{\rho}\widehat{M}^{\mu\nu}-\widehat{M}^{\mu\nu}\hat{P}^{\rho}\right)-\mathrm{i}\bar{\epsilon}_{\mu}\left(\hat{P}^{\rho}\hat{P}^{\mu}-\hat{P}^{\mu}\hat{P}^{\rho}\right)=-\bar{\omega}_{\mu\nu}\eta^{\mu\rho}\hat{P}^{\nu}.\end{aligned}$$

令 $\bar{\omega}_{\mu\nu}$、$\bar{\epsilon}_{\mu}$ 前系数相等，通过指标的变量代换，可得它们的对易关系：

$$[\hat{P}^{\mu},\ \hat{P}^{\rho}]=0. \tag{15.7-7a}$$

$$\mathbb{i}[\hat{P}^\mu,\ \widehat{M}^{\rho\sigma}] = \eta^{\mu\sigma}\hat{P}^\rho - \eta^{\mu\rho}\hat{P}^\sigma. \tag{15.7-7b}$$

$$\mathbb{i}[\widehat{M}^{\rho\sigma},\ \widehat{M}^{\mu\nu}] = \eta^{\nu\rho}\widehat{M}^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho}\widehat{M}^{\nu\sigma} + \eta^{\mu\sigma}\widehat{M}^{\nu\rho} - \eta^{\nu\sigma}\widehat{M}^{\mu\rho}. \tag{15.7-7c}$$

上式中角标取值范围是 $0,1,2,3$．$\eta^{\mu\nu}$ 是 Lorentz 度规 $(+---)$．令

$$\begin{aligned}&\{\widehat{M}^{23},\widehat{M}^{31},\widehat{M}^{12}\} = \{\hat{J}^1,\hat{J}^2,\hat{J}^3\} = \{\hat{\boldsymbol{J}}\};\quad \{\widehat{M}^{i0}\} = \{\hat{K}^i\} = \{\hat{\boldsymbol{K}}\}.\\ &\hat{H} \equiv \hat{P}^0 = \hat{P}_0;\quad \{\hat{\boldsymbol{P}}\} = \{\hat{P}^1,\hat{P}^2,\hat{P}^3\} = \{-\hat{P}_1,-\hat{P}_2,-\hat{P}_3\}.\end{aligned} \tag{15.7-8}$$

根据这里的符号约定，有 $\hat{J}_i = -\hat{J}^i$、$\hat{K}_i = -\hat{K}^i$（$i=1,2,3$）．经过不那么繁琐的演算，由式(15.7-7)、(15.7-8)可得到对易关系（$i,j,k=1,2,3$，$\epsilon^{123}=1$）：

$$\left[\hat{J}^i,\hat{J}^j\right] = \mathbb{i}\sum_{k=1}^{3}\epsilon^{ijk}\hat{J}^k. \tag{15.7-9a}$$

$$\left[\hat{J}^i,\hat{K}^j\right] = \mathbb{i}\sum_{k=1}^{3}\epsilon^{ijk}\hat{K}^k. \tag{15.7-9b}$$

$$\left[\hat{K}^i,\hat{K}^j\right] = -\mathbb{i}\sum_{k=1}^{3}\epsilon^{ijk}\hat{J}^k. \tag{15.7-9c}$$

$$\left[\hat{H},\hat{P}^i\right] = \left[\hat{H},\hat{J}^i\right] = \left[\hat{H},\hat{H}\right] = \left[\hat{P}^i,\hat{P}^j\right] = 0. \tag{15.7-9d}$$

$$\left[\hat{H},\hat{K}^i\right] = -\mathbb{i}\hat{P}^i. \tag{15.7-9e}$$

$$\left[\hat{P}^i,\hat{K}^j\right] = -\mathbb{i}\delta^{ij}\hat{H}. \tag{15.7-9f}$$

$$\left[\hat{P}^i,\hat{J}^j\right] = \mathbb{i}\sum_{k=1}^{3}\epsilon^{ijk}\hat{P}^k. \tag{15.7-9g}$$

需要指出的是(13.11-57)式是从轨道角动量得到的算符，不可能包含自旋．但是，在式(15.7-8)中，我们可以认为它包含自旋角动量 $\hat{S}_{\mu\nu}$：

$$\widehat{M}_{\mu\nu} \equiv \mathbb{i}\left(x_\mu\frac{\partial}{\partial x^\nu} - x_\nu\frac{\partial}{\partial x^\mu}\right) + \hat{S}_{\mu\nu};\qquad 0\leqslant\mu,\nu\leqslant 3. \tag{15.7-10}$$

其中 $\mathbb{i}(x_\mu\frac{\partial}{\partial x^\nu} - x_\nu\frac{\partial}{\partial x^\mu})$ 是轨道角动量，纯空间部分与式(15.2-46)相同．

15.7.2 Poincaré 代数的 Casimir 算子

Poincaré 代数不是半单的，故不能仿照式(13.17-6)定义 Casimir 算子．我们将非半单李代数的 Casimir 算子定义为：与该李代数任意元素都对易的算子．

经过前人研究，发现 Poincaré 代数有两个相互独立的 Casimir 算子，并已找到这两个算子；第一个是四动量的平方

$$\hat{C}_1 \equiv \hat{P}_\mu\hat{P}^\mu = \hat{H}^2 - \hat{\boldsymbol{P}}^2 = \hat{H}^2 - \hat{\boldsymbol{P}}\cdot\hat{\boldsymbol{P}}. \tag{15.7-11}$$

利用(15.7-7)可得

$$\begin{aligned}&\mathbb{i}[\hat{P}_\mu\hat{P}^\mu,\ \widehat{M}^{\rho\sigma}]=\mathbb{i}\hat{P}_\mu[\hat{P}^\mu,\ \widehat{M}^{\rho\sigma}]+\mathbb{i}[\hat{P}^\mu,\ \widehat{M}^{\rho\sigma}]\hat{P}_\mu\\=&\hat{P}_\mu(\eta^{\mu\sigma}\hat{P}^\rho-\eta^{\mu\rho}\hat{P}^\sigma)+(\eta^{\mu\sigma}\hat{P}^\rho-\eta^{\mu\rho}\hat{P}^\sigma)\hat{P}_\mu=0.\end{aligned}$$

再结合 $[\hat{C}_1,\hat{P}^\sigma]=0$，便验证了 $\hat{C}_1$ 与 Poincaré 代数的所有基矢对易.

为描述第二个 Casimir 算子，我们先定义 **Pauli–Lubanski 算子**为

$$\widehat{W}^\alpha\equiv\frac{1}{2}\epsilon^{\alpha\beta\mu\nu}\hat{P}_\beta\widehat{M}_{\mu\nu}\overset{15.7-7}{=\!=\!=}\frac{1}{2}\epsilon^{\alpha\mu\nu\beta}\widehat{M}_{\mu\nu}\hat{P}_\beta.\tag{15.7-12}$$

其中 $\epsilon_{\alpha\beta\mu\nu}$ 是体积元(8.6-3)在四维平直闵氏时空中的正交坐标系中的分量，故 $\epsilon_{0123}=1=-\epsilon^{0123}$；记 $\epsilon^{ijk}=\epsilon_{ijk}=\epsilon_{0ijk}$. 由式(15.7-8)可得

$$\widehat{W}^0=\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\hat{\boldsymbol{J}},\quad\widehat{\boldsymbol{W}}=\hat{H}\hat{\boldsymbol{J}}+\hat{\boldsymbol{P}}\times\hat{\boldsymbol{K}}.\tag{15.7-13}$$

容易得到下式

$$\hat{P}_\alpha\widehat{W}^\alpha=\frac{1}{2}\epsilon^{\alpha\beta\mu\nu}\hat{P}_\alpha\hat{P}_\beta\widehat{M}_{\mu\nu}=0.\tag{15.7-14}$$

利用式(15.7-7)可以证明 Pauli–Lubanski 算子与四动量是对易的：

$$[\hat{P}_\alpha,\widehat{W}^\rho]=\frac{1}{2}\epsilon^{\rho\beta\mu\nu}\hat{P}_\beta[\widehat{M}_{\mu\nu},\hat{P}_\alpha]=\frac{1}{2\mathbb{i}}\epsilon^{\rho\beta\mu\nu}\hat{P}_\beta(\eta_{\alpha\mu}\hat{P}_\nu-\eta_{\alpha\nu}\hat{P}_\mu)=0.\tag{15.7-15}$$

利用式(15.7-14)，有

$$0=[\hat{P}_\alpha\widehat{W}^\alpha,\widehat{M}_{\rho\sigma}]=\hat{P}_\alpha[\widehat{W}^\alpha,\widehat{M}_{\rho\sigma}]+[\hat{P}_\alpha,\widehat{M}_{\rho\sigma}]\widehat{W}^\alpha\quad\overset{15.7-7}{\Longrightarrow}$$

$$\hat{P}_\alpha[\widehat{W}^\alpha,\widehat{M}_{\rho\sigma}]=\mathbb{i}(\eta_{\alpha\sigma}\hat{P}_\rho-\eta_{\alpha\rho}\hat{P}_\sigma)\widehat{W}^\alpha=\mathbb{i}(\hat{P}_\rho\widehat{W}_\sigma-\hat{P}_\sigma\widehat{W}_\rho)=\mathbb{i}\hat{P}_\alpha(\delta^\alpha_\rho\widehat{W}_\sigma-\delta^\alpha_\sigma\widehat{W}_\rho).$$

由上式，再利用 $\hat{P}_\alpha$ 在四个方向相互独立，有

$$[\widehat{W}^\alpha,\widehat{M}_{\rho\sigma}]=\mathbb{i}\left(\delta^\alpha_\rho\widehat{W}_\sigma-\delta^\alpha_\sigma\widehat{W}_\rho\right).\tag{15.7-16}$$

利用式(15.7-16)可得：

$$[\widehat{W}^\alpha,\widehat{W}^\rho]\overset{15.7-16}{\underset{15.7-15}{=\!=\!=}}\frac{1}{2}\mathbb{i}\epsilon^{\rho\beta\mu\nu}\hat{P}_\beta\left(\delta^\alpha_\mu\widehat{W}_\nu-\delta^\alpha_\nu\widehat{W}_\mu\right)=\mathbb{i}\epsilon^{\alpha\rho\beta\mu}\hat{P}_\beta\widehat{W}_\mu.\tag{15.7-17}$$

第二个 Casimir 算子定义为

$$\hat{C}_2\equiv\widehat{W}_\mu\widehat{W}^\mu=-\frac{1}{2}\hat{C}_1\widehat{M}_{\mu\nu}\widehat{M}^{\mu\nu}-\hat{P}_\beta\hat{P}^\mu\widehat{M}_{\mu\nu}\widehat{M}^{\nu\beta}.\tag{15.7-18}$$

将下式最后一步展开即得式(15.7-18)最后一步.

$$\hat{C}_2=\frac{1}{4}\epsilon^{\alpha\beta\mu\nu}\epsilon_{\alpha\pi\rho\sigma}\hat{P}_\beta\widehat{M}_{\mu\nu}\hat{P}^\pi\widehat{M}^{\rho\sigma}\xlongequal{8.6-5}-\frac{3!}{4}\delta^\beta_{[\pi}\delta^\mu_\rho\delta^\nu_{\sigma]}\hat{P}_\beta\widehat{M}_{\mu\nu}\hat{P}^\pi\widehat{M}^{\rho\sigma}.$$

由式(15.7-15)，可验证 $[\hat{C}_2,\,\hat{P}^\alpha]=0$. 由式(15.7-16)，可验证 $[\hat{C}_2,\,\widehat{M}_{\rho\sigma}]=0$. 这样便证明了 $\hat{C}_2$ 与 Poincaré 代数所有基矢都对易，故是 Casimir 算子.

15.7.3 单粒子态的 Wigner 分类

单粒子态的 Wigner 分类的大体思路是[65]§2.5[60]§10.4：**(1)** 所有粒子的单粒子态均由 Hilbert 空间矢量描述. **(2)** 这些态矢量是四动量算符 $\hat{P}^\mu$ 的本征态. **(3)** 不同惯性系观者之间有一个变换（Poincaré 变换），相应他们观测到的同一个单粒子态之间也会有一个变换（式(15.7-1)中的 $\hat{U}(\Lambda,a)$）；这构成了一个 Hilbert 态矢空间上 Poincaré 群的不可约幺正表示. **(4)** 通过诱导表示法将 Poincaré 群表示化为小群（little group）的表示. **(5)** 通过小群对单粒子态进行分类.

下面具体讨论 Wigner 分类. 目前，物理学认为粒子状态由 Hilbert 空间（定义见16.15）中的矢量来描述. 我们只需要单粒子态就够了，单粒子态是指无相互作用的自由粒子状态，比如单个电子、质子、光子的状态；质子和束缚电子（即氢原子）的整体也是自由的，故也是单粒子态；氢原子核外的束缚电子则不是单粒子态. 单粒子态 $|p\sigma\rangle$（其中 p 代表四动量量子数；σ 代表其它量子数，后面会具体指出）一定是其自身的哈密顿（Poincaré 代数生成元 $\hat{H}$）的本征态，同时也是其它动量算符（$\hat{P}^i$，$i=1,2,3$）的本征态（请参考式(15.7-9)，四动量算符相互对易）. 由于 Casimir 算子（见 §15.7.2）与 Poincaré 代数中所有算符对易，故 $|p\sigma\rangle$ 也是 $\hat{C}_1$、$\hat{C}_2$ 的本征态. 因此，有

$$\hat{P}^\mu|p\sigma\rangle=p^\mu|p\sigma\rangle;\qquad \text{令 } p^0\equiv E. \tag{15.7-19}$$

$$\hat{C}_1|p\sigma\rangle=(\hat{H}^2-\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\hat{\boldsymbol{P}})|p\sigma\rangle=(E^2-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{p})|p\sigma\rangle. \tag{15.7-20}$$

$$\hat{C}_2|p\sigma\rangle=\left(\left(\widehat{W}^0\right)^2-\widehat{\boldsymbol{W}}\cdot\widehat{\boldsymbol{W}}\right)|p\sigma\rangle=c_2|p\sigma\rangle.\quad c_2\text{的数值待定} \tag{15.7-21}$$

首先，我们考虑平移. 单粒子态 $|p\sigma\rangle$ 在平移算符作用下，有

$$\hat{U}(1,a)|p\sigma\rangle=e^{\mathrm{i}a_\rho\hat{P}^\rho}|p\sigma\rangle\xlongequal{15.7-19}e^{\mathrm{i}a_\rho p^\rho}|p\sigma\rangle. \tag{15.7-22}$$

可以看到单粒子态在平移算符作用下结果很简单.

下面考察单粒子态在正时固有 Lorentz 变换下作如何改变．我们知道正时固有 Lorentz 变换 Λ 不改变四动量 p^μ（式(15.7-19)中的本征值）的类空、类时、类光属性，也不改变 $E\equiv p^0$ 的正负属性．那么第一 Casimir 算子 $\hat{C}_1$ 在正时固有 Lorentz 变换下是不变的，即式(15.7-20)中的本征值的时空属性不变．我们根据四动量 p^μ（式(15.7-19)中的本征值）的不同状态将单粒子态分为如下四种：**(1) 真空态**，此时 $E=0$ 且 $\boldsymbol{p}=0$；**(2) 类时态**，此时 $E^2>|\boldsymbol{p}|^2$；**(3) 类光态**，此时 $E^2=|\boldsymbol{p}|^2$ 且 $E\neq 0$；**(4) 类空态**，此时 $E^2<|\boldsymbol{p}|^2$．由于物理学上认为粒子不能处于负能态，故我们要求上述四种情形下的 $E\geqslant 0$．至此，第一 Casimir 算子对单粒子态的分类作用完结．

狭义相对论认为自然界中粒子的四动量不能处于类空态，故上述第 (4) 种情形是非物理的，我们不讨论这种情形．

第 (1) 分类是真空态，它是平庸的，Lorentz 群（实际是它的覆盖群 $SL(2,\mathbb{C})$）的所有无穷维幺正表示都是此种情形下单粒子态的对称群．真空态的四动量恒零，此种状态下单粒子态的自旋、电荷等等物理量均无实际意义．

类时态和类光态是讨论的重点．为此，我们先作如下叙述．

15.7.3.1 正时固有 Lorentz 变换下的单粒子态

记 Λ 为任意正时固有 Lorentz 变换，相应算符为 $\hat{U}(\Lambda,0)\equiv\hat{U}(\Lambda)$．我们有

$$\begin{aligned}\hat{P}^\mu\hat{U}(\Lambda)|p\sigma\rangle=&\hat{U}(\Lambda)\hat{U}^{-1}(\Lambda)\hat{P}^\mu\hat{U}(\Lambda)|p\sigma\rangle\xlongequal{15.7-6}\hat{U}(\Lambda)\Lambda^\mu{}_\rho\hat{P}^\rho|p\sigma\rangle\\=&\hat{U}(\Lambda)\Lambda^\mu{}_\rho p^\rho|p\sigma\rangle=(\Lambda^\mu{}_\rho p^\rho)\hat{U}(\Lambda)|p\sigma\rangle.\end{aligned}\tag{15.7-23}$$

根据 Wigner 定理（可参见[65]第二章），在态矢量上的变换 $\hat{U}(\Lambda)$ 必须是幺正且线性的（暂不考虑反幺正且反线性情形）．由式(15.7-23)不难看出 $\hat{U}(\Lambda)|p\sigma\rangle$ 的本征值为 $\Lambda^\mu{}_\rho p^\rho$，则它一定可以由此本征子空间的态矢量线性表出，即有

$$\hat{U}(\Lambda)|p\sigma\rangle=\sum_\tau|\Lambda p,\tau\rangle C_{\tau\sigma}(\Lambda,p).\tag{15.7-24}$$

需要注意到 Hilbert 空间是无穷维的，上式可以看成 Lorentz 变换 Λ 在 Hilbert 空间的线性表示；因 $\hat{U}(\Lambda)$ 是幺正的，故 $C_{\tau\sigma}(\Lambda,p)$ 必是无穷维幺正矩阵；这符合定理15.10要求．容易验证它是表示：

$$\hat{U}(\bar{\Lambda})\hat{U}(\Lambda)|p\sigma\rangle=\hat{U}(\bar{\Lambda})\left(\sum_\tau|\Lambda p,\tau\rangle C_{\tau\sigma}(\Lambda,p)\right)=\sum_\tau\left(\hat{U}(\bar{\Lambda})|\Lambda p,\tau\rangle\right)C_{\tau\sigma}(\Lambda,p)$$

$$= \sum_{\tau\kappa} |\bar{\Lambda}\Lambda p, \kappa\rangle \left(C_{\kappa\tau}(\bar{\Lambda}, \Lambda p) C_{\tau\sigma}(\Lambda, p)\right).$$

可见满足同态关系，故 $C_{\tau\sigma}(\Lambda, p)$ 是无穷维幺正表示.

而表示矩阵 $C_{\tau\sigma}(\Lambda, p)$ 有可能是可约的，我们需要将其约化成不可约的分块情形；我们要求它只把此种粒子（比如电子）变成它不同的状态（比如电子的其它动量态、自旋态）. 因此，可以用不可约的 $C_{\tau\sigma}(\Lambda, p)$ 代表不同粒子的单粒子态. 下面进一步分解 $C_{\tau\sigma}(\Lambda, p)$ 的结构.

式(15.7-19)中的本征值 p^μ（粒子四动量）是任意大小的，我们希望从一些简单的四动量状态 k^ν（称为**标准四动量**）出发，通过正时固有 Lorentz 变换 $L^\mu{}_\nu(p)$ 将 k^ν 变为 p^μ，即

$$p^\mu = L^\mu{}_\nu(p) k^\nu. \tag{15.7-25}$$

上式中的 L 一定存在. 比如我们将标准四动量选为

$$k_s^\nu = (E, 0, 0, p). \tag{15.7-26}$$

即把它的第一、第二分量选为零. 下标 "s" 代表 "standard". 根据爱氏能动关系可知：$E^2 = p^2 + m^2$，其中 m 代表粒子质量，E 代表粒子能量（正值），p 代表粒子三动量 $\boldsymbol{p}$ 的第三分量. 当粒子质量 $m \to 0 (p \to \pm E)$ 时，k_s^ν 趋于无质量粒子的四动量 $(E, 0, 0, \pm E)$（为简单起见，我们不考虑 $p = -E$ 的情形）. 当 $|p| < E$ 时，标准动量 k_s^μ 描述的是有质量粒子；尤其 $p = 0$ 时，有质量粒子标准四动量 k_s^ν 趋于它的最简形式 $(E, 0, 0, 0)$.

当粒子处于标准四动量 k_s^ν（式(15.7-26)）时，它所对应的单粒子态为 $|k\sigma\rangle$. 当 k_s^ν 经 $L^\mu{}_\nu(p)$ 变为 p^μ 时，$|k\sigma\rangle$ 也变为 $|p\sigma\rangle$，即

$$|p\sigma\rangle = N_p \hat{U}\left(L_p\right)|k\sigma\rangle. \tag{15.7-27}$$

其中 N_p 是归一化因子，对于这里的讨论来说并不重要.

我们将一般的洛伦兹变换 $\hat{U}(\Lambda)$ 作用到式(15.7-27)上，有

$$\hat{U}(\Lambda)|p\sigma\rangle = N_p \hat{U}(\Lambda)\hat{U}\left(L_p\right)|k\sigma\rangle = N_p \hat{U}(L_{\Lambda p})\hat{U}\left(L_{\Lambda p}^{-1}\Lambda L_p\right)|k\sigma\rangle. \tag{15.7-28}$$

上式最后一步，我们技巧性地乘以变换 $\hat{U}(L_{\Lambda p}^{-1})$，然后再乘以 $\hat{U}(L_{\Lambda p})$，这两步相当于啥都没干. 但这使得式(15.7-28)中出现一个变换 $\hat{U}\left(L_{\Lambda p}^{-1}\Lambda L_p\right)$，现在我们来分

析它．其中 $L_{\Lambda p}^{-1}\Lambda L_p$ 是作用到标准动量 k_s^ν 上的，它先令 k_s^ν 变到 p^μ，之后再变到 Λp，最后由 Lorentz 变换 $L_{\Lambda p}^{-1}$ 将 Λp 变回 k_s，即 $L_{\Lambda p}^{-1}\Lambda L_p$ 保 k_s^ν 不变：

$$(L_{\Lambda p}^{-1})^\sigma{}_\rho \Lambda^\rho{}_\mu (L_p)^\mu{}_\nu k_s^\nu = (L_{\Lambda p}^{-1})^\sigma{}_\rho \Lambda^\rho{}_\mu p^\mu = (L_{\Lambda p}^{-1})^\sigma{}_\rho (\Lambda p)^\rho = k_s^\sigma. \tag{15.7-29}$$

可见（下式中的 W 称为 **Wigner 转动**）

$$W^\sigma{}_\nu(\Lambda, p) = (L_{\Lambda p}^{-1})^\sigma{}_\rho \Lambda^\rho{}_\mu (L_p)^\mu{}_\nu. \tag{15.7-30}$$

保持 k_s^σ 不变，并且 W 构成齐次 Lorentz 群的子群，称之为**小群**．验证 W 满足群的定义是直接的，我们只需验证群乘法的封闭性，设有 W 和 $\overline{W}$，则

$$\overline{W}^\pi{}_\sigma W^\sigma{}_\nu k_s^\nu = (\bar{L}_{\bar{\Lambda}\bar{p}}^{-1})^\pi{}_\rho \bar{\Lambda}^\rho{}_\mu (\bar{L}_{\bar{p}})^\mu{}_\sigma k_s^\sigma = k_s^\pi.$$

满足封闭性，故是群．设 W 对应的 Hilbert 空间的幺正算符是 $\hat{U}(W)$，则

$$\hat{U}(W)|k\sigma\rangle = \sum_\kappa |k\kappa\rangle D_{\kappa\sigma}(W). \tag{15.7-31}$$

仿照验证 $C_{\tau\sigma}(\Lambda, p)$ 是表示的方式，容易验证 $D_{\kappa\sigma}(W)$ 是小群的幺正表示．

利用式(15.7-30)、(15.7-31)，式(15.7-28)可表示为

$$\begin{aligned}\hat{U}(\Lambda)|p\sigma\rangle &= N_p \hat{U}(L_{\Lambda p})\hat{U}\big(L_{\Lambda p}^{-1}\Lambda L_p\big)|k\sigma\rangle = N_p \hat{U}(L_{\Lambda p})\hat{U}\big(W(\Lambda, p)\big)|k\sigma\rangle \\ &= N_p \sum_\tau \hat{U}(L_{\Lambda p})|k\tau\rangle D_{\tau\sigma}\big(W(\Lambda, p)\big) = \frac{N_p}{N_{\Lambda p}} \sum_\tau N_{\Lambda p}\hat{U}(L_{\Lambda p})|k\tau\rangle D_{\tau\sigma}\big(W(\Lambda, p)\big).\end{aligned}$$

再由式(15.7-27)可得

$$\hat{U}(\Lambda)|p\sigma\rangle = \frac{N_p}{N_{\Lambda p}} \sum_\tau |\Lambda p, \tau\rangle D_{\tau\sigma}\big(W(\Lambda, p)\big). \tag{15.7-32}$$

对比式(15.7-24)（$\hat{U}(\Lambda)|p\sigma\rangle = \sum_\tau |\Lambda p, \tau\rangle C_{\tau\sigma}(\Lambda, p)$），除了归一化系数，我们已将寻找齐次 Lorentz 群表示 $C_{\tau\sigma}(\Lambda, p)$ 转化为寻找小群 W 的表示 $D_{\tau\sigma}\big(W(\Lambda, p)\big)$．这种通过较小子群表示（此处指 W）而得到较大群（此处指 Lorentz 群）表示的方法叫做*诱导表示法*．1930 年代，Wigner 正是通过诱导表示法给出了齐次 Lorentz 群的无穷维幺正表示．

前面，我们通过第一 Casimir 算子将单粒子态进行了分类，去掉几个非物理分类后，只剩下正能的*类时态*和*类光态*．我们将单粒子态看成齐次 Lorentz 群的不可约幺正表示 $C_{\tau\sigma}(\Lambda, p)$，在我们将其转化为其小群 W 的表示 $D_{\tau\sigma}\big(W(\Lambda, p)\big)$ 后，便可用第二 Casimir 算子继续讨论单粒子态的分类问题了．

有质量粒子正能态 类时态对应的是有质量粒子，我们只关心正能态．对于有质量粒子正能态来说，我们将标准动量选为最简形式 $k_s=(M,0,0,0)$，由于它的三动量全部是零，故描述它的小群 W 是 $SO(3)$（更确切地说是它的覆盖群 $SU(2)$）．由于标准动量中只有静质量非零，故有

$$\hat{P}^\mu|k\sigma\rangle_s=(M,0,0,0)^T|k\sigma\rangle_s.\qquad \hat{C}_1|k\sigma\rangle_s=M^2|k\sigma\rangle_s. \tag{15.7-33}$$

此时可以把三动量 $\hat{\boldsymbol{P}}$ 看成零算符．由此可计算出 $\widehat{W}^\mu$ 如下

$$\widehat{W}^0=0;\qquad \widehat{W}^i=M\hat{J}^i;\qquad \hat{C}_2=-M^2\hat{\boldsymbol{J}}\cdot\hat{\boldsymbol{J}}. \tag{15.7-34}$$

上式中 $\hat{\boldsymbol{J}}$ 是角动量算符；由于单粒子态是描述自由粒子的，此时轨道角动量为零，所以 $\hat{\boldsymbol{J}}$ 只包含粒子的自旋 $\hat{\boldsymbol{S}}$．故有

$$\hat{C}_2|k\sigma\rangle_s=-M^2\hat{\boldsymbol{S}}\cdot\hat{\boldsymbol{S}}|k\sigma\rangle_s=-M^2s(s+1)|k\sigma\rangle_s. \tag{15.7-35}$$

也就是说，有质量粒子正能态可依据粒子质量和自旋进行分类．

此处，我们不关心单粒子态的变换方式，具体可见[65]§2.5．

无质量粒子正能态 类光态自然是指以光速飞行的无质量粒子正能态．对于无质量粒子正能态来说，我们先将标准动量选为最简形式 $k_s=(E,0,0,E)$，并给出相关信息以备后用．无质量粒子的四动量和第一 Casimir 算子本征值是：

$$\hat{P}^\mu|k\sigma\rangle_s=(E,0,0,E)^T|k\sigma\rangle_s.\quad \hat{C}_1|k\sigma\rangle_s=(E^2-E^2)|k\sigma\rangle_s=0. \tag{15.7-36}$$

它的 $\widehat{W}^\mu$ 如下

$$\widehat{W}^0=E\hat{J}^3=\widehat{W}^3;\ \widehat{W}^1=E\left(\hat{J}^1-\hat{K}^2\right),\ \widehat{W}^2=E\left(\hat{J}^2+\hat{K}^1\right). \tag{15.7-37}$$

由此可得第二 Casimir 算子为

$$\hat{C}_2=-(\widehat{W}_1)^2-(\widehat{W}_2)^2=-E^2\left(\left(\hat{J}^1-\hat{K}^2\right)^2+\left(\hat{J}^2+\hat{K}^1\right)^2\right). \tag{15.7-38}$$

在此，第二 Casimir 算子本征值要么恒负，要么为零．

我们先叙述一个李代数收缩，这是 §13.11.3.2的续篇．

15.7.3.2 李代数收缩二：矩阵形式的 $\mathfrak{so}(3) \to \mathfrak{iso}(2)$

我们[35]仿照 Weinberg 的作法给出一种矩阵形式的 Inönü–Wigner 李代数收缩．为此，我们先重复温大师的论述．

例 15.27 Weinberg [65, §2.5]零质量小节开头的论述．

考虑一任意小群群元 $W^{\mu}{}_{\nu}$（注意它是 Lorentz 群的子群，故有 $W^T\eta W=\eta$），它满足 $W^{\mu}{}_{\nu}k^{\nu}=k^{\mu}$，其中 $k^{\mu}=(1,0,0,1)$ 是类光情况下的标准四矢量．这类 Lorentz 变换作用在类时四矢量 $t^{\mu}=(1,0,0,0)$ 上给出的四矢量 Wt，它的长度以及它与 $Wk=k$ 的标量积必须与 t 的长度以及 t 与 k 的标量积相同：

$$(Wt)^{\mu}(Wt)_{\mu}=t^{\mu}t_{\mu}=+1;\qquad (Wt)^{\mu}k_{\mu}=t^{\mu}k_{\mu}=+1. \tag{15.7-39}$$

式(15.7-39)具体计算如下：

$$\begin{aligned}(Wt)^{\mu}(Wt)_{\mu}=&\eta_{\mu\alpha}(Wt)^{\mu}(Wt)^{\alpha}=t^{\nu}(W^{\mu}{}_{\nu}\eta_{\mu\alpha}W^{\alpha}{}_{\beta})t^{\beta}=t^{\nu}\eta_{\nu\beta}t^{\beta}=t^{\mu}t_{\mu}=1.\\ (Wt)^{\mu}k_{\mu}=&k_{\mu}W^{\mu}{}_{\nu}t^{\nu}=(k_{\mu}W^{\mu}{}_{\nu})t^{\nu}=k_{\nu}t^{\nu}=1.\end{aligned}$$

任何满足式(15.7-39)第二个条件的四矢量可以写成

$$(Wt)^{\mu}=(1+\zeta_w,\alpha,\beta,\zeta_w).$$

那么式(15.7-39)第一个条件给出如下关系：$\zeta_w=(\alpha^2+\beta^2)/2$．由此可知，$W^{\mu}{}_{\nu}$ 作用在 t^{ν} 上的效果与如下 Lorentz 变换相同

$$S^{\mu}{}_{\nu}(\alpha,\beta)=\begin{pmatrix}1+\zeta_w & \alpha & \beta & -\zeta_w\\ \alpha & 1 & 0 & -\alpha\\ \beta & 0 & 1 & -\beta\\ \zeta_w & \alpha & \beta & 1-\zeta_w\end{pmatrix}. \tag{15.7-40}$$

可验证 $S^T\eta S=\eta$ 和 $\det(S)=1$．这并不意味着 W 等于 $S(\alpha,\beta)$，但是它确实意味着 $S^{-1}(\alpha,\beta)W$ 是一个保类时四矢量 $(1,0,0,0)$ 不变的 Lorentz 变换，所以它是一个纯旋转．另外，和 $W^{\mu}{}_{\nu}$ 一样，$S^{\mu}{}_{\nu}$ 保类光四矢量 $(1,0,0,1)$ 不变，所以 $S^{-1}(\alpha,\beta)W$ 必然是绕 z 轴转动某个 θ 角的旋转，即有

$$S^{-1}(\alpha,\beta)W=R(\theta). \tag{15.7-41}$$

至此，Weinberg 书中的叙述完毕．下面开始我们的阐述． ■

Weinberg 将无质量粒子的标准动量选为 $k^\mu_{photon}=(E,0,0,E)$. 在下面的叙述中我们把标准动量选为 $k^\mu_s=(E,0,0,p)$（即式(15.7-26)），将爱因斯坦能动关系（$E^2=m^2+p^2$，自然单位制）考虑在内；当粒子质量 $m\to 0(p\to E)$ 时，$k^\mu_s\to k^\mu_{photon}$；当 $0\leqslant p<E$ 时，标准动量 k^μ_s 描述的是有质量粒子. 我们来求保持 k^μ_s 不变 $(W^\mu{}_\nu k^\nu_s=k^\mu_s)$ 的小群 W，依照 Weinberg 的叙述 W 是一个矩阵，它可以分解成两个矩阵的乘积 $W(\alpha,\beta,\theta)=S(\alpha,\beta)R(\theta)$（即式(15.7-41)），$\alpha$、$\beta$、$\theta$ 是描述小群 W 的三个连续实参量，其中 $R(\theta)$ 是绕 z 轴的转动（式(13.10-17)）. 矩阵 S 是一个一般的 Lorentz 变换，可以表示成如下形式

$$S^\mu{}_\nu(\alpha,\beta)=\begin{pmatrix}1+q^2\zeta & z & r & -q\zeta\\ q\alpha & u & v & -\alpha\\ q\beta & w & s & -\beta\\ q\zeta & x & y & 1-\zeta\end{pmatrix}\xrightarrow[m\to 0]{q\to 1}\begin{pmatrix}1+\zeta_w & \alpha & \beta & -\zeta_w\\ \alpha & 1 & 0 & -\alpha\\ \beta & 0 & 1 & -\beta\\ \zeta_w & \alpha & \beta & 1-\zeta_w\end{pmatrix}. \tag{15.7-42}$$

其中 $q\equiv p/E=\sqrt{1-m^2/E^2}$ 是一无量纲实参数；$q=1(m=0)$ 表示无质量态，$q\neq 1(m>0)$ 表示有质量态. 并且有（参考例15.27不难得到下式）

$$\alpha^2+\beta^2+\left(1-q^2\right)\zeta^2-2\zeta=0. \tag{15.7-43}$$

满足方程(15.7-43)的 ζ 有两个，只取一个

$$\zeta=\frac{1}{1-q^2}\left[1-\sqrt{1-(1-q^2)(2\zeta_w)}\right],\qquad \zeta_w\equiv(\alpha^2+\beta^2)/2. \tag{15.7-44}$$

当 $q=1$ 时，满足方程(15.7-43)的 $\zeta=\zeta_w=(\alpha^2+\beta^2)/2$. 矩阵 S 的第二、三列是未知数，需要用 Lorentz 变换的条件（$S^T\eta S=\eta$）来求出；经过略微复杂的计算可以得到（请读者至少验证下式为 $S^T\eta S=\eta$ 的解）：

$$\begin{aligned}&s=\sqrt{1-(1-q^2)\,\beta^2},\quad v=\frac{-1}{s}\left(1-q^2\right)\alpha\beta,\quad u=\sqrt{1-(1-q^2)\,\frac{\alpha^2}{s^2}},\\ &w=0,\quad x=\frac{\alpha}{s},\quad y=u\beta,\quad z=xq,\quad r=yq.\end{aligned} \tag{15.7-45}$$

把小群 $W(\alpha,\beta,\theta)=S(\alpha,\beta)R(\theta)$ 进行无穷小变换求其李代数，即令 $\alpha\to 0$、$\beta\to 0$、$\theta\to 0$，同时忽略二阶及以上项，有

$$W^\mu{}_\nu=I+\begin{pmatrix}0 & q\alpha & q\beta & 0\\ q\alpha & 0 & -\theta & -\alpha\\ q\beta & \theta & 0 & -\beta\\ 0 & \alpha & \beta & 0\end{pmatrix}=I+\alpha A+\beta B+\theta J^3, \tag{15.7-46}$$

其中

$$A=\begin{pmatrix}0&q&0&0\\q&0&0&-1\\0&0&0&0\\0&1&0&0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0&0&q&0\\0&0&0&0\\q&0&0&-1\\0&0&1&0\end{pmatrix},\quad J^3=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&0&-1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

对比第476页的式(13.11-59)可知

$$A=-J^2-qK^1,\qquad B=+J^1-qK^2. \tag{15.7-47}$$

直接计算可以得到上述矩阵生成元的对易关系是

$$\left[J^3,A\right]=B,\quad \left[B,J^3\right]=A,\quad [A,B]=\left(1-q^2\right)J^3. \tag{15.7-48}$$

对易关系(15.7-48)表明：当 $q\to 0$ 时小群 W 是 $\mathfrak{so}(3)$ 李代数(15.2-42)；当 $q\to 1$ 时小群 W 是 $\mathfrak{iso}(2)$ 李代数(13.11-16)；当 q 从 0 变到 1 时，W 的李代数从 $\mathfrak{so}(3)$ 收缩到 $\mathfrak{iso}(2)$．这里给出的矩阵形式的李代数收缩与最原始的 Inönü–Wigner 收缩本质相同，只是表述形式不同罢了．

15.7.3.3 有质量粒子、无质量粒子正能态的统一表述

我们需要把 §15.7.3.2的内容用到 Hilbert 态空间．通过式(15.7-1)，我们把关系(15.7-48)同态成 Hilbert 空间的无穷小算符：

$$\hat{U}(W)=1-\mathbb{i}\alpha\hat{A}-\mathbb{i}\beta\hat{B}-\mathbb{i}\theta\hat{J}^3. \tag{15.7-49}$$

$$\text{其中 }\hat{A}=-\hat{J}^2-q\hat{K}^1,\qquad \hat{B}=+\hat{J}^1-q\hat{K}^2. \tag{15.7-50}$$

$\hat{J}^i$ 是角动量算符，对于无相互作用的自由粒子来说就是自旋；$\hat{K}^i$（此时是无穷维幺正的）是伪转动（boost）算符．当 $q=1$ 时，算符 $\hat{A}$、$\hat{B}$ 与式(15.7-37)中的 $\widehat{W}^1$、$\widehat{W}^2$ 相同（忽略正负号）．生成元的对易关系是

$$\left[\hat{J}^3,\hat{A}\right]=\mathbb{i}\hat{B},\quad \left[\hat{B},\hat{J}^3\right]=\mathbb{i}\hat{A},\quad \left[\hat{A},\hat{B}\right]=\left(1-q^2\right)\mathbb{i}\hat{J}^3. \tag{15.7-51}$$

从幺正变换 $\hat{U}(W)$ 的生成元 $\hat{A}$、$\hat{B}$、$\hat{J}^3$ 及其对易关系(15.7-51)可以看出，如果 $q=1$，那么这个李代数就是无质量态的李代数 $\mathfrak{iso}(2)$．如果 $q=0$ 就是有质量态

李代数 $\mathfrak{o}(3)$，也就是角动量．换句话说如果随着质量趋于 0，即 $q\to 1$，小群的李代数从 $\mathfrak{o}(3)$ 变成了 $\mathfrak{iso}(2)$．

当 $q\neq 1$ 时，也就是粒子质量不为零，如果令

$$\hat{J}'^1=\frac{\hat{A}}{\sqrt{1-q^2}}=\frac{E}{m}\hat{A},\quad \hat{J}'^2=\frac{\hat{B}}{\sqrt{1-q^2}}=\frac{E}{m}\hat{B},\quad \hat{J}'^3=\hat{J}^3. \tag{15.7-52}$$

则上述对易关系(15.7-51)变为

$$\left[\hat{J}'^3,\hat{J}'^1\right]=\mathbb{i}\hat{J}'^2,\quad \left[\hat{J}'^2,\hat{J}'^3\right]=\mathbb{i}\hat{J}'^1,\quad \left[\hat{J}'^1,\hat{J}'^2\right]=\mathbb{i}\hat{J}'^3. \tag{15.7-53}$$

这就是角动量的对易关系，因此李代数(15.7-51)就是 $\mathfrak{o}(3)$．这显然是正确的，因为当 $q\neq 1$ 时，标准动量 k_s^μ 就是有质量粒子情形，其小群自然是 SO(3)．

量子物理中，与实验可观测物理量对应的是算符矩阵元，即 $\langle\alpha|\hat{O}|\beta\rangle$，其中 $|\alpha\rangle,|\beta\rangle$ 是粒子所处的态矢量，$\hat{O}$ 是某可观测算符；算符本身以及态矢量本身都没有可观测效应；那么决定可观测物理量就有两个因素：算符和态矢量．

式(15.7-52)和(15.7-53)是有质量粒子的自旋算符及对易关系，如果粒子的自旋量子数是 s，那么由升降算符，$\hat{J}'_\pm=\hat{J}'^1\pm\mathbb{i}\hat{J}'^2$，可以取遍 $\hat{J}'^3$ 所有自旋态：$s,s-1,\cdots,-s+1,-s$，共 $2s+1$ 个态．比如粒子处于 $\hat{J}'^3$ 的本征态 $|j,m\rangle$ 时，那就有 $\hat{J}'_+|j,m\rangle\propto|j,m+1\rangle$．

自然界中的电磁波的量子是无质量粒子——光子——只有两个偏振状态，从未观测到第三个偏振态；物理理论自然要与实验相符合；物理理论上认为：宏观的可观测效应——偏振——与光子自旋算符相对应．

需要注意的是随着 $q\to 1$，也就是粒子质量 (m) 趋于 0，式(15.7-52)定义的自旋算符 $\hat{J}'^{1,2}$ 是奇异的；无穷大一般说来是非物理的，我们得想些办法来处理此事．从式(15.7-50)可以看到算符 $\hat{A},\hat{B}$ 是由自旋和伪转动构成，算符本身没有可操作空间，我们只能从态矢量上面来寻找原因．假设粒子处于态 $|p,\sigma\rangle$，其中 σ 代表自旋量子数，p 代表其它量子数；如果粒子的态矢量处在算符 $\hat{A}$、$\hat{B}$ 的非零本征值态，那么不论本征值多小，随着粒子质量 $m\to 0$，自旋(15.7-52)中的 $\hat{J}'^1$、$\hat{J}'^2$ 是奇异的．为避免此种情形，我们假设：

约定：只有使式(15.7-50)中算符 $\hat{A},\hat{B}$ 的本征值为 0 的 Hilbert 空间态矢量才能描述自然界中无质量粒子的单粒子态．

故从式(15.7-52)可知 $\hat{J}'^{1,2}|p,\sigma\rangle=E/m\times(\hat{A},\hat{B})|p,\sigma\rangle=E/m\times 0=0$．即便粒子质量 $m\to 0$，自旋 $\hat{J}'^{1,2}|p,\sigma\rangle$ 也不是无穷大，没有矛盾．同时这也使得无质

量粒子的升降算符 $\hat{J}'_{\pm}=\hat{J}'^{1}\pm\mathbb{i}\hat{J}'^{2}$ 恒为零，所以无质量粒子的自旋量子数是无法升降的，只能处于一个确定的状态 $|\sigma\rangle$；如果无质量粒子是空间反射不变的（光子就是如此），可以通过宇称变换得到另一个态 $|-\sigma\rangle$．这就是光子只有两个自旋态的物理解释，这里的解释无法确定 σ 的具体数值，需要从其它角度来确定此量子数的数值．上面解释概括起来就是，随着粒子质量 $m\to 0$，光子自旋态被锁定在 ±1，不能处于 0 自旋态．由于我们把无质量粒子单粒子态看成有质量粒子单粒子态的质量为零的极限态，故无质量粒子的自旋只能取：……、-1、$-\frac{1}{2}$、0、$\frac{1}{2}$、1、……．一般来说，物理学家喜欢把恒为零的量称为没有物理意义量，或没有实验可观测意义量；自旋为零的光子态就属于此类．

因为无质量粒子自旋量子数不能升降，所以物理上习惯用**螺旋度**（helicity）来称呼这个量子数，而不用自旋（spin）这个名词．

当我们选择的无质量粒子单粒子正能态使算符 $\hat{A}$、$\hat{B}$ 本征值为 0 时，依式(15.7-38)可知无质量粒子的第二 Casimir 算子 $\hat{C}_2$ 本征值必然为零．

至此，我们得到结论：可以依据 $\hat{J}^3$ 的本征值 σ（螺旋度，即自旋在动量方向上的投影）对无质量粒子正能态进行分类．

$SO(2)$ 群表示见例15.11，不过需要注意该表示中的 n（即上面的 σ）取值范围是：0、$\pm\frac{1}{2}$、±1、……．这是因为我们要把 $SO(2)$ 看成 $SO(3)$ 的子群，而描述量子物理的是 $SO(3)$ 的双重通用覆盖群 $SU(2)$；而 $SU(2)$ 绕 z 轴的转动周期是 4π（见式(15.2-16)）．此时，我们不能用 $SO(2)$ 群的无穷度通用覆盖群 $(\mathbb{R},+)$ 的不可约复表示（见例15.13）；因为有质量粒子单粒子态在质量趋于零时，无法退化到这个表示状态．

对比文献[65]$^{\text{p.72}}$、[60]$^{\text{p.198}}$上的直接假定：（他们的本意）自然界中从未发现令第二 Casimir 算子 $\hat{C}_2$ 本征值不等于零的粒子，故需取令 $\hat{C}_2$（式(15.7-38)）本征值等于零的单粒子态．虽然上面的“约定”与其本质相同，但我们[35]把有质量态和无质量态统一到一起表述；并且清晰地展示出粒子质量趋于零时算符的变化，此时需要对单粒子态进行限制才能使物理结果合理．

此处，我们不关心单粒子态的变换方式，具体可见[65]$^{\S2.5}$．

自评 我们的方法只是将 Weinberg 教材中的标准动量略作更改，整体架构与温大师书完全相同，乏善可陈．但可以当作该节[65]$^{\S2.5}$的有益补充．

15.7.4 量子场

本节将 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 的表示用到量子场上；主要参考了[19]§4.3.

设在平直的闵氏时空 $(\mathbb{R}^4_1,\eta)$ 上有经典场 $\Phi(x)$，它有 $N(\geqslant 1)$ 个分量．设坐标 $x\in\mathbb{R}^4_1$ 变换依赖于参数 ω，其变换规则是

$$x\to x'=L(x,\omega). \tag{15.7-54}$$

在上述变换下，经典场 $\Phi(x)$ 的变换是

$$\Phi(x)\to\Phi'(x')=\mathcal{T}(\omega)\Phi(x). \tag{15.7-55}$$

其中 $\mathcal{T}(\omega)$ 是一个 $N\times N$ 的矩阵．

下面讨论量子场．本节我们将参数 ω 限定在时空平移和 Lorentz 变换．根据 Wigner 定理[65]§2.2可知 Hilbert 空间态矢量 $|\alpha\rangle$ 的变换是幺正且线性的，或者是反幺正且反线性的．我们只考虑单位元（即恒等变换）附近的变换，故下式中的 $\hat{U}(\omega)$ 是幺正且线性的：

$$|\alpha'\rangle=\hat{U}(\omega)|\alpha\rangle;\qquad \text{且}\quad \hat{U}^{-1}(\omega)=\hat{U}^{\dagger}(\omega). \tag{15.7-56}$$

当我们把经典场 $\Phi(x)$ 推广到量子场 $\hat{\Phi}(x)$ 时，式(15.7-55)变成：

$$\langle\beta'|\hat{\Phi}(x')|\alpha'\rangle=\mathcal{T}(\omega)\langle\beta|\hat{\Phi}(x)|\alpha\rangle. \tag{15.7-57}$$

需要注意：式(15.7-57)等号左端中的场算符是 $\hat{\Phi}(x')$，不是 $\hat{\Phi}'(x')$．这是因为态矢量 $|\alpha'\rangle$ 已经带撇号，如果场算符再加上撇号，那么将产生双重变换；这属于重复变换，是不允许的，故场算符不带撇号．将式(15.7-56)代入式(15.7-57)，有

$$\hat{U}^{-1}(\omega)\hat{\Phi}(x')\hat{U}(\omega)=\mathcal{T}(\omega)\hat{\Phi}(x). \tag{15.7-58}$$

上式等价于

$$\hat{U}^{-1}(\omega)\hat{\Phi}(x)\hat{U}(\omega)=\mathcal{T}(\omega)\hat{\Phi}\big(L^{-1}(x,\omega)\big). \tag{15.7-59}$$

根据式(13.11-4)，并参考式(15.7-1)，当实参数 ω 趋于无穷小时，可将 $\hat{U}(\omega)$ 在单位元附近展开为（只保留线性项）：

$$\hat{U}(\delta\omega)=1-\mathrm{i}\hat{G}(\delta\omega);\qquad \text{其中}\hat{G}(\delta\omega)\text{是自伴算符}. \tag{15.7-60}$$

将上式代入式(15.7-59)，有（忽略高于一阶的小量）

$$\begin{aligned}&\Big(1+\mathrm{i}\hat{G}(\delta\omega)\Big)\,\hat{\Phi}(x)\,\Big(1-\mathrm{i}\hat{G}(\delta\omega)\Big)=\mathcal{T}(\delta\omega)\hat{\Phi}\big(x-\delta x(\omega)\big)\\ \Rightarrow\ &\hat{\Phi}(x)-\mathrm{i}\hat{\Phi}(x)\hat{G}(\delta\omega)+\mathrm{i}\hat{G}(\delta\omega)\hat{\Phi}(x)=\mathcal{T}(\delta\omega)\hat{\Phi}(x)-\mathcal{T}(\delta\omega)\delta x^{\mu}\partial_{\mu}\hat{\Phi}(x).\end{aligned}$$

继续化简上式，有

$$\mathrm{i}\Big[\hat{G}(\delta\omega),\ \hat{\Phi}(x)\Big]=\big(\mathcal{T}(\delta\omega)-1\big)\hat{\Phi}(x)-\mathcal{T}(\delta\omega)\delta x^{\mu}\partial_{\mu}\hat{\Phi}(x).\tag{15.7-61}$$

上式为量子场算符基本变换公式.

我们只考虑时空平移和 Lorentz 变换；根据式(15.7-1)，可令

$$\hat{G}(\delta\omega,\epsilon)=\frac{1}{2}\delta\omega_{\rho\sigma}\widehat{M}^{\rho\sigma}-\epsilon_{\rho}\hat{P}^{\rho};\quad \text{和}\quad \delta x^{\mu}=\epsilon^{\mu}+\delta\omega^{\mu}{}_{\nu}x^{\nu}.\tag{15.7-62}$$

平移 本小节只考虑平移，即 $\delta x^{\mu}=\epsilon^{\mu}$ 且 $\delta\omega=0$. 时空平移不会改变场 $\hat{\Phi}(x)$ 的分布，故 $\mathcal{T}(\delta\omega)=1$. 把式(15.7-62)代入(15.7-61)：

$$\mathrm{i}\Big[\hat{P}^{\rho},\ \hat{\Phi}(x)\Big]=\partial^{\rho}\hat{\Phi}(x).\tag{15.7-63}$$

下面我们验证一下式(15.7-63)与有限平移算符是兼容的. 为此需要用到如下算符求和表达式（证明见例题15.28）.

$$e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}}=\hat{B}+\Big[\hat{A},\hat{B}\Big]+\frac{1}{2!}\Big[\hat{A},\ \Big[\hat{A},\hat{B}\Big]\Big]+\cdots\tag{15.7-64a}$$

$$e^{-\hat{A}}\hat{B}e^{\hat{A}}=\hat{B}+\Big[\hat{B},\hat{A}\Big]+\frac{1}{2!}\Big[\Big[\hat{B},\hat{A}\Big],\ \hat{A}\Big]+\cdots\tag{15.7-64b}$$

根据例13.101，这里的平移算符为：$\hat{U}(a)=\exp\Big(+\mathrm{i}a^{\mu}\hat{P}_{\mu}\Big)$. Lorentz 度规号差为 $+2$ 时，请参考式(13.11-7). 将平移算符代入式(15.7-59)左端，有

$$\begin{aligned}e^{-\mathrm{i}a^{\nu}\hat{P}_{\nu}}\hat{\Phi}(x)e^{\mathrm{i}a^{\mu}\hat{P}_{\mu}}&\xlongequal{15.7-64}\hat{\Phi}(x)-\Big[\mathrm{i}a^{\mu}\hat{P}_{\mu},\hat{\Phi}\Big]+\frac{1}{2!}\Big[\mathrm{i}a^{\nu}\hat{P}_{\nu},\ \Big[\mathrm{i}a^{\mu}\hat{P}_{\mu},\hat{\Phi}\Big]\Big]+\cdots\\&\xlongequal{15.7-63}\hat{\Phi}(x)+(-a^{\mu})\partial_{\mu}\hat{\Phi}(x)+\frac{1}{2!}(-a^{\nu})(-a^{\mu})\partial_{\nu}\partial_{\mu}\hat{\Phi}(x)+\cdots\\&=\hat{\Phi}(x-a)\ =\text{式(15.7-59)右端}.\end{aligned}$$

Lorentz 变换 此处只考虑 Lorentz 变换，即 $\delta x^\mu = \delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu$ 且 $\epsilon^\mu = 0$. 有

$$\mathcal{T}(\delta\omega) = 1 - \frac{\mathrm{i}}{2}\delta\omega_{\mu\nu}\mathcal{S}^{\mu\nu}. \tag{15.7-65}$$

在 Lorentz 变换下，场 $\hat{\Phi}$ 分布必然会发生改变；Lorentz 变换是四维的，而场有 N 个分量，故我们需要用 Lorentz 群的 N 维线性表示作用到 $\hat{\Phi}$ 上；这样在 $\hat{\Phi}$ 上便体现了 Lorentz 变换. 式(15.7-65)为 Lorentz 群的通用覆盖群 $SL(2,\mathbb{C})$ 的无穷小表示. $\delta\omega_{\mu\nu}$ 是六个实参数，用来描述三个纯转动和三个伪转动. $\mathcal{S}^{\mu\nu}$ 关于上指标反对称，共有六个，它们包含三个转动算符生成元和三个伪转动算符生成元. 每个 $\mathcal{S}^{\mu\nu}$ 算符都是 $N\times N$ 的矩阵表示(15.4-42).

把式(15.7-65)、(15.7-62)代入(15.7-61)，有

$$\mathrm{i}\left[\frac{1}{2}\delta\omega_{\rho\sigma}\widehat{M}^{\rho\sigma},\ \hat{\Phi}(x)\right] = -\frac{\mathrm{i}}{2}\delta\omega_{\mu\nu}\mathcal{S}^{\mu\nu}\hat{\Phi}(x) - \left(1 - \frac{\mathrm{i}}{2}\delta\omega_{\rho\sigma}\mathcal{S}^{\rho\sigma}\right)\delta\omega_{\mu\nu}x^\nu\partial^\mu\hat{\Phi}(x).$$

忽略高于一阶的小量，我们得到量子场在 Lorentz 变换下的基本公式

$$\left[\hat{\Phi}(x),\ \widehat{M}^{\mu\nu}\right] = +\mathrm{i}(x^\mu\partial^\nu - x^\nu\partial^\mu)\hat{\Phi}(x) + \mathcal{S}^{\mu\nu}\hat{\Phi}(x). \tag{15.7-66}$$

其中“$\mathrm{i}(x^\mu\partial^\nu - x^\nu\partial^\mu)$”是轨道角动量，“$\mathcal{S}^{\mu\nu}$”是场的自旋. 很明显，当 $\hat{\Phi}(x)$ 是标量场时（$N=1$），表示(15.4-42)为 $\mathfrak{D}^{(00)} = (0)$，这说明标量场自旋为零. 当 $N>1$ 时，具体表示矩阵可参考式(15.4-42).

关于量子场的更多内容请参考[65]§5.6,5.7.

例 15.28 证明公式(15.7-64).

我们分两步来证明，先证明式(15.7-68). 设 A 和 B 为两个方阵（或线性算符），它们互不对易. 定义多重对易式 $\left[A^{(i)},B\right]$ 和 $\left[B,A^{(i)}\right]$ 如下：

$$\begin{array}{ll}
\left[A^{(0)},B\right] = B & \left[B,A^{(0)}\right] = B \\
\left[A^{(1)},B\right] = [A,B] & \left[B,A^{(1)}\right] = [B,A] \\
\left[A^{(2)},B\right] = [A,[A,B]] & \left[B,A^{(2)}\right] = [[B,A],A] \\
\cdots\cdots\cdots\quad\cdots\cdots\cdots & \cdots\cdots\cdots\quad\cdots\cdots\cdots
\end{array}$$

显然，对于 $\left[A^{(i+1)},B\right]$、$\left[B,A^{(i+1)}\right]$ 型的多重对易式，有

$$\left[A,\left[A^{(i)},B\right]\right] = \left[A^{(i+1)},B\right] \quad\Rightarrow\quad A\left[A^{(i)},B\right] = \left[A^{(i)},B\right]A + \left[A^{(i+1)},B\right].$$

$$\left[\left[B,A^{(i)}\right],A\right]=\left[B,A^{(i+1)}\right] \quad \Rightarrow \quad \left[B,A^{(i)}\right]A=A\left[B,A^{(i)}\right]+\left[B,A^{(i+1)}\right].$$

由上两式，利用数学归纳法可以证明：

$$A^kB=\sum_{i=0}^{k}\frac{k!}{(k-i)!i!}\left[A^{(i)},B\right]A^{k-i}, \tag{15.7-67a}$$

$$BA^k=\sum_{i=0}^{k}\frac{k!}{(k-i)!i!}A^{k-i}\left[B,A^{(i)}\right]. \tag{15.7-67b}$$

此处只证明式(15.7-67b)，另一个等式的证明留给读者当练习.

当 $k=0$ 和 $k=1$ 时，有

$$BA^0=B=\left[B,A^{(0)}\right]=\frac{0!}{(0-0)!0!}A^{0-0}\left[B,A^{(0)}\right].$$

$$BA^1=BA=\frac{1!}{(1-0)!0!}A^{1-0}\left[B,A^{(0)}\right]+\frac{1!}{(1-1)!1!}A^{1-1}\left[B,A^{(1)}\right].$$

故式(15.7-67b)对 $k=0$、$k=1$ 成立. 假设 $k=n$ 时式(15.7-67b)成立，则

$$\begin{aligned}
BA^{n+1}=&\sum_{i=0}^{n}\frac{n!}{(n-i)!i!}A^{n-i}\left[B,A^{(i)}\right]A\\
=&\sum_{i=0}^{n}\frac{n!}{(n-i)!i!}A^{n-i}\left(A\left[B,A^{(i)}\right]+\left[B,A^{(i+1)}\right]\right)\\
=&\sum_{i=0}^{n}\frac{n!}{(n-i)!i!}A^{n+1-i}\left[B,A^{(i)}\right]+\sum_{j=1}^{n+1}\frac{n!}{(n-j+1)!(j-1)!}A^{n-j+1}\left[B,A^{(j)}\right]\\
=&\frac{n!}{(n-0)!0!}A^{n+1}\left[B,A^{(0)}\right]\\
&+\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{n!}{(n-i)!i!}+\frac{n!}{(n-i+1)!(i-1)!}\right]A^{n+1-i}\left[B,A^{(i)}\right]\\
&+\frac{n!}{[n-(n+1)+1]![(n+1)-1]!}A^{n-(n+1)+1}\left[B,A^{(n+1)}\right]\\
=&A^{n+1}\left[B,A^{(0)}\right]+\sum_{i=1}^{n}\frac{(n+1)!}{(n-i+1)!i!}A^{n+1-i}\left[B,A^{(i)}\right]+A^0\left[B,A^{(n+1)}\right]\\
=&\sum_{i=0}^{n+1}\frac{(n+1)!}{[(n+1)-i]!i!}A^{(n+1)-i}\left[B,A^{(i)}\right].
\end{aligned}$$

即 $k=n+1$ 时式(15.7-67b)也成立．于是，式(15.7-67b)对任意非负整数 k 成立．若规定负整数的阶乘为正无穷大，则式(15.7-67)右边的级数化成无穷级数：

$$A^kB=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{k!}{(k-i)!i!}\left[A^{(i)},B\right]A^{k-i}, \tag{15.7-68a}$$

$$BA^k=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{k!}{(k-i)!i!}A^{k-i}\left[B,A^{(i)}\right]. \tag{15.7-68b}$$

至此，完成了第一步的证明．下面利用式(15.7-68)完成第二步的证明．

$$\begin{aligned}e^{-A}Be^{A}&=e^{-A}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}BA^k=e^{-A}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\sum_{i=0}^{\infty}\frac{k!}{(k-i)!i!}A^{k-i}\left[B,A^{(i)}\right]\\&=e^{-A}\sum_{i=0}^{\infty}\frac{1}{i!}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(k-i)!}A^{k-i}\left[B,A^{(i)}\right]=e^{-A}\sum_{i=0}^{\infty}\frac{1}{i!}e^{A}\left[B,A^{(i)}\right].\end{aligned}$$

上式最后一步中的指数 e^A、e^{-A} 相消后，便完成了公式(15.7-64)之一的证明；另一式子的证明留给读者当练习． ■

我们顺带着介绍两个常用公式．利用式(15.7-64)可以证明[76]§2-2如下公式：

$$e^{A+B}=e^Ae^Be^{-\frac{1}{2}[A,B]}e^{\frac{1}{6}[A^{(2)},B]-\frac{1}{3}[A,B^{(2)}]}\cdots \tag{15.7-69a}$$

$$e^{B+A}=e^Be^Ae^{-\frac{1}{2}[B,A]}e^{\frac{1}{6}[B^{(2)},A]-\frac{1}{3}[B,A^{(2)}]}\cdots \tag{15.7-69b}$$

注意 $e^{A+B}\equiv e^{B+A}$．当 $[A,B]=c\mathbb{1}$（c 为常数，$\mathbb{1}$ 为单位算符）时，由上式得

$$e^Ae^B=e^Be^Ae^{c\mathbb{1}}. \tag{15.7-70}$$

练习 15-6 试计算公式(15.7-43)．

练习 15-7 试计算公式(15.7-45)．验证 $S^{\mu}{}_{\nu}(E,0,0,p)^T=(E,0,0,p)^T$．

小结

本章只是描述了 $SU(2)$、$SL(2,\mathbb{C})$ 群及其李代数的初级内容；更多内容可参考[5, 60, 87]相应章节或类似书籍．更多旋量知识可参考[49]．

第十六章　Hilbert 空间简引

量子引力中会用到 Hilbert 空间，故予以简单概述.
请先了解第二、三、十二章知识，本章内容与其它章节几乎无关.

16.1　赋范空间

定义 16.1 数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 X 的**范数**$\|\cdot\|$ 是一个非负值函数：$X\to\mathbb{R}$ 满足 **(1)** $\|x\|\geqslant 0$ $(\forall x\in X)$；**(2)** $\|x\|=0\iff x=\mathbf{0}$；**(3)** $\|x+y\|\leqslant\|x\|+\|y\|$ $(\forall x,y\in X)$；**(4)** $\|\alpha x\|=|\alpha|\cdot\|x\|$ $(\forall\alpha\in\mathbb{F},\ \forall x\in X)$.

线性空间 X 上的范数在 X 上可诱导出度量 d：

$$d(x,y)=\|x-y\|,\qquad \forall x,y\in X. \tag{16.1-1}$$

线性空间有了度量后，便可诱导出拓扑，从而成为**拓扑线性空间**. 需要指出的是：线性空间上的任意度量不一定都可由范数诱导得到.

定义 16.2 定义了范数的线性空间称为**赋范线性空间**，简称**赋范空间**. 完备的（度量为式(16.1-1)）赋范线性空间叫作 **Banach 空间**.

完备性定义见2.78. 可见，Banach 空间是度量空间.

例 16.3 若指定 $\mathbb{C}^m$ 上度量为(12.2-11)式（$\langle x,y\rangle=\sum_{i=1}^m\bar{x}^iy^i$），则由此式可诱导出线性空间 $\mathbb{C}^m$ 上的范数为：

$$\|x\|=\sqrt{\sum\nolimits_{i=1}^m|x^i|^2}=\sqrt{|x^1|^2+\cdots+|x^m|^2}. \tag{16.1-2}$$

由此可知 $\mathbb{C}^m$ 是 Banach 空间.

例 16.4 仿照例3.10，可看到 l^p 空间是无穷维线性空间. 将 l^p 空间的范数定义为 $\|\xi\|=(\sum_{i=1}^\infty|\xi_i|^p)^{1/p}$. 由例2.85可证此空间是完备的，故 l^p 是 Banach 空间.

命题 16.5 赋范线性空间中的范数是连续映射.

证明 . 设有赋范空间 $(X,\|\cdot\|)$. 根据范数定义中的条件 (3)、(4)，有

$$\|y\| = \|y-x+x\| \leqslant \|y-x\| + \|x\|,$$
$$\|x\| = \|x-y+y\| \leqslant \|y-x\| + \|y\|.$$

由此可得：$\|y\| - \|x\| \leqslant \|y-x\|$、$\|y\| - \|x\| \geqslant -\|y-x\|$. 进而得到

$$\big|\|y\| - \|x\|\big| \leqslant \|y-x\|. \tag{16.1-3}$$

上式意味着范数是从 $(X,\|\cdot\|)$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续映射（定义见2.50）. ■

定理 16.6 若 $(X,\|\cdot\|)$ 是赋范空间，则一定存在 Banach 空间 $\hat{X}$ 和 X 到 $\hat{X}$ 的稠密子空间 $\widehat{W}$ 上的等距映射 ϕ. 若不区分等距空间，则空间 $\hat{X}$ 是唯一的.

证明 . 可参见[29]§2.3-2；或类似文献. ■

定义 16.7 对于线性空间 X 上的范数 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$，如果存在正实数 a、b 使得 $\forall x\in X$ 都有 $a\|x\|_1 \leqslant \|x\|_2 \leqslant b\|x\|_1$ 成立；则称 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ **等价**.

定理 16.8 在有限维线性空间 X 上，任意两种范数 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是等价的.

证明 . 可参见[92]定理 1.4.18；或类似文献. 本定理对无穷维空间不正确. ■

命题 16.9 任意有限维赋范空间必是 Banach 空间.（证明见[92]推论 1.4.19）

由定理16.8可知：**(1)** X 上序列的收敛与发散与具体选用的范数无关. **(2)** 由等价范数诱导得到 X 上的拓扑是同胚的（例如参见定理2.47）.

赋范空间上的线性算符是初等代数中线性变换概念的推广.

定义 16.10 赋范空间上的**线性算符**（或**线性算子**）T 需满足下述性质：**(1)** T 的定义域 $\mathscr{D}(T)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，T 的值域 $\mathscr{R}(T)$ 落在同一个数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间中；**(2)** $\forall x,y\in\mathscr{D}(T)$ 和 $\alpha\in\mathbb{F}$ 有 $T(\alpha x+y)=\alpha(Tx)+Ty$.

注 16.11 在赋范空间中，算符 T 的定义域 $\mathscr{D}(T)$ 是极其重要的.

若赋范空间 X 上的算符 T_1 和 T_2 有相同的定义域 $\mathscr{D}(T_1)=\mathscr{D}(T_2)\subset X$，且 $\forall x\in\mathscr{D}(T_1)=\mathscr{D}(T_2)$ 有 $T_1x=T_2x$，则称 T_1 和 T_2 是**相等的**，记为 $T_1=T_2$.

虽然 T_1 和 T_2 都是 X 上的算符，若它们的定义域不同，即便有 $T_1x=T_2x$，其中 $x\in\mathscr{D}(T_1)\cap\mathscr{D}(T_2)$；我们也不认为在 X 上 $T_1=T_2$.

算符 $T:\mathscr{D}(T)\longrightarrow Y$ 在 $\mathscr{D}(T)$ 的子集 B 上的**限制**记为 $T|_B$. 它是一个算符，定义为 $T|_B:B\longrightarrow Y,\forall x\in B$ 有 $T|_Bx=Tx$.

与限制相反，可定义延拓. 算符 T 到集合 $M\supset\mathscr{D}(T)$ 的**延拓**（或**扩张**）是一个算符：定义为 $\tilde{T}:M\longrightarrow Y$ 使得 $\tilde{T}|_{\mathscr{D}(T)}=T$；也就是说，$\forall x\in\mathscr{D}(T)$ 有 $\tilde{T}x=Tx$. 很显然，T 是 $\tilde{T}$ 在 $\mathscr{D}(T)$ 上的限制.

定义 16.12 设 X 和 Y 是赋范空间，$T:\mathscr{D}(T)\longrightarrow Y$ 是线性算符，其中 $\mathscr{D}(T)\subset X$. 若存在正的实常数 c 使得 $\forall x\in\mathscr{D}(T)$ 有 $\|Tx\|_Y\leqslant c\|x\|_X$，则称算符 T 是**有界的**，否则是**无界的**. 我们还可以给算符 T 定义一个范数：$\|T\|=\sup\frac{\|Tx\|}{\|x\|}$，其中 sup 指上确界，非零矢量 x 需要遍历整个定义域 $\mathscr{D}(T)$.

命题 16.13 若 T 是 $\mathscr{D}(T)\subset X$ 中的线性算符，则 T 是连续算符等价于 T 是有界算符.（本命题对赋范空间 X 的维数没有限定. 证明可见[92]命题 2.1.11）

命题 16.14 有限维赋范空间上的线性算符必有界.（证明见[92]命题 2.1.14）

我们将定义3.15中给出的线性泛函的定义略作推广. 即**线性泛函**f 是定义域落在赋范空间 X 中、值域落在 X 的基域 $\mathbb{F}$ 中的线性算符. 如果对于任意 $x\in\mathscr{D}(f)$，存在实常数 c 使得 $|f(x)|\leqslant c\|x\|$，则称 f 是**有界线性泛函**.

16.2 Hilbert 空间

定义了内积的线性空间称为**内积空间**，比如实数域上的欧几里得空间（见定义3.2），复数域上的酉空间（见定义12.6）.

定义 16.15 完备的内积空间称为 Hilbert 空间，记为 $\mathcal{H}$.

不难看出：内积空间是赋范空间，Hilbert 空间是 Banach 空间.

由命题16.9可知：有限维内积空间必是 Hilbert 空间.

本章余下内容主要讨论量子物理关心的复 Hilbert 空间.

定义 16.16 设内积空间 X 的内积为 $\langle x,y\rangle$（此处指酉空间的酉积12.6），其中 $x,y\in X$；则自然地定义 X 的范数为 $\|x\|\equiv\sqrt{\langle x,x\rangle}$.

命题 16.17 设有赋范空间 $(X,\|\cdot\|)$；在 X 上可以引入一个内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 的充分必要条件是：范数 $\|\cdot\|$ 满足如下**平行四边形等式**：

$$\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2\left(\|x\|^2+\|y\|^2\right). \tag{16.2-1}$$

证明 . “⇒”. 直接计算，有

$$\begin{aligned}&\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=\langle x+y,x+y\rangle+\langle x-y,x-y\rangle\\=&\langle x,x\rangle+\langle x,y\rangle+\langle y,x\rangle+\langle y,y\rangle+\langle x,x\rangle-\langle x,y\rangle-\langle y,x\rangle+\langle y,y\rangle.\end{aligned}$$

消去相应项，便得到命题中的公式.

“⇐”. 命

$$\langle y,x\rangle=\begin{cases}\frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2\right), & \text{当 } \mathbb{F}=\mathbb{R},\\ \frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2+\mathrm{i}\|x+\mathrm{i}y\|^2-\mathrm{i}\|x-\mathrm{i}y\|^2\right), & \text{当 } \mathbb{F}=\mathbb{C}.\end{cases}$$

经过较为繁琐的计算可以验证它是一个内积（略），且满足定义16.16. ■

16.2.1 完备化

例 16.18 当 $p\neq 2$ 时，序列空间 l^p 不是内积空间，更不是 Hilbert 空间.

用命题16.17中的公式(16.2-1)即可证明. 我们取 $x=(1,1,0,0,\cdots)\in l^p$、$y=(1,-1,0,0,\cdots)\in l^p$，可以算出

$$\|x\|=\|y\|=2^{1/p},\qquad \|x+y\|=2=\|x-y\|.$$

显然，若 $p\neq 2$，则上式不满足式(16.2-1)，故不是内积空间. 我们已知 l^p 是 Banach 空间（见例16.4），但不是 Hilbert 空间（$p\neq 2$）. ■

例 16.19 Hilbert 空间 l^2.

将序列空间 l^2 的内积定义为：$\langle\xi,\eta\rangle=\sum_{i=1}^{\infty}\bar{\xi}_i\eta_i$. 由 Cauchy–Schwarz 不等式（参见式(2.5-3)）可证此内积中的级数收敛. 由此内积诱导得到范数为：

$$\|\xi\|=\langle\xi,\xi\rangle^{1/2}=\left(\sum_{i=1}^{\infty}|\xi_i|^2\right)^{1/2}. \tag{16.2-2}$$

此范数的完备性参见例16.4. 故 l^2 是 Hilbert 空间. ■

例 16.20 无穷维、连续复值函数空间 $C[a,b]$.

参见例题3.10. 其内积定义为：

$$\langle x,y\rangle=\int_a^b\overline{x(t)}y(t)\mathrm{d}t;\qquad \forall x,y\in C[a,b]. \tag{16.2-3}$$

由注解2.81中的参考文献可知：$C[a,b]$ 在上述内积下是不完备的. 粗略地说，连续函数的无穷序列可能收敛于间断函数，间断函数自然不属于 $C[a,b]$. ■

例 16.21 无穷维、连续复值函数空间 $L^2[a,b]$（Lebesgue 空间）.

$L^2[a,b]$ 是指平方可积的复函数集，即其内积为：

$$\langle x,y\rangle=\int_a^b\overline{x(t)}y(t)\mathrm{d}t<+\infty;\qquad\forall x,y\in L^2[a,b]. \tag{16.2-4}$$

可以证明[92]例 1.4.11：$L^2[a,b]$ 空间的上述内积(16.2-4)是完备的；因此它是 Banach 空间，也是 Hilbert 空间.

量子物理中常见的 Bessel、Legendre、Laguerre 等多项式（以及很多其它特殊函数）在适当的区间上都是（加权）平方可积的. ■

上面两个例子表明：可将不完备的 $C[a,b]$ 延拓为完备的 $L^2[a,b]$. 与度量空间（见定理2.84）、赋范空间（见定理16.6）类似，Hilbert 空间也有如下定理：

定理 16.22 对于任意内积空间 X，存在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 和 X 到 $\mathcal{H}$ 的稠密子空间 $\mathcal{W}$ 上的等距同构 ϕ. 若不区分同构空间，则空间 $\mathcal{H}$ 是唯一的.

证明 . 可参见[29]定理 3.2-3；或类似文献. ■

例 16.23 n 维 $L^2(\mathbb{R}^n)$（Lebesgue 空间）.

函数空间 $L^2[a,b]$ 自然可以推广到 n 维 Hilbert 空间 $L^2(\mathbb{R}^n)$：

$$L^2(\mathbb{R}^n)\equiv\left\{f(t,x)\mid\int_{-\infty}^{\infty}\overline{f(t,x)}f(t,x)\mathrm{d}^nx<+\infty\right\}. \tag{16.2-5}$$

上式中 t 为实参数；完备性证明参见[92]例 1.4.11. **大多数情形下，量子物理中的 Hilbert 空间就是指上述的 $L^2(\mathbb{R}^3)$，参数 t 一般理解成时间.** ■

16.2.2 连续对偶空间

有限维线性空间（包括有限维 Hilbert 空间）的对偶空间相关知识已在 §3.3中陈述. 无穷维赋范空间的对偶空间要复杂许多；要区分代数对偶（即 §3.3中的定义）和连续对偶；完备或不完备的赋范空间 X 的连续对偶空间 X' 一定是完备的赋范空间（证明见[29]定理 2.10-4），而且 X、X' 两者间可能没有双射关系（不严谨地说 X' 比 X 大）；等等. 这些内容可参考[29]§2.10、§4.6；不再赘述.

完备的内积空间（Hilbert 空间）则要简单的多.

定义 16.24 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的连续对偶空间 $\mathcal{H}'$ 为 $\mathcal{H}$ 上的所有连续线性泛函.

$\mathcal{H}'$ 中元素的加法和数乘定义与式(3.3-1)相同，这样 $\mathcal{H}'$ 也是一个线性空间（通常是无穷维）. 依照命题16.13，上述定义中的连续与有界同义. 由于无穷维 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的代数对偶空间 $\mathcal{H}^*$ 过于复杂（比如包含不连续泛函），故不再赘述；本章中通常将连续对偶空间简称为对偶空间，代数对偶则不简称.

在有限维空间中（参见定理3.40），由 V 上非退化双线性函数 $f(\alpha,\beta)$ 诱导得到代数对偶空间 V^* 中的一个元素 α^*：$\alpha^*(\beta) \overset{def}{=} f(\alpha,\beta),\ \forall\beta\in V$.

对于有限维或无穷维 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 也有类似操作. 对于任意但固定的 $y\in\mathcal{H}$，由 $\mathcal{H}$ 上酉内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 可诱导出一个连续线性泛函 $y'\in\mathcal{H}'$：

$$y'(x) \overset{def}{=} \langle y,x\rangle, \qquad \forall x\in\mathcal{H}. \tag{16.2-6}$$

酉内积可以保证此映射（$\mathcal{H}\ni y\to y'\in\mathcal{H}'$）是单一连续的，但无法保证它是满的，即 $\mathcal{H}'$ 的元素可能没有原像. 实际上 $\mathcal{H}$ 和 $\mathcal{H}'$ 间的映射是双射（即既单又满），为此我们先叙述 **Riesz 表示定理**（Riesz representation theorem）：

定理 16.25 设 y' 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的一个连续线性泛函，即 $y'\in\mathcal{H}'$；那么必然存在唯一的 $y\in\mathcal{H}$，使得 $y'(x)=\langle y,x\rangle,\ \forall x\in\mathcal{H}$ 成立.

证明 . 证明可参见[92]定理 2.2.1；或类似文献. ■

需注意式(16.2-6)中的内积对第一个位置是共轭线性的，对第二个位置是线性的. Riesz 表示定理说明映射（$\mathcal{H}\ni y\longleftrightarrow y'\in\mathcal{H}'$）是满射，进而也是双射. 我们可以利用这个双射关系，给 $\mathcal{H}'$ 空间元素引入内积定义：

$$\langle y',x'\rangle_{\mathcal{H}'} \overset{def}{=} \langle x,y\rangle_{\mathcal{H}}, \qquad \forall y',x'\in\mathcal{H}'. \tag{16.2-7}$$

至此，我们在 $\mathcal{H}$、$\mathcal{H}'$ 之间建立了线性等距同构映射. 确切地说，对于实数域是等距同构；对于复数域是等距反同构（或等距共轭同构）. 连续对偶空间 $\mathcal{H}'$ 有了内积（自然是完备的）之后便成为了 Hilbert 空间.

16.2.3 正交集

定义 16.26 内积空间 X 上的两个元素 x 与 y 称为是**正交的**是指 $\langle x,y\rangle=0$，记作 $x\perp y$. 又设 M 是 X 的非空子集，$x\in X$. 若 $\forall y\in M$ 都有 $x\perp y$，则称 x 与 M **正交**，记作 $x\perp M$. 称集合 $\{x\in X\mid x\perp M\}$ 为 M 的**正交补**，记作 $M^{\perp}$.

定义 16.27 设 X 是一个内积空间，集合 $S \equiv \{e_\alpha \mid \alpha \in I\}$ 是 X 的一个子集. 若 $\forall \alpha, \beta \in I$，当 $\alpha \neq \beta$ 时，有 $e_\alpha \perp e_\beta$，则称 S 为**正交集**. 若有 $\|e_\alpha\| = 1 (\forall \alpha \in I)$，则称 S 为**正交规范集**. 又如果在 X 中不存在非零元素与 S 正交，即 $S^\perp = \{0\}$，那么称 S 为**完全的**；若同时 S 还是正交集，则称 S 为**完全正交规范集**.

注 16.28 在大多数文献中把上面定义中的**完全**（total）称作**完备**（complete）；由于我们在定义2.78中已占用**完备**这个术语，故在此换一个词儿.

定义 16.29 内积空间 X 中的正交规范集 $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in I\}$，称为一个**基**（或**封闭的**）是指 $\forall x \in X$ 有表达式 $x = \sum_{\alpha \in I} \langle x, e_\alpha \rangle e_\alpha$ 成立. 我们称 $\{\langle x, e_\alpha \rangle \mid \alpha \in I\}$ 为 x 关于基 $\{e_\alpha \mid \alpha \in I\}$ 的 **Fourier 系数**.

注 16.30 我们略微解释一下上面定义中的指标集 I. 当 X 是有限集合时，I 是正整数集合的一个有限子集. 当 X 是可数无限集时，I 是正整数集合. 当 X 是不可数无限集时，I 是某个连续的不可数标记，比如时空坐标.

定理 16.31 Hilbert 空间 $\mathcal{H} \neq \{0\}$ 中必存在完全正交规范集.

证明 . 参见[29]定理 4.1-8；或[92]命题 1.6.21. ■

定理 16.32 设 $\mathcal{H}$ 是一个 Hilbert 空间，其正交规范集 $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in I\}$ 是完全的充分必要条件为下述 **Parseval 等式**成立：

$$\|x\|^2 = \sum_{\alpha \in I} |\langle x, e_\alpha \rangle|^2 = \sum_{\alpha \in I} \langle x, e_\alpha \rangle \langle e_\alpha, x \rangle; \qquad \forall x \in \mathcal{H}. \tag{16.2-8}$$

证明 . 参见[29]定理 3.6-3；或[92]命题 1.6.25. ■

定理 16.33 设有 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$. 那么 **(1)** 若 $\mathcal{H}$ 是可分的，则 $\mathcal{H}$ 中的每一个规范正交集都是可数的. **(2)** 若 $\mathcal{H}$ 包含完全规范正交序列，则 $\mathcal{H}$ 是可分的.

证明 . 参见[29]定理 3.6-4. ■

16.2.4 Hilbert 空间上的有界线性算符

定义 16.34 设 $\mathcal{H}$ 和 $\mathcal{K}$ 是 Hilbert 空间，$T : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{K}$ 是有界线性算符，则使得对于所有 $x \in \mathcal{H}$ 和 $y \in \mathcal{K}$ 满足

$$\langle Tx, y \rangle_{\mathcal{K}} = \left\langle x, T^\dagger y \right\rangle_{\mathcal{H}}, \qquad T^\dagger : \mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{H} \tag{16.2-9}$$

的算符 $T^\dagger$ 叫作 T 的 **Hilbert 伴随算符**.（可以证明 $T^\dagger$ 是存在的.）

定理 16.35 设 $\mathcal{H}$ 和 $\mathcal{K}$ 是 Hilbert 空间，$S:\mathcal{H}\longrightarrow\mathcal{K}$ 和 $T:\mathcal{H}\longrightarrow\mathcal{K}$ 是有界线性算符，$\alpha\in\mathbb{C}$，则（下式及证明过程中 $x\in\mathcal{H}$、$y\in\mathcal{K}$）

$$\left\langle T^{\dagger}y,x\right\rangle=\langle y,Tx\rangle, \tag{16.2-10a}$$

$$(S+T)^{\dagger}=S^{\dagger}+T^{\dagger}, \tag{16.2-10b}$$

$$(\alpha T)^{\dagger}=\bar{\alpha}T^{\dagger}, \tag{16.2-10c}$$

$$(T^{\dagger})^{\dagger}=T, \tag{16.2-10d}$$

$$(ST)^{\dagger}=T^{\dagger}S^{\dagger},\qquad \text{假设 } \mathcal{K}=\mathcal{H}. \tag{16.2-10e}$$

证明 . **(a)** 从式(16.2-9)可得：$\left\langle T^{\dagger}y,x\right\rangle=\overline{\langle x,T^{\dagger}y\rangle}=\overline{\langle Tx,y\rangle}=\langle y,Tx\rangle$.

(b) 根据式(16.2-9)，对于所有 x,y 有

$$\begin{aligned}\left\langle x,(S+T)^{\dagger}y\right\rangle&=\langle(S+T)x,y\rangle=\langle Sx,y\rangle+\langle Tx,y\rangle\\&=\left\langle x,S^{\dagger}y\right\rangle+\left\langle x,T^{\dagger}y\right\rangle=\left\langle x,\left(S^{\dagger}+T^{\dagger}\right)y\right\rangle.\end{aligned}$$

因 x、y 的任意性便可证明此公式.

(c) 注意不要把式(16.2-10c)和公式 $T^{\dagger}(\alpha x)=\alpha T^{\dagger}x$ 混淆. 我们有

$$\left\langle y,(\alpha T)^{\dagger}x\right\rangle=\langle(\alpha T)y,x\rangle=\langle\alpha(Ty),x\rangle=\bar{\alpha}\langle Ty,x\rangle=\bar{\alpha}\left\langle y,T^{\dagger}x\right\rangle=\left\langle y,\bar{\alpha}T^{\dagger}x\right\rangle.$$

因 x、y 的任意性便可证明此公式.

(d) 由式(16.2-9)可知对于所有 $x\in\mathcal{H}$ 和 $y\in\mathcal{K}$ 有

$$\left\langle(T^{\dagger})^{\dagger}x,y\right\rangle=\left\langle x,T^{\dagger}y\right\rangle=\langle Tx,y\rangle.$$

因 x、y 的任意性便可证明此公式.

(e) 反复应用式(16.2-9)便有

$$\left\langle x,(ST)^{\dagger}y\right\rangle=\langle(ST)x,y\rangle=\left\langle Tx,S^{\dagger}y\right\rangle=\left\langle x,T^{\dagger}S^{\dagger}y\right\rangle.$$

因 x、y 的任意性便可证明此公式. ■

我们借用 Hilbert 伴随算符来定义一些常用算符. 下面几个定义中算符 T 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$（有限维或无穷维）上的有界线性算符 $T:\mathcal{H}\longrightarrow\mathcal{H}$.

定义 16.36 若 $T^{\dagger}=T$，则称 T 是**自伴算符**或**厄米算符**.

定义 16.37 若 T 是双射且 $T^\dagger = T^{-1}$，则称 T 是**酉算符**.

定理 16.38 设 T 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的有界线性算符，则 **(1)** 若 T 是自伴的，则 $\forall x \in \mathcal{H}$ 有 $\langle Tx, x\rangle$ 是实数. **(2)** $\forall x \in \mathcal{H}$ 有 $\langle Tx, x\rangle$ 是实数，则 T 是自伴的.

证明 . **(1)** 若 T 是自伴算符，则对于所有 $x \in \mathcal{H}$ 有 $\overline{\langle Tx, x\rangle} = \langle x, Tx\rangle = \langle T^\dagger x, x\rangle = \langle Tx, x\rangle$. 因此 $\langle Tx, x\rangle$ 等于其复共轭，所以它是实数.

(2) 若对于所有 $x \in \mathcal{H}$ 有 $\langle Tx, x\rangle$ 是实数，则

$$\begin{aligned} & \langle Tx, x\rangle = \overline{\langle Tx, x\rangle} = \overline{\langle x, T^\dagger x\rangle} = \left\langle T^\dagger x, x\right\rangle \\ \Rightarrow \quad & 0 = \langle Tx, x\rangle - \left\langle T^\dagger x, x\right\rangle = \left\langle \left(T - T^\dagger\right) x, x\right\rangle . \end{aligned}$$

因为 $\mathcal{H}$ 是复线性空间，再由 x 的任意性可得 $T - T^\dagger = 0$. ■

定理 16.39 如果线性算符 T 定义在整个复 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上，并且 $\forall x, y \in \mathcal{H}$ 满足 $\langle Tx, y\rangle = \langle x, Ty\rangle$，则 T 是有界线性算符.

证明 . 此定理称为 **Hellinger–Toeplitz 定理**，证明可见[29]定理 10.1-1. 该定理表明，满足 $\langle Tx, y\rangle = \langle x, Ty\rangle$ 的无界线性算符 T 不能定义在整个 $\mathcal{H}$ 上. ■

16.2.5 Hilbert 空间上的无界线性算符

定义16.34只适用于有界线性算符. 为了定义无界线性算符，我们先引入：

定义 16.40 线性算符 T 是**稠定的**是指 $\mathscr{D}(T)$ 在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中是稠密的.

定义 16.41 设 $T : \mathscr{D}(T) \to \mathcal{H}$ 是复 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中（可能无界的）稠定线性算符，则 T 的 Hilbert 伴随算符 $T^\dagger : \mathscr{D}\left(T^\dagger\right) \to \mathcal{H}$ 定义为：$T^\dagger$ 的定义域 $\mathscr{D}\left(T^\dagger\right)$ 由所有这样的 $y \in \mathcal{H}$ 构成，即对于这个 y 存在 $y^\dagger \in \mathcal{H}$，$\forall x \in \mathscr{D}(T)$ 满足

$$\langle Tx, y\rangle = \left\langle x, y^\dagger\right\rangle . \tag{16.2-11}$$

对于每个这样的 $y \in \mathscr{D}\left(T^\dagger\right)$，通过

$$y^\dagger = T^\dagger y \tag{16.2-12}$$

来定义 Hilbert 伴随算符 $T^\dagger$. 算符 T 的稠定属性可保 $T^\dagger$ 的唯一性.

Hilbert 空间上无界伴随算符的定义之所以需要分两步走，根本原因在于无界算符并非定义在整个空间上，其定义域通常只是一个稠密的真子空间. 这导致我们不能像有界算符那样，简单地通过内积等式来直接定义伴随算符. 第一步定义伴随算符的定义域；它通过有界性条件，从整个空间中挑选出那些能够与 T 良好“互动”的矢量，构成伴随算符的合法定义域 $\mathscr{D}(T^\dagger)$. 第二步定义伴随算符的映射法则，为 $\mathscr{D}(T^\dagger)$ 中的每个矢量唯一地指定了它在伴随算符下的像 $T^\dagger y$.

定义 16.42 设 $T:\mathscr{D}(T)\to\mathcal{H}$ 是在复 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中稠定线性算符. 如果对于所有 $x,y\in\mathscr{D}(T)$ 有 $\langle Tx,y\rangle=\langle x,Ty\rangle$，则称 T 是**对称算符**或**厄米算符**.

根据定理16.39，无界对称线性算符 T 不可能有 $\mathscr{D}(T)=\mathcal{H}$，从而面临着确定适当的定义域和进行延拓的问题. T 是 S 的一个延拓定义为（见 §16.1）：

$$\mathscr{D}(S)\subset\mathscr{D}(T),\quad \text{且}\quad S=T|_{\mathscr{D}(S)}. \tag{16.2-13}$$

我们将其简记为 $S\subset T$.

命题 16.43 在复 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中，T 是对称算符的充要条件是 $T\subset T^\dagger$.

证明 . $T^\dagger$ 所定义的关系是对于所有 $x\in\mathscr{D}(T)$ 和所有 $y\in\mathscr{D}\left(T^\dagger\right)$ 有

$$\langle Tx,y\rangle=\left\langle x,T^\dagger y\right\rangle. \tag{16.2-14}$$

假定 $T\subset T^\dagger$，则对于 $y\in\mathscr{D}(T)$ 有 $T^\dagger y=Ty$，故对于 $x,y\in\mathscr{D}(T)$，上式变成

$$\langle Tx,y\rangle=\langle x,Ty\rangle. \tag{16.2-15}$$

因此 T 是对称算符.

反之，假定对于所有 $x,y\in\mathscr{D}(T)$ 有 $\langle Tx,y\rangle=\langle x,Ty\rangle$ 成立. 通过对比式(16.2-14)和(16.2-15)可得 $\mathscr{D}(T)\subset\mathscr{D}\left(T^\dagger\right)$ 且 $T=T^\dagger\big|_{\mathscr{D}(T)}$. 根据定义，这意味着 $T^\dagger$ 是 T 的延拓. ■

定义 16.44 设 $T:\mathscr{D}(T)\to\mathcal{H}$ 是复 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中稠定的线性算符. 若 $T=T^\dagger$（等价于 $T\subset T^\dagger$ 且 $T^\dagger\subset T$），则称 T 是**自伴线性算符**.

由定义可以看出在无界线性算符中，自伴属性强于厄米属性. 在量子物理中能充当物理量的算符必须是自伴的，不能只是厄米. 比如位置算符 X，动量算符 $P=-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial x}$，哈密顿算符 H，等等；这些线性算符都是无界的、自伴的（注意不只是厄米的）. 具体证明可参考[29]第十、十一章，或类似文献.

其实，写到这里才真正进入量子力学的数学基础. 要进一步阐述相关内容则需要 Hilbert 空间谱理论，这超出了这份“简引”范畴，故就此打住.

16.3 Hilbert 空间在量子力学中的几例应用

16.3.1 Hilbert 空间的 Dirac 记号表示

现在补全例3.60中遗漏的部分. 我们将 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中的元素记为 $\{|\phi\rangle\}$，称作 Dirac 右矢空间；将 $\mathcal{H}$ 的连续对偶空间 $\mathcal{H}'$ 中的元素记为 $\{\langle\psi|\}$（撇号省略不写），称作 Dirac 左矢空间；两者相互对偶. 借用 Riesz 表示定理，我们把 Dirac 符号下的配合$\langle\psi|\phi\rangle_{\text{Dirac}}$ 转换为 $\mathcal{H}$ 中两个右矢（$|\phi\rangle$、$|\psi\rangle$）间的内积：

$$\langle\psi|\phi\rangle_{\text{Dirac}} \equiv \langle|\psi\rangle,\ |\phi\rangle\rangle_{\mathcal{H}} \equiv \langle\psi,\phi\rangle_{\mathcal{H}}. \tag{16.3-1}$$

在上述公式中，相当于借用 Riesz 表示定理将 $\mathcal{H}'$ 中的左矢 $\{\langle\psi|\}$ 诱导成 $\mathcal{H}$ 中的右矢 $\{|\psi\rangle\}$，然后再进行内积操作. 与此类似，我们所定义的算符也只作用在 $\mathcal{H}$ 中的元素，不会作用在 $\mathcal{H}'$ 中的元素，比如

$$\langle\psi|T|\phi\rangle_{\text{Dirac}} = \langle\psi,T\phi\rangle_{\mathcal{H}} = \langle\psi|T\phi\rangle_{\text{Dirac}}. \tag{16.3-2}$$

$$\langle\psi|T^{\dagger}|\phi\rangle_{\text{Dirac}} = \langle\psi,T^{\dagger}\phi\rangle_{\mathcal{H}} = \langle T\psi,\phi\rangle_{\mathcal{H}} = \langle T\psi|\phi\rangle_{\text{Dirac}}. \tag{16.3-3}$$

在 Dirac 记号下，仅仅是为了数学公式外在形式的对称才将其写成 $\langle\psi|\phi\rangle_{\text{Dirac}}$，并未真正引入作用在 $\mathcal{H}'$ 中元素的线性算符.

16.3.2 量子力学基本对易关系的 Weyl 表述

我们已知量子力学基本对易关系：

$$QP - PQ = \mathrm{i}\hbar\mathbb{1}. \tag{16.3-4}$$

然而 Q、P 是无界自伴算符，故需要在 Hilbert 空间中寻找它们共同定义域（不易寻得），这多少有些不便. 不论自伴算符 X 是有界还是无界，泛函分析中可以证明算符 $\exp(\mathrm{i}X)$ 是有界的（略）；而有界算符的定义域一定可以延拓至整个 Hilbert 空间，所以使用有界算符 $\exp(\mathrm{i}X)$ 描述基本对易关系更加便宜. 我们参

考式(15.7-70)（$e^Ae^B=e^Be^Ae^{c\mathbb{1}}$），令 $A=\mathbb{i}\alpha Q$、$B=\mathbb{i}\beta P$（其中 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$），则 $c=-\mathbb{i}\hbar\alpha\beta$；进而可得量子力学基本对易关系的 **Weyl 表述**：

$$\exp(\mathbb{i}\alpha Q)\exp(\mathbb{i}\beta P)=\exp(-\mathbb{i}\hbar\alpha\beta\mathbb{1})\exp(\mathbb{i}\beta P)\exp(\mathbb{i}\alpha Q). \tag{16.3-5}$$

令 $\alpha\to 0$、$\beta\to 0$，将上式展开，忽略高于二阶的小量，便可得到量子力学中常用的基本对易关系 $QP-PQ=\mathbb{i}\hbar\mathbb{1}$.

小结

本章主要取自文献[29]、[92].

本章只介绍了最基本的初级知识，更详尽的内容请参考上述文献.

附录 A　Fermi–Walker 导数

此附录较多参考了文献[23]§4.1、[41]§6.5.

此附录是依附于物理的数学知识，对相对论很重要；故将其放在这里讲述.

研究刚体运动是十分必要的，地球就可以近似看成刚体，我们生活在这个刚体的表面上. 在牛顿运动学中，质点需要用速度来描述；刚体除了速度之外，还必须引入角速度来描述. Fermi–Walker 导数是为了研究如何在四维闵氏时空 (M,g) 中定义无自转角速度标架场而引入的；转动自然属于刚体的性质，为此先复习经典力学中的刚体运动学.

A.1　牛顿力学中的刚体运动

先回顾一下三维经典力学中的刚体理论，可参阅文献[93]Ch. 3.

(1) 角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 是用于描述刚体的物理量，它是轴矢量（或赝矢量）；质点没有角速度或角动量的概念[1]. 角速度是描述整个刚体运动的一个物理量，不存在刚体上某点角速度的概念，或者说刚体上任意一点的角速度皆相同.

(2) 轴矢量性质只在坐标系左右手变化时才会体现，如果只在右手（或左手）坐标系内研究问题，轴矢量和普通矢量一样. 角速度除了用一个矢量来表示外，还可以用一个 3×3 的反对称矩阵来表示. 用矩阵表示时，没有轴矢量性质，在左右手坐标系变换时，表述具有不变性，无需额外增加负号. 刚体角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 与

[1]可能有读者会质疑此点，他会说把绕太阳旋转的地球看成质点，那地球不就有了角速度、角动量了吗？其实这种观点是认为太阳和地球间有一根无质量的刚性杆，这根作为刚体的杆自然可以有角速度；但作为质点的地球没有角速度.

3×3 反对称矩阵是一一对应的；比如 $\boldsymbol{\omega}=(\omega_x,\omega_y,\omega_z)$，那么

$$\Omega=\begin{pmatrix}0 & \omega_z & -\omega_y\\ -\omega_z & 0 & \omega_x\\ \omega_y & -\omega_x & 0\end{pmatrix}\iff \Omega_{ij}=\epsilon_{ijk}\omega_k \iff \omega_k=\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}\Omega_{ij}. \tag{A.1-1}$$

(3) 研究固连在刚体上的一个三维刚性标架（指三个非共面矢量，且大小和矢量间夹角不随时间变化），与研究刚体运动本身是等价的．通常情况下，都是研究这个刚性标架如何运动；这个刚性标架角速度自然是刚体角速度．

(4) 任意矢量 $\boldsymbol{G}$ 在两个参考系（绝对和相对）中变化率公式是（参见文献[93]§3.6第 218 页 (3.34) 式，或类似文献）：

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{G}}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{绝对}}=\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{G}}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{相对}}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{G}. \tag{A.1-2}$$

本节不考虑物体相对刚体的运动，所以等号后面的那个时间导数恒为零，即 $(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{G}}{\mathrm{d}t})_{\text{相对}}=0$；只剩下一项 $(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{G}}{\mathrm{d}t})_{\text{绝对}}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{G}$.

由于我们关心的刚体角速度，所以可忽略刚体的平动，只研究刚体的定点运动．将式(A.1-2)换成 3×3 反对称角速度矩阵形式（省略相对项）

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{G}^i}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{绝对}}=-\sum\nolimits_{j=1}^{3}\boldsymbol{\Omega}^{ij}\boldsymbol{G}^j. \tag{A.1-3}$$

(5) 就像描述质点速度 $\boldsymbol{v}$ 一样，描述刚体的角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 只有一个，它们都有三个分量，不论哪个分量发生变化都变成了另外一个状态，不再是原来的状态．刚体不存在绕 x,y,z 轴三个角速度的概念，它们是同一个角速度的三个分量（这很容易想明白，一个质点只有一个速度 $\boldsymbol{v}$，它有三个分量，但绝不能说一个质点有三个速度）．可能有的读者认为可以在角速度上叠加一个量不影响物理，比如令 $\boldsymbol{\omega}'=\boldsymbol{\omega}+\lambda\boldsymbol{G}$，则 $\boldsymbol{\omega}'\times\boldsymbol{G}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{G}+\lambda\boldsymbol{G}\times\boldsymbol{G}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{G}$，我们可以说 $\boldsymbol{\omega}'$ 和 $\boldsymbol{\omega}$ 对应同一物理状态吗？显然不可以！上面推导只针对某一个特定矢量 $\boldsymbol{G}$ 是正确的，但(A.1-2)对任意矢量都正确；同一物理问题中会处理很多物理量，除了 $\boldsymbol{G}$ 外，还处理另外多个矢量 $\boldsymbol{H}_i$；那么对于 $\boldsymbol{H}_i$ 而言，$\boldsymbol{\omega}'$ 和 $\boldsymbol{\omega}$ 便对应不同物理状态了．更不可能给每个 $\boldsymbol{H}_i$ 找个新的 $\boldsymbol{\omega}_i'$ 与之对应．[2]

[2]举个简单的例子，地球的角速度大概是每天 1 转，如果把地球角速度改成每天 10 转，或者叠加一个与现在角速度不同向的新角速度（比如方向躺在赤道面上），地球的自转肯定对应新的物理状态了．

A.2 四维时空刚体运动

现在探讨四维时空的刚体运动. 三维空间的角速度关系很难向四维空间推广[3]；而角速度的反对称矩阵表示却容易推广到四维空间.

选择固连在刚体上的一个三标架 $(e_i)^a, i=1,2,3$（类空），为了方便要求它们正交归一，即 $g_{ab}(e_i)^a(e_j)^b=\delta_{ij}$. 刚体的质心在时空中是一条指向未来的类时线 $G(\tau)$，其中 τ 是弧长参数，也就是固有时. 把这条类时线的切线切矢量 $Z^a\equiv(e_0)^a=(\partial_\tau)^a$ 当成第零坐标轴，Z^a 与其它三个标架都正交，这样便构成了一个四标架；也即是说在这个四标架场中度规 g_{ab} 分量是 $\mathrm{diag}(-1,1,1,1)$. 因三标架 $\{(e_i)^a\}$ 是固连在刚体上的，故研究 $\{(e_i)^a\}$ 的运动行为就相当于研究刚体的运动行为了.

这个四标架场是活动标架场；我们只研究刚体定点运动. 四标架场 $(e_\mu)^a$ 沿类时线 $G(\tau)$ 的变化一定可以展开成基矢场 $\{(e_\mu)^a\}$ 的一个组合

$$\nabla_{\partial_\tau}(e_\mu)^a=-\Omega^\nu{}_\mu(e_\nu)^a=-\Omega^a{}_b(e_\mu)^b;\quad \text{其中}\ \Omega^a{}_b=\Omega^\nu{}_\rho(e_\nu)^a(e^\rho)_b. \tag{A.2-1}$$

$\Omega^\nu{}_\mu$ 为展开系数. 这是容易理解的，因 $Z^c\nabla_c(e_\mu)^a$ 仍是时空 M 上的切矢量场，故它一定可以在局部标架场 $\{(e_\mu)^a\}$ 上展开. 由于考虑的是刚性正交归一标架，$g_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(-1,1,1,1)$，那么，有

$$\begin{aligned}0\equiv Z^c\nabla_c\big[g_{ab}(e_\mu)^a(e_\nu)^b\big]&=(e_\mu)_bZ^c\nabla_c\big[(e_\nu)^b\big]+(e_\nu)_aZ^c\nabla_c\big[(e_\mu)^a\big]\\&=-(e_\mu)_b\Omega^\rho{}_\nu(e_\rho)^b-(e_\nu)_a\Omega^\rho{}_\mu(e_\rho)^a=-\Omega_{\mu\nu}-\Omega_{\nu\mu}.\end{aligned} \tag{A.2-2}$$

也就是说 $\Omega_{\mu\nu}$ 关于下标反对称，其对角元全部为零；这说明其纯空间部分 $\Omega_{ij}(1\leqslant i,j\leqslant 3)$ 对应一个空间转动角速度 $\boldsymbol{\omega}$. 对比牛顿力学中（三维空间）定点运动角速度矩阵公式(A.1-3)，可以把式(A.2-1)中的 $\Omega^a{}_b$ 定义成四维空间中的**角速度矩阵**，它由三维空间的推广而来. 而且，式(A.2-1)很明显能退化到三维情形(A.1-3). 式(A.2-1)中的四维闵氏空间刚体角速度矩阵 Ω_{ab}（已用度规 g_{ab} 将指标降下）与三维空间角速度矩阵的属性大体相同；例如刚体只有一个四维角速度，它有六个独立分量（四维反对称矩阵）；……

[3]三维空间角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 不能推广到四维空间，一个直观的原因是“叉乘”只在三维空间有定义（略去七维空间不表），比如三维空间中速度是 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$，但它无法推广到四维空间. 例如设平直四维欧式空间有四个正交归一基矢 e_μ，那么前两个基矢的叉乘（$e_1\times e_2=?$）朝着哪个方向呢？e_3 还是 e_4？无法确定！

我们来看一下四维角速度矩阵 $\Omega^a{}_b$ 的分量是什么．对于第〇基矢，有

$$Z^c\nabla_c(e_0)^a = Z^c\nabla_c Z^a = A^a = -\Omega^\nu{}_0(e_\nu)^a. \tag{A.2-3}$$

其中 A^a 是刚体质心的四维加速度．由于 A^a 一定是空间矢量，那么有 $\Omega^0{}_0 = 0$ 和 $\Omega^i{}_0 = -A^i$；由此不难得到 $\Omega_{i0} = -A_i = -\Omega_{0i}$ 和 $\Omega^0{}_i = -A_i$．这说明刚体角速度的时空分量（$\Omega^0{}_i$）由该刚体质心的四加速度完全确定．对于第 i 基矢，有

$$\begin{aligned} Z^c\nabla_c(e_i)^a &= -\Omega^\nu{}_i(e_\nu)^a = -\Omega^0{}_i(e_0)^a - \Omega^j{}_i(e_j)^a = A_i Z^a - \Omega^j{}_i(e_j)^a \\ &= (A^b Z^a - A^a Z^b)(e_i)_b - \Omega^j{}_i(e_j)^a. \end{aligned} \tag{A.2-4}$$

上式最后一步利用了 Z^b 只有第零分量这一性质，即 $Z^b(e_i)_b = 0$.

结合第〇和第 i 基矢的公式，定义 **Fermi–Walker 导数**为：

$$\frac{\mathrm{D}_F f}{\mathrm{D}\tau} \overset{def}{=} \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\tau} \equiv \left(\frac{\partial}{\partial\tau}\right)^b \nabla_b f \equiv Z^b\nabla_b f, \qquad \forall f \in C^\infty\big(G(\tau)\big). \tag{A.2-5}$$

$$\frac{\mathrm{D}_F v^a}{\mathrm{D}\tau} \overset{def}{=} Z^c\nabla_c v^a + (A^a Z^b - A^b Z^a)v_b, \qquad \forall v^a \in \mathfrak{X}\big(G(\tau)\big). \tag{A.2-6}$$

上述定义可简称为 Fermi 导数．只有上述两个条件是不够的，还需要求 Fermi 导数与缩并可交换，以及满足 Leibniz 律和线性性；不再单独列出公式．注意：Fermi 导数是依赖于类时线 $G(\tau)$ 的.

很明显，如果 $G(\tau)$ 是测地线，那么 Fermi 导数就是协变导数.

下面看一下 Fermi 导数的一些性质，首先计算它对基矢的导数

$$\frac{\mathrm{D}_F Z^a}{\mathrm{D}\tau} = Z^c\nabla_c Z^a + (A^a Z^b - A^b Z^a)Z_b = 0, \tag{A.2-7}$$

$$\frac{\mathrm{D}_F (e_i)^a}{\mathrm{D}\tau} = Z^c\nabla_c(e_i)^a + (A^a Z^b - A^b Z^a)(e_i)_a = -\Omega^j{}_i(e_j)^a. \tag{A.2-8}$$

式(A.2-7)说明，四速度 Z^a 的 Fermi 导数是零，即第〇基矢沿 $G(\tau)$ 是 Fermi 移动不变的．由式(A.2-7)、(A.2-8)不难看出：Fermi 导数本质是扣除四维角速度矩阵（4×4 反对称矩阵，六个独立分量）的时时（恒零，一个非独立分量）、时空分量（三个独立分量），只保留空空分量（3×3 反对称矩阵，三个独立分量）.

仿照平行移动矢量场，我们定义

定义 A.1 若 $v^a \in \mathfrak{X}\big(G(\tau)\big)$ 满足 $\frac{\mathrm{D}_F v^a}{\mathrm{D}\tau} = 0$，则称 v^a 是沿 $G(\tau)$**Fermi 平行.**

请读者注意：刚体（或固连在其上的三标架场 $\{(e_i)^a\}$）四维角速度只有一个．前面我们已经分解出它的时空分量，这一部分是由于刚体质心四加速度引起的，一般说来不会为零．剩余纯空间部分（$\Omega^j{}_i$）描述三标架场 $\{(e_i)^a\}$ 在三维空间的自转．式(A.2-8)表明如果三标架场 $\{(e_i)^a\}$ 的 Fermi 导数为零，那么它的纯空间自转角速度矩阵 $\Omega^j{}_i=0$，即没有自转；将此陈述为如下定理：

定理 A.2 在四维闵氏时空 (M,g) 中有一刚体，此刚体质心类时世界线为 $G(\tau)$，固连在刚体上的正交归一三标架场是 $\{(e_i)^a\}$（类空）．则，刚体（即三标架场 $\{(e_i)^a\}$）无自转角速度的充要条件是它沿 $G(\tau)$Fermi 平行，即 $\frac{\mathrm{D}_F(e_i)^a}{\mathrm{D}\tau}=0$.

设有矢量场 $u^a=u^i(e_i)^a$，即它没有 $(e_0)^a\equiv Z^a$ 分量（明显有 $u^aZ_a=0$），那么借助式(A.2-8)容易得到

$$Z_a\frac{\mathrm{D}_Fu^a}{\mathrm{D}\tau}=Z_a\left(\frac{\mathrm{D}_Fu^i}{\mathrm{D}\tau}(e_i)^a-\Omega^j{}_iu^i(e_j)^a\right)=0. \tag{A.2-9}$$

此式说明如果 u^a 与 Z^a 正交，那么它的 Fermi 导数仍旧与 Z^a 正交．

由式(A.2-5)和 Leibniz 律，不难得到余切矢量场 ω_a 的运算规律：

$$v^a\frac{\mathrm{D}_F\omega_a}{\mathrm{D}\tau}+\omega_a\frac{\mathrm{D}_Fv^a}{\mathrm{D}\tau}=\frac{\mathrm{D}_F(v^a\omega_a)}{\mathrm{D}\tau}=v^a\nabla_Z\omega_a+\omega_a\nabla_Zv^a.$$

再由式(A.2-6)可得余切矢量场 $\omega_a\in\mathfrak{X}^*\big(G(\tau)\big)$ 的 Fermi 导数，

$$\frac{\mathrm{D}_F\omega_a}{\mathrm{D}\tau}=Z^c\nabla_c\omega_a+(A_aZ_b-A_bZ_a)\omega^b=\nabla_Z\omega_a+(A_a\wedge Z_b)\omega^b. \tag{A.2-10}$$

借助上式以及 Leibniz 律，可得度规场 g_{ab} 的 Fermi 导数，

$$\frac{\mathrm{D}_Fg_{ab}}{\mathrm{D}\tau}=\nabla_Zg_{ab}+(A_a\wedge Z_c)g^c{}_b+(A_b\wedge Z_c)g_a{}^c=0. \tag{A.2-11}$$

此式说明 Fermi 导数（联络）是和度规相互容许的，这与 Levi-Civita 联络一样．

因 g_{ab} 与 Fermi 导数相容，又因度规分量 $g_{\mu\nu}$ 是常数，从式(A.2-8)可得

$$\frac{\mathrm{D}_F(e^i)_a}{\mathrm{D}\tau}=g_{ab}g^{ij}\frac{\mathrm{D}_F(e_j)^b}{\mathrm{D}\tau}=-\Omega^k{}_j(e_k)^bg_{ab}g^{ij}=-\Omega_k{}^i(e^k)_a. \tag{A.2-12}$$

上式说明如果切矢量场 $(e_i)^a$ 是 Fermi 移动不变的（即标架无自转），那么其对偶基矢场 $(e^i)_a$ 也是 Fermi 移动不变的（即标架无自转）；两者具有完全相同的“自转与否”属性．

通过上面分析可知，在标架 $\{(e^{\mu})_a\}$ 下，刚体 G 的四维角速度矩阵为：

$$\Omega_{\mu\nu}=\begin{pmatrix} 0 & A_1 & A_2 & A_3 \\ -A_1 & 0 & \omega_3 & -\omega_2 \\ -A_2 & -\omega_3 & 0 & \omega_1 \\ -A_3 & \omega_2 & -\omega_1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{A.2-13}$$

其中 (A_1, A_2, A_3) 是刚体 G 质心的四维加速度 (A_0, A_1, A_2, A_3) 的纯空间部分；此加速度的分量 A_0 未必是零，但不出现在上述角速度矩阵(A.2-13)中.

我们已经学过了很多导数，作一个简单的对比是有教益的，见表A.1.

表 A.1: 不同导数对比

导数名称	符号	属性
外微分	d_a	只能作用于全反对称张量场；无附加结构
普通导数	∂_a	只适用于局部坐标系，没有全局性；无附加结构
一般仿射联络	∇_a	预先给定联络系数；与平行移动等价；无穷多个
Levi-Civita 联络	∇_a	预先给定度量；无挠、与度量相容、唯一
李导数	$\pounds_X$	预先给定矢量场 X^a，依赖 X^a 诱导的单参同胚群
Fermi–Walker 导数	$\frac{\mathrm{D}_F}{\mathrm{D}\tau}$	预先给定类时线 $G(\tau)$；只适用于闵氏时空

附录 B　源守恒定律独立于场方程

B.1　当前文献观点

先叙述当前理论物理文献是如何看待源守恒定律与场方程之间的关系.

对于电磁场，电荷守恒定律被看作是麦克斯韦方程组的一个推论，是不独立的. 推导过程很简单，假设麦克斯韦方程组成立，然后

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = -J^\nu \quad \Rightarrow \quad 0 = \partial_\nu \partial_\mu F^{\mu\nu} = -\partial_\nu J^\nu \quad \Rightarrow \quad \partial_\nu J^\nu = 0. \tag{B.1-1}$$

上式推导过程中用到了电磁场张量的反对称性质.

支持此观点的较早的文献有 Landau, Lifshitz [31, §30]，Feynman, Leighton, Sands [17, §18.1-18.3]，Pauli [48, §24]；较新的书籍有 Jackson [28, p.3]，Griffiths [20, §8.1]. 同时，麦氏散度方程（$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho$, $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$）也被认为麦氏旋度方程的初始条件，不独立于麦氏旋度方程；此观点可见 Stratton [58, p.6]，Courant, Hilbert [9, p.603]，邓煜[11]和绝大多数计算电磁学书籍.

对于引力场，源运动方程（$\nabla_a T^{ab} = 0$）被看作爱因斯坦引力场方程（$G_{ab} = 8\pi T_{ab}$）的推论，是不独立的. 推导过程同样不难，

$$G_{ab} = 8\pi T_{ab} \quad \Rightarrow \quad \nabla^a G_{ab} = 8\pi \nabla^a T_{ab} \quad \xRightarrow[8.2-12]{\nabla^a G_{ab} = 0} \quad \nabla^a T_{ab} = 0. \tag{B.1-2}$$

最早提出此观点是爱因斯坦[13]本人以及 Hilbert，可参见[46]§15(c). Misner, Thorne, Wheeler [41, §17.1-17.2]更是支持此观点；甚至，他们[41]§20.6还从爱氏场方程组导出了麦克斯韦方程组和测地线方程. 除此以外，还有如下文献也支持此观点：Choquet-Bruhat [8, p.44]；Hawking [22]第二章公式 (5)；Landau, Lifshitz [31, §95]中式 (95.10) 下面的自然段；Poisson, Will [51, §5.4]；Schutz [53, §6.6]；Weinberg [66, §1.5]中紧接着式 (1.5.20) 的自然段；Witten [67, §9.3].

然而，上述观点是错误的[79]，他/她们忽略了微分方程组解存在性需求.

B.2 微分方程的公理体系

我们先粗略地建立微分方程的公理体系，见表B.1.

表 B.1: 微分方程的公理体系

层级	内容
第二层	除解存在性定理之外的所有由微分方程得到的定理
第一层	微分方程解存在性定理
第〇层	微分方程本身

第〇层属于公理层，是无法证明的一些假设．在这里只有微分方程本身，比如一阶常微分方程，麦克斯韦方程组，爱因斯坦引力场方程组，等等．

第一层，只有一条内容：微分方程（组）解存在性定理；这里是指弱化到最一般情形的解存在性定理．这是一条需要证明的定理，不是公理．对于微分方程来说，解存在性需要数个条件，比如初边值条件，相容性条件，拓扑条件等等；所有这些都是解存在的充分条件，既然是充分条件，那么这些条件一定独立于微分方程本身．请读者一定注意：解存在的充分条件独立于微分方程本身是一个正常的逻辑，不是什么新的发现，是一个至少从 Peano(1858-1932) 时代就知道的逻辑关系．显然必须先有第〇层，才能有第一层．

第二层，是指那些（除了解存在性定理之外的）所有由微分方程得到的定理、命题、推论、断言、……．第二层次的所有内容都需要证明，第二层次是构建在第〇层和第一层之上的；没有前两层，第二层是不存在的．比如微分方程没有解，我们从一个无解方程不可能得到任何有意义的“定理”．

我们以常微分方程为例来说明一下上述三个层次．Peano 于 1890 年完全证明了常微分方程（组）解的存在性定理，比如参见文献[3]§31．此定理指出 Lipschitz 条件是常微分方程解存在的充分条件，那么我们可以断定 Lipschitz 条件一定独立于常微分方程．既然独立，那么 Lipschitz 条件一定是额外需要满足的一个条件；尤其 Lipschitz 条件一定独立于“第二层”中所有内容，是“第二层”中所有内容的基础之一．

再例，可见文献[9]p.16，也可见本书的例5.15或例5.16；上述三条内容相同．在例5.16中的微分方程是 $\sum_j \frac{\partial}{\partial x^j} F_{ji} = J_i$，解存在性条件是 $\sum_i \partial_i J_i = 0$．同样解存在性条件（相容性条件 $\sum_i \partial_i J_i = 0$）独立于偏微分方程组（$\sum_j \frac{\partial}{\partial x^j} F_{ji} = J_i$）．

我们将上述二维平面的例子拓展到三维空间，见例5.17（本质上就是旋度方程）. 同样解存在性条件（相容性条件 $\sum_i \partial_i J_i = \nabla \cdot \boldsymbol{J} = 0$）独立于偏微分方程组（$\sum_j \frac{\partial}{\partial x^j} F_{ji} = J_i \Longleftrightarrow \nabla \times \boldsymbol{u} = \boldsymbol{J}$）. 关于 div–curl 方程组的解存在性定理可参见文献[2] （笔者没有仔细查询最早是谁证明了此定理）.

B.3 麦克斯韦方程组

笔者没有查到严格证明麦克斯韦方程组解存在性定理的文献，不过我们可以用思辨的方式来判断电荷守恒定律是不是它的存在性充分条件. 我们只需麦氏方程组的一半，即

$$\partial_\alpha F^{\alpha\beta} = -J^\beta. \tag{B.3-1}$$

表面上来看，这个方程并没有指定维数. 在前面我们已经指出当维数 n 是 2 和 3 时，已经严格证明 $\sum_i \partial_i J_i = 0$ 是方程组 $\sum_j \frac{\partial}{\partial x^j} F_{ji} = J_i$ 解存在性充分条件之一；故当 $n = 2$ 或 $n = 3$ 时，$\sum_i \partial_i J_i = 0$ 独立于 $\sum_j \frac{\partial}{\partial x^j} F_{ji} = J_i$！

我们可以用这样思辨的方式来探求答案：$\partial_\beta J^\beta = 0$ 是方程组(B.3-1)解存在性条件之一吗？答案只能有两个，一个“是”，另一个“不是”；不存在模棱两可的回答. 首先，试着回答不是；既然不是，那么就是在说“$\partial_\beta J^\beta =$ 什么？”都与方程组解是否存在无关了. 比如令 $\partial_\beta J^\beta = 1$，很明显此时方程组(B.3-1)解不可能存在！故答案只能为“是”！既然“是”，那 $\partial_\beta J^\beta = 0$ 就独立于方程组(B.3-1)之外！需要注意：(1) 在这个思辨过程中根本不涉及方程的维数；(2) 整个过程只涉及第〇层和第一层，从未涉及第二层，因为解存在性还未解决的情况下，第二层的结论是不可靠的！

非常多的人持这样的观点：假设麦氏方程组解存在，那么自然能从麦氏方程组推出电荷守恒，从而电荷守恒不独立于麦氏方程组. 这个命题表面上看是正确的，但是“假设麦氏方程组解存在”就已经假设了 $\partial_\beta J^\beta = 0$ 成立！故里面存在循环逻辑，因此此种观点不正确. 这种只强调电荷守恒是推论，不强调独立的陈述必然错误. 请读者仔细理解这个循环论证.

可能有读者误认为：即使解不存在，也可以从麦氏方程得到电荷守恒. 我们需要忽略由初边值条件、拓扑条件等引起的解不存在情形，只考虑相容性条件（$\partial_\beta J^\beta = 0$）. 此时，“解不存在”是指将任意可微函数代入方程(B.3-1)左端都不能使得该方程成立，也就是说代入任何可微函数得到都是 $\partial_\alpha F^{\alpha\beta} \neq -J^\beta$. 这是

对“解不存在”准确理解. 这种情形下由 $\partial_\alpha F^{\alpha\beta} \neq -J^\beta$ 无法得到 $\partial_\beta J^\beta = 0$.

可以这样陈述两者关系：假设麦氏方程组解存在，那么自然能从麦氏方程组推出电荷守恒，但不代表电荷守恒不独立于麦氏方程组. 因为“假设麦氏方程组解存在”就已假设电荷守恒成立（它是麦氏方程组解存在充分条件之一），所以电荷守恒必然独立于麦氏方程组.

对于偏微分方程组来说，$\partial_\beta J^\beta = 0$ 只是麦氏方程组解存在性充分条件之一，还需补充初边值条件、拓扑条件等等；所有这些存在性充分条件构成的集合只能是“充分”条件，不可能是“充分必要”条件！

此处的循环逻辑类似于惯性定律中的循环逻辑[15]p.58，但需注意惯性系中的循环逻辑还没有办法克服，即惯性系的任何定义都涉及循环定义. 麦氏方程组中的循环逻辑与之不同，这里的循环逻辑是可以剔除的；只要认为电荷守恒定律独立于麦氏方程组就没有循环逻辑！

B.4 无源麦氏方程组

下面考虑没有电流、电荷源的麦克斯韦方程组：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0,\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0; \tag{B.4-1a}$$

$$\nabla\times\boldsymbol{E}=-\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t},\quad \nabla\times\boldsymbol{B}=\frac{\partial\boldsymbol{E}}{\partial t}. \tag{B.4-1b}$$

对式(B.4-1b)两边求散度，得

$$0=\frac{\partial\nabla\cdot\boldsymbol{B}}{\partial t},\qquad 0=\frac{\partial\nabla\cdot\boldsymbol{E}}{\partial t}. \tag{B.4-2}$$

有一种观点（Stratton [58, p.6]，Courant, Hilbert [9, p.603]，邓煜[11]等）认为：只须要求式(B.4-1a)在初始时刻（$t=0$）满足，则由式(B.4-2)就能得到(B.4-1a)式在任意时刻（$t>0$）都成立；这相当于把式(B.4-1a)看成式(B.4-1b)的初始条件.

这种观点也是不正确的，同样忽略了解存在性需求. 式(B.4-2)是麦克斯韦旋度方程组(B.4-1b)解存在的充分条件之一. 文献[2]已证明“相容性条件”是旋度方程解存在的充分条件之一；而式(B.4-2)正是相容性条件. 用同样的思辨过程也可看出这个论断. 只有式(B.4-1a)在任意时刻成立才能保证相容性条件(B.4-2)成立，进而保证式(B.4-1b)解的存在；故式(B.4-1a)必须在任意时刻成立，不能只在初始时刻成立. 否则，必然包含循环论证！

同样，只要认为式(B.4-1a)独立于式(B.4-1b)，那么便没有循环逻辑．这样必须同时考虑全部八个麦氏方程，不能将任何一个方程分离．对于电磁理论而言，现有理论已不再支持将式(B.4-1a)和(B.4-1b)分开处理．这对计算电磁学是一个很强的限制，那种只求旋度方程不解散度方程的方式被**否定**了；必须同时处理八个方程，不能拆开求解，比如先解旋度方程再解散度方程也是不合理的．

然而麦克斯韦方程组是超定的（在定义3.11意义下），需要用40页中的定义3.12来解释；在此定义下麦克斯韦微分方程组是确定的（well-determined）．

虽然麦氏微分方程组在定义3.12下是确定的，但当它离散成代数方程组后，代数形式的麦氏方程组必然是超定的．这便使得计算电磁学必然需要采用某些特殊办法（比如最小二乘法）去求解超定代数方程组．

B.5 爱因斯坦引力场方程组

有了前面几节的叙述，相信读者已经能直接看出源运动方程组（$\nabla^a T_{ab}=0$）独立于爱氏场方程（$G_{ab}=8\pi T_{ab}$）；认为不独立的观点中必然存在循环逻辑．

正确的逻辑是：源运动方程组（$\nabla^a T_{ab}=0$）独立于爱因斯坦引力场方程组（$G_{ab}=8\pi T_{ab}$），且是爱氏场方程组解存在性条件之一．若假设爱氏场方程组解存在，则可导出源运动方程，但不代表源运动方程不独立于爱氏场方程．

虽然无源麦氏方程组在 1+3 分解后（见式(B.4-1)）可能依旧存在循环逻辑（若处理不当）；但无源爱氏场方程组在 1+3 分解后貌似不存在潜在的微分恒等式了（笔者初步审查得到的结论），故 1+3 分解后的无源爱氏场方程组不会有循环逻辑问题．这样，数值相对论便不会出现类似于计算电磁学中的原理性谬误．

小结 若偏微分方程组中含有潜在的微分恒等式，比如单旋度方程、麦氏方程、爱氏场方程、Yang–Mills 方程、……；则一定要将它们的“相容性条件”看成解存在性条件之一，从而独立于方程组本身．否则，很可能陷入循环逻辑．

反思 此循环逻辑在理论物理最底层存在了一个多世纪！纠正与否几乎不影响整个理论物理框架的正确性；这可能是它一直没有被发现的原因，即使发现了，诸多学者也不愿接受的原因．但它对计算电磁学还是产生了无法忽略的影响．

参考文献

[1] Alexandrino M, Bettiol R. Lie Groups and Geometric Aspects of Isometric Actions[M]. DE: Springer, 2015. ISBN: 978-3-319-16613-1.

[2] Aramaki J. L^p Theory for the Div–Curl System[J]. International Journal of Mathematical Analysis, 2014, 8(6): 259-271.

[3] Arnold V. 常微分方程[M]. 北京: 科学出版社, 2001. ISBN: 9787030090805.

[4] Arnowitt R, Deser S, Misner C. The dynamics of general relativity[J]. General Relativity and Gravitation, 2008, 40(9): 1997-2027.

[5] Carmeli M. Representations of the Rotation and Lorentz groups[M]. US: Marcel Dekker, 1976. ISBN: 978-0-824-76449-4.

[6] Chandrasekhar S. The Mathematical Theory of Black Holes[M]. UK: Oxford University Press, 1983. ISBN: 978-0-198-51291-2.

[7] Chen Q, Yu W. The Mathematical Connection from the Conservation Law of Electric Charge and Maxwell's Equations[J]. Journal of Natural Science of HeiLongJiang University, 1993, 10(S1): 33-38.

[8] Choquet-Bruhat Y. General Relativity and Einstein Equations[M]. UK: Oxford University Press, 2009. ISBN: 978-0-199-23072-3.

[9] Courant R, Hilbert D. Methods of Mathematical Physics (Vol. II)[M]. US: Wiley-VCH, 1989. ISBN: 978-0-471-50439-9.

[10] Darrigol O. The mystery of Riemann's curvature[J/OL]. Historia Mathematica, 2015, 42(1): 47-83. DOI: 10.1016/j.hm.2014.03.001.

[11] Deng Y, Ionescu A, Pausader B. The Euler–Maxwell System for Electrons: Global Solutions in 2D[J/OL]. Arch Rational Mech Anal, 2017, 225: 771-871. DOI: 10.1007/s00205-017-1114-3.

[12] Duggal K L, Bejancu A. Lightlike Submanifolds of Semi-Riemannian Manifolds and Applications[M]. US: Springer, 1996. ISBN: 9780792339571.

[13] Einstein A, Infeld L. On The Motion of Particles in General Relativity Theory[J/OL]. Canadian Journal of Mathematics, 1949, 1(3): 209-241. DOI: 10.4153/CJM-1949-020-8.

[14] Einstein A. Albert Einstein Philosopher-Scientist:Vol. VII in the Library of Living Philosophers[M]. US: MJF Books, 1970. ISBN: 1-56731-432-5.

[15] Einstein A. The Meaning of Relativity[M]. US: Princeton University Press, 2014. ISBN: 978-0-691-16408-3.

[16] Eisenhart L P. Riemannian Geometry[M]. US: Princeton University Press, 1926. ISBN: 978-0-691-02353-3.

[17] Feynman R P, Leighton R B, Sands M. The Feynman Lectures on Physics, Vol. II[M]. US: Basic Books, 2006. ISBN: 978-0-465-02494-0.

[18] Gilmore R. Lie Groups, Lie Algebras, and Some of Their Applications[M]. US: John Wiley & Sons, 1974. ISBN: 0-471-30179-5.

[19] Greiner W, Reinhardt J. Field Quantization[M]. DE: Springer, 1996. ISBN: 3-540-59179-6.

[20] Griffiths D J. Introduction to Electrodynamics[M]. 5th ed. UK: Cambridge University Press, 2023. ISBN: 978-1-009-39775-9.

[21] Hall B C. Lie Groups, Lie Algebras, and Representations[M]. 2nd ed. DE: Springer, 2015. ISBN: 978-3-319-13466-6.

[22] Hawking S W. Properties of expanding universes[D/OL]. University of Cambridge Repository, 1966. DOI: 10.17863/CAM.11283.

[23] Hawking S W, Ellis G. The Large Scale Structure of Space-Time[M]. UK: Cambridge University Press, 1973. ISBN: 978-0-521-09906-6.

[24] Hehl F W, Obukhov Y N. Foundations of Classical Electrodynamics[M]. CH: Birkhäuser Press, 2003. ISBN: 978-0-817-64222-8.

[25] Helgason S. Differential Geometry, Lie Groups, and Symmetric Spaces[M]. US: American Mathematical Society, 2001. ISBN: 978-0-821-82848-9.

[26] Hilgert J, Neeb K-H. Structure and Geometry of Lie Groups[M]. US: Springer, 2012. ISBN: 978-0-387-84793-1.

[27] Husemoller D. Fibre Bundles[M]. 3rd ed. US: Springer-Verlag, 1994. ISBN: 978-1-4757-2263-5.

[28] Jackson J D. Classical Electrodynamics[M]. 3rd ed. US: Wiley, 1998. ISBN: 978-0-471-30932-1.

[29] Kreyszig E. Introductory Functional Analysis with Applications[M]. US: Wiley, 1991. ISBN: 978-0471504597.

[30] Kulkarni R S. Curvature and Metric[J/OL]. Annals of Mathematics, 1970, 91(2): 311-331. DOI: 10.2307/1970580.

[31] Landau L, Lifshitz E. The Classical Theory of Fields[M]. 4th ed. UK: Butterworth-Heinemann, 1975. ISBN: 978-0-750-62768-9.

[32] Lawson H B, Michelsohn M L. Spin Geometry[M]. US: Princeton University Press, 1990. ISBN: 978-0-6910-8542-5.

[33] Lee J M. Introduction to Smooth Manifolds[M/OL]. 2nd ed. US: Springer, 2013. DOI: 10.1007/978-1-4419-9982-5. ISBN: 978-1-4419-9981-8.

[34] Lee J M. Introduction to Riemannian Manifolds[M/OL]. 2nd ed. US: Springer, 2018. DOI: 10.1007/978-3-319-91755-9. ISBN: 978-3-319-91754-2.

[35] Liu C, Ge F. 2014. DOI: 10.48550/arXiv.1403.2698.

[36] Marsden J E. On Completeness of Homogeneous Pseudo-Riemannian Manifolds[J/OL]. Indiana University Mathematics Journal, 1973, 22(11): 1065-1066. DOI: 10.1512/iumj.1973.22.22089.

[37] Marsden J E, Ratiu T S. Introduction to Mechanics and Symmetry[M]. 2nd ed. US: Springer, 1999. ISBN: 978-0-387-98643-2.

[38] McRae A S. Clifford Algebras and Possible Kinematics[J/OL]. Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications, 2007. DOI: 10.3842/sigma.2007.079.

[39] Miller W. Symmetry Groups and Their Applications[M]. US: Academic Press, 1973. ISBN: 9780080873657.

[40] Milnor J. Curvatures of left invariant metrics on lie groups[J]. Advances in Mathematics, 1976, 21(3): 293-329.

[41] Misner C W, Thorne K S, Wheeler J A. Gravitation[M]. US: W. H. Freeman, 1973. ISBN: 978-0-716-70344-0.

[42] Munkres J. Analysis On Manifolds[M]. US: CRC Press, 1997. ISBN: 978-0-201-31596-7.

[43] Munkres J. Topology[M]. 2nd ed. Pearson, 2000. ISBN: 9780134689517.

[44] Newman E, Penrose R. An Approach to Gravitational Radiation by a Method of Spin Coefficients[J/OL]. Journal of Mathematical Physics, 1962, 3(3): 566-578. DOI: 10.1063/1.1724257.

[45] O'Neill B. Semi-Riemannian Geometry With Applications to Relativity[M]. US: Academic Press, 1983. ISBN: 978-0-125-26740-3.

[46] Pais A. Subtle Is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein[M]. UK: Oxford University Press, 1982. ISBN: 9780192806727.

[47] Palais R S. A global formulation of the Lie theory of transformation groups [J]. Memoirs of the American Mathematical Society, 1957(22).

[48] Pauli W. Electrodynamics[M]. Dover Publications, 1973. ISBN: 0486414574.

[49] Penrose R, Rindler W. Spinors and Space-Time (Vol. I)[M]. UK: Cambridge University Press, 1984. ISBN: 978-0-521-33707-6.

[50] Penrose R, Rindler W. Spinors and Space-Time (Vol. II)[M]. UK: Cambridge University Press, 1986. ISBN: 978-0-521-34786-0.

[51] Poisson E, Will C M. Gravity: Newtonian, Post-Newtonian, Relativistic[M]. UK: Cambridge University Press, 2014. ISBN: 978-1-107-03286-6.

[52] Popovych R O, Boyko V M, Nesterenko M O, et al. Realizations of real low-dimensional Lie algebras[J/OL]. Journal of Physics A, 2003, 36(26): 7337-7360. DOI: 10.1088/0305-4470/36/26/309.

[53] Schutz B. A First Course in General Relativity[M]. 3rd ed. UK: Cambridge University Press, 2022. ISBN: 978-1108492676.

[54] Serre J-P. Lie Algebras and Lie Groups[M]. DE: Springer-Verlag, 1992. ISBN: 978-3-540-55008-2.

[55] Spivak M. A Comprehensive Introduction to Differential Geometry: Vol. I [M]. 3rd ed. US: Publish or Perish, 1999. ISBN: 978-0-914-09870-6.

[56] Spivak M. A Comprehensive Introduction to Differential Geometry: Vol. II [M]. 3rd ed. US: Publish or Perish, 1999. ISBN: 978-0-914-09871-3.

[57] Stephani H, et al. Exact Solutions of Einstein's Field Equations[M]. 2nd ed. UK: Cambridge University Press, 2003. ISBN: 978-0-521-46136-8.

[58] Stratton J A. Electromagnetic Theory[M]. US: McGraw-Hill Book Company, 1941. ISBN: 0070621500.

[59] Tu(杜武亮) L W. An Introduction to Manifolds[M]. 2nd ed. UK: Springer, 2011. ISBN: 978-1-441-97399-3.

[60] Tung W-K. Group Theory in Physics[M]. UK: World Scientific Publishing Company, 1985. ISBN: 978-9-971-96657-7.

[61] Von Westenholz C. Differential Forms in Mathematical Physics[M]. US: Elsevier Science, 1978. ISBN: 978-0-444-85437-7.

[62] Wald R M. General Relativity[M]. US: University of Chicago Press, 1984. ISBN: 978-0-226-87033-5.

[63] Warner F W. Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups[M]. US: Springer-Verlag, 1983. ISBN: 978-1-4419-2820-7.

[64] Weinberg S. Gravitation And Cosmology[M]. US: Wiley, 1972. ISBN: 978-0-471-92567-5.

[65] Weinberg S. The Quantum Theory of Fields (Vol. I)[M]. UK: Cambridge University Press, 1996. ISBN: 978-0-521-67053-1.

[66] Weinberg S. Cosmology[M]. UK: Oxford University Press, 2008. ISBN: 978-0-198-52682-7.

[67] Witten E. Introduction to Black Hole Thermodynamics[J/OL]. 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2412.16795.

[68] Wolf J A. Spaces of Constant Curvature[M]. 6th ed. US: AMS Chelsea Publishing, 2011. ISBN: 978-0-8218-5282-8.

[69] 陈强顺, 冯承天. 电荷守恒定律可确定麦克斯韦方程组的数学形式[J]. 同济大学学报, 1989, 17(3): 395-400.

[70] 陈省身, 陈维桓. 微分几何讲义[M]. 2 版. 北京: 北京大学出版社, 2001. ISBN: 978-7-301-05151-1.

[71] 陈维桓. 微分流形初步[M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2001. ISBN: 978-7-040-09921-8.

[72] 陈维桓, 李兴校. 黎曼几何引论（上）[M]. 2 版. 北京: 北京大学出版社, 2023. ISBN: 978-7-301-33438-6.

[73] 陈维桓, 李兴校. 黎曼几何引论（下）[M]. 2 版. 北京: 北京大学出版社, 2026. ISBN: 978-7-301-37262-3.

[74] 黄劲松. 李群的表示论[M]. 湖南教育出版社, 2000. ISBN: 9787535532275.

[75] 黄宣国. 李群基础[M]. 3 版. 复旦大学出版社, 2024. ISBN: 9787309169447.

[76] 喀兴林. 高等量子力学[M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2001. ISBN: 978-7-040-09925-6.

[77] 梁灿彬, 周彬. 微分几何入门与广义相对论（上）[M]. 2 版. 北京: 科学出版社, 2006. ISBN: 978-7-030-16460-5.

[78] 梁灿彬, 周彬. 微分几何入门与广义相对论（中）[M]. 2 版. 北京: 科学出版社, 2009. ISBN: 978-7-030-24057-6.

[79] 刘长礼. 物理与工程, 2017, 27(3): 7-9. DOI: 10.48550/arXiv.1002.0892.

[80] 陆启铿. 微分几何学及其在物理学中的应用[M]. 北京: 科学出版社, 2026. ISBN: 978-7-030-47029-4.

[81] 孟道骥, 陈良云, 史毅茜, 等. 抽象代数 I[M]. 北京: 科学出版社, 2010. ISBN: 978-7-030-26302-5.

[82] 孟道骥, 史毅茜. Riemann 对称空间[M]. 天津: 南开大学出版社, 2005. ISBN: 7-310-02307-2.

[83] 丘维声. 群表示论[M]. 北京: 高等教育出版, 2011. ISBN: 9787040327113.

[84] 丘维声. 高等代数（上）[M]. 2 版. 北京: 清华大学出版社, 2018. ISBN: 978-7-302-48763-0.

[85] 丘维声. 高等代数（下）[M]. 2 版. 北京: 清华大学出版社, 2019. ISBN: 978-7-302-49513-0.

[86] 苏步青, 胡和生, 沈纯理, 等. 微分几何（修订版）[M]. 北京: 高等教育出版社, 2016. ISBN: 978-7-04044-722-4.

[87] 陶瑞宝. 物理学中的群论[M]. 高等教育出版社, 2011. ISBN: 9787040312058.

[88] 万哲先. 李代数[M]. 2 版. 高等教育出版社, 2013. ISBN: 9787040372663.

[89] 伍鸿熙, 沈纯理, 虞言林. 黎曼几何初步[M]. 北京: 高等教育出版社, 2014. ISBN: 978-7-040-40458-6.

[90] 项武义, 侯自新, 孟道骥. 李群讲义[M]. 北京: 高等教育出版社, 2014. ISBN: 978-7-040-39503-7.

[91] 许以超. 李群和 Hermite 对称空间[M]. 北京: 科学出版社, 2001. ISBN: 978-7-030-08624-2.

[92] 张恭庆, 林源渠. 泛函分析讲义（上）[M]. 2 版. 北京: 北京大学出版社, 2021. ISBN: 978-7-301-30964-3.

[93] 朱照宣, 周起钊, 殷金生. 理论力学（上）[M]. 北京: 北京大学出版社, 1982. ISBN: 978-7-301-00196-7.

名词索引

符号

ϕ-相关矢量场, 134
A^{-T} 表示转置逆, 47
(R,+) 群表示, 536

A

ADM 分解, 359
Ado 定理, 431
爱因斯坦流形, 245
爱因斯坦张量, 244

B

Banach 空间, 594
BCH 公式, 437
Bianchi 分类, 411
Bianchi 恒等式, 195, 200
巴拿赫空间, 594
伴随表示, 440
半单纯李代数, 496
半直和李代数, 431
半直积群, 414
包含映射, 123
闭包, 26
闭集, 26
标架丛, 224
标量曲率, 244

C

Cartan 判据, 496
Cartan–Ambrose–Hicks 定理, 506
Cartan 等距定理, 504
Cartan 结构方程, 199
Cartan 引理, 83
Casimir 算子, 497
Cauchy–Schwarz 不等式, 34, 399
Christoffel 记号, 180, 236
  广义克氏符号, 310
Codazzi 方程, 332
测地变分, 314
测地球, 318
测地球面, 318
测地线, 189, 302
  存在唯一性, 303
  法坐标系, 311
  仿射、缩放变换, 303
  黎曼法坐标系, 308

指数映射, 306
常曲率空间, 293
超曲面, 336
ADM 分解, 359
超球面, 352
二次超曲面, 349
法矢量, 337
可积性, 342
类光超曲面, 367
时间导数, 360
外曲率, 340
伪球面, 353
为双曲面, 354
诱导度规, 338
正交, 342
抽象指标, 86
稠定算符, 602
稠密, 26

D

Dirac 右矢空间, 604
Dirac 左矢空间, 604
代数闭域, 24
殆复流形, 404
单参数变换群, 136
局部, 140
单参数子群, 432
单位分解定理, 167
导代数序列, 427
等变的, 491
等度映射, 253
等距, 250
保 Levi-Civita 联络, 253
浸入、嵌入, 253
局部同构, 253
局部同胚, 253
整体同胚, 253
等距群, 457
笛卡尔积, 26
广义黎曼流形, 240
微分流形, 106
定向, 165
微分流形, 165, 167
度规
抽象指标表示, 92
惯性指数, 54
黎曼度规, 235
洛伦兹度规, 90
闵可夫斯基度规, 90
升降指标, 92
度量空间等距同构, 33
对称空间, 499
最大, 520
对称算符, 603
对偶基矢, 46
对偶空间, 46

E

Einstein 流形, 245
Engel 定理, 429
厄米对称, 397
厄米内积, 398
厄米双线性函数, 396
厄米算符, 603

厄米线性, 397

F

frame-homogeneous, 515
Frobenius 定理, 159
    外型式, 164
Frobenius 条件, 159
法 Jacobi 场, 321
法联络, 329
法坐标系, 309
反函数定理, 120
范数, 594
仿射空间, 1
复化, 403
复结构, 400
复流形, 404
复矢量丛, 206
复线性空间, 395
复向量丛, 206
覆叠空间, 34
    黎曼覆叠空间, 518
覆叠映射, 34
赋范空间, 594
赋范线性空间, 594

G

G-主丛, 223
Gauss 方程, 332
Gauss 引理, 316
Goldberg–Sachs 定理, 391
G 型联络, 229
G 型张量, 70
根补空间, 365
根空间, 364
共形变换, 295
    共形张量, 见 Weyl 张量
    平坦, 297
古典李代数, 456
古典李群, 456
固有广义欧氏空间, 364
惯性定理, 54
广义正交群, 453
规范场, 232
轨道, 488

H

Hausdorff 空间, 26
Hellinger–Toeplitz 定理, 602
Hermite 函数, 396
Hermite 内积, 398
Hilbert 空间, 596
Hodge 星对偶, 269
Hölder 不等式, 34
核, 21
弧长变分, 314
弧长第二变分, 316
弧长第一变分, 315

I

I(M), 见等距群
ISO(2) 群, 462

J

Jacobi 场, 318

Jacobi 方程, 319
Jacobi 切矢量场, 318
积分, 168
　基本公式, 168
　流形, 170
积分流形, 159
积分曲线, 136
积和式, 73
极限点, 26
极映射, 501
加法群, 408
降中心序列, 427
截面曲率, 291
紧致, 31
浸入, 122
径向测地线, 318
纠缠态, 63
局部对称空间, 499
局部欧氏空间, 278
局部性定理, 128
　仿射联络, 179
　切矢量场, 128
　外微分, 150
聚点, 26

K

Killing 切矢量场, 258
Killing 型, 443
Koszul 公式, 237
Kronecker 记号, 73
　乘积, 77
　广义 Kronecker 记号, 74
　缩并, 75
　行列式, 78
开覆盖, 31
开集, 25
可分, 26
可解李代数, 427
可解李群, 429
可迁的, 488
可数的, 26
克氏符, 236
空间型式, 517

L

l^2 空间, 597
$L^2(\mathbb{R}^3)$ 空间, 598
$L^2[a,b]$ 空间, 597
l^p 空间, 33
Levi–Malcev 定理, 432
Lorentz 代数, 472
Lorentz 群, 465
Lorentz 四矢量, 70
拉回丛, 217
黎曼几何, 235
黎曼几何基本定理, 237
黎曼结构, 235
黎曼流形, 235
黎曼曲率, 190, 242
　对称性, 194, 242
　分量, 192
　数目, 243
　型式, 196, 277
　　Bianchi 恒等式, 278

Cartan 结构方程, 277
刚性标架, 279
相容性条件, 248
黎曼群, 481
李变换群, 485
李代数, 405
半单纯, 406
单纯, 406
复化, 494
结构常数, 419
理想, 406
实形, 494
同态, 413
李导数, 142
适配坐标系, 145
无挠联络, 187
李定理, 429
李群, 405
Haar 测度, 479
不变积分, 479
覆盖群, 414
黎曼曲率, 482
双不变黎曼度规, 482
通用覆盖群, 414
同态, 413
线性表示, 413
右不变切矢量场, 423
指数映射, 434
左不变仿射联络, 423
左不变切矢量场, 416
李群 G 的李代数, 419
李群基本定理, 430
李群直积, 408
联络, 178
Levi-Civita, 236
仿射联络, 178
联络系数, 见 Christoffel 记号
普通导数, 183
协变导数, 184
型式, 196
协变导数, 197
子流形联络, 327
联络 1 型式场, 197
连通, 32
连续对偶空间, 598
列紧, 31
邻域, 25
螺旋度, 588

M

Maurer–Cartan 型式场, 424
Minkowski 不等式, 34
Myers–Steenrod 定理, 491
迷向子群, 488
幂零李代数, 427
幂零李群, 429
闵可夫斯基时空, 90
广义, 90

N

Newman–Penrose 型式, 372
NP 方程, 379
NP 型式, 372

爱氏、麦氏方程, 383
自旋系数, 375
挠率, 185
内积空间, 596
扭曲张量, 249

O

$O^{++}(p,q)$, 454
欧几里得空间, 36
广义, 90
局部, 278
欧几里得群, 461

P

Pauli–Lubanski 算子, 578
Petrov 分类, 383
Pfaff 方程组, 160
Poincaré 代数, 475
Casimir 算子, 577
Poincaré 群, 474, 574
Poincaré 引理, 155
Poisson 括号, 130
无挠联络, 187
庞加莱群, 474
陪集流形, 515
配合、配对（pair）, 47
平行移动, 188
平移群, 459
平直, 204

Q

齐性空间, 513
嵌入, 122
正则嵌入, 122
强各向同性流形, 515
切标架丛, 227
切丛, 125
切空间, 111
基矢, 113
张量, 116
自然坐标基矢, 114
坐标变换, 116
切矢量, 95, 111
方向导数, 95
切线切矢量, 114
曲线切矢, 114, 120
切矢量场, 127
几何定义, 128
切线切矢量, 114
切映射, 98
求和约定, 46
球对称, 527
球对称均匀时空, 528
球对称空间, 527
球对称时空, 528
曲线长度, 238
全纯函数, 394
群, 21
半群, 21
变换群, 23
不变子群, 21
群表示, 22
幺半群, 21

正规子群, 21
置换群, 23
子群, 21

R

Ricci 方程, 332
Ricci 平坦, 245
Ricci 曲率, 192
Riesz 表示定理, 599

S

Schur 引理, 530
SL(2,C) 群, 553
$SO^+(p,q)$, 454
SO(2) 群, 451
SO(2) 群表示, 536
SO(3) 群, 451
SO(p,q), 453
Stokes–Cartan 定理, 172
SU(2) 群, 536
三维单位球面群, 539
散度定理, 346
散度算子, 274
商代数, 411
商空间, 40
生成元, 435
实数加法群表示, 536
矢量丛, 206
截面, 208
矢量丛的联络, 213
矢量丛曲率, 220
矢量空间, 见线性空间
适配坐标系, 142
李导数, 145
收敛序列, 31
舒尔引理, 530
数域, 20
四矢量, 70
四元数, 24
算符, 595
无界, 596, 602
线性, 595
有界, 596
自伴, 603

T

tetrad postulate, 199
拓扑, 25
拓扑空间, 25
拓扑流形, 30
特殊线性群, 447
体积元, 265
同步参考系, 362
同构映射, 21
同胚, 30
同态核, 见核
同态映射, 21
退型, 364

U

U(1) 群, 455
U(1) 群表示, 536

W

Weyl 定理, 480
Weyl 旋量, 558
Weyl 张量, 245
Witt 等距延拓定理, 252
Witt 消去定理, 54
外代数, 79
外积, 79
    Kronecker 记号表示, 80
外微分“d”, 150
    定义式, 152
    无挠联络, 187
外微分型式场, 147
外型式, 83
外型式场, 见外微分型式场
弯曲, 204
完备, 32
    测地, 313
    度量完备, 32
    切矢量场, 138
微分流形, 100
    参数曲线, 108
    带边, 167
    函数, 109
    流形间映射, 108
    微分结构, 100
    微分同胚、光滑同胚, 109
    相容性, 100
    坐标卡、坐标图、坐标图册, 100
无界算符, 596

X

希尔伯特空间, 596
纤维丛, 222
线性变换, 42
线性独立, 36
线性泛函, 42, 596
    连续, 596
    有界, 596
线性函数, 42
    不定对称双线性函数, 364
    对称双线性函数, 53
    多重线性函数, 57
    双线性函数, 49, 52
线性空间, 35
线性李代数, 411
线性李群, 411
线性算符, 595
线性算子, 595
线性同构, 44
    自然同构, 48, 53
线性无关, 见线性独立
线性相关, 36
    微分线性相关, 40
线性映射, 42
向量丛, 206
向量空间, 35
楔积, 见外积
协变导数, 见联络
辛群, 456
行列式, 57, 73
旋量, 70, 552

循环逻辑, 614

Y

Yang–Mills 场, 232
淹没, 122
杨振宁-米尔斯场, 232
幺正空间, 见酉空间
一般线性群, 409
一般线性群 GL, 22
音乐同构, 300
引力场拉式密度, 272
有界算符, 596
有界线性算符, 600
有效的, 487
酉空间, 398
酉内积, 398
酉群, 454
右移动, 408
诱导定向, 167
诱导联络, 217
诱导拓扑, 29
诱导体积元, 344
诱导映射, 118, 132
    切映射、推前映射, 118, 132
    余切映射、拉回映射, 118, 132
余切空间, 114
余切矢量, 114

Z

Z_2, 21
张量, 68
    加法, 70
    逆变张量, 68
    缩并, 70
    协变张量, 68
    张量变换关系, 69
    张量的张量积, 70
张量场, 136
张量积, 62
    自然同构, 65
张量值型式, 232
整体对称空间, 506
正交群, 450
直和李代数, 431
指数映射, 306, 434
    矩阵群, 437
主丛, 223
自伴算符, 603
自列紧, 31
自旋仿射联络, 247
自由的, 488
子空间拓扑, 29
子流形, 120
    测地线, 336
    活动标架法, 332
    浸入、嵌入, 123
子流形联络, 327
最大对称空间, 520
左不变仿射联络, 423
左移动, 408