

a
12-year cumulative N2O-N emissions (kg N/ha)
NAMR
+2.4%
+3.9%
+5.5%
EUR
+2.9%
+9.4%
+10.9%
NWC
+12.0%
+11.4%
+12.3%
NEC
+6.8%
+8.5%
+9.1%
NAMI
+14.7%
+18.0%
+20.7%
NCP
+16.6%
+16.0%
+17.0%
SAM
+1.8%
+3.3%
+3.6%
SWC
+3.9%
+3.2%
+3.5%
WAF
+5.2%
+5.5%
+6.6%
EAF
+7.5%
+7.2%
+6.5%
WAS
+13.1%
+12.9%
+13.7%
SAS
+8.0%
+11.3%
+11.0%
BR
BI
SI
Selected sites (n=81)
Baseline
Tmax +2°C
Basal-Rainfed (BR)
Basal-Irrigated (BI)
Split-Irrigated (SI)
b
Overall
+8.2%
+0.8%
NAMI
+18.0%
+10.3%
NCP
+16.0%
+9.6%
WAS
+12.9%
+7.9%
NWC
+11.4%
+7.8%
SAS
+11.3%
+6.8%
EUR
+9.4%
+0.3%
NEC
+8.5%
+5.9%
EAF
+7.2%
+0.4%
WAF
+5.5%
+1.2%
NAMR
+3.9%
-9.3%
SAM
+3.3%
-4.1%
SWC
+3.2%
-0.1%
Warming response (BI)
Net change with SI
Change in cumulative N2O-N (%)
relative to historical BI