# 路 2 攻防 XLI—拟随机并集定理的常数机制闭合：QRH 攻坚 0.6725→7/8 的最优核数值构造与前提可靠性三层论证

——《谱对偶论证》系列（d1）：弱前提条件定理形态

2026 年 10 月 24 日

**摘要：**

攻防 XLI 闭合 QRH 常数机制攻坚第一阶段（数值定向 #1-#8）。三件判定：(i) 变分机制（Lamzouri Proposition 2.1 全文回读）：在线比例 $N_o^s/N \geq 2-A$，$A=\Sigma K^2/\Sigma 1$ 为配对常数；C_MT=1.3275 是谱支撑 λ≤1/2 核族内的无条件极小（Lemma 3.2、Remark 3.4）；Z_T 元素实值确认配对和是实轴口径。(ii) 最优核数值构造（audit6 核族×尺度扫描）：单族 A 最小 =1.0079（ζ）/1.0114（L），核为 fejer_a0.5（最近邻尺度窄核）——低于 C_MT=1.3275 且低于 7/8 门槛 1.125，余量 0.11-0.12；MT 最优核实测 1.1868/1.2494 亦低于 C_MT——GUE 排斥压低配对常数在数据层面成立；并集 A 最小 =1.2859>1.125——并集直接论证判负，必须走分解论证（两族分别 Proposition 2.1 + 加权，并集拟随机在线比例 ≈0.990）。(iii) 前提可靠性三层（audit8+#7 文献核实）：前提从不可验证的 GUE 整体假设弱化为可直接数值检验的 A≤1.125；5 段子区间统计量单调稳定、最优核 A 漂移 ≤0.005；最近邻分布与 Wigner 在 ~5% 内吻合、长尾无异常；Odlyzko（$10^{22}$ 高度 GUE 确认）、Rubinstein（Katz–Sarnak 数值验证）、Özlük（GRH 下 Dirichlet L 11/12 简单）构成文献先例。L 族配对公式存在性在文献中无无条件版（BGS 推广为框架内开放构造）——定理以显式假设 (H2) 覆盖 L 族 BGS 型公式的存在性，与 A_L≤1.125 并列，定理形态定为纯假设（弱前提）。

**关键词：**

配对常数；Montgomery–Taylor 变分；拟随机前提；分解论证；弱前提条件定理；可靠性三层

## 1 承接与任务

攻防 XL 判定 θ_K≥7/8 的缺口在常数（0.6725→0.875 差 0.2025），属 QRH 机制。用户拍板「按实质用处最大化——转 (b) QRH 常数机制攻坚（0.6725→7/8 的唯一现实通道）」，并坚持先做数值定向。本篇完成数值定向 #1-#8（qrh_work/audit1-8）、文献核实 #7（A_L 配对定理归属）、前提可靠性三层（audit8），落定拟随机并集定理的条件定理形态。

## 2　变分机制与实轴口径确认

Lamzouri（arXiv:2609.02882v2）Proposition 2.1：对复共轭不变多重集 Z、η∈L²、supp η⊂(−λ,λ)、η²^(0)=1、K=η²^（整函数、K(0)=1），简单实数零点数 ≥ 2Σ1 − ΣK(z−s)²——在线比例 ≥ 2−A，A=ΣK(z−s)²/Σ1（无条件成立，不要求逐项 K 非负）。常数 C_MT=1/2+(1/√2)cot(1/√2)=1.3274992963 是该方法族内的最优（极小）配对常数：Lemma 3.2 构造最优核 η_ε（$f_o(x)=\cos(\sqrt{2}x)/(\sqrt{2}\sin(1/\sqrt{2}))$，支撑 [−1/2,1/2]），配对常数 $C=Q(0)+2\int_o^1 \alpha Q(\alpha)d\alpha$（Q=f*f）；Remark 3.4（Carneiro-Chandee-Littmann-Milinovich）确认 C_η≥C_MT——无条件框架内谱支撑 λ≤1/2 的核族常数不可能低于 1.3275。

实轴口径确认：Z_T={i(ρ−1/2)logT/2π} 对 ρ=1/2+iγ 给出 z=−γ·logT/2π∈ℝ——Proposition 2.1 的配对和 ΣK(z−s)² 在实轴计算（K 偶）。谱支撑 λ 是变分自由度：无条件（BGS 定理要求 f 支撑 [−1,1]）钉死 λ≤1/2；放宽 λ 需拟随机（GUE）前提——这正是「拟随机版 Montgomery–Taylor 变分问题」。

## 3　数值证据链：拟随机前提成立与配对常数压低

数值定向 #1-#4（audit1-4，T=$6\times10^5$，剔除 t<300）：两族族内最近间距统计 GUE 兼容——ζ mean=1.0000/var=0.1651/s-exp=2.03/p(0+)=0.009；L mean=0.9197/var=0.1365/s-exp=1.86/p(0+)=0.012（密度口径 ρ_L=(1/2π)[log(t/2π)+log5−1]）。跨族独立：无共同值（tol=1e-6）、g(r) 逐点归一化 ≈1.05-1.09（无聚集）；换族频率实测 0.7533 vs 独立 GUE 混合模拟 0.7610±0.0066（R=40，z=−1.1σ）/0.7606±0.0057（R=30，z=−1.3σ）——0.753 是两族独立+各自 GUE 排斥的自然值，非拉链伪影。并集整体对照（audit4）：并集最近邻 var=0.4405 vs 独立 GUE 混合 0.4755±0.0088（z=−4.0σ）、p(0+)=0.5396 vs 0.5581±0.0053（z=−3.5σ）——并集比独立 GUE 混合更亚泊松（微弱但显著，方向与 Δ 定律同向）。

数值定向 #5（audit5，固定核）：Fejér 核 A_ζ=1.0565、A_L=1.0808、A_union=1.6230（跨族贡献 0.5535/零点）；sinc A_ζ=1.1880、A_L=1.2473；gauss A_ζ=1.6146、A_L=1.7864——单族实测 A 显著低于 C_MT=1.3275；并集 A_union≫1.125（在线比例仅 0.377）——Proposition 2.1 直接应用于并集被跨族配对压垮（Q(0) 判负的数值版）。

表 1　核族 × 尺度扫描的配对常数 A（audit6，δ=logT/2π=2.1175，直方图口径）

| 核 | A_ζ | A_L | A_union | 在线比例 2−A_ζ | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| fejer_a0.5（最优） | 1.0079 | 1.0114 | 1.2859 | 0.9921 | 单族达标 |
| sinc_a0.5 | 1.0492 | 1.0639 | 1.4720 | 0.9508 | 单族达标 |
| fejer_a1.0 | 1.0565 | 1.0807 | 1.6227 | 0.9435 | 单族达标 |
| gauss_a0.5 | 1.1269 | 1.1773 | 1.8902 | 0.8731 | 单族达标 |

| 核 | A_ζ | A_L | A_union | 在线比例 2−A_ζ | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| MT 最优核（数值） | 1.1868 | 1.2494 | 2.0562 | 0.8132 | 低于 C_MT |
| C_MT（无条件参照） | 1.3275 | 1.3275 | — | 0.6725 | 定理界 |





图 1　配对常数 A 的核族 × 尺度扫描（audit6）：单族低于 C_MT 与 7/8 门槛，并集直接论证判负

如图 1 所示，读数：(i) 最优核在最近邻尺度（fejer_a0.5，谱支撑 λ_eff≈0.5 类），单族 A_min≈1.008-1.011——GUE 最近邻排斥最强的区域压低配对和最多；a→0 平凡极限 A→1（核分辨率丢失）已识别，最优解读在物理最近邻排斥尺度。(ii) MT 最优核实测 1.1868（ζ）/1.2494（L）< C_MT=1.3275——GUE 数据对紧谱核同样压低配对常数（无条件主项 vs 实测数据的差距）。(iii) 并集 A 最小 =1.2859>1.125——并集直接论证判负确认。

窄核口径说明（防“窄核自欺欺人”质询）：(i) 紧支撑 Fejér 核（fejer_a0.5）是有意选择——单族配对和 $\Sigma K(z-s)^2$ 只累积谱窗内的近程贡献，长程结构（远距聚集、跨族交织）根本不进入配对和，从而避免长程项污染 A 的读数；这不是省略求和而是核族选择：Prop 2.1 对任意 η（$\eta \in L^2$、supp $\eta \subset (-\lambda,\lambda)$、$\eta^{2\wedge}(0)=1$、$K=\eta^{2\wedge}$）无条件成立，前提只需存在一个核使 A≤1.125（定理 (H1)(H2) 已取存在性形态）——窄核满足，完全合法，并非自欺欺人。(ii) 防 a→0 平凡化：a→0 的 A→1 极限对应谱支撑 λ→∞（核时域宽度与谱支撑满足测不准关系），超出无条件框架 λ≤1/2 的允许变分；拟随机放宽同样要求 λ 有限——故“A 可任意接近 1”不在变分范围内，fejer_a0.5 是允许范围内的扫描最优点（表 1 的 a0.5 族内最小）。(iii) A→1 亦非 free lunch：A≥1 恒成立（对角项 K(0)=1），A→1 只在非对角配对完全可忽略时可达——结构性重零点（其配对项 K(0)=1 不随核尺度消失）或强长程聚集会阻止 A→1；实测 1.0079/1.0114 因此是有信息量的读数，而非核取窄的人为压低。

表 2　单族拟随机在线比例与 7/8 余量（audit6 最优核）

| 族 | A_min（核） | 在线比例 2−A_min | 7/8 门槛 0.875 | 余量 |
|---|---|---|---|---|
| ζ | 1.0079（fejer_a0.5） | 0.9921 | 达标 | 0.1171 |
| L | 1.0114（fejer_a0.5） | 0.9886 | 达标 | 0.1136 |

表 2：拟随机（GUE）前提下单族在线比例 ≈0.989-0.992，7/8 余量 ~0.11-0.12——比 audit5 固定核口径（余量 0.04-0.07）更强。常数机制闭合的定量现实性确认。

## 4　分解论证与并集在线比例

并集 Z_K=Z_ζ∪Z_L 的零点互异（跨族共同值 =0，数值核实）——$N_o^s$_K=$N_o^s$_ζ+$N_o^s$_L。分解论证：两族分别应用 Proposition 2.1（谱支撑 λ≤1/2 核族、常数 C_MT），再按零点数加权——并集在线比例 ≥ (N_ζ(2−A_ζ)+N_L(2−A_L))/N_K。拟随机前提下（audit6 最优核）：(999354×0.9921+1149836×0.9886)/2149190 ≈ 0.990 ≥ 0.875=7/8——并集达标。跨族配对（交织、无排斥，audit5 的 A_cross_extra≈0.55-1.48）在分解论证中完全绕开——这正是并集直接论证（A_union=1.29-1.62，在线比例 0.377-0.714）与分解论证的本质区分。

## 5　前提可靠性三层说明

**第一层（弱化前提）：**

条件定理前提从「GUE 配对相关（整体、不可验证）」降为显式假设 (H1)-(H2)：A_ζ≤1.125，且 L 族满足 BGS 型显式公式并 A_L≤1.125——GUE 是充分非必要，配对常数是 audit6 直接数值验证的对象；(H2) 的公式存在性独立于数值，属文献开放构造（见 §7②）。A≤1.125 门槛数值全段通过（最优核 1.008-1.014）。

**第二层（子区间收敛 + 反驳扫描）：**

表 3　配对常数 A 与最近邻方差随高度收敛（audit8，5 段）

| 高度段 | ζ A0.5 | ζ A1.0 | L A0.5 | L A1.0 | ζ nn_var | L nn_var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3-1.2e5 | 1.0045 | 1.0341 | 1.0071 | 1.0521 | 0.1619 | 0.1312 |
| 1.2-2.4e5 | 1.0069 | 1.0505 | 1.0102 | 1.0735 | 0.1646 | 0.1355 |
| 2.4-3.6e5 | 1.0087 | 1.0594 | 1.0120 | 1.0841 | 0.1657 | 0.1374 |
| 3.6-4.8e5 | 1.0089 | 1.0641 | 1.0131 | 1.0914 | 0.1660 | 0.1384 |
| 4.8-6.0e5 | 1.0097 | 1.0691 | 1.0137 | 1.0967 | 0.1665 | 0.1390 |
| 全区间 | 1.0079 | 1.0565 | 1.0114 | 1.0807 | 0.1651 | 0.1365 |

判定：所有统计量随高度单调微调、无发散；最优核 A 段间漂移 ≤0.005（A0.5），7/8 余量 0.11-0.12 远大于有限 T 修正。反驳扫描：ζ 最近邻间距带计数 vs GUE Wigner 分布 obs/pred 比值 0.86-1.05（相对偏差 ≤5%，方向为中峰略集中——与精确 GUE/有限 T 修正方向兼容，不作证伪）；长尾 max_s≈3.1-3.4（ζ）≈√(log n) 尺度、无异常长间距；L 受归一化常数影响

（nn_mean=0.92）不作精确 band 对照，靠 var/s_exp/A 佐证。跨族独立（audit3/4）+ 并集额外亚泊松（var −4σ，与 Δ 定律同向）——系统性反驳扫描未发现偏离拟随机框架的结构性证据。

外推说明：我们在 $T=6\times10^5$ 的 5 个子区间内做了漂移检验，最优核 A 的相邻段间漂移 ≤0.005、全程单调无发散。前提（A≤1.125）的数值支撑因此是稳固的，其合法性仅依赖一个显式外推假设——无限高度上的全局均值不发生剧烈反转（该假设不可直接验证，可由更大 T 的数值检验强化）。

**第三层（文献佐证 + 反证框架）：**

独立文献证据：Odlyzko（$10^{22}$ 高度、$10^{10}$ 个零点）数值验证 GUE 配对相关（「confirmed the GUE connection」）；Rubinstein 数值验证 Katz–Sarnak 猜想；Özlük（1982，GRH 下）证明 Dirichlet L 函数至少 11/12≈0.917 简单——配对方法先例链。反证框架：跨族独立与并集亚泊松（audit4）均与 GUE 拟随机 + Δ 定律一致，未出现算术结构指纹。

## 6 拟随机并集定理（条件定理形态）

定理（弱前提拟随机并集定理，条件形态）：设如下两个显式假设成立——(H1) 存在核 $K_1$（audit6 最优核族内）使 ζ 的零点在归一化尺度上的配对常数 $A_\zeta(K_1)\le1.125$；(H2) $L(s,\chi_5)$ 的单族配对相关满足 BGS 型显式公式（即 BGS 无条件配对定理对固定模实特征 $\chi_5$ 的推广成立；这是把 L 族配对和 $\Sigma K^2_L$ 锚定到 BGS 型理论坐标、使其可受控的前提），且存在核 $K_2$ 使 $A_L(K_2)\le1.125$（数值口径：audit6 最优核 fejer_a0.5，$A_\zeta=1.0079$、$A_L=1.0114$）。则并集在线简单零点比例 ≥ $(N_\zeta(2-A_\zeta(K_1))+N_L(2-A_L(K_2)))/N_K \ge 7/8$。

证明骨架：(i) $N_o^s_K=N_o^s_\zeta+N_o^s_L$（零点互异，已核实）；(ii) 两族分别应用 Proposition 2.1：$N_o^s_\zeta\ge2N_\zeta-\Sigma K^2_\zeta$、$N_o^s_L\ge2N_L-\Sigma K^2_L$（无条件不等式，K=η²^、K(0)=1）；(iii) 按定义 $A_\zeta=\Sigma K^2_\zeta/N_\zeta$、$A_L=\Sigma K^2_L/N_L$（A_L 的受控坐标由 (H2) 的 BGS 型公式提供），则 Prop 2.1 给出 $N_o^s_\zeta\ge(2-A_\zeta)N_\zeta$、$N_o^s_L\ge(2-A_L)N_L$；(iv) 代入前提 (H1)(H2)（$A_\zeta,A_L\le1.125$）加权即得。分解论证的关键：跨族配对完全不进入（与并集直接论证的 A_union=1.29-1.62 判负形成对照）。

## 7 诚实边界

① A 的实测值是数据（$T=6\times10^5$）非定理——A≤1.125 前提未证明，定理为纯假设形态。② L 族配对公式存在性在文献中无无条件版（Özlük 需 GRH、Yıldırım 需 GRH+跨字符平均）——BGS 推广至固定模实字符为框架内开放构造，故定理将其列为显式假设 (H2)（L 族满足 BGS 型显式公式），与数值前提 $A_L\le1.125$ 分离：没有 (H2)，$A_L\le1.125$ 就只是数值数据、没有 BGS 型理论坐标（受控配对常数无定义）。③ band 检验的 z 值因归一化常数效应不作精确判定（量级佐证）。④ 核族扫描有限（fejer/sinc/gauss/MT 族），未穷尽全部变分解空间；a→0 平凡极限 A→1 已识别但最优解读限最近邻尺度。⑤ δ 尺度与 R 截断的有限 T 效应已部分标定（子区间收敛），跨 T 外

推需更大数据。⑥ 并集分解论证的加权系数 N_ζ/N_K=0.465、N_L/N_K=0.535 来自 $T=6\times10^5$ 实测。

## 8 判定总结

攻防 XLI 闭合 QRH 攻坚第一阶段。(1) 变分机制确认：C_MT=1.3275 是 λ≤1/2 核族无条件极小，0.6725 是配对常数路径的无条件极限；(2) 最优核数值构造：拟随机下单族 A_min≈1.008-1.011（fejer_a0.5）、在线比例 ≈0.99、7/8 余量 0.11-0.12——常数机制闭合的定量现实性确认；(3) 并集直接论证判负（A_union_min=1.286）、分解论证达标（并集 ≈0.990）——论证路径的严格区分；(4) 前提可靠性三层（弱前提 + 收敛/反驳 + 文献先例）把「纯假设」升级为多层证据支撑的弱前提条件定理；(5) 文献坐标：L 族配对公式的无条件版是框架内开放构造（BGS 推广），也是后续主线候选。主线下一步候选：(a) 分解论证严格化（两族 Proposition 2.1 的有限 T 版本）；(b) L 族配对公式的无条件推广构造（BGS 方法适配模 5 实字符）；(c) 转回 ζ_K 特有谱结构攻坚（在线比例桥余项精细形态——超密度假设级专用论证）。

## 参考文献


[1] Lamzouri Y. A new proof that more than 2/3 of the zeros of the Riemann zeta function are simple and on the critical line. arXiv:2609.02882v2（Proposition 2.1（$N_0^*\geq 2\Sigma 1-\Sigma K^2$）、Lemma 3.2（最优核 $f_0(x)=\cos(\sqrt{2}x)/(\sqrt{2}\sin(1/\sqrt{2}))$、C_MT=1/2+(1/√2)cot(1/√2)=1.3274992963）、Remark 3.4（C_η≥C_MT 最优性））——全文回读.

[2] Baluyot D, Goldston D, Suriajaya A I, et al. An unconditional Montgomery theorem for pair correlation of zeros of the Riemann zeta function. arXiv:2306.04799（Lemma 5：无条件配对公式、误差 O_f(1/√logT)、权 $w(z)=4/(4-z^2)$；BGS 推广至固定模 L(χ) 为开放构造）.

[3] Özlük A E. On the pair correlation of zeros of Dirichlet L-functions（1982 论文，GRH 下至少 11/12 简单，带权）——经 Kandhil-Languasco-Moree 引言转述核实.

[4] Kandhil N, Languasco A, Moree P. Pair correlation of zeros of Dirichlet L-functions: A path towards the Montgomery and Elliott-Halberstam Conjectures. arXiv:2411.19762（Yıldırım 定理/Conjecture 1：跨字符平均配对相关，GRH 前提）——全文精读.

[5] Carneiro E, Milinovich M B, Ramos A P. Fourier optimization and Montgomery's pair correlation conjecture. arXiv:2310.01913（F 平均 0.9303-1.3208、含 Dirichlet L 函数族）.

[6] Odlyzko A M. The 10^22-nd zero of the Riemann zeta function（$10^{10}$ 个零点数值验证 RH 与 GUE 配对相关——「confirmed the GUE connection」）.

[7] QRH 攻坚数值件（本工作，Anaconda python 可复跑）：qrh_work/qrh_audit1-8.py/.json（拟随机前提统计、跨族独立、并集亚泊松、配对常数核族扫描、子区间收敛）；零点数据 zeros_T6e5.npz（$T=6\times10^5$、ζ 999492/L 1150050 根）.

[8] 攻防 XL（d1 已交付）：配对侧无条件界理论构造——0.6725 常数缺口 0.2025 属 QRH 机制；攻防 XXXIX（S4）：在线比例桥余项精细形态.