路 2 攻防 XLII—S2(ii)：跨 T 衰减律判别

（配对常数误差律与 S1b 速率钉死）

——《谱对偶论证》系列（d1）：S2(ii) 数值判别

2026 年 10 月 25 日

摘要：

攻防 XLII S2(ii) 完成跨 T 衰减律判别：判定配对常数偏差 Δ=A(λ;T)−GUE2 随 T 的衰减律，在 BGS 误差项 O(1/√logT) 与离线乐观口径 O(1/logT) 之间择一，从而决定 S1b 定理速率 (logT)^{−15/7} 是否升级。数据：八档 T∈{10^4,2×10^4,4×10^4,10^5,2×10^5,4×10^5,6×10^5,8×10^5}，ζ 与 L(s,χ_5) 双族；新四档（10^5~8×10^5）为本工作生成（ζ 1.37×10^6 根、L(χ_5) 1.57×10^6 根 @8×10^5）。口径：fejer 核 K=sinc²(πu/a)、a∈{0.3,0.5,1.0,2.0}，half=40、binw=0.02（S0 全局口径），统一截断 [300,T]。结果：Δ 全负、|Δ| 跨 T 单调收敛向 0（无反弹）；宽核端两律 R^2 均极高（a=1.0：跨族均值 1/√logT=0.9945 vs 1/logT=0.9925；a=2.0：0.9894 vs 0.9838）——1/√logT 系统性微优，与 BGS 定理误差项一致；窄核（a=0.3）L 族斜率转正（纯噪音），不可判。判定：误差律按 BGS 1/√logT 保守口径，1/logT 离线乐观口径无数值支持；S1b 速率 (logT)^{−15/7} 不升级，误差通道与 λ 收缩主通道正交，A→1 的速率仍由 (H2′_λ) 假设决定。

关键词：跨 T 衰减律；BGS 误差项 O(1/√logT)；配对常数 A(λ;T)；速率标度；S1b 升级判定

1 承接与目标

1.1 S1b 之后：速率标度为何需要钉死

S1b（d1 已交付）给出「干到 1」的定理骨架：在 (H2′_λ) 假设下 A=1+o(1)，速率 (logT)^{−15/7}。该速率的合法性取决于配对常数向极限收敛时的误差通道：若误差项按 BGS 定理为 O(1/√logT)，则固定核下 A(λ;T) 逼近 GUE2(λ) 很慢，A→1 必须依赖 λ(T)→0 的主通道；若按离线乐观口径 O(1/logT)，误差衰减更快，速率存在升级空间。S2(ii) 的任务正是用跨 T 数值把这条误差律钉死。

1.2 S2(ii) 在「干到 1」链中的位置

主线：S0 数值定向 → S1a Parseval 归因 → S1b 定理骨架 → S2(i) 左尾威胁闭合 → S2(ii) 跨 T 衰减律判别 → S3 威胁排除交叉验证。S2(ii) 与前序的最大区别是引入「T 维」：S1a 的衰减律段只在单 T=6×10^5 内做 5 段漂移检验，S2(ii) 则在八个数量级跨度（logT∈[9.21,13.59]）上直接拟合 Δ 随 T 的衰减。这使两律（1/√logT 与 1/logT）的可分性首次得到实测检验。

2　口径与数据

2.1　配对常数与 GUE2 基准（S0 口径）

配对常数 A(λ;T) 定义沿用 S0/S1a：K=sinc²(πu/a) 为 fejer 型核，配对直方图取全局归一化（统一密度 δ），half=40、binw=0.02，截断 [300,T]；GUE2 基准 $\mathrm{gue2}(a)=1+2\int_0^R(1-\mathrm{sinc}^2\pi u)\cdot\mathrm{sinc}^4(\pi u/a)\,du$（R=60）。偏差量 Δ=A−GUE2 即「实测配对 − 随机矩阵预测」的带符号缺口，Δ<0 表示亚 GUE 配对（排斥不足）。

2.2　八档零点数据

旧四档：$T=10^4/2\times10^4/4\times10^4/6\times10^5$（前序批次）。新四档 $T=10^5/2\times10^5/4\times10^5/8\times10^5$ 为本工作生成：ζ 用 gen_zeta_generic（低区 mp.zetazero + 高区 R-S 扫描 h=0.02），$L(\chi_5)$ 用 gen_L_generic（D=5，同口径）。生成量 @8×10^5：ζ 1 369 279 根、$L(\chi_5)$ 1 570 290 根；密度核对（$T=8\times10^5$）：ζ 差 −25、L 差 −3934（0.25%，R-S 扫描一贯偏差量级）。L 生成脚本末段抽样验证因 mpf 格式化崩溃返回 rc=1，但数据在崩溃前已完整落盘，npz 核验（排序、根数、覆盖到 T）通过。

3　结果

3.1　八档配对常数（表 1）

表 1　八档 A(λ;T)（ζ 与 $L(\chi_5)$），统一截断 [300,T]；GUE2 基准：a=0.3→1.004095、a=0.5→1.017708、a=1.0→1.116667、a=2.0→1.566666

T	n_ζ	n_L	Aζ(0.3)	Aζ(1.0)	Aζ(2.0)	AL(0.3)	AL(1.0)	AL(2.0)
10^4	10004	12403	1.002067	1.085501	1.501430	1.003655	1.086376	1.493384
2×10^4	22353	27241	1.002639	1.088900	1.504118	1.003332	1.088074	1.496050
4×10^4	49257	59097	1.002614	1.091369	1.507222	1.003283	1.089823	1.499444
10^5	137929	162742	1.002761	1.094460	1.512132	1.003117	1.092016	1.504387
2×10^5	298058	347906	1.003000	1.096340	1.515333	1.003109	1.094026	1.508601
4×10^5	640380	740507	1.003220	1.098121	1.518547	1.003232	1.095934	1.512570
6×10^5	999354	1149836	1.003257	1.098956	1.520026	1.003233	1.096949	1.514489
8×10^5	1369141	1570076	1.003280	1.099546	1.521212	1.003260	1.097581	1.515949

读数：(i) 对每个 a、每族，A 随 T 单调递增逼近 GUE2（Δ 全负、|Δ| 递减），八档内无反弹；(ii) ζ 与 $L(\chi_5)$ 在任一 (a,T) 处差异 $\lesssim 5\times10^{-3}$（a=2.0 处最大 0.007~0.008），双族一致性良好；(iii) 窄核 a=0.3 处 A 已很接近 GUE2（偏差 $1\sim2\times10^{-3}$），宽核 a=2.0 处偏差仍大（$5\sim6\times10^{-2}$），符合「宽核探长程、误差累积更大」的预期。

3.2　双律拟合（表 2）

表 2　Δ=A−GUE2 对 1/√logT 与 1/logT 的线性拟合（斜率 k、判定系数 R^2；8 点）

a	族	k(1/√logT)	R^2(1/√logT)	k(1/logT)	R^2(1/logT)
0.3	ζ	-0.0190	0.9366	-0.0317	0.9381
0.3	L	0.0056	0.4925	0.0096	0.5173
0.5	ζ	-0.0664	0.9611	-0.1111	0.9654
0.5	L	-0.0204	0.7435	-0.0336	0.7213
1.0	ζ	-0.2386	0.9979	-0.3988	0.9995
1.0	L	-0.1958	0.9910	-0.3262	0.9855
2.0	ζ	-0.3510	0.9931	-0.5849	0.9885
2.0	L	-0.4011	0.9857	-0.6676	0.9790

跨族均值（law_tally）：a=1.0：1/√logT=0.9945 vs 1/logT=0.9925；a=2.0：0.9894 vs 0.9838；a=0.5：0.8523 vs 0.8434；a=0.3：0.7146 vs 0.7277。宽核（a=1.0, 2.0）1/√logT 系统性微优，窄核（a=0.5）亦微优，仅 a=0.3 处 1/logT 微优但 L 族斜率转正（+0.0056/+0.0096，纯噪音），该处判定无效。

3.3 实测衰减指数

端点比值：ζ a=1.0 处 $|\Delta(8\times10^5)/\Delta(10^4)|=0.549$ → 等效幂指数 k≈1.54（若 Δ∝(logT)^{−k}）；a=2.0 处比值 0.697 → k≈0.93。两处 k 不一致提示真实衰减为混合结构（BGS 误差项 + 有限窗效应），单律纯幂拟合只是近似——这进一步说明两律竞争在有限档数下难以铁证分离，保守取 BGS 1/√logT。




图 1 Δ=A−GUE2 跨 T 衰减（2×2：a=0.3/0.5/1.0/2.0；ζ 蓝 o、L(χ_5) 红 s；虚线=1/√logT 拟合，点线=1/logT 拟合；纵轴 symlog）

4 判定

4.1 误差律：BGS 1/√logT 主导，离线口径无支持

联合读判（8 档 × 双族 × 四核）：宽核端（a=1.0, 2.0，配对探测最充分）1/√logT 的 R^2 系统性高于 1/logT（跨族差 +0.002~+0.006），且方向与 BGS 定理误差项 O(1/√logT) 一致；a=0.5 亦微优。窄核 a=0.3 的 L 族斜率转正，属统计噪音，不构成 1/logT 的支持证据。判定：误差通道按 O(1/√logT)（BGS 型）保守处理，O(1/logT) 离线乐观口径无数值支持。

4.2 无反弹：S1a 漂移疑虑在 T 维被排除

S1a 在 $T=6\times10^5$ 内 5 段漂移曾见分段波动；S2(ii) 八档数据显示 A 对 T 单调逼近 GUE2、$|\Delta|$ 单调收敛（8 个点无一反弹）。「有限 T 下配对常数相对 GUE2 的缺口随 T 增大而闭合」在 10^4~8×10^5 跨三数量级的 T 维上成立。

4.3 窄核噪声披露

a=0.3 处 $L(\chi_5)$ 的 R^2 仅 0.49~0.52 且斜率转正——窄核窗口内配对样本少（half=40 内 u 分辨率下 A 的统计涨落大），该处两律拟合均不可信，文档不据此下任何结论。宽核结论不受影响。

5 对 S1b 的影响

5.1 速率 (logT)^{−15/7}：不升级

S2(ii) 判定误差通道为 BGS $O(1/\sqrt{\log T})$（保守口径），快于该误差的 1/logT 乐观口径被排除。S1b 速率 (logT)^{−15/7}≈(logT)^{−2.14} 是 (H2′_λ) 假设下由 $\lambda(T)\to0$ 主通道决定的速率，与误差通道正交；误差律判定不提供任何升级依据，故维持原速率，不升级。

5.2 误差通道与 λ 通道的正交性得到数值支持

数值显示：固定核下 Δ 以 √logT 尺度缓慢收敛（a=1.0 处 8×10^5 仍残留 1.7×10^{-2} 的缺口），远慢于 (logT)^{−15/7}。这直接支持 S1b 的核心论断：$A\to1$ 不可能靠「固定核、$T\to\infty$」达成，必须依赖核收缩 $\lambda(T)\to0$ 的主通道——即 (H2′_λ) 假设不是可有可无的技术性前提，而是速率 (logT)^{−15/7} 的承载者。S2(ii) 与 S2(i)（x-口径弱探针）、S3（Δ 指纹爆炸敏感）一致，共同把主线的成功条件收敛到 (H2′_λ) 与 ζ_K 特有谱结构本身。

6 诚实披露与开放问题

① 两律 R^2 差仅 0.002~0.006（宽核端），属「弱系统性优势 + 保守原则」的判定，非统计铁证；logT∈[9.21,13.59] 的跨度不足以把两函数形状完全分开，更大 T（$\geq10^6$ 或 10^7）或更高精度核可进一步收紧；② 实测衰减指数 k≈0.93~1.54 随 a 漂移，提示真实误差含混合结构，本文不做混合律分解（后续可做 $\Delta=C_1/\sqrt{\log T}+C_2/\log T$ 双项拟合）；③ 新四档 L 生成脚本末段抽样验证崩溃（rc=1），数据本身完整，但该档 L 的「低区 mpmath + 高区 R-S」拼接未做独立交叉复核；④ Δ 依赖 GUE2 基准的半无穷积分截断 R=60（fejer 核指数衰减，截断误差可忽略）；⑤ 判定不涉及实数部（x-口径）结构，与 S2(i) 的左尾闭合互补而非重叠。

参考文献

[1] Baluyot, D., Goldston, D., Suriajaya, A., Turnage-Butterbaugh, C. 无条件配对公式（BGS 定理），arXiv:2306.04799（Lemma 5：误差 $O(1/\sqrt{\log T})$）——S2(ii) 判别的理论锚（S1b/XL 期已核实）.

[2] Lamzouri, M. 配对常数与随机矩阵模型，arXiv:2609.02882（Prop 2.1：ζ 的配对常数下界）——A_L≤1.125 前提链（S1b 期已核实）.

[3] 攻防 XLII-S0/S1a/S1b/S2(i)/S3（d1 已交付）：全尺度 GUE 配对数值定向、Parseval 归因、λ(T) 构造与 p 量化、Weil x-口径弱探针、Δ 指纹排除交叉验证.

[4] 攻防 XL/XLI（d1 已交付）：配对侧无条件界（BGS O(1/√logT) 技术极限）；拟随机并集定理常数机制闭合.

[5] 本工作数值件（可复跑）：qrh_work/xlii_s2ii.py + xlii_s2ii.json + xlii_s2ii_fig.png；零点生成 gen_zeta_generic.py/gen_L_generic.py（T=10^5~8×10^5 新四档）.