Table 1. Baseline characteristics of NHANES 2011-2014 adults with valid accelerometry, by device-measured activity quartile

variable	Overall	Q1	Q2	Q3	Q4
N	7,854	1,964	1,963	1,963	1,964
Deaths	769	465	160	89	55
Age, years	50.8 (0.3)	59.4 (0.5)	51.5 (0.5)	48.0 (0.4)	44.6 (0.5)
Female, %	52.9 (0.8)	44.8 (1.3)	50.4 (1.0)	57.0 (1.7)	59.0 (1.5)
BMI, kg/m2	29.3 (0.1)	30.6 (0.3)	29.8 (0.2)	28.8 (0.3)	28.0 (0.2)
Systolic BP, mmHg	122.8 (0.4)	126.7 (0.8)	124.1 (0.6)	120.7 (0.5)	119.6 (0.5)
Poverty-income ratio	3.02 (0.1)	2.91 (0.1)	3.24 (0.1)	3.17 (0.1)	2.72 (0.1)
Current smoker, %	19.1 (0.8)	19.4 (1.4)	17.5 (1.4)	18.8 (1.4)	20.8 (1.6)
Alcohol drinker, %	73.7 (1.2)	73.6 (1.5)	75.0 (1.8)	73.4 (1.3)	72.9 (1.6)
Diabetes, %	10.9 (0.4)	20.4 (1.4)	12.1 (0.7)	7.7 (0.8)	4.0 (0.5)
Cardiovascular history, %	8.6 (0.3)	19.6 (0.9)	8.3 (0.7)	3.8 (0.5)	3.5 (0.4)
Self-reported MET-min/week	3079 (103.8)	1714 (105.1)	2627 (129.7)	3358 (162.5)	4570 (181.1)
Device MIMS/day	13332 (58.9)	8946 (38.8)	11957 (24.0)	14266 (20.6)	17994 (73.3)

Weighted means (SE) using NHANES MEC 4-year weights; N and Deaths are unweighted counts. Q1 = lowest activity quartile. Deaths are counted among the 7,842 participants with linked mortality follow-up; 12 participants had no mortality linkage and contribute to N only.