

第3章 溶液中的化学平衡



本章学习要点

知识要点	掌握程度	相关知识
水的性质和稀溶液的依数性	了解水的性质、稀溶液性质的原理及应用。	水的性质和应用，稀溶液蒸汽压下降、沸点上升、凝固点下降和渗透压。
酸碱理论	掌握酸碱质子理论、酸碱电子理论，理解共轭酸碱概念及其关系。	酸碱质子理论、酸碱电子理论，共轭酸碱对。
弱电解质离解平衡	明确弱酸（碱）离解平衡和缓冲溶液的概念，掌握化学平衡和缓冲溶液的有关计算。	水的离解平衡、一元弱酸（弱碱）溶液中浓度计算、同离子效应、缓冲溶液
难溶电解质的沉淀溶解平衡	掌握溶度积和溶解度的基本计算，了解溶度积规则及其应用。	溶度积、溶解度及其相互转换，溶度积规则，分步沉淀，沉淀溶解与转化
配合物和配离子的离解平衡	了解配合物的组成，学会配合物的基本命名和书写方法，了解配合物的离解平衡及平衡移动等。	配合物解离平衡移动，配合物的应用等。

本章主要内容

§3.1 水的性质和稀溶液的依数性

§3.2 酸碱理论

§3.3 弱电解质的离解平衡

§3.4 难溶电解质的沉淀溶解平衡

§3.5 配位化合物和配离子的离解平衡



吉布斯相律

自由度 = 组分数 - 相数 + 2 (温度、压力)

思考题：单组份最多几个相？




Figure 11.6 Phase diagram for simple compressible substance.

液体结构重要概念：粒子分布得到的密度修正函数 g
也叫做关联函数、概率密度函数

$$\rho^{(n)}(r_1, \dots, r_n) = \rho^n g^{(n)}(r_1, \dots, r_n)$$

双粒子之间的密度修正函数可由光散射实验测定
也叫径向分布函数 radial distribution function RDF




Figure 9.1 Radial distribution function for crystal structures.

固体：晶格、玻璃态
声子、热容

液体：壳层结构





Figure 9.2 Radial distribution function for liquids.

蒸汽压


实验测量了不同温度下的水蒸气压力，根据下图计算相变焓。(torr 毫米汞柱压力)

Temperature (degrees C)	Vapor Pressure (torr)
0	4.6
10	9.2
20	17.5
30	31.8
40	55.3
50	92.5
60	149
70	234
80	355
90	526
100	760



实验测量了不同温度下的水蒸气压力，根据下图计算相变焓。(torr 毫米汞柱压力)

Temperature (degrees C)	Vapor Pressure (torr)
0	4.6
10	9.2
20	17.5
30	31.8
40	55.3
50	92.5
60	149
70	234
80	355
90	526
100	760



$$p^* = p^* e^{-RT}$$

在数据中取2个 40°C ~ 50 Torr


80°C ~ 550 Torr

$$\frac{P_1}{P_2} = e^{-\frac{\Delta H}{R} \left(\frac{1}{273+40} - \frac{1}{273+80} \right)}$$



$$\frac{1}{7} = e^{-\frac{\Delta H}{R} (3.62 \times 10^{-4})}$$

$$\Delta H = - \frac{\ln\left(\frac{1}{7}\right) \cdot R}{3.62 \times 10^{-4}} = 44.69 \text{ kJ/mol}$$

水的凝固点随压力上升下降



$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial p} \right)_T = V_m$$




加压对蒸汽压的影响

$$\ln \frac{p}{p^*} = \frac{V_{\text{m}}(\text{l})}{RT} \Delta P$$

温度的影响

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta_{\text{trs}} S}{\Delta_{\text{trs}} V}$$


固液：



$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta_{\text{trs}} S}{\Delta_{\text{trs}} V}$$

$$p \approx p^* + \frac{\Delta_{\text{fus}} H}{T^* \Delta_{\text{fus}} V} (T - T^*)$$

气液



$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{T(RT/p)}$$

$$\frac{d \ln p}{dT} = \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{RT^2}$$

§ 3.1 水的性质和稀溶液的依数性


3.1.1 水的性质和应用

廉价溶剂


氢键而发生缔合

4°C 时密度最大

水的团簇结构




水团簇的稳定结构




冰的结构


微弱解离



298.15K 时, $K_w = \{c(\text{H}^+)/c^\ominus\} \{c(\text{OH}^-)/c^\ominus\} = 1.0 \times 10^{-14}$

水的三相变化





在气液平衡时：

气体称为饱和蒸气；

液体称为饱和液体；

饱和蒸气的压力称为饱和蒸气压。

饱和蒸气压 = 外压时，液体沸腾，此时的温度称为沸点。
饱和蒸气压 = 1 个大气压时的沸点称为正常沸点。在沸腾时，液体表面及内部分子同时汽化。

饱和蒸气压首先由物质的本性决定。对于同一种物质，它是**温度**的函数，随温度升高而增大。

表 3.1 水、乙醇和苯在不同温度下的饱和蒸气压


水		乙 醇		苯	
$t / ^\circ\text{C}$	p^* / kPa	$t / ^\circ\text{C}$	p^* / kPa	$t / ^\circ\text{C}$	p^* / kPa
20	2.338	20	5.671	20	9.9712
40	7.376	40	17.395	40	24.411
60	19.916	60	46.008	60	51.993
80	47.343	78.4	101.325	80.1	101.325
100	101.325	100	222.48	100	181.44
120	198.54	120	422.35	120	308.11

为什么糖水比纯水
蒸发的慢？



3.1.2 溶液的蒸汽压下降

溶液蒸汽压小于同一温度下纯溶剂蒸汽压的现象叫做溶液的蒸汽压下降。



$$\Delta p = p_A^* - p = p_A^* - p_A^* x_A = p_A^* (1 - x_A) = p_A^* x_B$$

式中， x_B - 溶质 B 的摩尔分数， p_A^* - 纯溶剂的蒸汽压

氯化钙 (CaCl_2) , 五氧化二磷 (P_2O_5)干燥剂原理



这是因为这些物质具有强吸水性，能使其表面形成的溶液的蒸气压显著下降，当低于空气中水蒸气的分压时，空气中的水蒸气可不断凝聚进入溶液，即这些物质可不断的吸收水蒸气。

判断题


1. 水的蒸气压就是水在标况下的蒸气压。 (×)
2. 相同温度下，纯溶剂的蒸气压大于溶液蒸气压 (√) 。
3. 水的蒸气压的实质是水的蒸汽分子和其液体分子平衡状态的
气压。 ()

3.1.3 溶液的沸点升高和凝固点下降

1. 沸点升高

定义：沸点为液体饱和蒸气压等于外压时的温度。

在外压 $p^\ominus$ (101.325kPa) 下的沸点为**正常沸点**。



若在纯溶剂 A 中加入不挥发的溶质 B，由于溶液的蒸气压 < 纯溶剂 A 在同温度的蒸气压。所以其蒸气压曲线 oc 在纯 A 蒸气压曲线 o^*c^* 下方。

在一定的外压下，纯液态沸腾的温度要低于溶液沸腾温度。

$$\Delta T_b = T_b - T_b^* > 0 \quad \text{称为沸点升高。}$$


稀溶液的沸点升高值 ΔT_b 与溶液的组成 b_B 的关系式，
可用热力学原理推导得出：

$$\Delta T_b = K_b b_B$$

K_b 称为沸点升高系数，单位为 $\text{K} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{kg}$

溶液的沸点升高

为什么在钢铁发黑工艺中所用的氧化液，加热至 140°C - 150°C 也不沸腾呢？



MINIONS


2. 凝固点下降

凝固点定义：在一定外压下，液态物质被冷却而开始析出固体的平衡温度，称为该液态物质的**凝固点**。若外压为标准压力，则该平衡温度为标准凝固点。

当溶剂 A 中有少量溶质 B 形成稀溶液，则溶液的凝固点，低于纯 A 在同外压下的凝固点。此即凝固点下降现象。



$$T_f < T_f^*$$



T_f^* 为纯液体 A 、纯固态 A 蒸气压相等的温度与压力。

对应的温度 T_f^* 为纯溶剂的凝固点。

T_f 对应于溶液中溶剂 A 的蒸气压与固态蒸气压相等的温度与压力。
对应的温度 T_f 为溶液的凝固点。

由图可见，

$$\Delta T_f = T_f^* - T_f > 0$$

稀溶液的凝固点降低

应用热力学原理，可推导出凝固点降低值与溶液组成的定量关系

$$\Delta T_f = T_f^* - T_f = k_f \cdot b_B$$

K_f 称为凝固点降低系数，单位是 $\text{K} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{kg}$

实际应用例子

为什么汽车水箱加入乙二醇可以防冻？

文献记载：当防冻液中乙二醇的含量为 60% 时，冰点可降低至 -48.3°C



为什么融雪剂
可以融雪？



[例 3.1] 在 25.0 g 苯中溶入 0.245 g 苯甲酸，测得凝固点降低 $\Delta T_f = 0.2048 \text{ K}$ 。试求苯甲酸在苯中的分子式。

解：由表查得苯的 $K_f = 5.10 \text{ K} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{kg}$ ，由：
$$\Delta T_f = K_f b_B \quad (4.7.4b)$$


$$\therefore \Delta T_f = K_f \cdot b_B = \frac{K_f m_B / M_B}{m_A}$$

$$\therefore M_B = \frac{K_f m_B}{m_A \Delta T_f} = \frac{5.10 \text{ K} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{kg} \times 0.245 \text{ g}}{25.0 \text{ g} \times 0.2048 \text{ K}} = 0.244 \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$$

已知，苯甲酸 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ 的摩尔质量为 $0.122 \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，故苯甲酸在苯中的分子式为： $(\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH})_2$ 。


■ 问题

■ 为什么人体输液需用 0.9% 生理盐水？




渗透压

由荷兰化学家范 特霍夫提出，任何溶液都有渗透压，但若没有用半透膜来分隔溶液与纯溶剂，渗透压即无法表现出来。




3.1.4 渗透压

在一定温度下，用半透膜将**纯溶剂**与**溶液**分开。**溶剂**会通过半透膜扩散到溶液中，使溶液液面上升，直到达到平衡，渗透才停止。



这种**对于溶剂的膜平衡**，叫作**渗透平衡**。

在渗透之前，在溶液液面上施加一相当于液面所产生的额外压力，恰能使渗透作用达到平衡，则称这个外压为**渗透压**。用符号 Π 表示。



$$\Pi V = n_B RT$$

或：


$$\Pi = c_B RT$$

应用实例

反渗透

为什么要用 0.9 % 的生理盐水

一、动物细胞的吸水和失水



外界溶液浓度
小于
细胞质浓度
细胞吸水膨胀

外界溶液浓度
大于
细胞质浓度
细胞失水皱缩

外界溶液浓度
等于
细胞质浓度
保持原状态

水由 低 浓度溶液流向 高 浓度溶液

渗透作用

人体的内环境存在一个稳态，也就是渗透压平衡。0.9% 的生理盐水和人体血浆的渗透压接近，能够维持细胞生理功能。

本节小结：

难挥发、非电解质、稀溶液通性的计算公式：

$$\Delta p = p_A^* - p = p_A^* - p_A^* x_A = p_A^* (1 - x_A) = p_A^* x_B$$

$$\Delta T_b = K_b \cdot b_B$$

$$\Delta T_f = K_f \cdot b_B$$

$$\Pi = c_B RT \approx b_B RT$$

溶液混合会改变单质液体的性质

理想溶液 (Raoult)




Fig. 5.1 The partial molar volumes of water and ethanol at 25°C. Note the different scales (water on the left, ethanol on the right).




Fig. 5.11 The total vapour pressure and the two partial vapour pressures of an ideal binary mixture are proportional to the mole fractions of the components.




Fig. 5.12 Two similar liquids, in this case benzene and methylbenzene (toluene), behave almost ideally, and the variation of their vapour pressures with composition resembles that for an ideal solution.




Fig. 5.13 A pictorial representation of the molecular basis of Raoult's law. The large spheres represent solvent molecules at the surface of a solution (the uppermost line of spheres), and the small spheres are solute molecules. The latter hinder the escape of solvent molecules into the vapour, but do not hinder their return.

$$p_A = x_A p_A^*$$

稀溶液 (Henry)





Fig. 5.14 Strong deviations from ideality are shown by dissimilar liquids (in this case carbon disulfide and acetone, propanone).




Fig. 5.15 When a component (the solvent) is nearly pure, it has a vapour pressure that is proportional to mole fraction with a slope p_B^* (Raoult's law). When it is the minor component (the solute) its vapour pressure is still proportional to the mole fraction, but the constant of proportionality is now K_B (Henry's law).

依数性 (Colligative properties)

蒸汽压下降

化学势下降

熔点下降

沸点上升

渗透压

活度

$$p_A = x_A p_A^*$$

$$\mu_A^*(g) = \mu_A^*(l) + RT \ln x_A$$

$$\ln(1 - x_B) = \frac{\Delta_{\text{vap}}H}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T^*} \right)$$

$$\Delta T = K x_B$$

$$K = \frac{RT^{*2}}{\Delta_{\text{vap}}H}$$

$$\Delta T = K' x_B$$

$$K' = \frac{RT^{*2}}{\Delta_{\text{fus}}H}$$

$$\mu_A^*(p) = \mu_A(x_A, p + \Pi) = \mu_A^*(p + \Pi) + RT \ln x_A$$

$$-RT \ln x_A = \int_p^{p+\Pi} V_m dp$$

$$RT x_B = \Pi V_m$$




Fig. 5.21 The chemical potential of a solvent in the presence of a solute. The lowering of the liquid's chemical potential has a greater effect on the freezing point than on the boiling point because of the angles at which the lines intersect.

100g 水溶解 29g NaCl 所形成溶液，在 100°C 时蒸汽压为

82900Pa ，求此溶液在 100°C 时渗透压。

(100°C 时水的比重 1.043 cm³/g)

某水溶液凝固点 -15°C ，求该溶质的活度和渗透压

二元混合物





Fig. 6.14 The temperature–composition diagram corresponding to an ideal mixture with the component A more volatile than component B. Successive boilings and condensations of a liquid originally of composition a_1 lead to a condensate that is pure A. The separation technique is called fractional distillation.




Fig. 6.16 A high-boiling azeotrope. When the liquid of composition a is distilled, the composition of the remaining liquid changes towards b but no further.





Fig. 6.17 A low-boiling azeotrope. When the mixture at a is fractionally distilled, the vapour in equilibrium in the fractionating column moves towards b and then remains unchanged.

冷凝、区域熔炼提纯半导体工业用高纯硅

共沸

A、B = 组分完全互溶双液系统，在 $p^\circ = 100000 \text{ Pa}$ 时，其相图如下。求：(1) 75°C 时，组分 A 的 P_A^* ；(2) 组分 B 之亨利系数 k_x ；(3) 组分 A 之汽化焓（设不随温度变化，理想气体）



(1) A 组分 75°C 时，

$$\text{气态压力 } P_A = 1 \times 10^5 \times (1 - 0.2) = 80 \text{ kPa}$$

$$\text{液态浓度 } x_A = 1 - x_B = 0.96$$

$$P_A^* = \frac{P_A}{x_A} = \frac{80 \text{ kPa}}{0.96} = 83.3 \text{ kPa}$$

(2) B 组分 75°C 时

$$\text{气相压力 } P_B = 1 \times 10^5 \times 0.2 = 20 \text{ kPa}$$

$$\text{液相浓度 } x_B = 0.04$$

$$\text{亨利系数 } k_x = \frac{P_B}{x_B} = 500 \text{ kPa}$$

[注意: A 为溶剂, B 为溶质]
稀溶液

(3)

$$P = A \cdot e^{-\frac{\Delta H_m^{\text{vap}}}{RT}}$$

$$75^\circ\text{C} \text{ 时, } P^* = 83.3 \text{ kPa}$$

$$80^\circ\text{C} \text{ 时 } p^* = 100 \text{ kPa}$$

$$\ln\left(\frac{100}{80} \cdot 0.96\right) = -\frac{\Delta H_m^{\text{vap}}}{R} \left(\frac{1}{300 \text{ K}} - \frac{1}{298 \text{ K}}\right)$$

$$\Delta H_m^{\text{vap}} = 37.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

1 . 1.00 克非电解质溶于 20.0 克水中，测定冰点是 -0.50°C ，该非电解质的相对分子量是（ ）（ $K_f = 1.86$ ）

$$\Delta T_f = K_f \cdot b(B)$$

(A) $1.86 / (0.50 \times 0.20)$

(B) $1.86 / (0.50 \times 20.0)$

(C) $0.50 \times 20.0 / 1.86$

(D) $1.86 / (0.50 \times 0.020)$

2. **相同质量**的蔗糖和葡萄糖分别溶解于相同体积的水中，所得溶液的渗透压（ **B** ）蔗糖

($C_{12}H_{22}O_{11}$) 葡萄糖 ($C_6H_{12}O_6$)

(A) 前者大于后者

(B) 后者大于前者

(C) 两者相同

(D) 不能判断

【例】： 将 12.0g 尿素 $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$ 和 34.2g 蔗糖 ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) 分别溶于 2000g 水中 , 计算此两种溶液的沸点 ($K_b=0.52\text{K}\cdot\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$)

解： $M_{\text{尿素}} = 60 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

$$b(\text{B}) = [12.0/(60\times 2000)] \times 1000 = 0.1\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}$$

$$\Delta T_b = K_b \cdot b_B = 0.52 \times 0.1 = 0.052 \text{ (K)}$$

$$T_{b \text{ 尿}} = 373.15_{(\text{沸点})} + 0.052 \approx 373.2 \text{ (K)}$$

同理，蔗糖的 $M = 342 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

$$b(\text{蔗糖}) = [34.2 / (342 \times 2000)] \times 1000 = 0.05 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$$

$$\Delta T_{b \text{ 蔗}} = K_b \cdot b_B = 0.52 \times 0.05 = 0.026 (\text{K})$$

$$T_{b \text{ 蔗}} = 373.15 \text{ (沸点)} + 0.026 \approx 373.18 (\text{K})$$

【例】：若将 12.0g 尿素 $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$ 和 34.2g 蔗糖
($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) 都加于 2000g 水中，计算此溶液的沸点
($K_b = 0.52 \text{ K} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$)

$$\Delta T_b = 0.52 \times (0.1 + 0.05) = \Delta T_{b \text{ 尿}} + \Delta T_{b \text{ 蔗}} = 0.078 \text{ K}$$

结论：依数性存在加和性

3.1.5. 溶液的通性

难挥发的非电解质稀溶液的蒸汽压下降、沸点上升、凝固点下降和溶液渗透压，通称为稀释定律。

对于电解质溶液，由于解离出的离子间、离子与溶剂分子间相互作用增大，上述定律的定量关系被破坏了，但是电解质溶液与非电解质稀溶液一样仍具有上述四种性质，其数值仍是随着溶质的粒子数目增多而增大，这就是溶液的通性。

溶液中的电解质理论






Fig. 5.33 The picture underlying the Debye-Hückel theory is of a tendency for anions to be found around cations, and of cations to be found around anions (one such local clustering region is shown by the circle). The ions are in ceaseless motion, and the diagram represents a snapshot of their motion. The solutions to which the theory applies are far less concentrated than shown here.

$$\mu_+ = \mu_+^{\text{ideal}} + RT \ln \gamma_{\pm} \quad \mu_- = \mu_-^{\text{ideal}} + RT \ln \gamma_{\pm}$$

$$\log \gamma_{\pm} = -|z_+ z_-| A I^{1/2}$$

I：离子强度

$$I = \frac{1}{2}(b_+ z_+^2 + b_- z_-^2)/b^{\oplus}$$



§ 3.2 酸碱理论

酸碱电离理论

酸碱质子理论

酸碱电子理论



§ 3.2 酸碱理论

3.2.1 酸碱电离理论

酸：在**水溶液**中解离产生的阳离子全部是 H^+ 的化合物；



碱：在**水溶液**中解离产生的阴离子全部是 OH^- 的化合物；

酸碱中和反应的实质： H^+ 和 OH^- 结合生成 H_2O 。

3.2.2 酸碱质子理论

酸：是质子 (H^+) 的给予体；

碱：是质子 (H^+) 的接受体。



上式中， HAc 、 NH_4^+ 、 H_2PO_4^- 都能给出质子，都是酸； Ac^- 、 NH_3 、 HPO_4^{2-} 都能接受质子，都是碱。

酸和碱相互依存、互相转化的关系称为**酸碱共轭关系**，酸（或碱）与跟它共轭的碱（或酸）一起被称为**共轭酸碱对**， $\text{HAc}-\text{Ac}^-$ 、 $\text{NH}_4^+-\text{NH}_3$ 都互称为共轭酸碱对。酸及其共轭碱之间的相互关系可用下式表示



使酸碱的适用范围扩展到非水体系，但对于不含质子的物质，如 SO_3 、 CaO 等参加的反应无法解释。

3.2.3 酸碱电子理论

酸： 可接受孤对电子的分子或离子称为，
如 HCl 、 SO_3 。


碱： 可给出孤对电子的分子或离子称为，
如 NH_3 、 CaO 。

§ 3.3 弱电解质的解离平衡

3.3.1 水的解离平衡和溶液的酸碱性

水的解离平衡

纯水或稀溶液中



$$298.15\text{K 时}, K = \{c(\text{H}^+)/c^\theta\} \{c(\text{OH}^-)/c^\theta\} = 1.0 \times 10^{-14} = K_w^\theta$$

溶液的酸碱性

溶液酸碱性	酸性	中性	碱性
$c(\text{H}^+)/\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$>1.0\times 10^{-7}$	1.0×10^{-7}	$<1.0\times 10^{-7}$
$c(\text{OH}^-)/\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$<1.0\times 10^{-7}$	1.0×10^{-7}	$>1.0\times 10^{-7}$

溶液的 pH

$$\text{pH} = -\lg [c(\text{H}^+)/c^\ominus]$$

溶液酸碱性	酸性	中性	碱性
pH	<7	=7	>7

$$\text{pOH} = -\lg [c(\text{OH}^-)/c^\ominus]$$

$$\text{pH} = \text{p}K_{\text{w}} - \text{pOH} = 14 - \text{pOH}$$

pH 越小，溶液酸性越强


pH 越大，溶液碱性越强

3.3.2 弱酸 (弱碱) 的解离平衡



1. 一元弱酸 (弱碱) 的解

离
一元弱酸



$$K_a^\ominus(\text{HAc}) = \frac{[\text{c}(\text{H}^+)/\text{c}^\ominus][\text{c}(\text{Ac}^-)/\text{c}^\ominus]}{[\text{c}(\text{HAc})/\text{c}^\ominus]}$$

简化为

$$K_a^\ominus(\text{HAc}) = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{Ac}^-)}{c(\text{HAc})}$$

一元弱碱



$$K_b^\ominus(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = \frac{c(\text{NH}_4^+)c(\text{OH}^-)}{c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})}$$

解离常数 K^θ 与其他平衡常数一样，在一定温度下与浓度无关；当温度变化时，随温度变化不大。相同浓度下，同类型弱酸，值大者酸性强。

2. 解离度 (α) 和离子浓度计算

$$\text{解离度 } (\alpha) = \frac{\text{弱电解质已解离的浓度}}{\text{弱电解质解离前的浓度}} \times 100\%$$

离子浓度计算



起始浓度 / $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ c 0 0

平衡浓度 / $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $c-c\alpha$ $c\alpha$ $c\alpha$

则

$$K_a^\theta(\text{HAc}) = \frac{c(\text{H}^+)c(\text{Ac}^-)}{c(\text{HAc})} = \frac{c\alpha \cdot c\alpha}{c(1-\alpha)} = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha}$$

当 $c/K_a^\theta \geq 500$ 时，取 $1 - \alpha \approx 1$ ，其误差小于 0.2%，小于测量误差，则有

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a^\theta}{c}}$$

$$c(\text{H}^+) = c\alpha = \sqrt{K_a^\theta c}$$

弱电解质的浓度越稀，解离度越大。这一规律称为**稀释定律**

同理可推出一元弱碱中

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_b^\theta}{c}}$$

$$c(\text{OH}^-) = c\alpha = \sqrt{K_b^\theta c}$$

α 与 c 有关, K^θ 与 c 无关

[例3.2] 计算 $0.100 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ HAc 溶液中 H^+ 的平衡浓度和 HAc 的解离度。 (已知 $K_a^\theta(\text{HAc}) = 1.8 \times 10^{-5}$)

解：设解离平衡时 H^+ 的浓度为 $x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，则有



初始浓度 / $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	0.100	0	0
---	-------	---	---

平衡浓度 / $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$0.100 - x$	x	x
---	-------------	-----	-----

$$K_a^\theta(\text{HAc}) = \frac{c(\text{H}^+)c(\text{Ac}^-)}{c(\text{HAc})}$$

$$1.8 \times 10^{-5} = \frac{x^2}{0.100 - x}$$

[例3.2] 计算 $0.100 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ HAc溶液中 H^+ 的平衡浓度和HAc的解离度。（已知 $K_a^\theta(\text{HAc})=1.8 \times 10^{-5}$ ）

因为 $cK_a^\theta = \frac{0.100}{1.8 \times 10^{-5}} \geq 500$ ，可作近似计算 $0.100-x \approx 0.100$

$$1.8 \times 10^{-5} = \frac{x^2}{0.100}$$

$$x = \sqrt{0.100 \times 1.8 \times 10^{-5}} \approx 1.34 \times 10^{-3}$$


$$c(\text{H}^+) \approx 1.34 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$\alpha = \frac{x}{0.100} \times 100\% \approx \frac{1.34 \times 10^{-3}}{0.100} \times 100\% = 1.34\%$$

或根据稀释定律 $\alpha = \sqrt{\frac{K_a^\theta}{c}} = \sqrt{\frac{1.8 \times 10^{-5}}{0.100}} \times 100\% = 1.34\%$

3. 多元弱电解质的解离平衡

多元弱酸在水溶液中**分步解离**



$$K_{a1}^{\ominus} = \frac{[\text{c}(\text{H}^+)/\text{c}^{\ominus}][\text{c}(\text{HS}^-)/\text{c}]}{[\text{c}(\text{H}_2\text{S})/\text{c}^{\ominus}]} = 1.1 \times 10^{-7}$$

$$K_{a2}^{\ominus} = \frac{[\text{c}(\text{H}^+)/\text{c}^{\ominus}][\text{c}(\text{S}^{2-})/\text{c}^{\ominus}]}{[\text{c}(\text{HS}^-)/\text{c}^{\ominus}]} = 1.3 \times 10^{-13}$$

分级解离常数逐级减小

因

$$K_{a1}(\text{H}_2\text{S}) \gg K_{a2}(\text{HS}^-), \text{ 故 } c(\text{H}^+) = c(\text{H}^+)_1 + c(\text{H}^+)_2 \approx c(\text{H}^+)_1$$

$$c(\text{HS}^-) = c(\text{HS}^-)_1 - c(\text{HS}^-)_2 \approx c(\text{HS}^-)_1$$

$$c(\text{S}^{2-}) = c(\text{S}^{2-})_2$$

多元弱酸的强弱主要取决于


$$K_{a1}^{\ominus}$$



[例3.3] 计算常温、常压下, $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{S}$ 饱和溶液中 $c(\text{H}^+)$ 、 $c(\text{S}^{2-})$ 和 H_2S 的解离度。

(已知 $K_{\text{a1}}^\theta(\text{H}_2\text{S})=1.1\times 10^{-7}$, $K_{\text{a2}}^\theta(\text{H}_2\text{S})=1.3\times 10^{-13}$)

解: 由于 $K_{\text{a1}}^\theta(\text{H}_2\text{S}) \gg K_{\text{a2}}^\theta(\text{H}_2\text{S})$, 因此可根据一级解离平衡计算。
设解离平衡时 H^+ 的浓度为 $x\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 则有



初始浓度 / $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	0.10	0	0
---------------------------------------	------	---	---

平衡浓度 / $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$0.10-x$	x	x
---------------------------------------	----------	-----	-----

$$\text{又 } c/K_{\text{a1}}^\theta = \frac{0.10}{\frac{1.1\times 10^{-7}}{c(\text{H}^+)c(\text{HS}^-)}} \geq 500 \quad 0.10-x \approx 0.10$$
$$K_{\text{a1}}^\theta(\text{H}_2\text{S}) = \frac{c(\text{H}^+)c(\text{HS}^-)}{c(\text{H}_2\text{S})} = \frac{x^2}{0.10-x} \approx \frac{x^2}{0.10} = 1.1\times 10^{-7}$$

则 $x=1.0\times 10^{-4}$, $c(\text{H}^+)=1.0\times 10^{-4}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

$c(\text{S}^{2-})$ 可根据二级解离平衡计算

$$K_{a2}^{\theta}(\text{H}_2\text{S}) = \frac{c(\text{H}^+)c(\text{S}^{2-})}{c(\text{HS}^-)}$$
$$c(\text{S}^{2-}) = K_{a2}^{\theta}(\text{H}_2\text{S}) \frac{c(\text{HS}^-)}{c(\text{H}^+)}$$

因为 $K_{a2}^{\theta}(\text{H}_2\text{S}) \ll K_{a1}^{\theta}(\text{H}_2\text{S})$, 所以 $c(\text{HS}^-) \approx c(\text{H}^+)$, 而 $c(\text{S}^{2-}) \approx K_{a2}^{\theta}(\text{H}_2\text{S})c^{\theta} = 1.3 \times 10^{-13} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_{a1}^{\theta}}{c/c^{\theta}}} = \sqrt{\frac{1.1 \times 10^{-7}}{0.10}} \times 100\% = 1.04\%$$

计算结果表明, 二元弱酸溶液中酸根离子浓度 $c(\text{S}^{2-})$ 近似等于 K_{a2}^{θ} , 与弱酸的浓度关系不大。

3.3.3 同离子效应和缓冲溶液

1. 同离子效应




在弱电解质 HAc 溶液中，加入易溶的强电解质 NaAc，由于 NaAc 全部解离，产生 Na^+ 和 Ac^- ，使溶液中的 Ac^- 增多，从而使 HAc 的解离平衡向左移动，HAc 的解离度降低。

这种在弱电解质溶液中加入含有相同离子的易溶强电解质，使弱电解质解离度降低的现象，称为同离子效应。

[例 3.4] 在 $0.100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{HAc}$ 溶液中，加入 NaAc 固体，使其溶解后的浓度为 $0.100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，求混合溶液中 $c(\text{H}^+)$ 和 HAc 的解离度。

解：由于 NaAc 为强电解质，在溶液中完全解离，则其解离出的 Ac^- 浓度为 $0.100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。设平衡时 $c(\text{H}^+) = x \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，则



初始浓度 / $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

0.100

0

0.100

平衡浓度 / $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

$$K_a^\theta(\text{HAc}) = \frac{c(\text{H}^+)c(\text{Ac}^-)}{c(\text{HAc})} = \frac{x(0.100+x)}{0.100-x}$$

$$1.8 \times 10^{-5} = \frac{x \times (0.100+x)}{0.100-x}$$

因为 $\frac{0.100}{1.8 \times 10^{-5}} \geq 500$ ，再加上 NaAc 的加入，大大抑制了 HAc 的解离，使得 $x \ll 0.100$ ，从而 $0.100+x \approx 0.100$ ， $0.100-x \approx 0.100$

[例 3.4] 在 $0.100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{HAc}$ 溶液中，加入 NaAc 固体，使其溶解后的浓度为 $0.100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，求混合溶液中 $c(\text{H}^+)$ 和 HAc 的解离度。

所以 $x=1.8\times 10^{-5}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $c(\text{H}^+)=1.8\times 10^{-5}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

$$\alpha_2 = \frac{x}{0.100} \times 100\% = \frac{1.8 \times 10^{-5}}{0.100} \times 100\% = 1.8 \times 10^{-2} \%$$

由例 [3.2] 计算知， $0.100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{HAc}$ 溶液的解离度 α 为 1.34% ，

$$\alpha / \alpha_2 = \frac{1.34\%}{1.8 \times 10^{-2}\%} = 74.4 (\text{倍})$$

解离度降低了 74.44 倍，可见同离子效应对平衡的影响很大。利用同离子效应，调节溶液的酸碱性，可控制弱电解质溶液中有关离子的浓度，进行金属离子的分离和提纯。

2. 缓冲溶液

缓冲作用：使溶液 pH 值基本保持不变的作用。具有缓冲作用的溶液，称为**缓冲溶液**。

缓冲作用原理：如 HAc+NaAc 混合液

外加适量碱 (OH^-)，平衡向右移动



外加适量酸 (H^+)，平衡向左移动

NaAc 抵消 H^+ ；HAc 抵消 OH^-

HAc+NaAc 混合溶液能抵抗少量外来酸、碱及少量水的稀释作用，而保持溶液 pH 值基本不变，为缓冲溶液

常见的缓冲溶液

如弱酸与弱酸盐、弱碱与弱碱盐等混合液，多元弱酸组成的两种不同酸度的盐混合液。

缓冲溶液	pK_i	pH 值范围
HAc-NaAc	4.76	3.6~5.6
$\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ - NH_4Cl	4.76	8.3~10.3
NaHCO_3 - Na_2CO_3	10.33	9.2~11.0
KH_2PO_4 - K_2HPO_4	7.20	5.9~8.0
H_3BO_3 - $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$	9.2	7.2~9.2

离子浓度计算

当 $c/K_a^\theta \geq 500$ 时, $\alpha < 5\%$, 取 $1 - \alpha \approx 1$, 其误差小于 0.2 %, 小于测量误差, 则有

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a^\theta}{c}}$$

$$c(\text{H}^+) = c\alpha = \sqrt{K_a^\theta c}$$

同理可推出一元弱碱中

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_b^\theta}{c}}$$

$$c(\text{OH}^-) = c\alpha = \sqrt{K_b^\theta c}$$

练习： 1. 下列物质哪些是酸，哪些是碱。



答：酸： HS^- H_2PO_4^- H_2S HAc H_2O

碱： HS^- CO_3^{2-} H_2PO_4^- NH_3 OH^- H_2O NO_3^-

2、对反应 $\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{OH}^-$ 来说，其中酸为（ ），碱为（ ）

A. H_2O 和 HPO_4^{2-}

B. H_2PO_4^- 和 H_2O

C. HPO_4^{2-} 和 OH^-

D. H_2PO_4^- 和 HPO_4^{2-}

答： B C

3、某一元弱酸的 K_a 是 10^{-7} , $0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 该酸溶液的 pH 为 ()

A.1 B. 2 C. 3 D. 4

答: D
4、恒温下, 某种溶液的一级电离常数约为 1.7×10^{-5} , 并有 1.3% 电离成离子, 该溶液的浓度是 () $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

A.0.13 B. 0.1 C. 2.0 D. 1.3

答: B

5、在 pH= 4.00 的 HAc 溶液中, HAc 的浓度为 ()

A. $5.6\times 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ B. $1\times 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$
C. $1.32\times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ D. $3.3\times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (HAc $K_a=1.77\times 10^{-5}$)

答: A

单项选择题

(1) $0.1 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ 的下列水溶液中，pH 最小的是 ()。

A. H_2S B. H_2CrO_4 C. NH_4Ac D. HAc

(2) 下列混合溶液中，属于缓冲溶液的是 ()。

A. 50g $0.2 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ HAc 与 50g $0.1 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ NaOH



B. 50g $0.1 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ HAc 与 50g $0.1 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ NaOH

C. 50g $0.2 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ HAc 与 50g $0.2 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ NaOH

D. 50g $0.2 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ HCl 与 50g $0.1 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

例3 常温下 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 的 $K_b=1.76\times 10^{-5}$, 求 $0.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 溶液中各种离子的浓度

解 分析溶液中存在的离子



溶液中有 NH_4^+ , OH^- , H^+ ,

同时 $[\text{OH}^-] = [\text{OH}^-]_{\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}} + [\text{OH}^-]_{\text{H}_2\text{O}}$
但水是极弱电解质, 所以, 可忽略 $[\text{OH}^-]_{\text{H}_2\text{O}}$

又 $\because c_{\text{碱}}/K_b > 500$

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b \cdot c} = 2.96 \times 10^{-3} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}) = [\text{NH}_4^+]$$

$\therefore$

$$[\text{H}^+] = \frac{K_w}{[\text{OH}^-]} = 3.36 \times 10^{-12} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

§ 3.4 难溶电解质的沉淀溶解平衡

3.4.1 沉淀溶解平衡与溶度积

难溶电解质：

溶解度 $< 0.01\text{g}/100\text{gH}_2\text{O}$

微溶电解质：

溶解度 $0.1\text{g}\sim 0.01\text{g}/100\text{gH}_2\text{O}$

易溶电解质：

溶解度 $> 0.1\text{g}/100\text{gH}_2\text{O}$



1. 溶度积




在一定条件下，当溶解与沉淀的速率相等时，便建立了固体和溶液中离子之间的动态平衡，叫做**溶解 - 沉淀平衡**。其平衡常数表达式为

$$K^{\ominus} = K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{BaSO}_4) = c(\text{Ba}^{2+})c(\text{SO}_4^{2-})$$

上式表明：难溶电解质的饱和溶液中，当温度一定时，各组分离子浓度幂的乘积为一常数，这个平衡常数称为**溶度积常数** $K_{\text{sp}}^{\ominus}$ 简称**溶度积**。

对于通式



溶度积的表达式简写为 $K_{sp}^{\theta}(A_nB_m) = \{c(A^{m+})\}^n \cdot \{c(B^{n-})\}^m$

K_{sp}^{θ} 是表征难溶电解质溶解能力的特性常数。与浓度无关，与温度有关，书后附表 6 有常见难溶电解质溶度积的实验数据 K_{sp}^{θ} ，粗略计算可当做 K_{sp} 使用。


2. 溶度积与溶解度

溶度积 (K_{sp}^{θ}) 和溶解度 (s) 都可以表示难溶电解质在水中的溶解情况，可进行相互换算。

在要注意，溶解度采用的单位为 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

[例3.5] 已知298.15K时, $K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{BaSO}_4)=1.08 \times 10^{-10}$, 求 BaSO_4 的溶解度。

解: 设 BaSO_4 的溶解度为 $s \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则由



$$(\text{BaSO}_4) = c(\text{Ba}^{2+})c(\text{SO}_4^{2-}) = s^2$$

$$s = \sqrt{K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{BaSO}_4)} = \sqrt{1.08 \times 10^{-10}} = 1.04 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

对于基本上不水解的 **AB 型** 难溶强电解质, 其溶解度在数值

上等于其溶度积的平方根, 即


$$s = \sqrt{K_{\text{sp}}^{\theta}}$$

AB₂ 型或 A₂B 型 难溶强电解质 (如 Ag_2CrO_4 、 CaF_2 等)

其溶度积与溶解度间的关系

$$s = \sqrt[3]{\frac{K_{\text{sp}}^{\theta}}{4}}$$


例 10.5 298K , Ag_2CrO_4 的 $s = 1.34 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 求 K_{sp}



$$\therefore K_{\text{sp}} = [\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}] = (2s)^2s = 4s^3 = 9.62 \times 10^{-12}$$

例 10.7 已知 $K_{\text{sp}}\text{Mg}(\text{OH})_2 = 1.2 \times 10^{-11}$ 求在纯水中 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的溶解

度: 设 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 溶解度为 s , 则



$$\therefore K_{\text{sp}} = [\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = s(2s)^2 = 4s^3 = 1.2 \times 10^{-11}$$


$$\therefore s = 1.44 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

3. 溶度积规则及其应用

1) 溶度积规

则根据

$$\Delta_r G_m \begin{cases} < \\ = \\ > \end{cases} 0 \begin{cases} \text{反应正向进行} \\ \text{平衡状态} \\ \text{反应逆向进行} \end{cases}$$



$$\text{离子积 } Q = \{c(A^{n+})\}^m \{c(B^{m-})\}^n$$

即溶度积规则

$$Q \begin{cases} < K_{sp} \\ = K_{sp} \\ > K_{sp} \end{cases} \begin{cases} \text{反应正向进行} \\ \text{平衡状态} \\ \text{反应逆向进行} \end{cases}$$



2) 沉淀的生成及同离子效应

(1) 沉淀的生成

[例 3.6] 在 20mL $0.020\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ Na_2SO_4 溶液中加入 10mL $0.20\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ BaCl_2 溶液, 有无 BaSO_4 沉淀生成? 各相关离子浓度为

解 BaCl_2 溶液液混合后, 无总体积为 0.03L, 各相关离子浓度为

$$c(\text{Ba}^{2+}) = 0.01\text{L} \times 0.20\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} / 0.03\text{L} = 0.067\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$c(\text{SO}_4^{2-}) = 0.02\text{L} \times 0.02\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} / 0.03\text{L} = 0.013\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

离子积 $Q = c(\text{Ba}^{2+}) \cdot c(\text{SO}_4^{2-}) = 0.067 \times 0.013 = 8.71 \times 10^{-4}$

$$Q > K_{\text{sp}}^{\theta}, \text{ 故 } \text{BaSO}_4 \text{ 沉淀能生成。}$$

例 1 将等体积的 $4 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ AgNO}_3$ 和 $4 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ K}_2\text{CrO}_4$ 混合，是否有 $\text{Ag}_2\text{CrO}_4 \downarrow$ ？已知， $K_{\text{sp}} = 9 \times 10^{-12}$


解：

$$\because Q = c_{\text{Ag}^+}^2 \cdot c_{\text{CrO}_4^{2-}} = \left(\frac{4 \times 10^{-3}}{2} \right)^2 \left(\frac{4 \times 10^{-3}}{2} \right) = 8 \times 10^{-9}$$

$\therefore Q > K_{\text{sp}}$ 有沉淀生成

(2) 同离子效应


 平衡移动方向



向难溶电解质加入含相同离子的强电解质，而使难溶电解质溶解度降低的现象也称作**同离子效应**。

[例 3.7] 求 298.15K 时, AgCl 在 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaCl 溶液中的溶解度。 (已知 $K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{AgCl})=1.77\times 10^{-10}$)

解: 设 AgCl 在 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaCl}$ 溶液中的溶解度为 $s=x\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 则



由于 $K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{AgCl})$ 很小, 即 AgCl 溶解度很小, 则 $x+0.10\approx 0.10$

$$\text{所以 } x=1.77\times 10^{-9} \quad s=1.77\times 10^{-9}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

即 298.15K 时, AgCl 在 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaCl}$ 溶液中的溶解度为 $1.77\times 10^{-9}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 相当于在纯水中的溶解度 ($1.33\times 10^{-5}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 的万分之一。

3.4.2 分步沉淀

在含有等浓度的 Cl^- 和 I^- 混合溶液中，逐滴加入 AgNO_3 溶液。

现象：先产生黄色 AgI 沉淀，后来出现白色 AgCl 沉淀。

混合溶液中，多种离子发生先后沉淀的现象称为**分步沉淀**。一般当 $c(\text{离子}) < 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，认为沉淀完全。

利用分步沉淀，可进行离子的分离。

[例 3.8] 某溶液中含有 $0.010\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Cl}^-$ 和 $0.010\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{I}^-$ ，逐滴加入 AgNO_3 溶液，哪种离子首先被沉淀出来？当第二种离子开始沉淀析出时，第一种离子是否被沉淀完全？（忽略溶液体积变化）

解：查表 $K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgCl})=1.77\times 10^{-10}$ ， $K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgI})=8.52\times 10^{-17}$

根据溶度积规则，生成 AgCl 、 AgI 所需 Ag^+ 的最低浓度分别为

$$\text{AgCl: } c_1(\text{Ag}^+) > \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgCl})}{c(\text{Cl}^-)} (c^\theta)^2 = \frac{1.77 \times 10^{-10}}{0.010} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} = 1.77 \times 10^{-8} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$\text{AgI: } c_2(\text{Ag}^+) > \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgI})}{c(\text{I}^-)} (c^\theta)^2 = \frac{8.52 \times 10^{-17}}{0.010} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} = 8.52 \times 10^{-15} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$c_1(\text{Ag}^+) \gg c_2(\text{Ag}^+)$ ，所以 AgI 先沉淀出来， AgCl 后沉淀出来。

[例 3.8] 某溶液中含有 $0.010\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Cl}^-$ 和 $0.010\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{I}^-$ ，逐滴加入 AgNO_3 溶液，哪种离子首先被沉淀出来？当第二种离子开始沉淀析出时，第一种离子是否被沉淀完全？（忽略溶液体积变化）

当 AgCl 开始沉淀的前一瞬间，溶液中的 $c(\text{Ag}^+)$ 必须同时满足下列两个关系式

在 AgCl 开始沉淀的前一瞬间，溶液中

即 $c(\text{I}^-) = 4.81 \times 10^{-9} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} < 1.0 \times 10^{-5} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，即溶液中 I^- 已沉淀完全，所以通过逐滴加入 AgNO_3 溶液即可达

沉淀次序：同类型、同浓度， K_{sp} 小的先沉淀；
不同

类型，须计算开始沉淀所需沉淀剂的

2、如果某一含 CO_3^{2-} 离子 $0.0001\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的溶液与等体积 II A 族某金属离子的 $0.0001\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 溶液混合，下列碳酸盐会沉淀出来的是 ()

	$K_{\text{sp}}(298\text{k})$
A. MgCO_3	1.1×10^{-5}
B. CaCO_3	5.0×10^{-9}
C. SnCO_3	1.1×10^{-10}
D. BaCO_3	5.5×10^{-10}

答： C D

6、 Cl^- , Br^- , I^- 都能与 Ag^+ 生成难溶性银盐, 当混合溶液中上述三种离子的浓度都是 $0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时, 加入硝酸银溶液, () 首先沉淀析出, () 最后析出

A. AgI B. AgBr C. AgCl D. Ag

($K_{\text{sp}} \text{AgCl} = 1.56 \times 10^{-10}$; $K_{\text{sp}} \text{AgBr} = 7.7 \times 10^{-13}$; $K_{\text{sp}} \text{AgI} = 1.5 \times 10^{-16}$)

答: A C

3.4.3 沉淀的溶解和转化

1. 沉淀的溶解

1) 生成弱电解质

利用酸与难溶电解质的组分离子结合成可溶性弱电解质，如 $\text{Mg(OH)}_2 (\text{s}) \rightleftharpoons \text{Mg}^{2+} + 2\text{OH}^-$

+




↓




2) 氧化还原法

利用氧化还原反应可降低难溶电解质组分离子的浓度，使 $Q < K_{\text{sp}}^{\theta}$ ，于是平衡向着沉淀溶解方向移动。




3) 生成难解离的配离子


若难溶电解质中解离出的简单离子能与某些试剂形成配离子，使简单离子的浓度降低，从而达到 $Q < K_{sp}^{\theta}$ ，使沉淀溶解。



+




↓



2. 沉淀的转化

借助于某一试剂，将一种难溶电解质向另一种难溶电解质转变的过程，称为**沉淀的转化**。




一般说来，由一种难溶的电解质转化为更难溶的电解质的过程很容易实现，而由一种很难溶的电解质转化为不太难溶的电解质则比较困难。

§ 3.5 配位化合物和配离子的解离平衡


3.5.1 配位化合物的组成和命名

1. 配合物的组成



1. 配合物的组成

配位原子



中心
原子
(形成
体)



配
体



配
位
数

1) 形成体

在配合物内界，位于中心位置的带正电荷的离子（或中性原子）称为配合物的**中心离子**（或原子），也叫配合物的形成体。

- 形成体通常是金属阳离子和原子，如 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 中的 Cu^{2+} ， $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 中的 Fe^{2+} ， $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ 中的 Ni， $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ 中的 Fe。

少数高氧化态的非金属元素也可作为中心离子，如 $[\text{SiF}_6]^{2-}$ 中的 Si^{4+} ， $[\text{BF}_4]^-$ 中的 B^{3+} 。

2) 配位个体、配位体和配位原子

- 配位个体——形成体与一定数目配体形成的结构单元
- 配位体 (简称配体)——与形成体结合的离子或中性分子

如



配体



常见的配体 阴离子: X^- 、 OH^- 、 CN^-

中性分子: NH_3 、 H_2O 、 CO 、 RNH_2 (胺)

- **配位原子——配体中提供孤电子对与形成体形成配位键的原子**

常见的配位原子： N、 O、 S、 C、 卤素原子

如



配体



配位原子



2. 配位个体、配体及配位原子

- 配体：根据一个配体中所含配位原子个数
配体分为单齿配体和多齿配体

	单齿配体	多齿配体
一个配体所含 配位原子个数	1	2 个或 2 个以上
举例	NH_3 、 X^- OH^-	$\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$



常见单齿配体

中性分子 配体	H_2O 水	NH_3 氨	CO 羰基	CH_3NH_2 甲胺
配位原子	O	N	C	N

阴离子 配体	F^- 氟	Cl^- 氯	Br^- 溴	I^- 碘	OH^- 羟基	CN^- 氰	NO_2^- 硝基
配位原子	F	Cl	Br	I	O	C	N

阴离子 配体	ONO^- 亚硝酸根	SCN^- 硫氰酸根	NCS^- 异硫氰酸根
配位原子	O	S	N

常见多齿配体

分子式	名称	缩写符号
	草酸根	(OX)
	乙二胺	(en)
	邻菲罗啉	(o-phen)
	联吡啶	(bpy)
	乙二胺 四乙酸	(H ₄ edta)

3) 配位数—与一个形成体成键的配位原子总数

配位个体	配位体		配位原子	配位数
$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	NH_3	单齿	N	4
$[\text{CoCl}_3(\text{NH}_3)_3]$	Cl^- NH_3	单齿	Cl N	6
$[\text{Cu}(\text{en})_2]^{2+}$	en	双齿	N	4

配体为单齿，配位数 = 配体的总数
配体为多齿，配位数 $\neq$ 配体的数目

4) 配离子的电荷—形成体和配体电荷的代数和

配离子电荷 = 形成体与配体电荷的代数和

= - 外界离子的电荷

配合物	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$	$\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
形成体	Cu^{2+}	Fe^{2+}
配体	NH_3	CN^-
配离子电荷	+2	$(+2) + (-1) \times 6 = -4$
外界	SO_4^{2-}	K^+
配离子	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$

2. 配合物的命名及书写

1) 配合物的命名

- 配合物：阴离子在前，阳离子在后
- 配位个体：配体→合→形成体→（形成体氧化数）
阴离子→中性分子
无机配体→有机配体
同类配体以配位原子元素符号英文字母次序排列
- 配体间用“.”隔开，配体数用一、二等表示
- 形成体氧化数用罗马数字表示

遵循
一般
无机
物命
名原
则

例 题 命名下列配合物和配离子：

- a. $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$ 氯化二氨合银
- b. $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 硫酸四氨合铜
- c. $\text{H}[\text{PtCl}_3(\text{NH}_3)]$ (I) 氯·氨合铂 (II)
- d. $\text{K}_2[\text{Co}(\text{NH}_3)\text{H}_2\text{OCl}_4]$ (II) 四氯·一氨·一水合钴 (II)
- e. $[\text{Pt}(\text{NH}_2)(\text{NO}_2)(\text{NH}_3)_4]$ 酸钾氨基·硝基·四氨合铂
- f. $\text{H}_2[\text{SiF}_6]$ (II) 六氟合硅 (IV)
- g. $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_4$ 四氯化六氨合铂
- h. $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$ (IV) 二氯·二氨合铂
- i. $\text{Na}[\text{Cr}(\text{NCS})_4(\text{NH}_3)_2]$ 四异硫氰酸根·二氨合铬 (III) 酸

2) 配合物的书写

原则

- 含有配离子的配合物：阳离子在前，
阴离子在后
- 整个配位个体用方括号 [] 括起来
- 配位个体：形成体 → 配体
阴离子 → 中性分子
无机配体 → 有机配体

同类配体以配位原子元素符号英文字母顺序排列

例 题 写出下列配合物的化学式

- a. $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$ 氯化二氨合银
- b. $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 硫酸四氨合铜
- c. $\text{H}[\text{PtCl}_3(\text{NH}_3)]$ (II) 氯·氨合铂 (II)
- d. $\text{K}_2[\text{Co}(\text{NH}_3)\text{H}_2\text{OCl}_4]$ 四氯·一氨·一水合钴 (II)
- e. $[\text{Pt}(\text{NH}_2)(\text{NO}_2)(\text{NH}_3)_4]$ 酸钾氨基·硝基·四氨合铂
- f. $\text{H}_2[\text{SiF}_6]$ (II) 六氟合硅 (IV)
- g. $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_4$ 四氯化六氨合铂
- h. $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$ (IV) 氯·二氨合铂
- i. $\text{Na}[\text{Cr}(\text{NCS})_4(\text{NH}_3)_2]$ 四异硫氰酸根·二氨合铬 (III) 酸

类型	化学式	命名
配位酸	$\text{H}[\text{BF}_4]$	四氟合硼 (III) 酸
	$\text{H}_3[\text{AlF}_6]$	六氟合铝 (III) 酸
配位碱	$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4](\text{OH})_2$	氢氧化四氨合锌 (II)
	$[\text{Cr}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_5](\text{OH})_2$	氢氧化一羟基⊠五水合铬 (III)
配位盐	$\text{K}[\text{Al}(\text{OH})_4]$	四羟基合铝 (III) 酸钾
	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]\text{Cl}_3$	三氯化五氨⊠一水合钴 (III)
	$[\text{Pt}(\text{NH}_3)_6][\text{PtCl}_4]$	四氯合铂 (II) 酸六氨合铂 (II)
中性分子	$[\text{Ni}(\text{CO})_4]$	四羰基合镍
	$[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)_2]$	二氯⊠二氨合铂 (II)

注意

带倍数词头的无机含氧酸根阴离子配体，命名时需用括号括起来

如 $\text{Na}_3[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]$

二 (硫代硫酸根) 合银 (I) 酸钠

$\text{NH}_4[\text{Cr}(\text{NCS})_4(\text{NH}_3)_2]$

四 (异硫氰酸根) · 二氨合铬 (III) 酸铵

注意

- 有些配体具有相同的化学式，但由于配位原子不同，而有不同的命名

如

配体	配位原子	命名
ONO^-	O	亚硝酸根
NO_2	N	硝基
SCN^-	S	硫氰酸根
NCS^-	N	异硫氰酸根

注意

某些分子或基团，作配体后读法上有所改变

如

CO

羰基

OH⁻


羟基

NO

亚硝基

3.5.2 配位平衡

1. 配位平衡



同类型配离子，可以直接用 $K_{\text{f}(\text{稳})}^{\theta}$ 比较其稳定性；

不同类型配离子，需通过计算比较其稳定性。

中越稳定。

同一配离子的稳定常数与不稳定常数互为倒数，即

$$K_{\text{f}}^{\theta} \quad K_{\text{d}}^{\theta}$$


$$= 1/$$

2. 配位平衡的移动

1) 改变溶液的 pH

向深蓝色 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 溶液中加入适量的酸 (H^+)。

现象：溶液会变为浅蓝色。




一般地，两种配离子的稳定常数相差越大，配离子之间的转化越完全。

2) 配离子之间的转化

在某一配离子溶液中加入另一配体，若能形成更稳定的配离子，则原有的配位平衡被破坏，向着生成更稳定配离子的方向移动。

例如



K^θ 值很大， $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 可完全转化为 $[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ 。

3) 配离子与沉淀之间的转化


在配合物溶液中加入一种沉淀剂，若形成体（中心离子）与沉淀剂反应生成沉淀，则配位平衡会向着配离子解离的方向移动；同样，一种沉淀物也会因与配位剂作用而溶解。例如，AgCl溶于氨水的反应



[例 3.9] 计算 25°C , AgCl 在 6.0 mol·L⁻¹ 氨水溶液中的溶解度

解：查表知 $K_{sp}^{\theta}(\text{AgCl}) = 1.77 \times 10^{-10}$,

$K_f^{\theta}([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+) = 1.12 \times 10^7$, 设 25°C 时, AgCl 在氨水中的溶解度为 $x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$



初始浓度 / mol·L ⁻¹	6.0	0	0
----------------------------	-----	---	---

平衡浓度 / mol·L ⁻¹	6.0 - 2x	x	x
----------------------------	----------	---	---


$$K^{\theta} = \frac{c[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ \cdot c(\text{Cl}^-)}{\{c(\text{NH}_3)\}^2}$$

$$K_{sp}^{\theta}(\text{AgCl}) = c_{\text{Cl}^-} \cdot c_{\text{Ag}^+}$$

$$K_f^{\theta}([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+) = \frac{c_{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+}}{\{c_{\text{Ag}^+}\} \{c_{(\text{NH}_3)}\}^2}$$

[例 3.9] 计算 25°C , AgCl 在 6.0 mol·L⁻¹ 氨水溶液中的溶解度

解：查表知 $K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{AgCl})=1.77\times 10^{-10}$,
 $K_{\text{f}}^{\theta}([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+)=1.12\times 10^7$, 设 25°C 时, AgCl 在氨水中的溶解度为 $x \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$



初始浓度 / mol·L⁻¹ 6.0 0 0

平衡浓度 / mol·L⁻¹ 6.0 - 2x x x

$$K^{\theta} = \frac{\{c[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+\}c(\text{Cl}^-)}{\{c(\text{NH}_3)\}^2} = K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{AgCl}) K_{\text{f}}^{\theta}([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+) = \frac{x^2}{(6.0 - 2x)^2}$$

$$\text{即 } 1.12\times 10^7 \times 1.77\times 10^{-10} = \frac{x^2}{(6.0 - 2x)^2}$$

$$x = 0.24$$

故 25°C 时, AgCl 在 6.0 mol·L⁻¹ 氨水中的溶解度为 0.24 mol·L⁻¹。

3.5.3 配位化合物的应用

1. 分析化学方面

离子的定性鉴定

掩蔽剂



$6\text{H}_2\text{O}$ 萃取剂

2. 冶金工业方面

生物医药方面

电镀工业方面

面

$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ 为深蓝色，
 $[\text{Fe}(\text{SCN})_n]^{3-n}$ 呈血红色，
 $[\text{Co}(\text{NCS})_4]^{2-}$ 在丙酮中显艳蓝色

Fe^{3+} 干扰 Co^{2+} 鉴定，只要在溶液中加入 NaF ， F^- 与 Fe^{3+} 形成更稳定的无色配离子 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ ，即可避免 Fe^{3+} 对 Co^{2+} 鉴定的干扰。

单项选择题

(4) 在 PbI_2 沉淀中加入过量的 KI 溶液，使沉淀溶解的原因是

- A. 同离子效应
- B. 生成配位化合物
- C. 氧化还原作用
- D. 溶液碱性增强

(5) 下列说法中正确的是

- A. 在 H_2S 的饱和溶液中加入 Cu^{2+} ，溶液的 pH 将变小
- B. 分步沉淀的结果总能使两种溶度积不同的离子通过沉淀反应完全分离开
- C. 所谓沉淀完全是指沉淀剂将溶液中某一离子除净了
- D. 若某系统的溶液中离子积等于溶度积，则该系统必然存在固相

(6) 配离子的电荷是由 () 决定的。

A. 中心离子电荷

B. 配离子电荷

C. 中心离子电荷与配位体电荷的代数和
能知道

D. 通过实验测量才

(7) 在氨水中加入少许 NH_4Cl 后, NH_3 的离解度 α 和 pH 值变化正确的是 ()

A. α , pH 都增大

B. α 减小, pH 增大

C. α 增大, pH 变小

D. α 、pH 都减小

(1) B (2) A (3) C (4) B (5) A (6) C

(7) D



The End

Periodic table of the elements

Group	1	2											13	14	15	16	17	18
	I	II											III	IV	V	VI	VII	He
	IA	IIA											IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	
Period	Period 1																	
	1 H hydrogen 1.0079 1s ¹												2 He helium 4.00 1s ²					
	3 Li lithium 6.94 2s ¹	4 Be beryllium 9.01 2s ²											5 B boron 10.81 2s ² 2p ¹	6 C carbon 12.01 2s ² 2p ²	7 N nitrogen 14.01 2s ² 2p ³	8 O oxygen 16.00 2s ² 2p ⁴	9 F fluorine 19.00 2s ² 2p ⁵	10 Ne neon 20.18 2s ² 2p ⁶
	11 Na sodium 22.99 3s ¹	12 Mg magnesium 24.31 3s ²	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al aluminium 26.98 3s ² 3p ¹	14 Si silicon 28.09 3s ² 3p ²	15 P phosphorus 30.97 3s ² 3p ³	16 S sulfur 32.06 3s ² 3p ⁴	17 Cl chlorine 35.45 3s ² 3p ⁵	18 Ar argon 39.95 3s ² 3p ⁶
	19 K potassium 39.10 4s ¹	20 Ca calcium 40.08 4s ²	21 Sc scandium 44.96 3d ¹ 4s ²	22 Ti titanium 47.87 3d ² 4s ²	23 V vanadium 50.94 3d ³ 4s ²	24 Cr chromium 52.00 3d ⁴ 4s ¹	25 Mn manganese 54.94 3d ⁵ 4s ²	26 Fe iron 55.84 3d ⁶ 4s ²	27 Co cobalt 58.93 3d ⁷ 4s ²	28 Ni nickel 58.69 3d ⁸ 4s ²	29 Cu copper 63.55 3d ¹⁰ 4s ¹	30 Zn zinc 65.41 3d ¹⁰ 4s ²	31 Ga gallium 69.72 4s ² 4p ¹	32 Ge germanium 72.64 4s ² 4p ²	33 As arsenic 74.92 4s ² 4p ³	34 Se selenium 78.96 4s ² 4p ⁴	35 Br bromine 79.90 4s ² 4p ⁵	36 Kr krypton 83.80 4s ² 4p ⁶
	37 Rb rubidium 85.47 5s ¹	38 Sr strontium 87.62 5s ²	39 Y yttrium 88.91 4d ¹ 5s ²	40 Zr zirconium 91.22 4d ² 5s ²	41 Nb niobium 92.91 4d ⁴ 5s ¹	42 Mo molybdenum 95.94 4d ⁵ 5s ¹	43 Tc technetium (98) 4d ⁵ 5s ²	44 Ru ruthenium 101.07 4d ⁶ 5s ¹	45 Rh rhodium 102.90 4d ⁷ 5s ¹	46 Pd palladium 106.42 4d ¹⁰	47 Ag silver 107.87 4d ¹⁰ 5s ¹	48 Cd cadmium 112.41 4d ¹⁰ 5s ²	49 In indium 114.82 5s ² 5p ¹	50 Sn tin 118.71 5s ² 5p ²	51 Sb antimony 121.76 5s ² 5p ³	52 Te tellurium 127.60 5s ² 5p ⁴	53 I iodine 126.90 5s ² 5p ⁵	54 Xe xenon 131.29 5s ² 5p ⁶
	55 Cs caesium 132.91 6s ¹	56 Ba barium 137.33 6s ²	57 La lanthanum 138.91 5d ¹ 6s ²	72 Hf hafnium 178.49 5d ² 6s ²	73 Ta tantalum 180.95 5d ³ 6s ²	74 W tungsten 183.84 5d ⁴ 6s ²	75 Re rhenium 186.21 5d ⁵ 6s ²	76 Os osmium 190.23 5d ⁶ 6s ²	77 Ir iridium 192.22 5d ⁷ 6s ²	78 Pt platinum 195.08 5d ⁹ 6s ¹	79 Au gold 196.97 5d ¹⁰ 6s ¹	80 Hg mercury 200.59 5d ¹⁰ 6s ²	81 Tl thallium 204.38 6s ² 6p ¹	82 Pb lead 207.2 6s ² 6p ²	83 Bi bismuth 208.98 6s ² 6p ³	84 Po polonium (209) 6s ² 6p ⁴	85 At astatine (210) 6s ² 6p ⁵	86 Rn radon (222) 6s ² 6p ⁶
7	87 Fr francium (223) 7s ¹	88 Ra radium (226) 7s ²	89 Ac actinium (227) 6d ¹ 7s ²	104 Rf rutherfordium (261) 6d ⁴ 7s ²	105 Db dubnium (262) 6d ⁵ 7s ²	106 Sg seaborgium (263) 6d ⁶ 7s ²	107 Bh bohrium (262) 6d ⁷ 7s ²	108 Hs hassium (265) 6d ⁸ 7s ²	109 Mt meitnerium (266) 6d ⁹ 7s ²	110 Ds darmstadtium (271) 6d ¹⁰ 7s ²	111 Rg roentgenium (272) 6d ¹⁰ 7s ²	112	113	114	115	116	117	118
	6																	
	7																	
Molar masses (atomic weights) quoted to the number of significant figures given here can be regarded as typical of most naturally-occurring samples.																		
	6																	
	7																	
Lanthanoids (lanthanides)																		
Actinoids (actinides)																		

Molar masses (atomic weights) quoted to the number of significant figures given here can be regarded as typical of most naturally-occurring samples.