XDSY118019 期末考试第一部分

冯伊然 22302010009

问题描述

- 1. 给定参数a, b, u0, N, 计算坐标数组[u0, ..., uN]
- 2. 从1.中得到的坐标数组, 绘制散点图
- 3. 对于从多个参数a得到的坐标数组,以a为横坐标、x为纵坐标绘制散点图
- 4. 分析3.中得到的orbit diagram, 寻找使henon_map收敛为周期数列的a值

解答思路

将问题拆分成几个模块:

- 1. henon_map函数 给定参数a, b, 返回一个二元函数f(x, y),它是a和b对应的henon map函数。
- 2. 迭代并生成坐标数组[(x0, y0), ..., (xN, yN)]的函数trajectory() 给定函数f、初值u0 = (x0, y0)和迭代次数N。 初始化列表point_list = [u0]。 每次计算下一个(x, y)并加入 列表,最后返回这个列表。
- 3. 根据坐标数组绘制散点图的函数plot_trajectory()

用matplotlib.pyplot.scatter()。

值得注意的是,这里应该把整个数组传递给scatter(),而不是用一个for循环一个一个点地传递,那样会导致性能非常低。

- 4. 使用这些函数完成问题中的工作。具体地:
 - ① 输出轨迹[u0, ..., uN]: 直接打印trajectory()的返回值即可
 - ② 用轨迹绘制散点图: 直接对trajectory()的返回值调用plot_trajectory()
 - ③ 绘制orbit diagram: 取出trajectory()返回值中的x部分,与a进行plt.scatter()
 - ④ 寻找使henon map收敛为周期数列的a值:

在③中对不同的a值进行尝试,并且去掉迭代中前一半的点(只关注最终是否进入循环,前面的点会扰乱 我们的分析),

如果观察到图像上只有离散的点,对应的a值即使henon_map收敛为周期数列;否则,若图像看起来像是连续的线,则说明没有成为周期。

结论

我找到了以下使得henon map收敛为周期数列的a的值(b=0.3, u0=(0,0)): -0.12~1.05

1.23~1.25

1.300~1.304

1.4219~1.4221

代码使用方法

使用者只需要关注主函数部分。

要求的4部分中,每部分均用1个注释开头,标明代码对应哪部分要求。

第3、4部分展示了以上找到的收敛的henon_map,对应的取值在a_list中。可以修改a_list来观察a取其他值时的orbit diagram。


结果图

1. 输出轨迹

这里N=10000,结果极长,只展示一小部分。


199417-982218, 6.139648179159674), (6.799226198407722, -0.1347826496697139), (-0.07902618207428), 6.067399026734215, -0.4348191116996878, (-0.873801259674279), (-0.66739902573427), (-0.66739902573427), (-0.667390125967427), (-0.9682157451342906), (-0.57012545154340902), (1.770231425154967, -0.023667100269067), (-1.282229655653707), 0.311156402754527), (-0.904227746654428, -0.324667100206907), (-1.28229655653707), (-0.904227746654428), -0.324426441990693), (-0.90427746954428), (-0.90427746654428), -0.9048157672666656), (-0.55771226042967907), 0.1254419689757689, -0.170241968927), (-0.7901458304744069, -0.2692663114240764), (-1.48356716867807), -0.8881147474902468), (-0.9048157651276697807), (-0.9048157651276697807), (-0.9048157651276697807), (-0.904815765137747), (-0.9048157651276697807), (-0.9048157651276697807), (-0.9048157651276697807), (-0.9048157651276697807), (-0.9048157651276697807), (-0.9048157651276697807), (-0.9048157651276697807), (-0.9048157651276697807), (-0.90481576697

2. 绘制a=1.4, b=0.3, u0=(0, 0)时的轨迹



3. 绘制orbit diagram

注意,这里省略了前一半的点,以免收敛到周期前的点干扰分析。



4. 绘制Henon map收敛到周期轨道时的轨迹

注意,这里没有省略前一半点,而是显示完整轨迹,所以有许多比较淡的点,他们是收敛到周期前的。

