

БЕКТЕМ
Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
алдындагы Дары каражаттары
жана медициналык буюмдар
департаментинин
директорунун орун басары
Кысанов Т.А.
«15» сентябрь 2025-ж.

**ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА
НУСКАМА**

ДИОСПЕРИДИН

Соодадагы аталышы

Диосперидин.

Эл аралык патенттелбеген аталышы

Жок.

Дарынын түрү

Жука чел кабык капталган таблеткалар.

Курамы: жука чел кабык капталган ар бир таблеткада төмөнкүлөр камтылат:

Диосмин 450 мг

Гесперидин 50 мг

Көмөкчү заттар: микрокристаллдуу целлюлоза, натрий крахмалгликоляты, желатин, тальк, магний стеараты.

Кабыгында камтылган: глицерол, гипромеллоза 2190, макрогол 6000, натрий лаурилсульфаты, темир (III) сары оксиди (E172), темир (III) кызыл оксиди (E 172), титан диоксиди (E 171), магний стеараты.

Сүрөттөмөсү

Сүйрү, эки жагы томпок бир жагында кертиги бар, кызгылт саргыч боз түстөгү жука чел кабык капталган таблеткалар.

Фармадарылык тобу

Ангиопротекторлор. Диосмин башка препараттар менен айкалышта.

АТХ коду: C05CA53

Фармакологиялык касиеттери

Фармакодинамикасы:

Диосперидин кан тамырды кубаттандыруучу жана ангиопротективдүү касиеттерге ээ. Вена деңгээлинде – кан тамырдын чоюлушун жана кан тамырдагы уюп калууларды азайтат. Микроциркуляция деңгээлинде - капиллярлардын өткөргүчтүгү, морттугу төмөндөйт жана туруктуулугу жогорулайт. Капиллярдык морттугу жогору бейтаптарда дары менен дарылоодон кийин ангиостереометриялык ченелген капиллярдык туруктуулугу жогорулаган. Кан тамырдын кубаттуулугу жогорулайт: веналык окклюзиялык плетизмографиянын жардамы менен веналык бошотуу убактысы азайганы көрсөтүлгөн. Колу-буттардын функционалдык жана органикалык өнөкөт веналык жетишсиздигин дарылоодо, ошондой эле проктологияда геморройду дарылоодо дарылык натыйжалуулугу далилденген.

Диосмин — биофлавоноид. Гесперидин менен айкалышта кан тамырды кубаттандыруучу жана ангиопротективдүү таасир берет. Чымырдуулугун жогорулатат жана кан тамырдын чоюлчактыгын азайтат, ал кан тамырдагы уюп калууларды азайтууга көмөк берет; капиллярлардын өткөргүчтүгүн төмөндөтөт жана алардын туруктуулугун жогорулатат; микроциркуляцияны жана лимфадан чыгууну жакшыртат. Кол буттардын учтарынын өнөкөт вена жетишсиздигин дарылоо, өнөкөт геморройду жана курч геморроидалдык приступтарын дарылоо үчүн гесперидин менен аралаштырылып колдонулат.

Фармакокинетикасы:

Ашказан-ичеги жолунда тез сиңет. Препарат негизинен заң менен бөлүнүп чыгат. Препараттын кабыл алынган өлчөмүнүн орточо 14 % заара менен бөлүнүп чыгат.

Жарым жартылай бөлүп чыгаруу мезгили 11 саатты түзөт. Препарат зат алмашуунун жогорку деңгээлине ээ, ал заарада фенол кислотасынын болушу менен көрсөтүлөт.

Колдонууга көрсөтмөлөр

- органикалык жана функционалдык табияттан буттардын өнөкөт веналимфалык жетишсиздиги (шишик, оору, буттардын оор болушу);
- курч жана өнөкөт геморрой.

Каршы көрсөтмөлөр

- препаратка белгилүү жогору сезгичтик.
- бала курак.

Колдонуу жолу жана дозасы

Пероралдуу колдонуу үчүн.

Өнөкөт веналимфалык жетишсиздикти дарылоо (шишик, оору, буттардын оор болушу, түнкү карышуулар, трофикалык жара, лимфедема ж.б.): тамактануу учурунда суткасына 2 таблетка (эки жолу кабыл алууга). Бир жума кабыл алгандан кийин тамактануу учурунда суткасына 2 таблетканы бир убакта кабыл алууга болот.

Өнөкөт геморрой: тамактануу учурунда суткасына 2 таблетка (эки жолу кабыл алууга). Бир жума кабыл алгандан кийин тамактануу учурунда суткасына 2 таблетканы бир убакта кабыл алууга болот.

Курч геморрой: алгачкы 4 күндүн ичинде суткасына 6 таблетка жана кийинки 3 күндүн ичинде суткасына 4 таблетка. Тамактануу мезгилинде кабыл алынат. Таблеткалардын суткалык саны 2-3 бөлүп кабыл алынат.

Дарылоо курсу жана дозалоо колдонуу көрсөтмөсүнө, оорунун өтүшүнө жараша болот жана дарыгер тарабынан аныкталат. Дарылоонун орточо узактыгы 2-3 айды түзөт.

Кыйыр таасири

Тамак сиңирүү системасы тарабынан: тез-тез – ич өтүү, көңүл айнуу, кусуу, диспепсия; көп эмес – колиттер.

БНС тарабынан: сейрек – баш айлануу, баш оору, жалпы талмоорсу.

Тери катмары тарабынан: сейрек – бөртмө, кычышуу, бөрү жатыш; жыштыгы такталбаган – бет, эрин, кабактын обочолонгон шишимиги, айрым учурларда – ангионевротикалык шишимик.

Ашыкча доза

Дозасынан ашыруу учурлары белгиленген эмес.

Башка дары каражаттары менен өз ара таасири

Белгиленген эмес.

Өзгөчө көрсөтмөлөр

Геморрой күчөгөндө, бул препараттын дайындалышы башка бузулууларды атайын дарылоону алмаштырбайт. Дарылоо узактыгы «Колдонуу жолу жана дозасы» бөлүмүндө көрсөтүлгөн мөөнөттөрдөн ашпашы керек. Эгерде кыска дарылоодон кийин симптомдору кетпесе, проктологиялык текшерүү жүргүзүп, колдонулуп жаткан дарылоону кайра карап чыгуу керек. Кан тамырда кан айлануунун бузулуусу болгондо сергек жакшы тең салмакталган жашоо стили менен айкалышта камсыздалат, анда күндө көп жүрүүдөн алыс болуу, дене салмагын азайтуу, жөө жүрүү керек жана кээ бир учурда кандын айланышын жакшырткан атайын байпак кийүү керек.

Кош бойлуулук жана бала эмизүү:

Кош бойлуулуктун алгачкы үч айында препаратты колдонуудан кармануу керек.

Препараттын эне сүтүнө бөлүнүп чыгуусу боюнча маалыматтар жоктугунан улам бала эмизген энелерге препаратты кабыл алуу сунушталбайт.

Автомобиль айдоодо жана психикалык жана физикалык реакциялардын жогорку ыладамдыгын талап кылган иштерди аткарууда таасири:

Таасир бербейт.

Чыгаруу формасы:

ПВХ блистерде жука чел кабык менен капталган 15 таблетка.

2 ПВХ блистер медициналык колдонуу боюнча нускамасы менен бирге картон таңгакта.

Сактоо шарты:

25°C дан жогору эмес аба табында, кургак, жарыктан корголгон жерде сакталат.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек!

Жарактуулук мөөнөтү:

3 жыл. Жарактуулук мөөнөтү бүткөндөн кийин колдонууга болбойт.

Дарыканадан берүү шарты:

Рецепти жок.

Үчүн өндүрүлдү:

SPEY MEDICAL LTD.

Lynton House, 7-12 Tavistock Square, London, WC1H 9LT, Улуу Британия

Өндүрүүчү:

HELP S.A.,

Pedini Ioanninou, Янина,

45500, Греция

Кыргыз Республикасынын аймагында продукттун сапаты боюнча

керектөөчүлөрдөн арыз-доолорду кабыл алган уюмдун дареги:

«Аман Фарм» ЖЧК, Бишкек ш., Кыргыз Республикасы, Тыныстанов көч. 4а үй, 11-батир,

E-mail: aman.pharm12@gmail.com